

# الأمان النسبي للمبيدات الميكروبية والحيوية

إعداد

أ.د. زيدان هندي عبد الحميد

أستاذ كيمياء المبيدات والسموم  
جامعة عين شمس - كلية الزراعة

الناشر

كانزا جروب





# الأمان النسبي للمبيدات الميكروبية والحيوية على الفقاريات واللافقاريات

الأستاذ الدكتور

زيدان هندي عبد الحميد

أستاذ كيمياء المبيدات والسموم

كلية الزراعة - جامعة عين شمس

الناشر

كانزا جروب

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

# الأمان النسبي للمبيدات الميكروبية والحيوية علي الفقاريات واللافقاريات

© إعداد: الأستاذ الدكتور

زيدان هندي عبد الحميد

أستاذ كيمياء المبيدات والسموم  
كلية الزراعة — جامعة عين شمس

© التنسيق الداخلي: أحمد حسين عواد

© الناشر: كانزا جروب للنشر والتوزيع

٩ عمارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس  
الدمرداش — القاهرة — جمهورية مصر العربية  
ت/ف: ٤٨٥٤٧١١ — ٤٨٣٥٥٤٣ (٢٠٢)

© الطبعة: الأولى ٢٠٠٦ (جميع حقوق الطبع والنشر © ٢٠٠٥ محفوظة للناشر)

© رقم الإيداع: ١٦٤٢٩ / ٢٠٠٥

لا يجوز طبع أو استنساخ أو نقل أو تصوير أي جزء من مادة  
الكتاب بأي طريقة كانت إلا بأذن كتابي مسبق من الناشر.



# إهداء

✽ إلي والدي ووالدتي رحمة الله عليهما .....

✽ تحية وإعزاز وتقدير إلي زوجتي العزيزة ....

**أ.د. نجوي محمود محمد حسين**

رئيس بحوث معهد بحوث وقاية النبات

مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة

✽ الزوجة التي شاركتني مر الحياة وحلوها.... وكانت لي عوناً كبيراً

ولأسرتي خير راعياً.... مع الدعاء أن يحفظها الله ويرعاها....

✽ أبنائي الأعزاء/ عمرو زيدان – أيمن زيدان – خالد زيدان

وفقههم الله .... فقد كانوا عوناً وسنداً لنا كل الوقت.

✽ أساتذتي وزملائي بكلية الزراعة جامعة عين شمس – الجامعات الأخرى

– مراكز البحوث والمعاهد البحثية.... لما قدموه لي من عون صادق.

✽ أحفادي/ سليمي أيمن      زياد عمرو      سليمي أيمن



# فهرس المكتاب

الصفحة

١

\* مقدمة الكتاب

## الباب الأول

٥

### متطلبات تسجيل واعتبارات الأمان في وسائل مكافحة الميكروبية للأفات

٧

الفصل الأول: المبيدات الحيوية الميكروبية بين الواقع التقنى والتجارى ومتطلبات التسجيل

٨

باسيلليس ثورينجينيميز

١٢

باسيلليس سفيريكس

١٣

الفطريات الممرضة للحشرات

١٥

البكتولوفيروسات

١٩

البروتوزوا

٢٠

المراجع

٢١

الفصل الثاني: المركبات المضادة للحشرات والمشتقة من الكائنات الدقيقة

٢٣

الألكيلوكيميات المضادة للحشرات

٢٣

المركبات المضادة للحشرات التي أشتقت من البكتريا غير الخطية:

أحماض الكل تتر هيدروفيوران - Amino levulinic - الديابروتيكينات -

ثيوليوتين - ثورنجيسين - زينورليديتات

٢٦

المركبات المضادة للحشرات المشتقة من الاكتينومايسيتس:

المضادات الحيوية العامة - المضاد الحيوى A 204 A - إ- الانوسين -

الوساميدين - ليلاموماسين - المضاد الحيوى Antibiotic B-41

٣٠

المركبات العطرية للنيثرو:

أفيريكتينات - ليوريوتين - بافيلومايسينات - سيترومايسين - كونكافا ميسينات -

ديوكسا بيرولومايسين - الفيريغوجينات - جريزولين - ليوكانيسين -

ميليبيسينات - نيكومايسين - لوكسوجروليدين - البيريبيديتات -

راسيمومايسينات - رودلوتين - سينيوسينات - تترانكتين - ثيوليوتين -

\* فالينومايسين

٣٨

المركبات المضادة للحشرات المشتقة من الفطريات:

الفينوليكتات - بولى (أستيل) أستيلينات - تريينونيز - أفلاتوكسينات - أفلاتريمات

- أفلافانينات - أفلافازول - أريثارينات - أسبرتتين - أسبرينومين -

لوراسيريونات وفونيسيينات - أزوكسى بزينات - مشتقات بينافالين - بريفانا

ميدات - كاريونارينات - سيريريوسيدات - شيتوجلوسينا - كروميدات -

سيترينين - كليوسين - كورنيسين - كلمورين - سيكوليول - حامض

سيكلوبيازوونيك - سيتوكالسينات - نيندروشين - نيرموسين - إى- ٦٤

ومثبطات الثبول بروتينيز - مركبات إيثيلينوات - إيمونين - أيبورومينات -  
أرجوفالين - ليوجينيتين - فيوزلوفينينات - حامض فيوزلريك - جريزوفولين -  
ميثيليديك أسيد - مكسينيل فيزوفورين

#### مشتقات الهيدروكينون:

أيزوبايكسينونات - أيزوبيمادترينات - حامض كوجيك - الكوتانينات والمركبات  
المرتبطة - لاكتانرس - ليبورين - مونيلفورمين - ماكروفورينات -  
ماسمانينات - ميلينات - مونوسيرينات - مسكيمول والمركبات المرتبطة -  
حامض ميكوفينوليك - صبغات نافثازارين - نيجرا جيلين - نومينين -  
أوكراتوكسينات - وكرينولات - باراهيركوسيدات والمركبات القريبية -  
أوكرامينات - باسبالينين ومشتقاته - باتولين - باكسيلينات - حامض بنسيليك -  
بنتريمات والمركبات القريبية - بيرامين - فومالاكتون - بيربروبين - رادريجات -  
- مشتقات راسولوسين - روبرتوكسينات - ريجيولوسين - شيارلينات -  
الاستيرولات - سليبينات - تينيو أزيك أسيد - ترفينلات - تريتريمات -  
ترايكوسيسينات - توليبين - توبينجينينات - فيريوكولجين وأقرانها - فيرسيميد -  
فيوميلين - زانثونات - زيرالونات

#### الببتيدات الحلقية المضادة للحشرات

ألفا - أمانيين - أسبوكراسين - باسبانوليد - بوفاريسين - سيكلوسبورينات -  
ديستروكسينات - إيفراينتين دي - أنياتينات - إيسارينات - شيراميد A

#### البروتينات المضادة للحشرات

مفبطات ألفا - أميليز - توكسينات باسيليس سفيريكس - توكسينات باسيليس  
ثورينجينيسيز - لوفاريا سلفوروسينيس السام للجليكوبروتين - كيتينيزيس -  
كوليسترول أكسيديز - توكسين الكلوسترديوم - هيرسيوتيلينات - ليكتينات -  
فوسفوليزيس - توكسينات فوتورليس لومينيس - بروتيزيس - ريستريكوسين -  
البروتينات الخضرية كمبيدات حشرية - بروتينات غير موصفة

#### التشيط

- ٨٠  
٨١ اتجاهات المستقبل / المنظور التجارى  
٨٥ الفصل الثالث: متطلبات تسجيل واعتبارات الأمان في وسائل مكافحة الميكروبية للأفات  
٨٥ أولا : المتطلبات من أمريكا الشمالية  
٩٧ ثانيا : الاتحاد الاقتصادي الأوروبى  
١٠٩ ثالثا : متطلبات التسجيل واعتبارات الأمان للوسائل الميكروبية في مكافحة الآفات  
في روسيا الاتحادية وبعض الدول المجاورة  
١٢٤ رابعا : متطلبات تسجيل واعتبارات الأمان لوسائل مكافحة الميكروبية في اليابان  
١٤٤ خامسا: تسجيل المبيدات الكيميائية والحيوية الميكروبية (دون تفرقة) في مصر  
١٧٥ سادسا: دلائل تسجيل الوسائل الميكروبية في مكافحة الآفات في كندا

## الباب الثاني

### المنظور الأيكولوجى

### (التأثيرات المحتملة للمبيدات الحشرية الميكروبية)

- ٢٠٩  
٢١١ الفصل الأول: التأثيرات المحتملة للمبيدات الحشرية الميكروبية على مفصليات  
الأرجل النافعة في البيئات الأرضية

٢١٢	الوسائل المصيبة للأمراض وتداخلاتها مع المفترسات واشبه الطفيليات
٢٢٤	التداخل المؤثر بين الكائنات النافعة والمرضات الحشرية
٢٢٩	المراجع
	<b>الفصل الثاني: تأثير المبيدات الحشرية الميكروبية على بيئة المياه العذبة مع تناول</b>
٢٣١	الخاص لبرنامج مكافحة داء المذنبات الملتهبة الذي تضطلع به منظمة
	الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي
٢٣٢	طرق تقييم تأثير المبيدات الحشرية الميكروبية على الكائنات المائية غير المستهدفة (NTO's)
٢٣٣	التأثيرات الإيكولوجية للمبيدات الحشرية الميكروبية الأساسية على كائنات وحياء المياه العذبة
٢٣٤	الاختبارات المعملية
٢٣٦	التجارب الحقلية
٢٤٨	المراجع
	<b>الفصل الثالث: التأثير الفعال للمبيدات الحشرية الميكروبية على البينات البحرية</b>
٢٤٩	ومصبات الأنهار
٢٥٠	وسائل مكافحة الميكروبية ودراسات الأمان
٢٥٠	الفيروسات ( كمثال الفيروس العصوى لحشرة أوتوجرافا كنيفورنيكا = (ACB)
٢٥٧	البكتريا (كمثال باسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع كورستاكلي)
٢٥٩	الفطريات (كمثال <i>Lagenidium giganteum</i> - سلالة كاليفورنيا)
٢٦١	البروتوزوا (كمثال نوزيما كنياتم <i>Nosema Cuneatum</i> )
٢٦٤	المراجع

## الباب الثالث

٢٦٧	<b>أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على الفقاريات</b>
	<b>الفصل الأول : الأمان على الفقاريات – الإنسان Vertebrates-Human</b>
٢٦٩	تقديم واستعراض عام
٢٦٩	فلسفة تقييم الضرر
٢٧٠	دلائل الاختبارات <b>Testing guidelines</b>
٢٧٢	عدوى مرضات الحشرات للثدييات <b>Infectivity</b>
٢٧٣	سمية مرضات الحشرات البكتيرية والفطرية على الثدييات
٢٨١	المراجع
٢٨٨	<b>الفصل الثاني: أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على الفقاريات والحيوانات الأليفة</b>
٢٨٩	والحياة البرية
٢٨٩	تقديم واستعراض علم
٢٩٠	تصميم اختبارات الأمان <b>safety test design</b>
٢٩٢	مجاميع الممرضات <b>Pathogen groups</b>
	البكتريا – الفيروسات – الفطريات – البروتوزوا – الديدان
٣٠٩	الاستنتاجات
٣١١	المراجع

## الباب الرابع

### أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على اللافقاريات غير المستهدفة

- ٣١٥ الفصل الأول: الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة من الفيروسات العنوية
- ٣١٥ مقدمة
- ٣١٦ تخصص الفيروسات العنوية على الآفات الحشرية (كعائل بديلة وأنواع غير مختلفة)
- ٣١٨ أمان الفيروسات العنوية على الحشرات النافعة
- ٣٢٠ المفترسات
- ٣٢١ أشباه الطفيليات
- ٣٢٥ الكائنات المائية غير المستهدفة
- ٣٢٦ تأثير تطبيقات الفيروسات العنوية في الحقول
- ٣٢٧ المراجع
- ٣٢٩ الفصل الثاني: الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة في سلاسل حرشية الأجنحة
- للـباسيلـيس ثـوريـنجـينـسـيـز والـبيـتا-كـسـوتـوكـسينـات
- ٣٢٩ مقدمة
- ٣٣١ السلاسل الفعالة ضد حرشيات الأجنحة
- ٣٣١ التأثيرات على كائنات المياه العذبة
- ٣٣٢ التأثيرات على الكائنات البحرية
- ٣٣٣ تأثيرات كائنات التربة
- ٣٣٤ التأثير على الكائنات الأرضية
- ٣٤١ البيتا-كسوتوكسين في الباسيليس ثورينجينسيز B- Exotoxin
- ٣٤٧ الخلاصة والاستنتاجات
- ٣٥٠ المراجع
- ٣٥٣ الفصل الثالث: أمان باسيليس ثورينجينسيز اسرائيلينسيز والباسيليس سفيريكس
- على الكائنات غير المستهدفة في البيئات المائية
- ٣٥٥ طرق قياس التأثير على الكائنات غير المستهدفة في المياه الجارية
- ٣٦٠ تأثير BT اسرائيلينسيز والباسيليس سفيريكس على الكائنات غير المستهدفة في المياه السائفة
- ٣٧٣ المراجع

## الباب الخامس

### اعتبارات الأمان لأنواع بكتريا باسيليس

### والوسائل الحيوية الخطرية والنيماطودية ومتطلبات التسجيل

- ٣٧٧ الفصل الأول: اعتبارات أمان استخدام باسيليس بويلا الممرض المسبب للمرض
- اللبني في رتبة الجعل scarabidae
- ٣٩٣ الفصل الثاني: أمان وسقل المكافحة الحيوية الفطرية والنيماطودية على اللافقاريات
- غير المستهدفة الهامة اقتصاديا كافات

٣٩٣	أولاً: أمان وسائل مكافحة الحيوية الفطرية
٣٩٤	وضع الفطريات الممرضة للحشرات المسجلة
٣٩٥	المدى الموائى والتخصصية
٤٠٤	التأثيرات على اللاقاريات غير المستهدفة
٤١٠	المراجع
٤١١	ثانياً: أمان الوسائل الحيوية الئيماتودية
٤١١	نيماتودا <i>Dealenus siricidicola</i>
٤١٣	النيماتودا <i>Heterorhabdiidae &amp; Steinernematidae</i>
٤١٨	المراجع

## الباب السادس

### المخاطر البيئية للممرضات الحشرية

٤٢١	والكائنات الدقيقة والنباتات المهندسة وراثياً بين
	التشريع والأمان الحيوي

٤٢٢	أولاً : الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً
٤٣٣	ثانياً : النباتات المهندسة وراثياً
٤٤١	ثالثاً : الأمان الحيوي في مصر بين التشريع والتطبيق
٤٦٠	رابعاً : المخاطر البيئية للممرضات الحشرية المهندسة وراثياً
٤٦٨	خامساً: استخدام التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات باستخدام مستحضرات
	باسيلليس ثوريينجيسيز
٤٧٥	سادساً: التفاعلات المستخدمة في إنتاج المركبات الحيوية البكتيرية
٤٨١	سابعاً : دراسات عن التأثيرات الحيوية والهيماطولوجية والجزيئية لبعض المبيدات
	الحيوية على حيوانات التجارب
٤٩٢	المصطلحات
٥٠٠	المراجع العربية





## **الباب الأول**

### **متطلبات تسجيل واعتبارات الأمان في وسائل مكافحة الميكروبية للآفات**

الفصل الأول: المبيدات الحيوية الميكروبية بين الواقع التقني والتجاري ومتطلبات التسجيل

الفصل الثاني: المركبات المضادة للحشرات والمشتقة من الكائنات الدقيقة

الفصل الثالث: متطلبات تسجيل واعتبارات الأمان في وسائل مكافحة الميكروبية للآفات



## الفصل الأول

### المبيدات الحيوية الميكروبية بين الواقع التقني والتجاري ومتطلبات التسجيل

بالرغم من أن المبيدات الحشرية الميكروبية تمثل أقل من ١٪ من المبيعات العالمية للمبيدات فإن المكافحة الميكروبية للأفات اكتسبت وما زالت الكثير من الأهمية. هذا يرجع إلى الأداء المحسن والمنافسة السعرية للميكروبات بالإضافة إلى زيادة مقاومة مفصليات الأرجل للمبيدات الحشرية الكيميائية. استخدام المبيدات الميكروبية ينمو ويتزايد بمعدل سريع يتراوح من ١٠-٢٥٪ كل عام. الباسيليس ثورينجيسيز تمثل الهدف الرئيسي لتطوير المنتجات وأصبحت تمثل معظم المبيعات في حدود ما يقرب من ٧٥ مليون دولار وهي السوق العالمي لمنتجات المكافحة الحيوية (Stanes وآخرون ١٩٩٣). في الحقيقة فإن المبيدات الحيوية الميكروبية تقدم مصدر لاكتشاف مواد ووسائل جديدة فعالة في مكافحة الآفات الضارة في الزراعة والصحة العامة وآفات الغابات. التطويرات الأساسية تحققت مع الباسيليس ثورينجيسيز، الباسيليس سفيريكس، والفطريات الممرضة للحشرات والباكتولوفيروسات والتي سوف تلعب دوراً مؤثراً حتى الوصول إلى مرحلة النمو في المبيدات الحيوية.

منتج أو مستحضر الباسيليس ثورينجيسيز (BT) ذات قيمة كبيرة في الإدارة المتكاملة للآفات IPM لأنها أقل ضرراً على المفترسات وأشباه الطفيليات عما هو الحال مع المبيدات الكيميائية ذات المدى العريض broad spectrum ومن ثم تكون فعالة كي تحل محل المبيدات الكيميائية فيما يعرف "طاحونة المبيدات الحشرية insecticide treadmill" كما أنها سوف تسمح بشفاء ومعاودة ظهور ونمو مجاميع وعشائر الأعداء الطبيعية. كما هو الحال مع العديد من المبيدات الحيوية فإنها قليلة الفاعلية بنفسها بالمقارنة بالمبيدات الكيميائية. حيث أن هذه البكتريا تستخدم في نظام الإدارة المتكاملة للآفات عند الحاجة مما يعمل على الحفاظ على الأعداء الطبيعية فإن تأثيراتها تقيم عن طريق فعل هذه الأعداء الطبيعية مما يجعل استخداماتها في حماية المحاصيل الزراعية ذات مردود اقتصادي ومتواصل.

## باسيليلس ثورينجينسيس (BT): *Bacillus thuringiensis*

الباسيليلس ثورينجينسيس بكتريا موجبة لجرام عصوية الشكل تنتج بلورات باراجرمومية Parasporal تتكون في واحد أو أكثر من البروتينلات. عندما تقوم الحشرة بتناول البكتريا يحدث تحلل بروتيني Proteolyzed للتوكسين الأولى Protoxin بداية إلى بروتين توكسين نشط والذي ينتشر خلال الغشاء حول الغذائي Peritrophic membrane ويرتبط على المستقبلات على الغشاء الطلائي للمعوى الأوسط ومن ثم تتوقف الحشرة عن التغذية. عندما يرتبط التوكسين النشط فإن التداخل المتبادل بين المستقبل - التوكسين يصبح غير عكسي ويعتقد أن التوكسين يفرس في الغشاء مسببا حدوث موضع ضرر أو تكوين ثقب. تكوين الثقوب يحدث خلل في نظام تدرج أيون البوتاسيوم مما يؤدي إلى حدوث انتفاخ في microvilli ثم تتحطم وتكلف. يحدث تعرض لضرر في تكامل المعدة الحشرة في الهيموسيل. الجراثيم يحدث لها إنبات وتستسلم الحشرة Succumbs لتعفن دم قاتل Lethal septicemia (Stranes) وآخرون (١٩٩٣). سوف نتناول هذه العملية بالتفصيل فيما بعد.

ولو أن BT لوحظت بداية بواسطة Ishikawa في اليابان عام ١٩٠٢ فإن الوصف العلمي سجل عام ١٩١١ بواسطة Berliner في ألمانيا. لقد قام Steinhaus في الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد الأفاق التجريبية لبكتريا BT عام ١٩٥٠. في الحقيقة فإنه من ١٩٤٨ وما بعدها تم تسجيل تسعة مستحضرات BT بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA وحدها كما في الجدول التالي:

### المبيدات الحيوية للباسيليلس BT المسجلة بواسطة وكالة EPA

الكائن الدقيق <i>Microorganism</i>	سنة التسجيل <i>Year of registration</i>	الآفة المستهدفة <i>Target Pest</i>
1- <i>Bacillus popilliae</i>	1948	Japanese beetle larvae
2- <i>B. thuringiensis</i> (BT)	1961	Lepidopteran larvae
3- <i>B. t. israelensis</i>	1981	Mosquito/ black fly larvae
4- <i>B. t. aizawai</i>	1981	Lepidopteran larvae
5- <i>B. t. tenebrionis</i>	1988	Certain beetle larvae
6- <i>B. t. EG2348</i>	1989	Gypsy moth larvae
7- <i>B. t. EG2371</i>	1989	Lepidopteran larvae
8- <i>B. t. EG2424</i>	1990	Lepidopteran/ Coleopteran larvae
9- <i>B. t. Pseudomonas</i>	1991	Lepidopteran/ Coleopteran larvae

Source: Starnes et al., (1993)

اكتشاف بكتريا BT. Tenebrionis فتح مجالات جديدة وأفاق واسعة لسلالات ذات أنشطة جديدة. يمكن فصل السلالات بناء على شكل السوط والطرز السيرولوجي ومورفولوجية البلورات ونظام الفرد الكهربى SDS- PAGE وال بلازميد. العديد من الشركات ادعت جمع الاف من عزلات الباسيلليين BT من كل مكان معيشة أو بيئة يمكن تصوره. لقد تم اكتشاف العديد من أنواع البلورات الجديدة وقد أدى توصيف الجينيات والبروتينات من هذه العزلات إلى الحصول على العديد من براءات الاختراع وحقوق الملكية والاحتكار Patents. مع اكتشاف العديد من التوكسينات الجديدة تم اقتراح نظام جديد للتقسيم Classification بناء على تركيب البروتين وقد اتسع نطاق اتباع واستخدام هذا التقسيم للتوكسينات الجديدة كما أشار بذلك الباحث Lee وآخرون ١٩٩٨ والذي يشار اليه كما في الجدول التالي:

تقسيم البروتينات التي تعمل كمبيدات حشرية من بكتريا BT بالنظر للعوائل المختلفة:

حشرية الأجنحة Lepidopteran	ثنائية الأجنحة Dipteran	غمدية الأجنحة Coleopteran
Cry 1 Aa (133.5)	Cry 2 Aa (70.9)	Cry 3 Aa (73.1)
Cry 1 Ab (131.0)	Cry 4 Aa (134.4)	Cry 3 Ba (74.2)
Cry 1 Ac (133.3)	Vry 4 Ba (127.8)	Cry 7 Aa (74.4)
Cry 1 Ba (138.0)	Cry 10 Aa (77.8)	Cry 3 Ca (73.8)
Cry 1 Ca (134.8)	Cry 11 Aa (72.4)	Cry 1 Ib (81.2)
Cry 1 Cb (134.0)	Cyt 1 Aa (27.4)	
Cry 1 Da (132.5)	Cyt 2 Aa (29.2)	
Cry 1 Fa (133.6)		
Cry 9 Aa (129.7)		
Cry 2 Aa (70.9)		
Cry 2 Ab (70.8)		
Cry 1 Ib (81.2)		

Source: Lee et al., 1998; Figures : parentheses express mass in KDa.

بالإضافة لهذه البروتينات تملك بكتريا BT توكسينات أخرى مثل ألفا، بيتا، دلتا- اكسوتوكسينات وكذلك البروتين الخضرى الابدائى على الحشرات (Vip 3 A) (Estruch وآخرون ١٩٩٦).

بالرغم من المميزات العديدة إلا أن بكتريا BT تواجه بعض الصعوبات في اتجاه الاستخدام التجارى. المدى العوائلى المحدود يعتبر من بين هذه التحديات والصعوبات في هذا الاتجاه. لتقضى هذا الوضع تم إجراء العديد من التجارب والمحاولات لمكافحة ثاقبة الذرة الأوروبية وهى من أقات رتبة حرشفية "الجنحة Lepidopteran وخنفساء كلورادو البطاطس من خلال التعامل مع البلازميد ونقل البلازميد Md -150 من بكتريا BT كورسناكى وبلازميد Md -88 من البكتريا BT تينيريونيس والنسب تسم دمجها في كائن واحد (Starnes وآخرون ١٩٩٣).

المشكلة الثانية التى تواجه البكتريا BT تتمثل في خطورة المقاومة resistance. عندما يستمر استخدام بكتريا BT كحل تكنولوجى منفرد كما هو الحال مع المبيدات الكيميائية التى سبقها فإنها ترش بانتظام مما أدى بمدى من الأقات الحشرية لتطوير المقاومة. في التجارب العملية طورت فراشة الدقيق الهندية "بلوديا انترينكتلا (هينر) مقاومة ٣٠ مثل في جيلين وبعد ١٥ جيل وصل مستوى المقاومة ضد BT كورسناكى - HD1 (ديبل) إلى ١٠٠ مرة أعلى مما هو الحال مع الحشرات غير المعاملة (Mc Gaughey ١٩٨٥). على نفس المنوال أظهرت المجاميع الحقلية في الفراشة ذات الظهر الماسى "بلوتيل زيلوستيلا" (الينيس) ٢٥ - ٣٠ مرة أقل سمية عما هو الحال مع الحشرات الحساسة (Tabashnic وآخرون ١٩٩٠) أو دودة اللوز الأمريكية "هليوسيزيس فيرسينس (فابريكس)" المقاومة للتوكسين Cry I A أظهرت كذلك مقاومة مشتركة للتوكسينات الأخرى لبكتريا BT والتي تختلف كثيرا في التركيب والفاعلية (Gould وآخرون ١٩٩٢).

المشكلة الثالثة المرتبطة ببكتريا BT تتمثل في نقص معظم الخصائص الحيوية المطلوبة لوسيلة مكافحة الحيوية مثل القابلية أو المقدرة على التكاثر وتوطيد نفسها في المحاصيل. الميزة الفاتحة للوسائل الحيوية بالنسبة للمبيدات الكيميائية تتمثل في قدرتها على قتل الحشرات في اتجاهين أى الاستجابة الوظيفية والتكاثر على حساب الآفة أى الاستجابة العددية مما يحقق بعضا من مكافحة في أجيال الآفة في المستقبل. بكتريا BT لم تتكيف على البقاء أو الثبات في البيئة المحصولية كما أن التطوير التجارى ركز قليلا على الاحتفاظ بقدرة على التكاثر والانتشار ولكنه عظم كثيرا من تأثيرات التوكسين الخاص بها القاتل للحشرات. بكلمات أخرى فإن التطوير التجارى للبكتريا ركزت على استخدامها على غرار المبيدات الحشرية الكيميائية وليس كوسيلة مكافحة

حيوية حية. هذا يمثل الحقيقة مع التطور الجاري للمبيدات الحيوية في الوقت الحالي. هذا يعكس كذلك حقيقة أن صناعات الكيميكالات الزراعية عديدة القوميات والتي سادت تطور المبيدات الحيوية ذات مهارات تقليدية واهتمامات محددة على إنتاج وتسويق المركبات شبيهة المبيدات. ليس هناك محل للشك بأن هذه الهيئات التجارية قد استخدمت طرق وتقنيات جزيئية مختلفة لتطوير المنتجات من خلال دمج الجينات من السلالات المختلفة لزيادة الفاعلية - بالإضافة إلى ذلك فإن اندماج Fusion الجينات من الباكولوفيروسات مع جينات بكتريا BT استخدمت - مع المدى العوائلي للباسبيليس. هذه المنتجات تمر بمراحل مختلفة من التطور وحتى الاتجار.

يوجد قليل من الدراسات متاحة في اتجاه استخدام بكتريا BT على المجموع الخضري للنباتات حيث تتغذى الحشرات. من المطلوب أن يتم تناول BT كي تحدث الفعل على الحشرات ولذلك فإن طرق استخدام الميكروب تتطلب الكثير من العناية. استخدام BT ضد آفات الغابات درست بعناية van Frankenhuyzen 1993، 1997 مع آخرين) حيث تم تسجيل الحجم المناسب للقطرات والتوزيع الملائم في أشجار الغابات مما أدى إلى تحسين التطبيق وتحقيق مكافحة تكافئ ما يحدث مع أكثر المبيدات شيوعاً واستخدامها في هذه البيئات. يوجد عدد من الحشرات التي تتغذى على الثمار والتي يصعب قتلها تحت الظروف الحقلية. في هذا الخصوص فإن الطرق لهندسة جين أو جينات الباسبيليس BT مباشرة في النبات أو في الكائنات التي تستعمر النبات لمجابهة هذه المشكلة تقدم لدرجة أن برامج الهندسة الوراثية للنباتات بغرض مكافحة الآفات تكتسب أرضية يوماً بعد يوم. لقد تم هندسة نباتات الذرة والقطن والبطاطس والدخان وراثياً للتعبير عن جينات بلورات البروتين (Cry) من بكتريا BT.

بالرغم من أنه يوجد عدد من العيوب لهندسة جينات بكتريا BT في النباتات مثل تطور المقاومة وقبول العامة للأغذية المهندسة وراثياً إلا أن الهيئات التجارية ترى في الأفق مميزات عديدة بالإضافة إلى زيادة الفاعلية. النباتات المهندسة وراثياً في الوقت الراهن تحتوي جينات BT فردية وهي نباتات جيل أول وسوف تتبع بنباتات متطورة من جيل ثاني وثالث مع مرونة كبيرة للاستخدام في نظام الإدارة المتكاملة للآفات IPM. الجيل الثاني من النباتات المهندسة وراثياً المقاومة للحشرات نصت التطوير تشمل كلا بروتينات BT وبروتينات غير الباسبيليس (Estruch وآخرون 1997).

برامج IPM في المستقبل تتضمن دمج المنتجات الميكروبية BT المحورة والمهندسة وراثيا مع أنواع عديدة من النباتات المهندسة وراثيا ومنتجات BT التقليدية. في النظرة التجارية نقول أنه في الوقت الراهن يتم إنتاج العديد من ملايين الكيلوجرامات من بكتريا BT كورستاكى HD-1 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. في أمريكا وحدها تستخدم هذه التقنية على ٣٠ محصول مسجلة عليها ضد ما يزيد عن ١٠٠ نوع من الآفات الحشرية واسعة الانتشار على مستوى العالم (Lee وآخرون ١٩٩٨). على نفس المنوال نجحت العديد من تجارب التفرقة بين BT إلى تعريف سلالات ذات بروتينات لها مدى عوائل عريض من بين آفات حشرات حشرية الأجنحة وغمدية ونصفية الأجنحة. البكتريا BT اسرانييلينسز تعتبر الآن من أكبر المنتجات التجارية لمكافحة البعوض والذباب الأسود التي تعتبر ناقلات للأمراض التي تصيب الإنسان على مستوى العالم. الفحص بشعة اكس للكشف عن تركيب بروتين Cry IIIA لبكتريا BT تينيريونيس (Li وآخرون ١٩٩٨) فتحت المجال لهندسة البروتين وتصميم تراكيب مبيدات حشرية بكتيرية من الباسيليلس BT.

#### باسيليلس سفيريكس (BS) *Bacillus sphaericus*:

الباسيليلس سفيريكس (BS) وسيلة ميكروبية أخرى واعدة لمكافحة البعوض. خلال مرحلة التجرثم تقوم بكتريا BS بإنتاج بلورات جراثيم خارجية Parasporal تحتوي على بروتينات عديدة سامة ليرقات البعوض (Yaf, 1995). اليرقات من جنس الكيوليكس ذات حساسية خاصة لهذه التوكسينات أما يرقات الاتوفيليس ذات حساسية متوسطة أما يرقات بعوض الابيديس مقاومة لحد ما.

تعريف المكونات المسامة وتتابع الدنا المكسبون DNA Cloned (Arapinis وآخرون ١٩٨٨) لدت إلى تحديد نوعان من البروتينات السامة الكبرى ذات ٥١، ٤٢ KDa واللاتي ترجمت فرديا من وحدة نسخ فردية ذات bicistronic. بمجرد تناول البلورة بواسطة يرقة البعوضة فإن بروتينات 51 KDa و 42 KDa تذوب في المعى القلوي وتجهز من خلال التحلل البروتيني proteolytically إلى بروتين 43 KDa و 39 KDa على التوالي. لقد اتضح أن البروتين 42 KDa لا يحدث سمية إلا اذا كان مصحوبا ببروتين 51 KDa (Broadwell وآخرون ١٩٩٠). ميكانيكية الفعل السام على المستوى الجزيئي غير مفهوم ولكن دراسات الميكروسكوب الإلكتروني أوضحت أن الموقع الأولي لإحداث الفعل يحدث في خلايا المستقيم الأعور المعدي gastric caecum



والمعي الخلفي حيث الفجوات والانتفاخ في الميتوكوندريا. باستخدام البروتينات المشع and A2 KDa -51 فشل الباحث Davidson وآخرون (١٩٩٠) في استرداد أو إنقاذ السمية التي حفزت بواسطة البروتين 42KDa التي تغت بعد بروتين 51 KDa إذا تم عكس المعاملات. الصورة الفعالة للبروتين 51 KDa تبقى مرتبطة مع نسيج المعى الأوسط حتى ٢٤ ساعة للتداخل مع بروتين 42 KDa. هذا ولو أنه في غياب بروتين 51 KDa فان البروتين 42 KDa قد يرتبط مع موقع آخر على الغشاء.

التوكسين البللورى لبكتريا BS سام عند تركيزات منخفضة وهو ثابت في البيئة المائية وهو قاتل لليرقات في المياه الملوثة. ليس لهذه البكتريا تأثير ضار على الكائنات غير المستهدفة والأسماك والحياة البرية أو الإنسان كما أنها تقدم أسلوب جديد وأمن لمكافحة الناقلات المرضية التي تتولد في مياه الصرف الملوثة. النشاط الباقي الكبير ضد اليرقات لبكتريا BS من المميزات الظاهرة بما يفوق كفاءة BT اسرائيلينسيز. هذا ولو أنها تكمل بعضها البعض في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة البعوض.

هذه المحدودية التي تجابه بكتريا BS تتمثل في المدى العوائى المحدود. حتى مع تفاوت الحساسية بين أنواع البعوض بشكل ملحوظ بسبب الاختلافات في قابلية الارتباط على المستقبل و/ أو موقع الفعل (Davidson ١٩٨٩). لقد لوحظت مقاومة ميدانية لبكتريا BS في البرازيل والهند. ميكانيكية هذه المقاومة غير معروفة. هذا ولو أن المستوى العالي من المقاومة الذي لوحظ في المعمل وجد أنه يرجع إلى نقص ارتباط المستقبل في المعى الأوسط.

### الفطريات الممرضة للحشرات Entomopathogenic Fungi

ارتباط الفطريات بالحشرات من الأمور المعروفة جيدا وبعضها يسبب أمراض خطيرة في العوائل. لقد وجد أن ما يقرب من ٧٥٠ نوع من الفطريات التي تنتمي إلى ٥٦ جنس تهاجم مفصليات الأرجل الأرضية والمائية. من الفطريات الأكثر شيوعا الممرضة للحشرات تلك التي تنتمي إلى ثلاثة تحت أقسام من Eumycotina. الفطريات الممرضة للحشرات كوسائل تجارية لمكافحة الحشرات لم تحدث أية أضرار. هذا ولو أن المنتج "Bio- 1020" الذي طور بواسطة شركة باير يعتمد على الفطر *Metarrhizium anisopliae* لمكافحة آفات رتبة غمدية الأجنحة على نباتات الزينة المختلفة (Mc Donald ١٩٩١). My car هو المنتج الذي ينتج بواسطة معامل أبوت في أمريكا باستخدام الفطر *Hirsutella thompsonii* لمكافحة أكاروس الموالح

فيلوكوبترونا أوليفيرا (Ashmead). يوجد العديد من أنواع الفطريات الأخرى من مراحل الاتجار أو الإنتاج بغرض التجريب في أمريكا والبرازيل وبعض البلدان الأخرى. من الأنواع الأكثر شيوعاً التي تستخدم والأكثر توزيعاً الأنواع التالية الموزعة كثيراً على مستوى العالم.

*Beauveria bassiana*, *Culicinomyces clavisporus*, *H. thompsonii*, *M. anisopliae*, *Nomuraea rileyi*, *Verticillium lecanii*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Cercospora rodmanii*, *Peniophora gigantea* and *Trichoderma viride* (McDonald, 1991)

هذه الفطريات ذات أهداف متخصصة على الحشرات مثل خنافس كلورادو البطاطس والفراشة الغجرية وثاقبة الذرة الأوربية ودودة الصنوبر وبقرات البعوض وأكاروسات الموالح والباصوق والمن والبق الأخضر والسذاب الأبيض والتربس والنطاطات والمصاصير والعديد من بقرات حشرية وغمدية الأجنحة (Zimaenrman 1992). أظهرت بعض الدراسات الحديثة مقدرة الفطريات *B. bassiana* وكذلك *V. lecanii* ضد المن الأخضر الانجليزى سيتوبيون أفيني وكذلك من الدردار الصوفى "أيريسوما أمريكانوم".

**الكونيديا Conidium** : هي وحدة العدوى في الفطريات الممرضة للحشرات والتي قد تخترق كيويتكل الحشرة من جراء الضغط الميكانيكى بواسطة الأنبوب الجرثومى والانتهيار الانزيمى للكيوتيكل. سلالات هذه الفطريات تنتج الإنزيمات المحللة للبروتينات *Proteases* والمحللة للكيتين *Chitinases* في المزرعة السائلة. من المثير للاهتمام أن البروتينيز يننتج أولاً في المزارع وهي أساسية في اتجاه هدم مادة البروتين قبل أن يقوم الفطر بهدم الكيتين. بمجرد اختراق الكيويتكل والتغلب على ميكانيكيات الدفاع في العائل يقوم الفطر بالتكاثر *Proliferates* على شكل أجسام الهيفات والتي تتضاعف بالتبرعم *budding*. ينتشر الفطر خلال الهيموسيل ومن ثم تموت الحشرة عادة بعد 3-14 يوم بعد استخدام الجراثيم. التوكسينات التى تنتج بواسطة هذه الفطريات تلعب دوراً كبيراً كذلك في أحداث المرضية وقد تم عزل عدد من هذه الكيميتات الأليلية *allelochemicals* وتم تعريفها كما سيرد لاحقاً.

حيث أن الأمان هو أحد العوامل الكبرى في اتجاه التطوير والاستخدام العملي للمبيدات الميكروبية أظهرت العديد من الدراسات الباثولوجية أو المرضية عدم حدوث

أية تأثيرات ضارة على الإنسان والتديلات أو التغيرات. أظهرت دراسات أخرى مع الفطر *M. anisopliae* عن طريق الحقن والاستنشاق والتغذية والعيون والجلد ضد الجرذان والأرانب وخنازير غينيا والفئران والأسماك والعصافير... الخ عدم حدوث أية تأثيرات مرضية كما في الجدول التالي.

حيوان الاختبار	طريقة الفعل	التأثير
- الجرذان	الحقن - الاستنشاق - التغذية	- لا توجد تأثيرات سامة LD50 الحادة عن طريق الفم والجلد أكبر من ٢٠٠٠ ملجم/ كجم
- الفئران	التغذية - الحقن	- لا توجد تأثيرات سامة أو مرضية
- خنازير غينيا	التغذية - الاستنشاق	- لم تلاحظ تأثيرات سامة
- الأسماك	استخدام الكونديا في الماء	- لم تلاحظ اختلافات في الوفيات عن المقارنة
- العصافير	اختبارات السمية مع التغذية	- لم تلاحظ أية تأثيرات جانبية ضارة
- الأرانب	معاملات عن طريق الجلد العين	- لم تحدث التهابات على الجلد أو العين

كفاءة وفعالية الفطريات في مكافحة الآفات الحشرية تعتمد على الظروف البيئية السائدة بعد المعاملة خاصة ما يتعلق بالرطوبة النسبية. لكي يسمح للفطر بالنمو تحت درجة الرطوبة النسبية الملائمة يكون من الضروري تطوير مستحضرات تحتفظ بالرطوبة moisture- retaining في الحقيقة فإن التربة هي من أكثر البيئات ملائمة للمكافحة الحيوية بواسطة الفطريات لأنها تحتوى على المحتوى الصحيح والمناسب من الرطوبة وهي عادة مناسبة لنمو الفطريات. ضوء الشمس ودرجة الحرارة تمثل تحديات أخرى لاستخدام المبيدات الحيوية الفطرية حيث أنها تفقدها نشاطها وفعاليتها. لذلك يكون من الأهمية اختيار العزلات التي تنمو سريعاً في درجات الحرارة بعد استخدام الجراثيم. لكي نحسن من كفاءة الممرضات الفطرية فإن الطرق المبتكرة من التكنولوجيا الحيوية تفيد في المناورة بالصفات المرغوبة. طرق التحول Transformation والنماذج المتكامل تستطيع أن تعطي رؤية وتصور عن النظام لتحسين وراثية هذه الكائنات لكي تستخدم كوسائل لمكافحة الحشرات في المستقبل.

#### البكتيريوفيروسات Baculoviruses:

الفيروسات تعتبر وسائل مكافحة حيوية عالية التخصص. البكتيريوفيروسات عبارة عن فيروسات دنا مزدوجة التخطيط عالي التخصص للعوائل الحشرية. هذه الفيروسات خيطية الشكل وفي الغالب تنرس في داخل غلاف البروتين السواقي

المعروف بالاسم "الجسم الضمني" occlusion body التى تساهم في تحديد ثباتها في البيئة. الباكولوفيروسات توضع وتقسّم إلى المراتب التالية: (i) فيروسات البولى هيدروزيين النووية (NPV) التى توجد فيها العديد من جسيمات الفيروس في كل جسم ضمين مكونة بروتين بولى هيدرين، (ii) الفيروس المحبب granulosis virus (GV) والتي يوجد فيها جسيم فيروس واحد في كل جسم ضمين تتكون من بروتين الجرانوليون، (iii) الفيروسات غير الضمنية والتي تنتقل كجسيمات حرة. من بين هذه المراتب الثلاثة تعتبر المرتبتان الأولى والثانية نموذجية للإدارة المتكاملة للأفات حيث أنها آمنة على الإنسان والبيئة والحشرات النافعة غير المستهدفة.

بالرغم من أن الباكولوفيروسات عزلت أساسا من حشرات غشائية وحرشفية الأجنحة إلا أن قليل من العزلات عزلت من ثنائية وعمدية وشبكية الأجنحة والترايكوتيرا والقشريات. معظم هذه الفيروسات تم تطويرها لأغراض الاستخدام في الغابات والمزارع فقط.

التناول هو الطريق الرئيسي لكيفية أحداث الفعل. بمجرد تناول الفيروس بواسطة يرقة حرشفية الأجنحة يذاب بروتين الجسم الضمين في عصير المعدة القلوي (درجة حموضة من 9-10.5) مما يحرر ويطلق جسيمات الفيروس. هذه الجسيمات تعدى خلايا المعدة وتتضاعف ثم تنتشر للأعضاء الأخرى كفيروس غير ضمين. بينما أن جسيمات الفيروس هذه تصبح كجسم ضمين متأخرا في دورة الحياة. عندما تموت اليرقات يتم انفراد كميات كبيرة من الأجسام للضمنية في البيئة مما يؤدي إلى عدوى يرقات أكثر. الوقت المطلوب لقتل الحشرة يعتمد على النوع ولكن هذا الوقت يتراوح بوجه عام من 3-7 أيام. قد تكون الفترة من 3-4 أسابيع اعتمادا على التداخلات بين الفيروس والحشرة والنبات. عملية عدوى الحشرة سوف توصف بالتفصيل فيما بعد.

الباكولوفيروس الأول الذي تم تسجيله للاستخدام التجارى كان فيروس الباكولوفيروس الأول الذي تم تسجيله للاستخدام التجارى كان فيروس *Helicoverpa Zea (Boddie) NPV (H2NPV)*. لقد تم إنتاج وتسويق الفيروس بواسطة شركة ساندوز في عام 1975 تحت الاسم التجارى الكار Elcar. لقد تم إنتاج الفيروس *H2 NPV* بنجاح وعلى مستوى كبير في الصين باستخدام طريق إنتاج نصف إلى فاستخدمت في حقول القطن وفول الصويا والدخان والذرة والسمورج والطماطم لمكافحة *H. armigera*. لقد قام الباحثان Hardee and Bell (1997) باستخدام *H2 NPV* الناتجة من 8 مليون يرقة *H. Zea* في معاملة 81000 هكتار

من النباتات العائلة في بداية الموسم. حديثاً تم اكتشاف فيروس غير ضمين من حشرة H. Zea (Raina and Adams 1990). الفيروس أطلق عليه الاسم "فيروس النكاثر H2 reproductive virus (H2 RV) H2 وهو يعدى الأنسجة التناسلية فقط للذكور والإناث مما يجعلها عقيمة بشكل تام. ينتقل الفيروس خلال البيض والحيوانات المنوية. في الوقت الحالي تستخدم الباكولوفيروسات على نطاق واسع في البرازيل حيث يحمى NPV لدودة الفول القطيفية ٥٩٠٠ هكتار من فول الصويا ضد هذه الآفة. تستخدم الباكولوفيروسات في روسيا والصين كذلك بعد سنوات عديدة. بينما تستخدم في روسيا لمكافحة آفات الغابات إلا أنها في الصين تستخدم لمكافحة الآفات في الحقول الزراعية. في أوروبا تقوم بعض الشركات بتطوير الباكولوفيروسات أو أنها تمكنت من إنتاج منتجات تحتوى على الباكولوفيروسات مثل GV الفراشة الفجرية، NPV لنزابة قش الصنوبر الأوروبية، NPV للدودة القارضة في البنجر، NPV لنطاط البرسيم. بسبب وفرة وقلة تكلفة العمالة تم تقديم الباكولوفيروسات في الدول النامية وهي أماكن نموذجية للإنتاج. لقد اقترح Stames وآخرون (1993) أربعة استراتيجيات لاستخدام المبيدات الفيروسية:

- ١- ينشر الفيروس من تطبيقات محدودة حيث يقوم بالتنظيم الدائم والمستمر لمجموع الحشرة من خلال مكافحة الحيوية التقليدية.
  - ٢- يتم تحقيق وبائية epizootic حيوانية من خلال الانتشار الرأسى والأفقى ولكن معاودة الاستخدام قد تكون ضرورية بسبب عدم استدامة المكافحة.
  - ٣- العدوى الرأسية في البيئة يحافظ عليها ويعاود تنشيطها من خلال المناورة البيئية.
  - ٤- بلجاً لتكرار المعاملات لمكافحة مجموع حشرة بسبب عدم وجود نشر أفقى للفيروس- هذه استراتيجية واسعة الاستخدام بسبب كفاءتها وفاعليتها.
- الباكولوفيروسات حساسة جداً للأشعة فوق البنفسجية UV من ضوء الشمس. لقد استخدمت العديد من الوسائل الكيميائية بما فيها محدثات البريق الضوئي Optical brightners كحاميات للفيروس NPV (Shapiro 1992). لقد تم اختبار ٣٢ من هذه المواد الكيميائية ووجدت فعالة ضد الفراشة الفجرية. الباكولوفيروسات تستخدم كنقالات للتعبير عن البيولوجيا الجزيئية المندمجة في الإنسان. لقد ساعد ذلك العلماء في علمهم لفرس جينات خاصة في جينوم الباكولوفيروس وبذلك يمكن تحقيق مقدرة الباكولوفيروس على القتل المبكر. بسبب استخدام الباكولوفيروسات كنظام للتعبير

وكمبيد حشري اتجهت الأبحاث نحو تحسين الإنتاج خارج وداخل الجسم. هذا ولو أن النظم الخارجية *In vitro system* لم تثبت فائدتها بسبب نقص الإنتاجية والتكاليف العالية وحساسية الخلايا لظروف النمو والطفرية وصيانة العقم.

المعدل المنخفض للقتل يظل محددا للمحدودية للباكولوفيروسات. هدف الهندسة الوراثية للباكولوفيروسات للاستخدام كمبيدات الحشرية يتمثل في دمج مرضية الفيروس مع الفعل الابادى للتوكسين كمبيد حشري وكذلك الهورمون أو الإنزيم ( Bonning and Hammock 1996). في هذه الحالات فإن تتابع جين البوليهيدرين من الجينوم الفيروسي يمكن إحلاله بمنطقة الكود للجين القريب والذي هو تحت بادئ جين البوليهيدرين القوى. في هذه الحالات فإن هذا الاقتراب يبدو مجديا (Meada وآخرون 1991، Stewart وآخرون 1991). من بين التطويرات الحديثة التعبير عن سم العقرب (AaIT) تحت سيطرة البادئ من الجين المبكر الواقع (iel) للفيروس AcMNPV مما يسبب التعبير المبكر عن التوكسين.

من الطرق الأخرى لتقليل زمن القتل ما يتمثل في تحسين نظم المستحضرات والتطبيق. الخفض الإضافي في تكاليف الإنتاج وموائمة الأداء الحفلي والتغلب على العقبات التنظيمية والتشريعية ضروري للتمكن من تطوير منتجات أكثر اقتصادية وفاعلية. النواحي البيئية المرتبطة بالاتجار في الفيروسات المندمجة مثل التداخل مع الفقاريات والأنواع الناقعة وغير المستهدفة وإحلال الفيروسات الطبيعية والثبات الوراثي للكائنات المندمجة سوف تبقى مؤثرة. بعض التحويرات مثل الفيروسات التى بها بوليهيدرين ناقص، الجسم الضمين المرافق، الجسم الضمين المسبق تم تطويرها لتجنب ثبات الفيروسات المندمجة في الطبيعة (Wood 1990). بالنسبة للفاعلية فإن الانتاج بواسطة التخمر يعتبر ويمثل التحدى التقنى الأكبر. الانتاج يحتاج إلى تحسين كبير محسوس فيما وراء التكنولوجيا الجارية. لكي تتحقق المنافسة في الأسواق الكبرى يكون مطلوبا توفير إنتاج على مدى واسع باستخدام مخمرات سعة 100,000 لتر يوميا (Rice وآخرون 1998). زراعة خلايا العائل الحشري على هذا المستوى يعتبر من المجالات الجديدة دون أية ضمانات للنجاح. هذا ولو أن منتج الباكولوفيروس المحصور وراثيا سيصبح في حيز الحقيقة. إلا أن الحصول على موافقات تشريعية لاستخداماته سوف تظل مثار تساؤلات في حاجة للإجابات.

## البروتوزوا Protozoa:

البروتوزوا الممرضة للحشرات توجد في كل المجاميع الكبرى من البروتوزوا لكن الميكروسبورديا تمثل القسم الرئيسي لهذه الممرضات. المبيدات الحيوية التي تعتمد على البروتوزوا (لم تحدث تأثيرات ضارة ذات معنى ولا توجد دراسات كثيرة متاحة. المادة الوحيدة المسجلة هي Nisema Locustana لمكافحة النطاط والتي سجلت بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA عام ١٩٨٠ (Colon ١٩٨٠). يستخدم المركب في صورة طعوم حيث تعامل به المناطق والمساحات الحساسة للمبيدات الحشرية الكيميائية والمكافحة ذات الأثر الباقي في المسطحات الخضراء وفي حدائق المنازل (Henery ١٩٧١). هذا ولو أن البحوث مطلوبة لتقدير الطور المبكر الممكن الكشف عنه في النطاطات والطريقة المثلى لأخذ العينات للكشف عن العدوى. هذه البحوث سوف تساهم في تقييم العدوى بالنوزيما لوكستا بعد التطبيقات الحقلية للبروتوزوا. لكي يتحقق استخدام فعال للبروتوزوا الممرضة يكون مطلوب التوصيف على المستوى الجزيئي للأنواع والأجناس المرتبطة بها بما يساعد في التعرف المناسب للأنواع والإنتاج الواسع والمنورة الجينية الوراثة وما يستتبع ذلك من استخدام مناسب لوسائل مكافحة الميكروبية.

مستقبل المبيدات الميكروبية: ولو أن الميكروبات ككائنات مفيدة في الإدارة المتكاملة للآفات ألا أنه توجد صعوبات وعوائق محددة وهي نقاط واجب التركيز عليها في المستقبل. من بين هذه النقاط الأكثر أهمية التحديات التشريعية خاصة مع الميكروبات المهندسة وراثيا حيث أن البيانات المطلوبة تظهر أكثر من اللازم كما بطلب مزيد من البحوث الأساسية الدقيقة على المستوى الصناعي أكثر منها على المستوى الأكاديمي بسبب وجود فجوة في التكنولوجيات الخاصة بالعلاقة بين التكاليف والفاعلية الخاصة بالفطريات والفيروسات والحوافز الاقتصادية لتطوير وتحديث التكنولوجيات وكذلك هناك حاجة لمزيد من البحوث عن التطبيقات التكنولوجية. استخدام الميكروبات يتطلب كذلك اهتمام زائد بمعرفة سلوك الآفة وبيولوجيتها وديناميكية المجموع. على المرء أن يكون مفهوم واضح عن الاختلافات بين المركبات الكيميائية والحيوية وطرق استخدامها.

## REFERENCES

- Colon, J. M. (1980) *Nosema locustae* exemption from requirement of tolerance. *Fed. Reg.*, 45, 31312-31313.
- Davidson, E. W. (1989) Variation in binding of *Bacillus sphaericus* toxin and wheat germ agglutinin to larval midgut cells of six species of mosquitoes. *J. Invertebr. Pathol.*, 53, 251, 259.
- Gould, F., Martinez-Ramirez, A., Anderson, A., Ferre, J., Silva, F. J. and Moar, W. J. (1992) Broad spectrum resistance to *Bacillus thuringiensis* toxins in *Heliothis virescens*. *Proc. Natl. Acad. Sci., USA*, 89, 7986, 7990.
- Hammock, B. D., Bonning, B. C., Possee, R. D., Hanzlik, T. N. and Maeda, S. (1990) Expression and effects of the juvenile hormone esterase in a baculovirus vector. *Nature*, 344, 458-461.
- Ignoffo, C. M. and Couch, T. L. (1981) The nucleopolyhedrosis virus of *Heliothis* species as a microbial insecticide. In H. D. Burges (ed.), *Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970-1980*, Academic Press, New York, PP. 329-362.
- Li, J., Carrol, J. and Ellar, D. J. (1991) Crystal structure of insecticidal  $\delta$ -endotoxin from *Bacillus thuringiensis* at 2.5 Å Resolution. *Nature*, 353, 815-821.
- McDonald, D. (1991) Biopesticides- pesticides with a bright future. *Int. Pest Cont.*, 33, 33-35.
- Neilsen- Leroux, C., Charles, J.-F., Thiery, I. and Gorghiou, G. P. (1995) Resistance in a laboratory population of *Culex quinquefasciatus* (Diptera: Culicidae) to *Bacillus sphaericus* binary toxin is due to a change in the receptor on midgut brush-border membrane. *Eur. J. Biochem.*, 228, 206-210.
- Rice, M. J., Legg, M. and Powell, K. A. (1998) Natural products in agriculture- A view from the industry. *Pestic. Sci.*, 52, 148-188.
- Tabashnik, B. E., Cushing, N. L., Finson, N. and Johnson, M. W. (1990) Field development of resistance to *Bacillus thuringiensis* in diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae). *J. Econ. Entomol.*, 83, 1671-1676.
- VanFrankenhuyzen, K. (1992) The challenge of *Bacillus thuringiensis*. In P. F. Entwistle, J. S. Cory, Bailey and S. Higgs (eds.), *Bacillus thuringiensis, an Environmental Biopesticide: Theory and Practice*, Wiley, New York, PP. 1-35.
- Wood, H. A. (1995) Genetically enhanced baculovirus insecticides. In M. Gunasekaran and D. J. Weber (eds.), *Molecular Biology of the Biological Control of Pests and Diseases of Plants*, CRC Press, Boca Roton Florida, PP. 91-104.
- Zimmermann, G. (1993) the entomopathogenic fungus *Metarhizium anisopliae* and its potential as a biocontrol agent. *Pestic. Sci.*, 37, 375-379.



## الفصل الثاني

### المركبات المضادة للحشرات والمشتقة من الكائنات الدقيقة

الكائنات الدقيقة تشمل تنوع في الكائنات في خلفيات نشوء مختلفة وهي البكتريا البدائية Eucaryota — Eubacteria — Archaeobacteria. البكتريا البدائية تشمل العديد من الكائنات الحية التي تعيش في بيئات متناهية التباين كما في المناطق ذات الحرارة العالية. الايوكاريتات تشمل معظم البكتريا الشائعة والبكتريا الخيطية مثل الاكتينومايسيتس. الايوكاريتات تشمل الفطريات والخميرة. هذه الكائنات تستطيع العيش في بيئات متنوعة تشمل الينابيع الساخنة والمناطق تحت المتجمدة والصحارى والمحيطات. كما هو متوقع من الكائنات المتنوعة يمكن عزل نواتج تمثيل متنوعة ولكن القليل من المجموع درست باستفاضة بحثا عن مركبات مضادة للحشرات. من بين هذه المجموع التي درست الفطريات حيث أنها المصدر الرئيسي لمعظم نواتج التمثيل الثانوية ذات الفاعلية ضد الحشرات بلها الاكتينومايسيتس. البكتريا ممثلة في الباسيليس ثوريينجيسيز يحتمل أن تكون مصدر معظم البروتينات المضادة للحشرات. Antiinsectan proteins.

مصادر المركبات المضادة للحشرات تعكس اتجاهات البحوث التي أجريت في الماضي بواسطة الحكومات والجامعات والصناعة. مثال ذلك ما تقدمه البيانات الخاصة بالتخمير من مصدر للتفرقة والوقوف على النشاط الحيوي في الصناعة خاصة عندما تدمج بالتقييم والتحليل ضد الكائنات الأخرى أو مستهدفات الزراعة أو النواحي الصيدلانية. هذا على الرغم من أن الهدف المنشود يتمثل في التخليق الكيميائي للمركب الفعال (أو المركبات المشتقة من التراكيب الأولى البائدة) أو الاشتقاق من سائل التخمر الناتج فعلا بما يسمح بالتطوير للمستوى التجاري عند الطلب (كما في حالة الايفرمكتينات، الاسينوسينات Spinosyns وغيرها). كيمياء الجمع Combinatorial chemistry تسمح بالانتاج السريع لمشتقات التركيب القاعد كما أن التحليل المتعدد Multi-well plate يستخدم في تتابع وتكامل مع الكشف detectors كقارئات للأطباق الدقيقة تسمح بالانتاج السريع (Borman 1999). بسبب نجاح النماذج المهندسة وراثيا في التعبير عن صور محورة من بروتينات الباسيليس ثوريينجيسيز

دمجا مع مدى الكفاءة المحدود فقد استخدمت تفرقة التخمر البكتيري لاكتشاف بروتينات فعالة ضد الحشرات (purcell, 1997, warren, 1997).

بسبب أن المبيدات الحشرية تشتق من المركبات التي أظهرت بداية فاعلية ونشاط ضد الفقاريات مثل المركبات الفوسفورية العضوية والكاربامات) فقد تم بحث ودراسة فاعلية المركبات ذات النشاط على الفقاريات ضد الحشرات لأغراض المقارنة واكتشاف تراكيب رائدة ضد الحشرات تحقق اختيارية خلال الاشتقاق. من أوائل هذه المركبات الميكوتوكسينات المشتقة من الفطريات Mycotoxins.

الاقترابات البيئية استخدمت كذلك لتعريف المركبات الميكروبية ذات الفاعلية ضد الحشرات. لقد تركزت المجالات الرئيسية للبحث والدراسة حول الممرضات على الحشرات والتراكيب ذات الدوام على المدى الطويل والبلانث النباتية الداخلية المرضية endophytes. بعض من هذه الاتجاهات تتداخل مع طرق التفرقة في الصناعة كما ذكر قبلا حيث أن الباسيلس ثوريينيميز تعتبر ممرض ضد الحشرات. لقد درست نواتج التمثيل الثانوي والبروتينات التي تنتج بواسطة ممرضات الحشرات باستفاضة (كما في Clayton and Grove 1982, Krasnoff, etal, 1966, Roberts, 1981, Warren, 1997). لقد درست كذلك التراكيب ذات الدوام على المدى الطويل (عيش الغراب والاسكليروشيا التي تنتج بواسطة الفطريات) بنجاح كمركبات مضادة للحشرات. لقد كان المنطق يشير إلى امكانيات استخدام أهم الانسجة من النباتات خاصة البذور كمصادر لهذه المواد الفعالة بيولوجيا.

بسبب تشابه التراكيب من المصادر المختلفة والتي اكتشفت من خلال الاقترابات المختلفة وبسبب المناقشات السابقة التي تناولت المركبات المضادة للحشرات من الكائنات المختلفة اتفق على تناول المعلوماتية عن هذه المركبات في هذا المقام من خلال عمل مجاميع أولية ترتب أليجديا تبعاً لتشابه التراكيب مع أقسام خاصة بالمركبات الناتجة من البكتريا والاكيتنوما يسيتس والفطريات كمصادر للمركبات الثانوية. هذا ولو أن البيبتيدات الحلقية سوف تتناقش بشكل منفصل. هذا النظام يقلل من التكرار في حالة ما إذا كان نفس المركب/المركبات تنتج بواسطة كائنات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحقق امكانية تمثيل كيفية احداث الفعل مع توفر بيانات العلاقة الكمية بين التركيب والفاعلية QSAR. كذلك فإن المركبات التي تعمل في ظل نظام التنشيط أو توجد في مخاليط من نفس الكائنات سوف يلقي الضوء عليها بشكل منفصل.

### ❖ الأليلوكيميائيات المضادة للحشرات Antiinsectan allelochemicals:

يوجد العديد من الأليلوكيميائيات ذات أوزان جزيئية أقل من ١٠٠٠ أظهرت فاعلية ضد الحشرات. العديد من هذه المركبات اشتقت من الفطريات وأختبرت ضد دودة كيزان الذرة. السمية لهذه المركبات قدرت بنفس طريق التقييم عن طريق الفم Oral assay والتي تفاوتت من موت محسوس مع تركيز أقل من ١٠٠ جزء في المليون وحتى الخفض القليل في معدلات النمو مع تركيزات الالف من الاجزاء في المليون. هذا ولو أن الفاعلية مع التركيزات العالية قد تكون وثيقة الصلة من الناحية البيولوجية للتركيز الذى وجد في المادة المصدر. المستخلصات من الكائنات المنتجة مثل *Amanita muscarina* استخدم كمركب قاتل للذباب منذ العصور الوسطى (Dickinson and Lucas) medieval times (١٩٧٩).


### ❖ المركبات المضادة للحشرات التى اشتقت من البكتريا غير الخيطية:

#### ❖ أحماض الكيل تترأ هيدروفيوران Alkyltetrahydrofuran acids

المركب ٥- ن- هكسيل- تترأهيدروفيوران- ٢- أسيتيك أسيد عبارة عن مركب حيوى متحول أو مشتق الحامض من ١٢- هيدروكسى أوكتالديكانوبك أسيد بواسطة بكتريا باسيليس لينتس (Huang وآخرون ١٩٩٦). لقد اتضح أن هذا المركب له نشاط مشابه لهورمون الشباب ضد عذارى كاربوفيلس هيميبترس. حيث أحدث ١٥% أطوار وسيطة مشوهة من العذارى- الحشرة الكاملة بعد المعاملة بتركيز ٠,٢ ميكروليتر من محلول ١ ملليجرام/ مليلتر من محلول الميثوبرين. هذا بينما أنت المعاملة بتركيز ٠,٢ مللجم من المادة النقية لحامض الكيل تترأهيدروفيوران الى انتاج ٨٠% من الأطوار الوسيطة من العذارى والحشرات الكاملة.

#### ❖ Amino levulinic (5- amino-4-pentanoic acid)

حامض 5-(δ)-amino levulinic ينتج بواسطة العديد من البكتريا الضوئية phototrophic مثل *Anacystis nidulans*, *Anabaena variabilis*, *Rhodobacter sphaeroides*, *R. plautis* وغيرها كما أن البكتريا ذات الاغذاء الكيميائى Chemotrophic ومنها الهوائية مثل *Pseudomonas riboflavina* *Propionibacterium shermanu*, واللاهوائية مثل *Methanosarcina barkeri*, *Methanobacterium thermoautotrophicum*. تستطيع إنتاجها. عندما أعطى المركب ٥- أمينولييفولينيك أسيد لحشرة *H. zea* ٢٥٠ جزء في المليون أحدث خفض في النمو




**5-*n*-hexyl tetrahydrofuran-2-acetic acid (5-HTFA)**



### 5-Amino Levulinic Acid

### ❧ الدیابر و ٹیکنات :Diabroticins


لقد تم عزل الديابروتيكينات من مزارع بكتريا باسيلليس سبتيلس. لقد ظهرت فاعلية الديابروتيكينات A و B بمعدلات ٢-٤ ، ٢٥-٥٠ جزء في المليون على التوالي ضد يرقات العمر الاول من حشرة ديابروتكا انديسوم بنكتانا (Stonard وآخرون ١٩٩٤).



### Diabrotin A

### ٤ ثوليوتين Thiolutin:


البكتريا التكافلية *xenorhabdus sp.* المرتبطة بالنيما تودا الممرضة للحشرات *Steinernema* وبعض الاكتينومايسيتس تنتج الثوليوتين. المركب يقتل يرقات حشرة ليوسيليا بكاتا بمستويات غير محددة.



Thiolutin

### ٤ ثورنجينسين (β-exotoxin) Thuringiensin:


المركب ينتج بواسطة باسيليس ثورنجينسيس وهو فعال ضد الاكاروسات والحشرات في رتب غمدية الاجنحة ونصفية وغشائية ومتساوية وحرشفية ومتساوية الاجنحة. المركب يؤثر على المراحل الاخيرة من تخليق الحامض النووي RNA كما ان الصورة غير المفسرة غير سامة نسبيا.



b-Exotoxin

### ٤ زينورايدينات Xenorhabdins

لقد تم عزل زينورايدينات من البكتريا التكافلية *xenorhabdus spp* التي تحدث مع النيما تودا الممرضة للحشرات *Steinernema*.






### Xenorhabdin 1

المركبات المضادة للحشرات المشتقة من الاكتينومايسيتس:

### General antibiotics الحيوية العامة

لقد نشرت العديد من الدراسات المرجعية عن تأثيرات المضادات الحيوية التي تنتج بواسطة ستربتو مايسيتس على الحشرات. اختبارات المضادات الحيوية ضد الحشرات تجرى منذ عام ١٩٤٥. من بين المضادات التي اختبرت على الانواع المختلفة من الحشرات ما هو موصف في الجدول التالي حيث ثبت أن أكثرها فعالية هو اكتينومايسين A ، سيكلوهكسيميد ، نوفوبيوسين ولو أن الفعالية متفاوتة. لقد وجد أن نوفوبيوسين والاكتينومايسين A تثبط تخليق البروتين




جدول يوضح السمية العامة للمضادات الحيوية على الحشرات

المركب Compound	حشرية الأجنحة Lepidoptera	متجسدة الأجنحة Homoptera	شعيرة الأجنحة Coleoptera	متساوية الأجنحة Orthoptera	العنكبوتية Mites
amphotericin	L	L	-	-	M,H
ampicillin	-	L	-	-	M
anisomycin	-	-	-	L	-
anthelmeycin	-	M	-	-	H
Antimycin A	L	L	M	L,H	M
actinobolin	-	-	-	-	L
bacitracin	L	-	-	L	L
brevicidin	-	L	-	-	-
cadidicin	-L	-	-	L	-
chloramphenicol	M	-	-	-	-
chloromycetin	-	L	-	-	M
chlortetracycline	-	-	H	-	-
cytovirin	L	L,M,H	-	-	H
cycloheximide	L,H	L,M	-	-	H
erythromycin	L	-	-	-	M
flavensomycin	-	-	-	M	-
fumagillin	L	L	-	-	-
fungichromin	L	L	-	-	-
furacin	-	-	-	L	-
griseoviridin	L	-	-	-	L
hygromycin	L	L,H	-	-	-
kanamycin	L	L	-	-	M
mitomycin	-	M	-	-	M
nemomycin	L	-	-	M,H	M
novobiocin	H	L,M,H	-	-	H
nybomycin	-L,M	-	-	-	-
nystatin	-	-	-	L	M
oleandromycin	-	M	-	-	M
pactamycin	-	L	-	L	H
penicillin	L	L	-	-	-
oxytetracycline	-	L,M	L,M	-	L
phleomycin	L	-	-	-	-
phytoactin	M	L	-	-	M
polymixin	-	-	-	L,H	M
puromycin	-	L	-	-	H
ristocetin	L	-	-	-	-
sarkomycin	-	L	-	-	M
streptomycin	-	-	L,M	M	-
streptoviridin	L	L,M,H	-	-	M
terramycin	-	-	-	L,M	L
thiopyrametin	-	-	-	L	-
Trisulfamic	-	-	-	L	-
Tylosin	L	-	-	-	L
Tyrosin	L	-	-	-	L
vancomycin	L	-	-	-	L
Viomycin	-	-	-	L	-
viridogrisein	-	L	-	-	L
Venturicidin	M	-	-	-	-
xanthomycin	-	-	-	H	-
	H = عالية	M = متوسطة			L = قليلة

L= low, M= moderate, H= high; relative to other compounds tested on the same species. Multiple entries indicate information on multiple species. Modified from Huang and Shapiro (1971). Most structures are available in Glsby (1976).

### ٤ المضاد الحيوي A 204


المركب من النوع بولى أثير يرتبط بالموننسين monensin وهوينتاج بواسطة ستربتومايسيس الفس حيث يحدث ١٠٠% موت فى حشرة من القطن بتركيز ١٠٠٠ جزء فى المليون عند الرش قميا



Antibiotic A204A


### ٤ ال- الاتوسين L-alanosine

المركب ال- الاتوسين ذات التركيب ال- ٢- أمينو- ٣ (هيدروكسى نيتروساميتو)- بروبيونيك أسيد تم عزله من أنواع مختلفة من الاستربتومايس مثل S. alanosinicus. عندما يضاف المركب للغذاء ينشط التخلص من كبسولة الرأس فى ٥٠% من يرقات حشرة لبوسينا سيبيراتا.



### ٤ اللوساميدين Allosamidin


لقد تم عزل المركب من أنواع ستربتومايسيس. المركب ينشط انزيم كينينيز فى





### Antibiotic B-41 المضاد الحيوي


المركب عبارة عن لاکتون حلقي (براءة اختراع في أمريكا رقم 3,984,563)  
دون فاعلية موصفة على الحشرات والاکلروسات



### Antibiotic B41

1 | **أپلاسموماسین Aplasmomycin**

المركب ينتج بواسطة ستریتومايسيس جریس. يسبب المركب ١٠٠% موت  
في العنكبوت *T. urticae* بتركيز ١٠٠ جزء في المليون




## ٤ المركبات العطرية للنيترو

لقد عزلت هذه المركبات في سترينومايسيس جرييس الصنف أوتوتروفيكس وقد أحدث موت ١٠٠% ليرقات بعوض الايبس عند تركيز ٦,٢٥ جزء في المليون.

## ٥ أفيرميكتينات Avermectins

لقد عزلت في الاساس من سترينومايسيس أفيرميكتيلس. الصور التجارية تشمل أفيرميكتين ivermectin (٢٢, ٢٣- ديميدروأفيرميكتين B<sub>1</sub>) لأفات الدواجن والمواشي وكذلك أبامكتين abamectin (٨٠% أفيرميكتين B<sub>1</sub>: ٢٠% أفيرميكتين Bib) لأفات البساتين. لقد سجلت اختلافات كبيرة في الفاعلية حتى بين الحشرات القريبة. لقد وجد أن الاختلافات في السمية ترجع الى الاختلافات في مستقبلات الجابا GABA receptors حيث كانت المعايير الاخرى مثل النفاذية والتمثيل متشابهة. التأثيرات تحت القاتلة شملت عدم امتداد الكيويتكل ولم يتأكد حدوث تأثيرات ممانعة للتغذية. لقد تأكدت العلاقة بين التركيب والفاعلية. الافيرميكتين يرتبط بشكل متخصص ببروتينات قناة الكلوريد المختلفة لانتاج أيون الكلوريد المتحرك في لخلايا العصبية مما يؤدي الى شلل لا شفاء منه.


لقد سجلت حالات مقاومة للأبامكتين في حشرة L. decemlineata. يشترك فيها انزيمات الاكسدة والتحلل المائي.



Avermectin B<sub>1a</sub>

### ٢٤ أوريوثين Aureothin


المركب ينتج بواسطة ستربتومايسيس ثيولوتيسنس. لقد أحدثت جرعة ١ ميكروجرام موت ٧٥% من أبى دقيق الكرنب. عندما رش المركب بمعدل (١٠ ميكروجرام / ملي لتر) محلول حدث موت ٩٥% في العنكبوت الأحمر تترانكس كغازاوا.



Aureothin

### ٢٥ بافيلومايسينات Bafilomycins


المركبات تنتج بواسطة ستربتومايسيس جراسيمس. المعاملة بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون مع الغذاء أظهرت فاعلية ضد ذبابة الفاكهة. المركب بافيلومايسين A<sub>1</sub> يحدث خلل في تكوين حامض الدنا في الدروسوفيلا عن طريق تثبيط انزيم ATP ase المشترك في التنظيم الايوني



Bafilomycin

### ٢٦ سترترومايسين Citromycin


المركب ينتج بواسطة S. hygroscopicus. عندما تغتذ الذباب والصراصير على تركيز ٥٠٠ جزء في المليون أحدثت المركب ٣٠، ٥٠% موت على التوالي. السمية قد ترجع الى التأثير على أنبيات ملبيجي في الحشرات.



**Citromycin**

### ٤ كونكانا ميسينات Concanamycins


المركبات تنتج بواسطة *S. diastatochromogens*. المركب فعال ضد أنواع عديدة من الحشرات. المركب كونكاميسين A يثبط انزيم ATP ase من خلايا الدخان كذلك قد يعمل كما في الباقيلوميسينات على تنظيم الايونات في أنبيات مليجي في الحشرات.



**Concanamycin A**


### ٤٢ ديوكسا بيرولوميسين Dioxapyrrolomycin

لقد تم عزل المركب بداية من *S. fumanus* ووجد فعال ضد العديد من أنواع الحشرات والاكاروسات. بالرغم من أن المركب له سمية غير مرغوبة على الفقاريات إلا أنه يعتبر مركب رائد التركيب للحصول على بعض المشتقات الفعالة. المركب يحدث الفعل عن طريق عدم ازدواج الفسفرة للتأكسدية.




### ٤٣ الفيريغوجينات Faeriefungins

لقد عزلت في *S. griseus* من الصنف *var. autotrophicus* وهي في العادة خليط في مركبين يختلفا في وجود أو غياب مجموعة ميثيل. المخلوط B,A أحدث موت ١٠٠% في يرقات بعوض الابيينس إيجيبتى.




المركب ينتج بواسطة *S. griseus* من الصنف أوتوتروفيكس وهو فعال ضد البعوض




### ٤ ليوكاتيسيدين Leucanicidin

المركب ينتج بواسطة *S. halstedii* ويحدث ١٠٠% قتل ليرقات *L. separate* بعد ٤ أيام من المعاملة بتركيز ٢٠ جزء في المليون




### ٥ ميلبيميسينات Milbemycins

الميلبيميسينات عبارة عن مركبات macrolide عزلت في الاستربتومايسين مثل *S. hygroscopicus* تحت النوع *aureolacrimosus*. سلاسل الالفا تحتوي على حلقة نتراميدروفوران ولكن سلاسل البيتا لا تحتوي على هذه الحلقة مع سلاسل ١٠-ألفا وسلاسل 5-B. المركبات فعالة ضد الاكاروسات. المركبات تحدث الفعل على غرار الاقيرمكتينات عن طريق فتح قناة الكلوريد.




### ٦ نيكومايسين Nikkomycins

المركب عزل من *S. tendae* وهي مركبات مثبطات فعالة لانزيم سينيز الكيتين ولو أن هذا الانزيم في حشرة هيلوفورا سيكروبيا لم يتأثر نسبيا بالمقارنة بالانزيم *T. ni*




#### ٤ أوكسوهجروليدين Oxohugrolidin

المركب ينتج بواسطة *S. hygroscopicus*. عندما أضيفت ١٠٠٠ جزء في المليون للغذاء لم تلاحظ فاعلية واضحة ضد حشرة ذبابة الفاكهة وغيرها.



#### ٤ البيرييسيدينات Piericidins


تنتج بواسطة ستربتومايسيس ماباراينسيس *S. mabaraensis*. لقد عرف أن البيرييسيدينات B,A سامة للعديد من أنواع الحشرات. لقد عرف تشاكل البيرييسيدينات A للمرافق الانزيمي Q. يتفاعل البيرييسيدينات مع DPNH (NADPH) وهيدروجينيز عند موقع قد يكون هو نفسه كما في الروتينون كما يثبط انزيم سكسينيك ديهيدروجينيز من خلال التنافس على المرافق الانزيمي Q كموقع ارتباط. هناك أمثلة عديدة تشير إلى البيرييسيدينات يثبط نظام نقل الإلكترون في الميتوكوندريا بما فيها الحشرات.



#### ٤ راسيموميسينات Racemomycins

تنتج هذه المركبات بواسطة ستربتومايسيس لافنديولا *S. lavendulae*. الفاعلية ضد الحشرات تزداد مع زيادة أعداد بقايا البيتا-لايسين ولو أن غياب حلقة ستروبولينيدين يقل بشكل كبير من الفاعلية ضد الحشرات. عند تناول المركب بواسطة


الذئب المنزلي بجرعة ١٠٠٠ جزء في المليون حدث موت ٣٠، ٥٠، ٨٠% بعد ٤٨ ساعة مع راسيموميسين A, B, C على التوالي.



Racemomycin A

#### ٤ رودابلوتين Rhodaplutin

ينتج المركب بواسطة Noardioides albus. عندما أضيف المركب مع الغذاء بمعدل ٤٠٠ جزء في المليون لم يسبب نشاط موصف ضد العديد من الحشرات مثل الدروسوفيلا ومن الخوخ والاكاروس.




Rodaplutin

#### ٤ سبينوسينات Spinosyns

هذه المركبات متاحة تجاريا وقد عزلت في البداية من الاكتينومييسيت Saccharopolyspora spinosa. تنتج صور عديدة في بيئة التخمر ولكن الأكثر شيوعا هي سبينوسين D, A ذات ٣، ٨، ٠ جزء في المليون كتركيز نصفى قاتل على التوالي ضد يرقات دودة اللوز الامريكية. لقد لوحظت فاعلية كبيرة ضد حشرات نصفية وغشائية الاجنحة وغيرها وهي ضعيفة الفاعلية ضد المن والنيماتودا. وجود أو غياب




مجموعة ميثيل فردية في أى موضع نقل من النشاط ضد دودة اللوز الشوكية بحوالى ٢٠٠ مرة. سبينوسينات تسبب نشاط ثابت في مستقبلات نيوتينيك أسيتيك كولين وتغير من وظيفة قنوات الكلوريد لأبواب الجابا. سبينوسينات فعال على نسق البيرثرويدز المخلقة ضد حشرات حرشفية الاجنحة.



Spinosyn A

#### ٤ تترانكتين Tetranactin

ينتج بواسطة سترپتومييسيس أوريس *S. aureus* وهو فعال ضد الاكارسات وقليل الفاعلية ضد يرقات البعوض. خليط ديناكيتين والترأى نكتين والتترانكتين يحدث ٨٤,٨% موت عند معدل ١ ميكروجرام/حشرة *C. chinensis*. المركب يعمل على عدم ازدواج الفسفرة التأكسدية كما في ميتوكوندريا الصرصور




Tetranactin

#### ٤ ثيوليوتين Thiolutin

ينتج بواسطة سترپتومييسيس البس، سترپتومييسيس سيلوفلافس والبكتريا زينورايدس. التركيز النصفى القاتل على يرقات *L. sericata* تساوى ٣٢ جزء في المليون.

### ٤٢ فالينومييسين Valinomycin




ينتج المركب بواسطة *S. griseus*, *S. roseochromogenes*, *S. flavissimus*.  
لم يظهر المركب فاعلية على الذباب المنزلي عندما عومل قفيا ولكن كان شديد الفاعلية عندما حقن في الذكور والاثاث حيث وصلت الجرعة النصفية القاتلة ٠,٠٢ ، ٠,٠٣ ميكروجرام/ ذبابة على التوالي. عند التركيزات غير القاتلة يسبب فالينومييسين عدم انتظام في ضربات القلب في الصرصور الأمريكي، الكالينومييسين محب للأيونات ذات اختيارية عالية لأيونات البوتاسيوم مما يجعلها تتحرك عبر أغشية الليبيدات ومن ثم يتداخل مع النقل النشط.




### ٤٣ المركبات المضادة للحشرات المشتقة من الفطريات

#### ٤٣ الفينوليكتات Phenolics

يوجد العديد من الفطريات تنتج مركبات الفينوليكتات كذلك التي تحدث في النباتات الراقية. هذه المركبات تشمل حامض فيروليك (ينتج بواسطة فطر الريزوكتونيا) وحامض السيناميك والمثيلسينامات (ينتج بواسطة الفيوزاريوم والبسيليوم والريزوكتونيا واللينتينس والايورونيوم) وحامض البنزويك ومشتقاته (تنتج بواسطة أسبرجيلس، أيورونيوم، لامبرتيللا، بنسيليوم، بولي بورس، لينتينس) وحامض الفانيليك (ينتج بواسطة ريزوكتونيا ليجيو مينيكولا وريزوكتونيا سولاني) وحامض الكوماريك (ريزوكتونيا، أيورونيوم).





### ٢٠ بولي (أسيتيل) أستيلينات poly(acetyl)enes



البولي أستيلينات تنتج بواسطة أنواع عديدة من الفطريات ومعظمها مكونات عيش الغراب. الفطريات التي تنتج البولي أستيلينات تشمل Agrocyebe, Camorophyllus, Clitocybe, Collybia, Coprinus, Daedalea, Drosophila, Fistulina, Fomes, Gymnophilus, Hydnum, Kuehneromyces, Pemophora, Pleurotus, Polyporus, Psilocybe, Ramaria, Resinicium, Russula, Serpula, Stereum, البولي أستيلينات التي تنتج بواسطة هذه الفطريات تكون ذات ٩ أو ١٠ ذرات كربون (في مقابل ١٣ ذرة كربون في النباتات) وقد تكون متماثلة أو مشابهات لتلك المشتقة من النباتات. البولي أستيلينات تنشط ضوئياً وتلك المشتقة من النباتات سامة على الحشرات.



### Polyacetylene

#### ٢١ تربينويدز Terpenoids

العديد من أنواع الفطريات تنتج التربينويدز على نفس المنوال كما في النباتات الراقية. الجيرانوليول ومشتقاته تنتج بواسطة Ceratoeystis spp و Trichothecium spp أما اللينالول ينتج بواسطة Lactarius, Phellinus and Trichothecium spp, Agaricus, Boletus, Ceratocystis Cronartium fusiforme أما الليمونين ينتج بواسطة Conartium fusiforme هذه المركبات فعالة ضد العديد من أنواع الحشرات.






$\beta$ -Pinene



Limonene

### ٢ الأفلاتوكسينات Aflatoxins

بداية تقوم فطريات أسبرجلس فلافس، أسبرجلس باراسيتيكس بإنتاج الأفلاتوكسينات. لقد تم دراسة فاعلية هذه المركبات على الحشرات. أظهرت نتائج التمثيل الأولى في مسار التخليق الحيوي للأفلاتوكسين سمية أقل على العمر البرقي الأول لحشرة أوسترينيا نوبيلاليس. الأفلاتوكسين بمعدل ١٠٠٠ جزء في المليون أحدث ١٠٠% موت بينما سبب Sterigmatocystin بمعدل ٦٠٠٠٠ جزء في المليون ٤٥% موت بينما سبب Versicolorin، averufin، حمض norsorlinic لم تظهر أية فاعلية بتركيز ٦٠٠٠٠ جزء في المليون.




Aflatoxin B<sub>1</sub>

لوحظ تتأصل شاذ في الحشرات التي تناولت مستويات غير قاتلة من هذه المواد. الأفلاتوكسينات تنشط انزيميا إلى الأيوكسيد الذي يتفاعل مع بقايا الجواندين في الحامض النووي DNA والذي يتحول إلى فورماميدوبيريميد. هذا الشذوذ في الحمض "الدنا" يسبب أخطاء خلال النسخ. عند إعطاء المركب عن طريق الفم أظهرت بعض الحشرات مثل الذباب والديدان حساسية عالية بينما البعض الآخر مثل

الصراصير أظهرت مقاومة. الدراسات على مبيض الذباب المنزلي أظهرت تداخل مع DNA وتخليق r RNA. أظهرت دراسات أخرى على حشرة H. zea في المعى الأوسط تحول أولى للأفلاتوكسين B<sub>1</sub> إلى صور أخرى B أو G ذات نفس السمية. توجد جينات عديدة تشترك في مقاومة السلالات المختلفة من الدروسوفيلا ولكن ميكانيكية هذه الظاهرة ما زالت غير معروفة.

#### ٤٤ أفلاتريمات Aflaterms


لقد تم عزل هذه المركبات من فطر أسبرجلس فلافس، أسبرجلس براسينيكس، أسبرجلس سباوليفيس سكروشيا. لم يظهر هذا المركب فاعلية عند ١٠٠ جزء في المليون ضد اليرقات والخنافس. المركب المرتبط B. aflaterem عزل كذلك من أسبرجلس فلافس سكروشيا.



β-aflaterm

#### ٤٥ أفلافانينات Aflavanines


الأفلافانين والديهيدروكسي أفلافانين عزلت من أسبرجلس فلافس بما فيها الاجسام الحجرية للأسبرجلس فلافس. عند ٢٥ جزء في المليون أحدث ديهيدروكسي أفلافانين ٣٣، ٣٥،٥% نقص في النمو في دودة اللوز الأمريكية و S. frugiperda على التوالي. لقد كانت المشتقات الأخرى غير فعالة ضد الحشرات. لقد تم عزل ثلاثة أفلافانينات جديدة من الاجسام الحجرية للأسبرجلس توبينجينسيز الصورة الكيتونية هي الوحيدة الفعالة حيث أحدثت ٦٨% خفض في النمو، ٣٨% خفض في الخصوبة في يرقات دودة اللوز الأمريكية و C. hemipterus على التوالي



Dihydroxyaflavanine


## ٤ أفلافازول Aflavazole

تم عزل هذا المركب من سكليروشيا الاسبرجلس فلاقس حيث سبب ٧٥،  
٦٢،٥% خفض في تطور يرقات والحشرات الكاملة C. hemipterus على التوالي.



## ٤ أرينارينات Arenarins


لقد عزات هذه المركبات من سكليروشيا اسبرجلس أرينارينس. لقد أحدث  
الأرينارين A ١٣% خفض في النمو للحشرات الكاملة من C. hemipterus أما  
الارينارينات B، C أحدثت ٢٠، ١٣% خفض مع تركيز ١٠٠ جزء في المليون على  
الحشرات الكاملة على التوالي.



Arenarin A

## ٤ أسبرنتين Asperentin


تقوم فطريات أسبرجلس وكلاوسوبوريوم وإبروتيوم بإنتاج أسبرنتين ومشتقاته.



Asperentin

## ٤٢ أسبيرنومين Aspernomine


لقد تم عزل هذا المركب من ميكروشيا الفطر اسبرجلس نوميس وهو فعال ضد بركات دودة الذرة الاوربية بمعدل ٢٥ جزء في المليون.



Aspernomine

## ٤٣ أوراسبيرونات وفونسيينونات Aurasperones and fonsecinones


يتم انتاج هذه المركبات بواسطة أنواع مختلفة من الاسبرجلس. تحدث للمركبات تثبيط في نشاط انزيمات NADH أكسيداز في دودة الذرة الاوربية وغيرها.



Aurasperone A

### أزوكسي بنزينات Azoxybenzenes


الازوكسي بنزينات 4-hydroxymethylazoxybenzene-4- The azoxybenzenes عزلت في السلالة الممرضة carboxylic acid. and azoxybenzene-4,4'- dicarboxylic acid للحشرات في الفطر *Entomophthora virulena*. عندما استخدم ٢,٥ ميكروجرام في حامض الابروكسي حقنا في حشرات *C. vicina* البالغة حدث موت ٧٧,٥% خلال ٧٢ ساعة وعند جرعة ٢,٧ ميكروجرام لكل ذبابة كان الحامض الثنائي diacid غير فعال



Azoxybenzene Derivative

### مشتقات بينافثالين Binaphthalene derivative


لقد تم عزل هذه المشتقات من فطريات نباتية داخلية غير معروفة في شجرة الاركس الشرقية larch (*Larix laricina*) وقد وجدت سامة لدودة البراعم حيث أحدثت ٩,٦% موت مع تركيز ٤٠٠ جزء المليون.



Binaphthalenyl Derivative

### أبريفيناميدات Brevianamides

المركبات تنتج بواسطة الفطريات *Penicillium brevicompactum* و *Penicillium expansum*




Brevianamide




## ٢ كاربوناريينات Carbonarins

لقد تم عزل العديد من الكاربورينات من سكليروشيا اسبرجلس كاربوناروم ووجدت فعالة ضد الحشرات. هذه المركبات ذات مقدرة على تثبيط NADH اكسيديز



## ٣ سيربيريوسيدات Cerebrosides


تم عزل هذه المركبات في *Schizophyllum commune* (Mizuno, 1995) و *Humicola fuscoatra* والطفيل النباتي *Pachybasium* (= *Trichoderma*) sp. و (Wicklow et al. 1998)



## Cerebroside D


## ٤ شيتوجلوبيوسينا Chaetoglobosins

لقد تم عزل هذه المركبات من *Chaetomium* spp. *Penicillium aurantio-* و *Diplodia macrospora* و *virens*



## ٤ كرومينات Chromenes


الكرومينات على غرار البريكوسينات عزلت من *Lactarius fuliginosus* و *L. picinus* وقد توجد في *L. fumosus* وهي فعالة ضد بعض الحشرات. لقد لوحظت تفاعلات موجبة للكرومين عندما تم فصلها بالكروماتوجرافي TLC ولكن لم يمكن عزل المركبات النقية.



Lactarius Chromene

## ٤ سيترينين Citrinin


لقد تم عزل ٢٨ المركب في *crotalaria crispata* والعديد من أنواع البنسيليوم السيترينين بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون أحدث خفض في نمو الحشرات من ٦-٤٠%. أنبيات ملبى في الحشرات والتي تقارن مع كل الفقاريات تعتبر هدف السيترينين. لقد وجد أن السيترينين يثبط تخليق الكوليسترول في الفئران وقد تكون الميكانيكية ممكنة الحدوث في الحشرات.



Citrinin

## ٤ كليتوسين Clitocine


ينتج بواسطة عش الغراب *Clitocybe inversa* وليس له فعل متخصص ضد دودة اللوز القرنفلية



Clitocine

### ✧ كورديسبين Cordycepin


الكورد سيبين (٣ - ديوكسي أدنوسين) ينتج بواسطة الفطر الممرض للحشرات *Cordyceps miliaris* واسبرجلس نيتيولانس. المركب فعال ضد دودة الشمع.



Cordycepin

### ✧ كلمورين Culmorin


المركب ينتج بواسطة فيوزاريوم كالموريوم، *F. graminearum*، *F. nivale*



Culmorin

### ✧ سيكلوبينول Cyclophenol


ينتج بواسطة العديد من البنسيليوم



Cyclophenol

## ٤ حامض سيكلوبيلازونيك Cyclopiazonic acid


ينتج بواسطة أنواع مختلفة من فطريات بيسييوم وأسرجلس. الفاعلية قد ترجع الى التداخل في تنظيم الضغط الايدروستاتيكي كما في حالة مركب روتياميد. الهدف على المستوى الخلوي انزيم ATP ase الناقل للكالسيوم في الشبكة الاندوبلازمية. هذا دعا الى الاقتراح بان ATP- ase في أنبيات مليجي تتأثر مما يعبر من تنظيم الماء كما هو الحال مع الباقيلوفايسين.




Cyclopiazonic Acid

## ٤ سيتوكالسينات Cytochalasins

تنتج بواسطة أنواع عديدة من الفطريات. *Aspergillus clavatus*, *A. terreus*, *Chalara microspora*, *Helminthosporium dematioideum*, *Metarrhizium anisoplia*, *Phomopsis* spp., *Rosellinia necatrix*, and *Zynosporium masonu* المركبات تثبط نقل السكر عبر الاغشية.




Chaetochalasin



Cytochalasin H

## ٤ ديندروشين Dendrochin


ينتج بواسطة *Dendrochium foxicum* ويسبب ٤١% موت ضد دودة الشمع. الديندروشين يزيد من قطر أنبيات مليجي في يرقات الحشرة.



**Dendrodochin A**

### ٤٤ ديموسيبين Dermocybin


تم عزل المركب من أنواع مختلفة من Dermocybin. المركب يشبط تحول البرقة في الدروسوفيللا الى عزاء بمعدل ٧٢% عند ٣٥٠ جزء في المليون.



**Dermocybin**

### ٤٥ إي-٦٤ ومثبطات الثيول بروتيناز E-64 and related thiol protease inhibitors


المركب E-64 (L-trans-epoxysuccinyl-leucylamino-(4-guanidino)-butane) عزل في أسبرجلس جايونيكس. المركبات المرتبطة استاتينات B,A Estatins عزلت من Myceliogthora thermophila أما مركبات B,A Cathestatin عزلت من بنسيليوم سترينيوم وتم عزل مركبات B,A AM 4299 من كروميلوسوريوم فلفوم. لقد استخدم المركب E-64 في داخل الحشرة في بعض الحالات لتوصيف نشاط بروتيناز معدة الحشرات. عندما أضيف المركب E-64 لغذاء خنفساء كالوسوبروكس ماكولاتس أحدث موت ٤٣% وسبب خفض في مدة بقاء الحشرة وخفض من نسبة تحول العذارى الى حشرات كاملة.



E-54


### كـ مركبات إيشيلونيكت Echinulins

تنتج هذه المركبات بواسطة فطريات اسبرجلس ومنها *A. ochraceus*. الأيزو إيشيفولين A يثبط نمو دودة الحرير بدرجة غير موصفة عند معدل ١٠٠٠ جزء في المليون.



### كـ إيمودين Emodin


عزل من أنواع عديدة من الفطريات تشمل *Acrocyphus sphacrophoroides* و *A. Hypocrea*, *Nephoroma*, *Penicillium*, *Phoma*, و *aculeatus*, *Aspergillus wentii*, *Eurotium*, *Pyrenochaeta*, *Talaromyces*, و *Cetraria cucullata*, *Drechsleera sp.*, و *Xanthoria* المركب يحدث ٤٦,٧% موت عند معدل ٤٥ جزء في المليون على الدروسوفيللا كما يخضع من التحول الى طور العنقاء.



Emodin

### ٢٤ إبيورومينات Epiamauromines


هذه المشتقات تنتج بواسطة الفطر اسبرجلس أوكراسيوس *A. ochraceous*.  
الايبيورومين و ن - ميثيل ايمورين يحدثا ٣٠ ، ١٧% خفض في النمو في يرقاات  
دودة اللوز الامريكية على التوالي. التركيب قريب من مركب أمورجين المعزول من  
الفطر *Amauroascus* وهو Vasodilator



N-Methylepiamauromine


### ٢٥ إرجوفالين Ergovaline

يبدو أن المركب إرجوفالين ينتج بواسطة الفطر الداخلي *Acremonium lolii* /  
*arundinacea* وهو المسئول عن النشاط ضد الحشرات. الإرجوفالينات لها ميل عالي  
لمواقع الارتباط ٥- هيدروكسي تريتامين وقد يكون له ميل عالي كذلك لمواقع الارتباط  
الدوبامينية dopanergic.



### ٢٦ إيوجينيتين Eugenetin


الفطريات *Cylindrocarpon sp.* والاسبرجلس تنتج الإيوجينيتين. التأثيرات غير  
القاتلة تشمل مناطق بدون صبغة في الكيوتكل وهذا قد يرجع للتداخل مع التانينات.



Eugenetin

#### ❧ فيوزارينتينات Fusarentins


تم عزل هذه المركبات من السلالة الممرضة للحشرات من الفطر فيوزاريوم لارفارو *Fusarium larvaru*. المركبات فيوزارينثيت-٦-ميثيل إثير (١٠ ميكروجرام) والفيوزارينثين ٦ دا ميثيل إثير (٧ ميكروجرام) أحدثت ٣٠% موت بعد ٣ أيام.



Fusarentin Derivative

#### ❧ حامض فيوزاريك Fusaric acid

ينتج بواسطة العديد من أنواع الفيزوزاريوم. عندما حققت ٢٠ ميكروجرام في حشرات *C. vicina* حدث موت ٧٠% بعد ٣ أيام. المركب ذات أهمية أكبر كمنشط في التكوين المرافق للمركب.




Fusaric Acid

#### ❧ جريزوفولين Griseofulvin

لقد تم عزل المركب من العديد من أنواع فطريات الينسيليوم بما فيها سكليروشيا *P. raistrickii*. المركب القريب ٦-ديسل ميثيل جريزوفولفين عزل كذلك من سكليروشيا *P. raistrickii*. المركب يتداخل مع انقسام الخلية في *Antheraea poly-*phen. لا يوجد ما يدل على أن المركب يتداخل مع تخليق البروتين في الحشرات.




يبدو أن المركب يتأكسد في البداية بواسطة انزيمات الاكسدة في حشرة *S. frugiperda* ودودة اللوز الامريكية!



Griseofulvin

#### ٧ هيبتيلايديك أسيد Heptelidic acid


الهيبتيلايديك أسيد ومشتقاته تنتج بواسطة *Anthostoma avocetta*. حامض *Chaetomium globo-sum*, *Glidocladium virens*, *Trichoderma viridae* هيبتيلايديك (٢,٢ ميكرومول) وهيدروهيبتيلايديك (٨,١٦ ميكرومول) وهيبتيلايديك أسيد كلوروهيدرين (٧,٤ ميكرومول) أحدثت قتل ٧٨ ، ٨٨ ، ١٠٠% في حشرة *C. fumiferana* بعد اسبوعين عندما اضيفت مع الغذاء.



Heptelidic Acid


#### ٨ هكسينيل بنزوفوران Hexenylbenzofurans

المركبان [5-hydroxy-2-(1'-oxo-5'-methyl-4'-hexenyl)benzofuran and 5-hydroxy-2-(1'-hydroxy-5'-methyl-4'-hexenyl)benzofuran] عزلا من فطريات داخلية غير معروفة من نجيل الشتاء *Caultheria procumbens*. المركب الاول أحدث ٣٦% موت في حشرة كريستيبورا فيوميفيرانا.



## ٤ مشتقات الهيدروكينون Hydroquinone derivatives


المركب ٢- ميثيل هيدروكينون ينتج في بنسيليوم يوريتيسيا، نكتاريا أريوبسيسنس، وأنواع الفوما، *Scopulariopsis brumptii*. المركب فعال ضد يرقات *O. nubilais*.



2-Methyl-hydroquin

## ٥ أيزوبوكسيدونات Isoepoxydons


الايروبوكسيدون عزل من بنسيليوم يوريتيسيا وبورونيا بنكتاتا. المركب فعال ضد حشرة *H. zea* في مدى ١٠٠٠ جزء في المليون.



(+)-Isoepoxydon

## ٦ أيزوبيماداترينات Isopimaratrienes


لقد تم عزل مركبين داي تربونيد أيزوبيماداترينات من فطريات داخلية غير معروفة من *balsam fir*. هذين المركبين حققا ٤٤% موت مع حشرة *C. fumiferana* عند تركيز ٦ ميكرومول عندما أضيفت مع الغذاء.



Isopimaratriene Derivative


## ٢٤ حامض كوجيك Kojic acid

يُنتج بواسطة العديد من أنواع الاسبرجلس والبنيسليوم. يسبب الموت ويؤخر نمو حوريات حشرة *Oncopeltus fasciatus*. حامض الكوجيك أكثر أهمية كمثبط للانزيمات metalloenzymes بما يسمح بالتدخل، تنشطيا مع نواتج التمثيل المرافق ويثبط انزيمات الدفاع في الحشرات والنباتات.




## ٢٥ الكوتانينات والمركبات المرتبطة Kotanins and related compounds

الكوتانينات والايروكوتانينات عزلت في سكليروشيا اسبرجلس الياميس. لقد سبق عزل الكيوتانين والديس ميثيل كوتانين في *A. flavus* و *A. glaucus*. الكوتانين غير فعال ضد *H. zea* ولكن يحدث خفض في نمو حشرة *C. hemipterus* عند معدل ١٠٠٠ جزء في المليون مقداره ٢٣%. الديس ميثيل كوتانين غير فعال على هاتين الحشرتين. الايروكوتانين C,B يخفض النمو بدرجات متفاوتة ونفس الحال مع الايروكوتانين A. الكوتانين يثبط NADH أكسيداز




Isokotanin

المركب مرتبط عن قرب هو أفلاكارين ثم عزله في سكليروشيا *A. flavus*



## ٢٤ لاکتارانس Lactarans


لاكتاروروفينات عزل من *Lactarius rufus*. مدى الفعالية تم ترتيبه تنازليا كما يلي: لاکتاروروفين A، B أيزولاكتاروروفين على حشرة *T. confusum*. خليط المونوهيدروكسي لاکتونات من *L. necatro* أحدث فعل مضاد للتغذية في هذه الحشرة. أوضحت الدراسات أن الاكتارينات والماراسمات أكثر فاعلية من الايزو لاکتارينات. القليل من مجاميع الايدروكسيل تحقق فاعلية في الايزو لاکتارينات. القليل من مجاميع الايدروكسيل تحقق فاعلية أكثر للفيوران ولم يثبت تأثير ثابت مع اللاكتونات. المركبات ذات ٨ ذرات كربون أكثر فاعلية.



Lactarorufin A

## ٢٥ لبيورين A Leporin A


لقد تم عزل المركب من سبرجلنس ليپوريس وهو فعال ضد *H. zea* عند ٢٥ جزء في المليون



Leporin A


### ٤ مونيليفورمين Moniliformin

ينتج بواسطة العديد من فطريات الفيوزاريوم.




### ٤ ماكروفورينات Macrophorins

تم عزل هذه المركبات من أنواع *Macrophora* sp. والبنسيليوم بريفي — كوميكتوم. مشتق الماكروفورين عزل في الاسكستروماتا *Eupenicillium* و *E. molle* و *crustaceum*. المركب يخفض نمو الحشرات المعاملة عند تركيز جزء في المليون.




### ٤ ماراسمانيات Marasmanes

لقد تم عزل هذه المركبات من أنواع عيش الغراب *Lactarius* ، *L. ursinus* ، *Marasmius* spp. المركبات مثل فاليرال والايروفاليدال يتكون عند كسر عيش الغراب. البائنات تخزن في الهيفات. معظم هذه المركبات لها فعل مانع للتغذية.



## ❖ Melleins


عزلت من *Aspergillus ochraceus*, *Apiospora camptospora*, *Cercospora taiwanensis* (Turner and Aldridge, 1983) and *Fusarium larvarum* المركب له تأثير صارع بعد الحقن في الحشرات Knockdown



Isovelleral

## ❖ Monocerins

تنتج من *Drechslera monoceras* (= *Helminthosporium monoceras*) and *fusarium larvarum* (Grove and pople, 1979) أحدث حقن المونديسيرين (١٧,٥ ميكروجرام في حشرة *C. vicina* ٤٢% موت).





Monocerin Derivative

## ❖ Muscimol and related compounds المرتبطة


لقد تم عزل المكسيمول وحامض إيبوتينيك من *Amanita muscaria*، *pantherina* والأنواع القريبة من عيش الغراب. المكسيمول يقتل ٤٥% من حشرات الذباب المنزلي عند تركيز ٤٠ مللجم/الغذاء في اليوم كما يقتل ١٠٠% من يرقات البعوض عند ٢٠ مللجم/ ورقة في ٢٥ دقيقة. المكسيمول يعمل كمشارك agonist في مستخلصات الجهاز العصبي المركزي في الصرصور. حامض إيبوتينيك فعال على

هاتين الحشرتين وهو يعمل كمشارك مع الجلوتامات. لقد تم عزل مركب حامض ترايكولوميك *tricholomic* من *Trichoma muscaria* وهو يشابه حامض أيبوتينيك في الفاعلية ضد الذباب. المسكرين عزل من *Amanita spp.* وهو يتداخل مع مستقبلات خاصة في كلا النظم العصبية في الفقاريات والحشرات.



٢٤ حامض ميكوفينوليك **Mycophenolic acid**


تم عزل الحامض من أنواع البنسيليوم، فيرتيسكلا ديللا ايبنتينا وسبتوريا نوتوروم. الحامض يثبط تخليق الحامض النووي DNA ويغير من نظام الياف glial في مزارع الخلايا السرطانية. أظهر الحامض بعض الفاعلية ضد حشرة *H. zea* عند تركيز ٢٥٠ جزء في المليون.




**Mycophenolic Acid**

### ٢٠ صبغات نافتازارين Naphthazarin pigments

صبغات النافتازارين والمركبات القريبة فيوزاروبان، انهيدروفيزاروبين، جافانيسين عزلت في سلالات فيوزاريوم سولاني، فيوزاريوم جافانيكوم الممرضة للحشرات. هذه المركبات تملك أيونات المعادن مخليا ومن ثم توجد مواقع مستهدفة عديدة للفعل.




Anhydrofusarubin



Javanicin

### ٢١ نيجرا جيلين Nigragillin

اسبرجلس نيجر تنتج نيجراجيلين وهو يحدث صرع فوري يتبعه الموت عندما يعامل فميا بتركيز ٥ ميكروجرام/جم من يرقات نودة الحرير.




Nigragillin



### ٢٠ نوميئين Nominine


لقد تم عزل نوميئين في سكلوروشيا أسبرجلس نوفيس واسبرجلس الياميس.  
للمركب فعال ضد *H.zea* و *C. hemipterus*.



Nominine

### ٢١ أوكراتوكسينات Ochratoxins


لقد تم عزل المركبات من أنواع البنسيليوم والاسبرجلس منها سكلوروشيا  
اسبرجلس كربوناريوس. يحدث المركب خفض في معدل نمو الحشرات أتاجينس  
يونيكولور. المركب يحدث تأثير في تركيب أنبيات مليجي.



Ochratoxin A

### ٢٢ أوكريندولات Ochrindoles


لقد تم عزل المركب في سكلوروشيا أسبرجلس أوكريسيس وهو يمسبب خفض  
في نمو حشرة *H.zea* مع تركيز ٢٠٠٠ جزء في المليون.



Ochridole

## ٢ باراهيركواميدات والمركبات القريبة Paraherquamides and related compounds


البنسيليوم شارليسي وبنسيليوم باراهيركوى تنتج مركبات الهيركواميدات. المركبات فعالة ضد بعض الحشرات ولكنها فعالة أساساً ضد النيماتودا. المركب القريب المسمى سكليروثياميد عزل من اسكلوروشيا أسبرجلس سكليرونيوم. يحدث المركب أعراض غير عادية بين الحشرات حيث يحدث انتفاخ في الغشاء بين الحلقات تحت صفائح الجلد في بعض الأفراد مع جرعات غير قاتلة. كذلك يحدث شقوق في الجلد وسواد ويستتبع ذلك أكسدة. مركبات DOPA في الهيموليف بواسطة الفينيل أكسيدازيس. مع النيماتودا يتداخل المركب مع تنظيم الضغط الأيوسماتيكي في الهيموسيل.



Sclerotiamide

## ٢ أوكرامينات Okaramines


لقد عزلت الأوكرامينات من البنسيليوم سيمبليسيسيموم *P. simplicissimum* ووجد فعال ضد يرقات دودة الحرير مع المركبات لوكرامينات A-G.




Okaramine A

### ٢٠ باسبالينين ومشتقاته Paspalanines and derivatives

لقد عزلت هذه المركبات من فطريات كلايفيس باسبالى ومزارع اسبرجلس فلافس وسكليروشيا *A. flavus* و *A. nomius* واسكوستروماتا للفطر *E. shearii*. المركب فعال عند تركيز ١٠٠ جزء فى المليون ضد *H. zea* ويسبب خفض نمو *C. hemipterus*. مشتقات المركب باسبالينين لها فاعلية ضد الحشرات كذلك مثل ١٤- هيدروكسى باسبالينين، ١٤ (ن - ن ردايمثيل - إل - فاليلوتسى) باسبالينين. كذلك تم عزل باسبالين من فطر *Claviceps paspali* واسبرجلس فلافس، وسكليروشيا *A. alliaceus*.




Paspaline



Paspalinine


## ٤ باتولين Patulin

يُنتج بواسطة أنواع عديدة من البنسيليوم. للمركب غير فعال عن طريق الفم ولكنه يحدث ٩٥% صرع في حشرة الدروسوفيلا بعد الملامسة لمدة ٢٤ ساعة بمعدل ١٠ ميكروجرام/سم. المركب يحدث خلل في الأغشية الخلوية في مزارع الخلايا وهذا ما يحدث في الحشرات.




## ٤ باكسيلينات Paxillines

تنتج بواسطة بنسيليوم باكسيلي والاسكوتروماتا للايوبنسيليوم شيارلي. الباكسيلينات التي عزلت من E. shearli وجدت متفاوتة في كفاءتها ضد الحشرات. مركبات ٢١- ايزو بنتينيل باكسينيل، باكسينيل، ٧- هيدروكسي -١٣- ديهيدروباكسيلين، ١٢- ديهيدروكسي اكسيلين، ١٨,٢- ديوكسو -١٨,٢- سيكرباكسيلين تحدث خفض في نمو H. zea مقدار ٥٥، ٨٣، ٦٥، صفر، ١٧% على التوالي.



## ٤ حامض بنسيليك Penicillic acid


عزل من أنواع عديدة من البنسيليوم والاسبرجلس. المركب يحدث خفض ٩٤% في تغذية الدروسوفيلا و ٩٠% موت في دودة ورق القطن عند تركيز ١٠ أجزاء في المليون.



## Penicillic Acid


### ٢٠ بنيتيريمات والمركبات القريبة Peniterems and related compounds

لقد تم عزل مركب بنيتيريم من البنسيليوم كرسوسم، بنسيليوم سيكلوبيوم. لقد تم عزل بنيتيريم B وسيكونيتيريم من سكوروشيا اسبرجلس سلقوريس. يفترض أن البنيتيريمات تعمل على مواقع الجابا GABA nergic. المركبات تحدث خفض في نمو حشرة *H. zea*



٢٠ بيرامين Peramine


ينتج البيرامين بواسطة الفطر الداخلي "اندوفيت" اكريمونيوم أروندناسيا. المركب بيرامين مسئول عن مقاومة المن روبالوسيفم بادي في tall fescue وخنفساء الساق الأوريجينية *L. bonariensis* ومقاومتها في الراى المعمر. المركب يعمل على تثبيط نشاط السيتوكروم P-450 ذات للنشاط الهلام في دودة ورق القطن. ١



Peramine


### ٢١ فومالكتون Phomalactone

يتحصل عليه من هيومياليسيس روزلليس ، نيتروسبوراً ، فوم مينسبوراً




## ٢ بيريبروبين Pyripyropene

ينتج من اسبرجنس فوميجانس والاسكوستر وماتنا للأيوبسيليوم ريتيكوليسورم بسبب أن تمثيل الكوليسترول هام كذلك في حشرة H. zea فان كيفية نتائج الفعل في هذه الحشرة تشابه ما يحدث مع الجرذان.




## ٣ رادارينات Radarins

تم عزل هذه المركبات من سكليروشيا اسبرجنس سلفوريس. الرادارينات A-D أحدثت ٥٢,٧% صفر، ١٧,١% خفض في النمو في يرقات H. zea عند ١٠٠ جزء في المليون.




## ٤ مشتقات رامولوسين Ramulosin derivatives

مشتقات أيزوكومارين رامولوسين عزلت من الفطر كاثوبه لبا الجانتيولا.



### ٢٠ روبراتوكسينات Rubraoxins


تم عزل المركبات من بنسيليوم روبروم، بنسيليوم بيريريوجينوم. المركب روبراتوكسين B.A ذات جرعة نصفية قاتلة LD50 تساوي ١٨، ٢٠٠ جزء في المليون ضد حشرة *L. sericata*.



Rubratoxin B

### ٢١ ريجيولوسين Rugulosin


تم عزل المركب من أنواع البنسيليوم، *H. dematioides* ، *M. verrucari*



Rugulosin

### ٢٢ شيارانينات Shearaneines


تم عزل المركبات من اسكستروماتا للفطر *ايوبنسيليوم شيلاري*. الشيارانينات C.B.A ذات فاعلية في خفض نمو يرقات *C. heonipetrus*



Sheariline A

## ❧ الاستيروولات Sterols


أستيرول سلفات تنتج بتركيز ١٥٠٠ جزء في المليون بواسطة الفطر جراميناريس. لقد أختبر كمصدر للاستيرول يؤثر على الاتسلاخ ضد يرقات حرسفية الاجنحة والخنافس. المركب لا يؤثر على تغذية الحشرات الكاملة *C. hemipterus*.



**Fusarium Sterol Sulfate**

## ❧ سلفينينات Sulpinines


تم عزل هذه المركبات بواسطة اسبرجلمن سلفوريوس. المركبات سلفينين C,B,A تحدث خفض في نمو يرقات *H. zea* عند تركيز ١٠٠ جزء في المليون.



**Sulpinine A**

## ❧ تينيو أزويك Tenuazonic acid

حامض تينيو أزويك: الفا- أسيتيل- جاما- سيك- بيوتيل نتراميك أسيد تنتج بواسطة الفطر الترناريا الترنااتا. المركب يعمل كمثبط لتخليق البروتين.




**Tenuazonic Acid**



### ٤ ترفينيلات Terphenyls


المركبات 3,3''-dihydroxy-6-desmethylterphenyllin, 3'-demethoxy-6'desmethyl 5'-methoxycandidusin B and 6'-desmethylcandidusin B عزلت من سكلير وشيا بنسيليوم رايس تريكا.



Terphenyllin Derivative

### ٤ تريتريمات Terriremes

لقد تم عزل هذه المركبات من أسبرجلس تيريس. التريتريمات C.B.B.A لم تحدث موت كبير في حشرة H. zea ولكنها أحدثت خفض كبير في نمو اليرقات.




Territrem B

### ٤ ترايكوسيسينات Trichothecenes


تضم مجموعة كبيرة من ممثلات الفطريات التي تنتج بداية بواسطة أنواع الفيوزاريوم وأقارنها. تشمل هذه المجموعة الميكوتوكسينات مثل توكسين T<sub>2</sub> والديوكسين فاليفول والداي أسيتوكسي سكريبينول. لقد أختبرت هذه المركبات بشكل مكثف مما أدى الى قيام الباحث بتناولها تبعا لتأثيراتها على الرتب المختلفة من الحشرات. في غمدية الاجنحة تم عزل مركب ينخفض مع التغذية هو فيروكارين من مايروتيكيوم روريديوم. المركب توكسين T<sub>2</sub> بمعدل ١٠٠ جزء في المليون أطل فترة تطور اليرقات للضعف في خنفساء ترابوليوم كونفيوزوم وقد ثبت وجود تداخل بين

المركب ومحتوى البروتين في الغذاء. كذلك أحدث المركب تنشيط في انزيم ATP-ase في اليرقات بينما انخفض هذا الانزيم في الحشرات الكاملة للخنفس.


عصارة الخنافس أسرعت من انهيار المركب ودأى أسيتوكسى سكرينول مع حرشية الاجنحة اتضح أن بعض الترايكوسمينات التى تنتج من فيوزاريوم جرامينديوم أحدثت خفض في نمو حشرة *H. zea* كما في حالة ٨- هيدروكسى كالونكترين، ديوكسينيدكاليينول، ديهدروكسى كالونكترين، ٩- ١٠- ديهدروكسينيفالينول. المركبين دأى أسيتوكسى سكرينول ونيسولانيول أهدئا ٤٨، ٤٦% نشاط مانع للتغذية ضد حشرة *G. mellonella* مع تركيز ٥٠ جزء في المليون.



Deoxynivalenol



Diacetoxycircipenol




T-2 Toxin

#### ٧ توليبين Tolypin

التركيب غير متوفر وهو مركب ثابت ضد التحلل الحرارى وهو ناتج تمثيل قابل للذوبان فى الماء على خلاف السيكلوسبورينات وهى تنتج بواسطة الفطريات *Cylindrosporium Tolypcladium* و *T. inflatum*.

#### ٨ توبينجينسينات Tubingensins


التوبينجينسين A عزل من سكوروشيا أسبرجلس توبينجينسين.



Tubinaensin A

### ٤ فيريوكولجين وأقارنها Verruculogen and relatives


لقد تم عزل هذه المركبات من الفطريات البنسيليوم والاسبرجلس وهي تحدث خفض في معدلات نمو حشرة *H. zea* وغيرها. الفيريوكولجين يثبط مستقبلات الجابا في مخ الجرذان وعضو الكهرباء في سمك التورنيد كما أنه قد يتداخل مع نظم الجابا في الحشرات.



Verruculogen

### ٤ فيرسيميد Versimide


الفيرسيميد: ميثيل- ألفا (ميثيل سكسينيميدو) اكريليت ينتج بواسطة اسبرجلس فيريسيكولور وهو يسبب ١٠٠% صرع ضد حشرات الدوسوفيللا البالغة عند التلامس بتركيز ٥ ميكروجرام/سم<sup>٢</sup> في ٤ ساعات.



Versimide

### ❖ فيوميلين Viomellein


ينتج بواسطة الفطريات أسبرجلس ميلليس، سلفوريس، بنسيليوم سيتريوفيردي، بنسيليوم فيريديكاتوم، ميكروسبوروم توكي. يسبب المركب خفض في التغذية.



Viomellein

### ❖ زانثونات Xanthones


المركب ٦.٥.٣.١- تتراهيدروكسي -٨- ميثيل زانثون عزل من سكليروشيا بنسيليوم اسنريكس وفاعلية غير معروفة ضد حشرة H. zea



Xanthone Derivative

### ❖ زيبرالينونات Zearalenone

تنتج بواسطة العديد من فطريات الفيوزاريوم. المركب يحدث زيادة في نشاط ATP-ase في حشرة خنفساء الدقيق.




Zearalenone

## الببتيدات الحلقية المضادة للحشرات Antiinsectan cyclic peptides


### الف- أمانيتين $\alpha$ -amanitin

عزل المركب من عيش الغرباب للفطر أمانيتا فالويز وهو يشبط تخليق الحامض النووي RNA في الكائنات وحيدة النواة eukaryotes بما فيها ارثروسيغلا عندما حقنت بتركيز ٠,٥ ميكروجرام/ يرقعة. المركب يشبط نشاط دوبا ديكروروبوكسيليز في بعوض الابيديس أيجييتي ولكنه يشبط تخليق التريسين في الاساس. المركب أكتينومايسين D مشبط آخر لتخليق RNA له نفس التأثير. حقن اميكروجرام الف- أمانيتين في حشرة كالينورا فيسسيني أحدث تثبيط ي دوبا- ديكروروبوكسيليز. بالنسبة للتأثير على RNA - بوليميريز II في حشرة الدروسوفيللا مع مشتقات الالف- أمانيتين اتضح حدوث خفض كبير ومؤثر مع مجاميع الهكسيل أو المجاميع الاطول. السلالات المقاومة ضد الدروسوفيللا وجدت بها انزيم بوليميريز II أقل حساسية للالا- أمانيتين.



### أسبوكراسين Aspochracein


الاسبوكراسين مركب تراى ببتيد حلقى. (ن - ميثيل - إل - فاليل - ن - ميثيل - إل - الانيل. عندما حقن المركب في دودة الحرير بتركيز ١٥ ميكروجرام/جم حفر حدوث شلل تبعه موت.



Aspochracein


### ٢٠ باسياتوليد Bassianolid

تم عزل المركب من بوفاريا باسيانا والفريسيليمون ليكاني



### ٢١ بوفاريسين Bassianolide Beauvericin


يُنتج بواسطة الفطر بوفاريا باسيانا وكذلك فطريات باكيلوماييس فيوموزا- روسيس، بولي بورس سلفوريوس وأنواع الفيوزاريوم. لقد وجد البوفاريسين بداية فعال وسام ضد يرقات البعوض.



Beauvericin

### ٢٢ سيكلوسبورينات Cyclosporins


تنتج بواسطة التريكوثرما بولي سيوروم، سيلندروكاربون ليوسيدوم وكذلك أنواع الفيوزاريوم. سيكلوسبورينات C.B.A وجدت فعلة ضد الكوليكس.



Cyclosporin A


### ❖ ديستروكسينات Destruxins

لقد تم عزل ووصف الديستروكسينات B, A من الفطر أوسبورا وبستركتور (*metarhizium anisopliae*) وأسبرجلس أوكرسيوس. مشتق الديستروكسين A المعروف روزيتوكسين B عزل من تراكوتيكيوم روسيوم وهو مشابه في الفاعلية للديستروكسين A.



### ❖ إيفراپينتين دي Efrapentins


تم عزل المركبات من ممرض الحشرات *Tolypocladium niveum*. المركبات تعتبر مثبطات لمختلف انزيمات ATP-ase في الذباب المنزلي.



### Efrapentin D


### ❖ أنباتينات Enniatins

تم عزل هذه المركبات من أنواع الفيوزاريوم مثل *F. lateritium* و *F. sambucinum*. المركب فعال ضد يرقات البعوض.



### ❖ إيساريينات Isariins


تم عزل هذه المركبات في الفطر *Isaria felina*. عندما حققت ٢٠ ميكروجرام في حشرة *G. mellonella* حدث موت بعد ٣ أيام مع مركبات الإيسارين (B-D، صفر، صفر، ٥٠، ٦٠% على التوالي).



Isariin D

#### ٤٤ شيراميد A Shearamide A

شيراميد A عبارة عن أوكتا ببتيد حلقي وجد أولاً في أسكوستروماتا للفطر أوبونيسيليوم شيارى.



Shearamide A

#### ٤٥ البروتينات المضادة للحشرات Antiinsectan proteins

##### ٤٥-١ مثبطات ألفا-أميليز α-amylase inhibitors

مثبطات ألفا-أميليز PAIM, HAIM, (tendamistat) HOE-467 عزلت من سترتوماييس تندى. HOE-467 به ٧٤ حمض أميني تساوى ٨ KDa بروتين مع اثنان من كبارى ثنائى كبريتيد (١٩٩٩ CAS). هذا المركب لم يظهر أى فاعلية ضد الالفا-أميليز من العديد من حشرات حرشفية الاجنحة ولو أنه عند 260-5 ميكرومتر سجل خفض فى النشاط حوالى ١٥ - ٢٠% مع الفلوريميما أوبيركيولليليا.

##### ٤٥-٢ توكسينات باميلليس سفيريكس Bacillus sphaericus toxins

يوجد نوعان من هذه التوكسينات أحدهما يأتى من سلالات عالية السمية وتوكسين مفرد (SSII-1) يأتى من السلالات الأقل سمية وهى تنتج خلال مرحلة النمو



الخطري. طبيعة هذه التوكسينات معقدة حيث توجد ببتيدات متعددة كما يبدو حدوث بعض التشطيط بسبب عملية التحلل المائي للبروتينات في معدة الحشرة. التوكسين المشترك يتكون من نوعين من البروتينات ذات أوزان جزيئية ٤٣، ٥٦ KDa مع جينات مقابلة ذات الشفرة ٤١،٩ ، ٥١،٤ KDa بروتينات. التوكسينات فعالة في الأساس ضد بعض الابينيس والكوليكتس.

#### ٢٨ توكسينات باسيلس ثوريينجيسيز *Bacillus thuringiensis* toxin

سوف نتناول الكلام عن هذه التوكسينات في مواضع لاحقة من هذا الكتاب.

٢٩ لوفاريا سلفوروسينس السم للجليكوبروتين *Beauveria sulfarces toxic glycoprotein*  
لقد تم عزل البروتين TF<sub>2</sub> من فطر بوفاريا سلفوروسينس ذات الوزن الجزيئي ٢٩ KDa ويبدو أنه جليوكوبروتين دون نشاط محلل للبروتين.

#### ٣٠ كيتينيزيس *Chitinases*

نشاط الكيتينيز المشتق من الميكروبات الفعالة أو المنشطة مع البروتينات الأخرى سجل في العديد من الدراسات المرجعية ولو أن أى منها لم يشير الى مصدر الكيتينز. الانزيم كيتينيز من فطر سيراتيا مارييس ذات وزن جزيئي ٣٦٠٠٠ مع درجة حموضة مناسبة ٨،٥ - ٩.

#### ٣١ كوليمستروك أوكسيداز *Cholesterol oxidase*

كوليمستروك أوكسيداز (٥٢،٥ KDa) عزل من سترپتوميسيس وجدت سامة للأنثونومس جرانديس. الانزيم أحدث تأخير في نمو يرقات حشرة دودة اللوز الأمريكية ودودة ثاقبة النرّة ودودة اللوز القرنفلية بمقدار ٨٦ ، ٤٦ ، ٣٠% على التوالي مع تركيز ١٠٠ جزء في المليون. أكسدة الكوليمستروك ترتبط غالباً بنشاط الالتكالاين فوسفاتيز المخفض في أغشية الفرشاه في أنواع الحشرات المختلفة.

#### ٣٢ توكسين الكلوستريديوم *Clostridium toxin*

الضمين الباراجرثومي من كلوستريديوم بيفيرمينتاس من الصنف السيروولوجي مالايزيا ووجدت فعالة ضد يرقات بعض الاتوفيلس ستيفنسي. الفاعلية قد تكون مرتبطة بالنشاط المحلل للبروتين. لقد عزل ثلاث بروتينات ذات أوزان جزيئية ١٦، ١٨، ٦٦ KDa من مزارع البكتريا وكان وجودها مرتبط بالسمية على الاتوفيلس ستيفنسي.

### K هيرسوتيلينات Hirsutellins

لقد تم عزل هيرسوتيلينات من مزارع هيرسوتيللا ثومبسوني. لقد كان الوزن الجزيئي للبروتين المنقى ١٥٠٠٠ وكانت نقطة الايزو الكهربائية عند حموضة ١٠,٥. المركب هيرسوتيلين A يعمل ببطء شديد محدثا ١٠٠% موت عند ٨٠٠ ميكروجرام في ١٥ يوم، ١٠٠ موت بتركيز ٢٠٠ ميكروجرام بعد ٣٠ يوم من الحقن في يرقات دودة الشمع. المركب أكثر فاعلية ضد الابينيس ايجيني.

### K ليكتينات Lectins

بالرغم من أن العديد من الفطريات تنتج ليكتينات فإن المركبات التي أختبرت أظهرت فاعلية محدودة ضد الحشرات.

### K فوسفوليبيز Phospholipases

لقد أختبرت مستحضرات نصف منقاه من الفوسفوليز ضد الحشرات. المستحضر الأكثر فاعلية من ovis ٢٠٢٠ كان ذات أقل وزن جزيئي (١٥ - ١٧ Kda) وأعلى نقطة ايزو كهربية (درجة حموضة ٩,٥ ودرجة قلبية مناسبة نسبيا ٨,٤) بالمقارنة بالمصادر الأخرى.

### K توكسينات فوتورابديس لومينيس Photorhabdus luminescens toxin

البكتريا فوتورابديس لومينيس يرتبط بمرض الحشرات مثل النيماتودا تنتج العديد من التوكسينات. المعقد المنقى من المنتجات (٢٥ - ٢٠٧ كيلو دالتون) من الجينات المكونة وجدت سامة لحشرة مانوكا سيكستا.

### K بروتيناز Proteases

لقد تم عزل البروتيناز السام من بسيدوموناس ايريجينوزا. السمية على دودة الشمع بسبب حقن البروتيناز ( $10^{-3}$  x وحدات بروتيناز كلى لكل يرقة) كانت ١١٠ مع بروتيناز B (الوزن الجزيئي ١٧ كيلو دالتون ١٣٩ tu / ملليجرام)، ٣٦ للبروتيناز، ٦ كيلو دالتون، ٢١٦ tu / ملليجرام) في مقابل ٥٠ للبروتيناز D (١٣ كيلو دالتون، ٢٤,٢ tu / ملليجرام)، ٧٠ - ٨٠ مع بروتيناز E (٤٠ كيلو دالتون، ٩٧ tu / ملليجرام). بالنسبة لحموضة المتلى كانت متعادلة مع بروتيناز C, B (PH = ٧,٥) نصف قلبية مع بروتيناز D (PH = ٨) وقلبية مع بروتيناز E (PH = ٩). لقد تم عزل بروتيناز سامة أخرى من سيراثيا مارسيس. الميتالوبروتيناز له درجة PH ملائمة بينما السيرين بروتيناز له

حموضة ملائمة ١٠,٩. كلا الروتييزيس لهما وزن جزيئي ٣٧ كيلو دالتون. البروتييزيس السام عزلت كذلك من الفطر *Metarhizium arisopline*. البروتييز P1 له حموضة ملائمة ٧,٢٥ أما بروتييز P2 له حموضة ملائمة ٩,٠ البروتييزيس السامة عزلت كذلك من فطريات بوفاريا باسيانا. البروتييز ذات الوزن الجزيئي المنخفض له درجة حموضة ملائمة قريبة من ٦,٥ بينما البروتييز ذات الوزن الجزيئي العالي لها درجة حموضة ملائمة بالقرب من ٩.

#### ٢ ريستريكتوسين Restrictocin

ينتج بواسطة أسبرجلس ريستريكس وهو عبارة عن بروتين ريبوسومي غير نشط (فوسفوداي استريز) حيث يكسر اختياريًا هذه الرابطة في الحمض النووي RNA الريبوسومي. الريستريكتوسينات الأخرى مثل ألفا-ساركين والميتوجيلين (ينتج كذلك بواسطة أنواع الأسبرجلس) يرتبط عن قرب من الناحية الترتيبية. يحدث الريستريكتوسين في آلاف عديدة من أجزاء في المليون في تراكيب مكونة الجراثيم للأسبرجلس - يستركتس ويحدث السمية ويثبط وع تغذية الخنافس والديدان.

#### ٣ البروتينات الخضرية كمبيدات حشرية Vegetative insecticidal proteins (VIPs)

VIPs تنتج خلال مرحلة النمو الخضري للبكتريا وتم عزلها من باسيليس سيريس. البروتينات الابتدائية (٨٠، ٤٥ كيلودالتون) عزلت من سلالة AB78 وكانت فعالة ضد خنافس ديابروكتكتيس عنه مع *D. longicornis* و *D. virgifer* عنه مع *D. undecimpunctata* وليس ضد الكريز وميليدى الأخرى أو أية خنافس أخرى أو بعوض. لقد وجدت بروتينات مشابهة في الباسيليس ثورينجينسيز من الصنف تينبيريونيس. لقد تم عزل بروتين اضافي (a) Vip 3A من سلالة باسيليس ثورينجينسيز وهو ذات وزن جزيئي حوالي ٨٠٠٠٠ وهو فعال ضد العديد من أنواع ديدان حشرية الاجنحة والمنتجات المكونة تحقق اكثر من ٩٥% موت من النودة القارضة عند تركيز ٠,٠٧ جزء في المليون. البروتين Vip 3A يحدث شلل في المعدة عند تركيز ٤ نانو جرام/سم<sup>٢</sup> ويحدث تحلل في الخلايا الطلائية للمعدة عند تركيز ٤٠ نانو جرام/سم<sup>٢</sup>. هناك VIP آخر ينتج بواسطة الباسيليس سفيريكس.

#### ٤ بروتينات غير موصفة Uncharacterized proteins

هناك العديد من المواد البروتينية غير المعروفة (بناء على الحركة مع الحرارة وغيرها من الخصائص) تنتج بواسطة أنتوموفورا كوروناتا *E. apiculata* حيث تسبب موت في يرقات دودة الشمع على شكل اسوداد الهيموليف.

### ✱ التنشيط Synergism

المخلبيات/المواقع الأيونية Chelators/ ionophores مثل حامض الكوجيك وحامض الفيوزاريك منتشرة بشكل واسع في الفطريات. قد نشر أن هذين الحامضين يعملان كمادة منشطة Synergists للمركبات ذات الحدوث المرافق Coocuring. من المعروف أنها تثبط الانزيمات وثيقة الصلة بها مثل المونوأكسجينيز والبيروكسيديز/فيولوكسيديز. الخلطات الأخرى من نواتج تمثيل البنسيلوم والفيوزاريوم يمكن أن تحدث تأثيرات تنشيطية على الحشرات. البيرامين يستطيع أن يثبط انزيمات الهيم التأكسدية ويعمل كمثبط. لقد اقترح تداخل تنشيطي للسكلوسبورينات والتولوبين. هناك ميل للقول بأن التداخلات التنشيطية بين نواتج تمثيل الحدوث المرافق والبروتينات منتشرة وهي تعمل بناء على استراتيجيات الدفاع أو الهجوم defensive/ offensive.

التداخلات التنشيطية مع البروتينات ذات السمية المباشرة أو تلك التي تسهل نفاذية البروتينات الأخرى أو المركبات ذات النشاط النبوي وجدت ذات أهمية كبيرة حالياً وفي منظور المستقبل. هناك بعض الأمثلة حيث مخالط الكيتينيز وتوكسينات الباسيليس تؤكد أنها تنشيطية. من المفترض أن الكيتينيز يكسر الحاجز مثل الغشاء حول الغذائي بما يسمح بنفاذ أكثر للبروتين النشط. الممرضات الفطرية التي تنفذ من جلد الحشرة يبدو أنها تساعد بواسطة الانزيمات الهامة للكيوتكل مثل الكيتينيز والليباز والبروتيز. مخالط البروتينات هذه تكون ذات قيمة وفاعلية في الطعوم والممرضات الحشرية والنباتات المهندسة وراثياً لهدم المادة الجليدية الداخلية المبطنة للغشاء حول الغذائي للحشرة بما يسمح بنفاذ نواتج التمثيل النباتية الثانوية أو البروتينات.

المركبات التي تستهدف نفس مواقع التأثير تنتج بواسطة نفس الكائن. كمثال فإن الاسبرجلس فلافيس ينتج الاقلاتوكسينات التي تتداخل مع تضاعف الحامض النووي الدنا DNA والسيكلوبيازونيك أسيد التي تثبط انزيم ATP- ase نقل الكالسيوم

ومركبات مسببات الاورام termogenic التي يبدو انها تعمل على مواقع طاقة الجابا GABAergic وكذلك حامض الكوجيك الذي يثبط انزيمات الهدم وفقد السمية وكذلك انزيمات الدفاع في الحشرات والنباتات والافلافينات التي تثبط NADH أكسيديز. هذا يعطى مثال واضح على استراتيجية منع المقاومة في الحشرات المستهدفة. هذه الاستراتيجية تفتح المجال وتغطي دلائل عن امكانية استخدام نواتج التمثيل الثانوية المشتقة من الكائنات الدقيقة و/أو البروتينات لحماية النباتات أو هندسة ممرضات للحشرات أكثر كفاءة وفاعلية.

كما الحشرات من جهة أخرى قادرة على تطوير المقدرة للتعامل مع مختلف الدفاعية كما سبق القول من منظور المقاومة النسبية والتمثيل. مثبطات البروتينيز السامة من الفطر *M. anisopliae* أستخلصت من دودة الشمع *G. mellonella*. لقد حدثت مستويات أكبر في الهيموليمف مقارنة بما في المعدة أو الجسم الدهني. المثبط كان أكثر فاعلية عما هو الحال مع بروتينيزيرين الميتاهيزيوم كما أن له بعض الفاعلية ضد سلفهيدريك بروتينيز.

#### ❖ اتجاهات المستقبل/ المنظور التجارى

بعض المركبات التي نوقشت قبلا دخلت الى المرحلة التجارية مثل مركب الاقيرمكتينات والاسيوسينات وبلورات بروتين BT والكوليسترول أكسيديزس وتوكسينات VIP للاستخدام في النباتات المحورة وراثيا. أسباب الاتجار وصفت قبلا ومن أهمها الكفاءة البيولوجية العالية جدا ضد الحشرات مع نسبة موت عالية في مدى ١٠ جزء في المليون عن طريق الفم أو ٠.٠٠١ ميكروجرام/حشرة عن طريق المعاملة الفمية. الاختيارية ذات أهمية كذلك. مع استمرار التكلفة العالية (عملية ملايين متعددة من الدولارات) للتطوير والتسجيل للمبيدات الحشرية والنباتات المهندسة وراثيا فان المركبات ذات النشاط الحيوى يجب أن تمر من خلال بطاريات عديدة من الاختبارات حتى يمكن الوصول للاتجار الناجح.

المصادر الجديدة للمركبات تعتبر الخطوة الفاتحة والمحددة للاقتربات الايكولوجية أنت الى معدلات عالية من الكشف بالمقارنة مع التفرقة التجارية. هذا ولو أنه لم يصل أى من المركبات المكتشفة بيئيا الى المرحلة التجارية بسبب المعدلات اللواطية من النشاط والفاعلية بالنسبة للمعايير التي وصفت قبلا. النظر الى المصادر الجديدة أو التي لم تعرف قبلا قد اقترحت كاستراتيجية. مطلوب مجهود مشابه لتعريف

البروتينات الفعالة حيث مطلوب اختبار من ٤٠٠ - ١٠٠٠٠ مزرعة لإيجاد منتج يصل الى المرحلة التجارية. كل المركبات التجريبية في الوقت الراهن تنتج أو تستق من الباسيلليس أو استربتوميسيز والتي عرفت من خلال التفرقة العشوائية. الكشف والاكتشاف من المصادر الايكولوجية قد يعطى فرص أقل حيث الحشرة المستهدفة فيها نظم تمثيل غير محورة أو متكيفة. الدراسات أظهرت أن الحشرات التي تتغذى أفضليا على الفطريات مثل خنافس عصير كاربوفيلس كانت أكثر مقاومة عن الديدان التي تتغذى على المركبات المعزولة من الفطريات. مرة أخرى خلص الباحثون الى أن البروتينات الجديدة من الناحية الايكولوجية تجعل من تكيف الحشرة لها قليلا. هذا يفسر نجاح مواد ووسائل مكافحة الافات التي يتحصل عليها من عزلات التربة ولو أن البروتينات الناتجة بواسطة ممرضات الحشرات تعتبر استثناء بشكل واضح.

بسبب أن النظم الهادفة خاصة في الافات الكبرى درست باستفاضة فانه يكون من المحتمل في الوقت الراهن التنبؤ بأى من أنواع المواقع والشقوق تتعرض للهدم وفقد السمية. من الممكن أن المصدر الأكثر غرابة "alien" كمصدر ومن ثم المركب الذى يمكن الحصول عليه فان الحشرة تكون أقل ميل للتعامل والتوافق معه أو تطوير سلالات مقاومة له كما أن المركبات المشتقة من الميكروبات ذات مقدرة عالية مع هذه الخاصية. هذا ولو أن تمثيل الحشرات للشقوق التركيبية مشابهة لما تم تكيفه في النباتات مع مركبات الفا - أمانيتين، أفيرمكتينات، أفلاتوكسينات، ديستروكسينات، ترايكوسيسينات، جريسيفولين والبروتينات. الكائنات الدقيقة التي لا تقتصر على حشرة واحدة تعتبر مصدر أفضل لمركبات ذات دوام طويل وأكثر فاعلية ولكن معدل الاكتشاف يكون أقل من الاقترابات الواردة من البيئة.

نظرية المقاومة تقترض بوجه عام أى المواقع المستهدفة لمتعددة الواجب التعامل معها كما هو الحال مع مخابيط المركبات حيث تقلل من تطور المقاومة. كما نكر قبلا فان التوكسينات المتعددة التي تنتج بواسطة نفس النوع يمكن أن تكون ذات طرق احداث فعل مختلفة كما تعمل كمنشطات. للدلائل الحديثة للنشاط غير المباشر بواسطة الانزيمات التي تولد الاكسجين مثل البروكسيديزيس أو البولى فيزيل أوكسيديز التي لها طرق فعل متعددة ومواقع احداث فعل متعددة أدت الى الاقتراح بأن المقاومة تكون صعبة التطور بواسطة الحشرات بسبب الجينات المتعددة التي يجب أن تتغير. الفطريات تنتج انزيمات أكسدة مشابهة مثل التيروسينيزيس والكسينيزيس.

التحكم في مسار فردى أو تغييرات في الجين المنظم قد يؤدي إلى الحصول على مركبات جديدة نشطة بيولوجيا متعددة التأثير كما وصف مع جينات R. P. C. A في الدرة. كلونة معقدات البولي كيتيد سمحت بنجاح هذا الاقتراب مع الميكروبات والنباتات كذلك.

كيمياء الخلط Combinatorial chemistry تعتبر طريقة تؤدي للحصول على تراكيب يمكن اشتقاقها السريع إلى مركبات أكثر فاعلية وأكثر اختيارية والتي لم تسجل إلى حيز التنفيذ مع الوسائل الكيميائية التقليدية.

الاقترابات الجديدة في البيولوجيا الجزيئية تسمح بعزل الحامض النووي الدنا والجينات المؤثرة من ٩٩,٩% من الكائنات الدقيقة.





## الفصل الثالث

# متطلبات تسجيل واعتبارات الامان فى وسائل مكافحة الميكروبية للأفات

### أولا: المتطلبات من أمريكا الشمالية North America

الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات دخلت الاستخدام التجارى فى أمريكا الشمالية منذ ما يقرب من اربعين سنة. الان ظهرت انواع من البكتريا والفطريات والبروتوزوا والفيروسات على مستوى قليل ولكن بتوسع بالتريج فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. لقد استغلت مميزات هذه الوسائل من حيث كيفية احدث الفعل المتخصص العوائل فى مكافحة الذباب من (كيوليميرى) والذباب الاسود (سيموليدى) والعديد من الآفات الزراعية وتلك التى تضر بالغابات. التشريعات الخاصة بالمبيدات الميكروبية الحشرية ظلت سنوات عديدة تعتمد على المعايير والمقاييس السابقة التى اتبعت مع المبيدات المخلفة الكيميائية. الان وضعت الدولتان متطلبات للتسجيل تأخذ فى اعتبارها الخصائص المتميزة للكائنات الدقيقة. حديثا توجه وتركز الاهتمام ناحية تقييم المبيدات الميكروبية المهندسة وراثيا والعمل فى اتجاه التعديل والضبط المناسب لبرامج التشريع الجارية عن هذه الوسائل.

المبيدات الميكروبية ينظر اليها بشكل ملائم من منظور الامان بسبب المدى العوائلى الضيق ونقص السمية على الثدييات او المرضية او التوافق مع الكائنات النافعة وبالتالي دورها وقيمتها فى نظم وبرامج الادارة "متكاملة للأفات. هذا ولو ان النجاح التجارى لهذه المنتجات تخفى وراء مدى النشاط الطبيعى لهذه المستحضرات وقصر فترة الحياه فى الحقول او النشاط البطئ ضد الآفة المستهدفة. للتعامل مع هذه المشاكل تبذل مجهودات مكثفة لتطوير مستحضرات اكثر ثباتا فى البيئة وعزل سلالات سوبر واستخدام كلا الطرق التقليدية والحديثة من المناورة manipulation- مثل الحامض النووى دنا المندمج لانتاج منتجات اكثر فاعلية ذات مقدرة عالية على المنافسة.

الاعتبارات العامة للأمان: تسجيل المبيد الميكروبي يتضمن امكانية الاستخدام التجارى العريض والتعرض البيئى. لذلك فان السلطات المسؤولة عن التشريع يجب ان تأخذ فى

الاعتبار تأثيرات التعرض للمبيد على الصحة العامة والبيئة. تعرض الانسان قد يكون مباشر مع عمليات الخلط والتحميل وتطبيق المركب او بشكل غير مباشر كما في حالة التعرض الغذائي من خلال استهلاك المحاصيل الغذائية المعاملة. الكائنات غير المستهدفة (NTO's) توجد فعلا في البيئة مرافقة coexist مع الممرضات الحشرية entomopathogens التي تحدث طبيعيا. هذا ولو ان الاستخدامات الواسعة للكائنات الدقيقة تتطلب التقييم بسبب وجود علاقات رقمية ومتزامنة ومؤقتة بين وسائل مكافحة الميكروبية والكائنات غير المستهدفة (NOT's).

٦. **تقويم الخطر Risk assessment** للمبيدات الميكروبية يعنى التقييم العلمى الجهازى لبيانات الضرر hazard والتعرض متبوعا بوضع الاستنتاجات حول المقدرة على احداث المخاطر الصحية والبيئية نتيجة لاستخدام المبيد (الضرر x التعرض = الخطر). يعبر عن الضرر بمسميات التأثير المعاكس على الكائنات غير المستهدفة NTO مثل الموت الذى ينتج من التوكسين الميكروبي او غيرها من الاعمال المرضية. تعرض NOT's قد يكون مباشر وقت المعاملة او غير مباشر نتيجة لتكاثر الاحياء الدقيقة وانتشارها. اذا اخذت هذه العوامل بشكل مستقل نجد انه لا الضرر ولا التعرض لوجودهما تملك اعتبار على صحة الانسان او البيئة. المشاكل المؤثرة تحدث عندما تتعرض الكائنات غير المستهدفة الحساسة الى المبيد الميكروبي ذات القدرة على احداث تأثير معاكس عليها. نموذج تقييم الخطر الذى ذكر اعلاه هو الاسس لنظم حزم البيانات المطلوبة التى وضعت من قبل السلطات الكندية والامريكية لتقييم المبيدات الميكروبية الطبيعية. بوجه عام فان التعريف الواعى للمركب بالاضافة الى بيانات التأثيرات الصحية وعلى البيئة المطلوبة موضحة فى الجدول (١-١). فى العادة فان الاختبارات الاضافية (مثل الحزمة او البطارية الثانية (Tier II) تكون مطلوبة فقط عندما تشير نتائج البطارية الاولى الى حدوث ضرر على الكائنات غير المستهدفة بمعنى ان تكون نتائج وتأثيرات الاختبارات موجبة. اختبارات البطارية الثانية تشير الى تطور بيانات التعرض وكذلك التأثيرات الاضافية على الكائنات غير المستهدفة. لذلك فن وسائل مكافحة الافات الميكروبية المسجلة فى الوقت الراهن لا يوجد من بينها ما يتطلب اختبارات فيما وراء البطارية الاولى (Tier I). لكل دولة حرية التشديد او التخفيف فى بروتوكولات اختبارات تقييم امان واداء هذه الوسائل الميكروبية.

جدول (١-١): البيانات المطلوبة لتنفيذ التسجيل والاستخدامات التجريبية للمبيدات الميكروبية في الولايات المتحدة الأمريكية (a)

البيانات المطلوبة		حتى	التسجيل	Eup السماح باستخدام تجريبي
← تحليل المركب Product analysis				
هوية أو ذاتية المركب وعملية التصنيع			R	R
مناقشة تكوين مواد غير مطلوبة			R	R
تحليل المعينات			CR	CR
شهادة الحدود			R	R
طرق التحليل			R	R
الصفات الطبيعية والكيميائية			R	R
تسليم المعينات			CR	CR
← تحليل البقايا أو المخلفات Residue analysis			CR	CR
← التوكسيكولوجي Toxicology				
البطارية الأولى Tier I				
التعرض الحاد عن طريق الفم			R	R
التعرض الحاد عن طريق الجلد			R	R
التعرض الحاد عن طريق الرئتين			R	R
للتعرض الحاد عن طريق الحقن الوريدي			R	R
الالتهابات الأولية على الأعين			R	R
الحالات من فرط الحساسية			R	R
زراعة الأمسجة (الفيروسات)			R	R
البطارية II والبطارية III				
← بطارية الكائنات غير المستهدفة والمصير البيئي (ط)				
التأثيرات البيئية				
التأثيرات على الطيور عن طريق الفم			Rc	Rd
التأثيرات على الطيور عن طريق الاستنشاق			CRd	
التأثيرات البرية			CRd	
سمك المياه العذبة			Rc	Rd
للالقاريات المائية في المياه العذبة			Rc	Rd
الحيوانات البحرية وعند المصب			CRd	
النباتات غير المستهدفة			Rd	Rd
الحشرات غير المستهدفة			Rc	Rd
نحل العسل			Rc	Rd
← البطارية II - الملوك البيئي				
البيانات المطلوبة تتوقف على نتائج اختبارات البطارية I				
← البطارية III - لتأثيرات الأيكولوجية				
البيانات المطلوبة تتوقف على نتائج اختبارات البطارية I				
← البطارية الرابعة IV - دراسات المحاكاة والدراسات الفعلية على الكائنات الأرضية والمائية				
البيانات المطلوبة تتوقف على نتائج البطارية I				
R = مطلوبة			CR = مطلوبة تحت ظروف خاصة	- = غير مطلوبة

• توجد متطلبات عالية للبيانات. فقد تطلب بيانات قليلة أو اضافية في حالات خاصة. في EUP قد تكفى قليل من البيانات بناء على طبيعة الكائنات الدقيقة والاستخدام المحدود للمبيد.

• b تعنى ان البروتوكولات الموصى بها تمت مراجعتها لجعلها في قوائم مع نتائج البحوث والخبرات الحديثة. العبارات الخاصة بها اذا كانت البيانات مطلوبة دوما او عرضيا يجب تحديثها بما يتفق مع تمشيها في نفس مسار المعلومات والتطبيقات الجارية.

• C تعنى ان البيانات المطلوبة تحت ظروف خاصة اى مشروطة كما في الصوب والاستخدامات في داخل المباني والمنشآت.

• d ليست مطلوبة لاستخدامات الصوب وداخل المباني.

### EUP السماح بالاستخدام بغرض التجريب Experimental use permit

التعريف الدقيق للكائنات الدقيقة المطلوب تسجيلها تمثل الخطوة الاولى في تقييم التأثيرات على صحة الانسان والبيئة. التعريف يقدم كذلك تأكيدا عن تجانس وعدم تلوث المنتج واساسيات اختبارات المركب كما يقدم النقطة المرجعية للمقارنة مع الكائنات الدقيقة المعروفة عنها احدثائها لتأثيرات صحية وبيئية<sup>1</sup> في هذا السبيل تؤخذ العديد من النقاط قبل اجراء اية اختبارات متعلقة بالضرر. مثال ذلك يوصى بإجراء تجارب اقل من حيث العنقوانية في حالة ما اذا كان المبيد لا ينتمى لأى فرع او مجموعة او هو فرد من افراد الكائنات الدقيقة ذات الاهمية السريرية Clinical او تلك المعروف عنها احدثائها للمرضية في الانواع ذات الاهمية الاقتصادية والبيئية.

تقييم الضرر يتطلب تقديم المعلومات لتوضيح ما اذا كان الكائن الدقيق ممرض او سام او له تأثيرات معاكسة اخرى لم لا. كما هو موضح اعلاه فان المدى العوائلى للكائنات الدقيقة وكذلك العلاقات مع ممرضات معروفة من العوامل الهامة والمحددة لتحديد نوعية وحجم البيانات المطلوبة وكذلك تعريف اى مجاميع الكائنات غير المستهدفة NOT's التى تتطلب تقييم اكثر شدة. مثال ذلك ان اختبارات المبيدات الحشرية الميكروبية على NOT's قد تركز بداية على تقييم وضع الحشرات النافعة المرتبطة بالافة المستهدفة او لتتبع التعرض في المساحات المعاملة.

المعلومات المطلوبة لتقييم التعرض تشمل البيانات عن بقاء الكائن الدقيق والنمو والتكاثر والانتشار. تقويم التعرض يتوقف على المقدرة على الكشف عن والتحديد الكمي للكائن الدقيق في الوسط البيئي الذي يعيش فيه. ان قاعدة بيانات التعرض في تقويم المخاطر يعتمد على كيفية حدوث الخفض في بقاء الكائن الدقيق ونقص نموه. بوجه عام فانه من أصعب الأمور توضيح ان الوسيلة الميكروبية لمكافحة الآفات سوف تموت بشكل كامل بعد المعاملة. لذلك فانه من الصعوبة استبعاد إمكانية ان الكائن الدقيق يبقى ويستمر في المعيشة في مستويات اقل من حدود الكشف ومن ثم يكون قادرا على النمو والانتشار عند تجدد الظروف البيئية الملائمة لمعيشته. هذه الصعوبات من احد الأسباب التي حثت ان تتضمن البطارية الأولى من اختبارات تقويم المخاطر ضرورة تعريف الكائن الدقيق وتقويم الضرر. حينئذ فانه إذا تأكدت إمكانيات احداث ضرر معنوي مؤثر في اختبارات البطارية الأولى يكون من اللازم اجراء تقويم عييق عن التعرض في البطارية الثانية Tier II.

#### ٥ برنامج التشريع الأمريكي Us regulation program:

التشريع القومي لمبيدات الآفات في الولايات المتحدة الأمريكية يصدر من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) Environmental protection Agency تحت سلطات ومسؤوليات القانون الفيدرالي للمبيدات الحشرية والفطرية والقوارض (FIFRA) الذي صدر عام ١٩٧٢ وتم تعديله في يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٨٨. في أمريكا كل ولاية قد تشرع وتضع قوانينها الخاصة بما يعزز إصدار وتشريع الوكالة EPA. القانون الفيدرالي ينص صراحة على ان كل المبيدات (بما فيها الكائنات الدقيقة) يجب ان تسجل قبل ان يسمح لها بالبيع والتداول على المستوى التجاري. درجة التشدد من قبل وكالة EPA يعتمد على درجة استخدام المركب والتعرض البيئي. في العادة وبوجه عام فان الاستخدام والتعرض يرتبطا بمرحلة تطوير المركب. مثال ذلك من ان توقع الاختبارات الحقلية على المستوى البسيط سوف تؤدي الى الحد الأدنى من التعرض والخطر ومن ثم تستدعي تشدد اقل من قبل الوكالة. بوجه عام فان الاختبارات التوسعية فيما قبل التسجيل للكائنات الدقيقة بغرض تقييم الفاعلية والحصول على معلومات بقصد التسجيل في العادة تتطلب اذن بالاستخدام والتجريب experimental use permit (EUP). من جهة اخرى فان الاختبارات التوسعية (وكنكك الاستخدامات التجارية

الكاملة) قد تؤدي الى تعرض مكثف مع احتمالات قوية لحدوث مخاطر. لذلك فان الوكالة EPA تضع قيود اشد كثيرا في الحالة للتوسعية من الاستخدام. بعد تقييم المعلومات والبيانات المقدمة قد تقوم وكالة EPA بتسجيل هذه المنتجات عندما تستخدم تحت توصيف دقيق لا يحمل في طياته احتمالات حدوث مخاطر غير معقولة على صحة الانسان والبيئة.

البيانات العالية المطلوبة للاستخدام بغرض التجريب وتسجيل المبيدات الميكروبية وضعت وشرعت تحت العنوان "البيانات المطلوبة لتسجيل مبيد لكل من المحاور الخمسة الكبرى المطلوب عنها بيانات وهي: تحليل المنتج، تحليل البقايا، التوكسينولوجي، التأثيرات الايكولوجية والسلوك البيئي (الجدول ١-١). البيانات المطلوبة لاغراض التجريب تعتبر من المطالب الفرعية من البيانات المطلوبة للتسجيل. في العديد من الحالات فان الحاجة لتحديد متطلبات خاصة من البيانات تعتمد على نظام استخدام المبيد. لذلك فان البيانات المطلوبة في كل ناحية يجب ان توصف صراحة اما مطلوبة required او مطلوبة تحت ظروف معينة conditionary required او غير مطلوبة not required مع كل النظم الكبرى لاستخدام المركب: الاستخدامات الارضية على المحاصيل الغذائية او غير الغذائية، الاستخدام على الاطعمة الغذائية او غير الغذائية، الاستخدامات في الصوب على المحاصيل الغذائية وغير الغذائية، الاستخدامات في الغابات وخارج اماكن السكن وفي داخل المنشآت والمباني.

مع كل بيانات مطلوبة يجب التحديد وبوضوح التواكب مع البيانات الموجودة في القسم الفرعي M في دلائل التقويم للمبيدات. هذه الدلائل تحتوي على طرق اختبار موصى بها وبروتوكولات تستخدم لوضع وتطوير البيانات المطلوبة. الدلائل guidelines تراجع وتحدث بما يعكس التصنيفات الحديثة التي استجندت في طرق الاختبار والخبرات التي اكتسبت في تقييم نتائج الاختبارات في السنوات الخمس الماضية والتركيز على الوثائق بشكل مباشر اكثر من المنظور الميكروبيولوجي للاختبارات المطلوبة. التحديدات الاكثر اهمية وتأثيرا تشمل التغييرات في طرق ومستويات تعرض الكائن الحي للوسيلة الميكروبية لمكافحة الآفة حتى يمكن النصح بظروف اختبارات تقارب كثيرا للتعرض الواقعي الحادث فعلا. الدلائل التي روجعت كانت متاحة عام ١٩٨٩. خطوات اعداد البيانات المطلوبة للاستخدام بغرض التجريب

وسجل المبيدات الميكروبية موجودة في منوعة التشريعات الفيدرالية Code of Federal Regulations في الجزء ١٧٢ وكذلك الجزء ١٦٢ على التوالي. هذه التشريعات توصف الظروف التي يجب توفيرها في حالة طلب الموافقة للتجريب EUP او بفرض التسجيل. هذه التشريعات تقدم بيانات تفصيلية عن متطلبات التقدم التجريبي EUP والتسجيل والبطاقة الاستدلالية للمركب والبيانات التعضدية واجراء التجارب الحقلية في البرامج الخاصة بالتجريب. العناصر الاساسية في طلب السماح بالتجريب EUP تتضمن تعريف المنتج تحت الاختبار، الكميات التي تستخدم، مواقع ومساحات الاختبار، مقترح برنامج الاختبار، البطاقة الاستدلالية للمركب، تحليل المركب والبيانات الخاصة بالامان. البيانات الخاصة بطلب التسجيل تشمل نفس البيانات مع بيانات اضافية تغطي بشكل مباشر كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للمبيد.

المنتجات من استخدامات طرق الهندسة الوراثية مثل الحامض النووي دنا المندمج recombinant DNA وصلت حتى النقطة التي أكدت ضرورة اجراء اختبارات حقلية لتقييم الفوائد. من منظور التساؤلات العلمية واهتمامات العامة عن هذه المنتجات حددت وكالة حماية البيئة الامريكية EPA ان من الحكمة تقييم مبيدات الافات الميكروبية المهندسة وراثيا قبل استخدامها في البيئة. هذا على عكس الكائنات الداخلية التي تحدث طبيعيا والكيميائيات والتي لا تتعرض لاستعراضات مرجعية تقليدية حتى تستخدم في التجارب التوسعية. سياسة الوكالة عن الدراسات ائرجعية على كل نواحي المبيدات الميكروبية المهندسة وراثيا صدرت عام ١٩٨٦ في سياسة تضمنت اصدارات الوكالات الفيدرالية الاخرى التي تضطلع بمسؤوليات في هذا الاتجاه (مثل هيئة الزراعة والغذاء والدواء FDA ووزارة الزراعة والمعاهد الصحية القومية).

تحت مدونة السياسات لعام ١٩٨٦ يكون على الوكالة استيفاء البند 9od قبل البدء باجراء اية اختبارات حقلية على المستوى الصغير. على المتقدم بطلب التجريب او التسجيل ان يزود الوكالة بالمعلومات والبيانات الموجودة في الفقرة الخاصة بالسياسات بما فيها تعريف الكائن الدقيق وكيف يمكن المناورة به، والمعلومات عن السلالة او السلالات الابوية او تلك المهندسة وراثيا بما فيها صفات النمو والبقاء والمنافسة والمدى العائلي والتأثيرات المؤثرة على لكائنات غير المستهدفة NOT's والمعلومات الخاصة بمقترح وتقييم الدراسات الحقلية المقترحة.

قد تكون هناك حاجة لبيانات اضافية اعتمادا على الكائنات الدقيقة الخاصة وطبيعة التغيرات الوراثية والمادة التى تتحلل ومقترح نظم الاستخدام. هذا الاستعراض المرجعى عن كل حالة بحالة يسمح للوكالة EPA باجراء تقييم جيد عن الاختبار المقترح وتحديد ما اذا كان مطلوب اذن سماح بالتجريب EUP ام لا. عند هذه المرحلة الابتدائية فان البرنامج العلمى للتقويم فى الوكالة يأخذ فى الاعتبار العوامل الفاتحة لحدوث الخطر الذى يودى الى تأثيرات معاكسة مؤثرة للمبيد الميكروبي حتى مع التجارب المصغرة: المقدرة على البقاء والاستقرار فى منطقة جديدة، القابلية او المقدرة على القيام بوظائف جديدة، نقل للمادة الوراثية المعروسة فيه الى كائنات دقيقة اخرى والمنافسة.

اذا كان الاختبار الحقلى المقترح لا يمثل اية مخاطر معنوية مؤثرة وفى حالة عدم طلب بيانات اضافية فانه لا تكون هناك حاجة للحصول على اذن للسماح باستخدام EUP قبل اجراء الاختبارات الحقلية. اذا برزت تسلاوات حول مخاطر المركب الميكروبي او كانت هناك حاجة لبيانات اضافية او تم عمل برنامج استكشاف فان الوكالة قد تقرر الحاجة للحصول على اذن سماح باستخدام EUP بغرض التجريب قبل البدء بالتجريب فى الحقول. فى هذه الحالة يجب استكمال كل طلبات الحصول على EUP. ما وراء مرحلة الاختبار على المستوى البسيط يجب التقدم وتوفير كل متطلبات التجريب EUP والتسجيل لكلا المبيدات الميكروبية المهندسة وراثيا وغير المهندسة وراثيا. قد تطلب بيانات اضافية عن الكائنات المهندسة وراثيا ولكن فقط عن الخواص التى برزت لها اهتمامات اضافية بناء على طبيعة المادة الوراثية التى ادخلت او الطريق الذى احدث تغيير فى المبيد او فى استخداماته.

#### ٤٠ برنامج التشريع الكندى Canadian Regulatory Program:

كل مبيدات الافات بما فيها وسائل مكافحة الميكروبية يجب ان تتعرض للتقويم العلمى للبيانات الخاصة بالامان والفاعلية قبل التسجيل او البيع او الاستخدام فى كندا. تسجيل جميع مبيدات الافات يقع تحت القانون الرسمى لمنتجات مكافحة الافات Pest Control Products Act (pcp) وللتشريعات تحت مسؤولية قطاع المبيدات فى الانتاج الغذائى وفرع المتابعة فى الزراعة الكندية. بالاضافة الى ذلك يوجد عدد من القوانين الفدرالية الاخرى التى تضطلع باستخدامات وتشريعات المبيدات. على وجه



الخصوص فان قانون الغذاء والدواء يحدد الحدود القصوى لمخلفات المبيدات Maximum Residue limits مع جميع الاستخدامات الغذائية.

الهدف الاول من عملية الاستعراض المرجعى يتمثل فى تأكيد الامان والفوائد وقيمة واهمية المنتجات ذات التأثيرات الابلية على الافات. يتناول هذا الاستعراض المرجعى الاستعانة بالخبرات الواسعة مع التركيز على الوصول لافضل القرارات المتوازنة. الخبراء من الوكالات الفدرالية الاخرى تقوم باستعراض اجزاء من البيانات تبعا لخبرات كل منهم كما فى تطبيقات رجال البيئة الكنديين عن السلوك البيئى ومردوداته والتأثيرات المعاكسة الواضحة على الاحياء الارضية كما يقوم خبراء الثروة السمكية والمحيطات باستعراض التأثيرات على الكائنات المائية ويقوم خبراء الصحة والحياه الاجتماعية بتقويم الاضرار المهنية والعرضية ووضع الحدود القصوى للمخلفات على الاطعمة وكذلك رجال خدمات الغابات يستعرضون النواحي المتعلقة بالغابات والبيئة. دلائل التسجيل والبيانات المطلوبة وبروتوكولات وسائل المكافحة الميكروبية فى تطور مستمر. اقتراب البطارية يتبع للوقوف على تقويم المخاطر المؤثرة على صحة الانسان والتأثيرات على البيئة اعتمادا على خصائص ومواصفات المادة مثل الكائنات التى توجد طبيعيا فى مقابل المهندسة وراثيا، درجة الهندسة الوراثية، الكائنات الطبيعية فى مقابل غير الطبيعية والاستخدام المقصود او المستهدف. الاهتمام والتجريب مع الوسائل الميكروبية والحيوية فى المكافحة ذات جدوى فى كندا منذ بداية الستينات. فى عام ١٩٦٢ تم تسجيل مستحضرين من بكتريا باسيليس ثورينجيسيز وكاننا نتملان المبيدات الميكروبية الاولى التى استخدمت فى كندا. فى عام ١٩٨٢ تم تسجيل مستحضرات بكتريا ثورينجيسيز تحت النوع اسرايلىنيسيز (النوع السيروولوجى H14) ونوعان من فيروس البولهيديروسيز النووى (فيروس فراشة نوجلاس وفيروس فيرتاسوك O. pseudotsugata وفيروس ذبابة نشارة الصنوبر حمراء الرأس N. lecontei).

لقد تم استعراض مرجعى لوسائل ميكروبية للمكافحة جديدة بشكل تقليدى على اساس حالة- حالة او ان الاقتراب التشريعى المبكر لم يميز بين الوسائل الحيوية عن المبيدات الكيميائية. لقد تم نشر مسودة خاصة للدلائل التشريعية عن المبيدات التى تحدث طبيعيا فى عام ١٩٨٦.

استجابة للنمو السريع فى البحوث والتطور الصناعى فى مجال التكنولوجيا الحيوية تجرى مجهودات جبارة لوضع وتطوير الدلائل بحيث تشمل كل الوسائل الميكروبية للمكافحة. التحدى يتمثل فى تجهيز البيانات المطلوبة على اسس علمية سليمة والتي تتكون من جهة مناسبة لمسولى التطوير ولكنها من ناحية اخرى تؤكد على الامان على صحة الانسان والبيئة. فى الوقت الراهن تعتبر عملية التسجيل من الاقترابات المرحلية. تشمل هذه العملية نظام خاص للسماح بالتجريب واستعراض التشريع متبوعا بالتسجيل الكامل (١- ٥ سنوات). بالاضافة الى ذلك توجد خطط تحت الاعتبار لتطوير برنامج معلوماتى ودلائل لمرحلة البحوث المعملية.

#### ١- متطلبات السماح باجراء البحوث Research Permit requirements

المتطلبات الحالية للسماح باجراء البحوث (T-1- 126 Trade memorandum.) لا تفرق بين المبيدات للكيماوية والوسائل الميكروبية كما ان التقدم بطلب السماح باجراء البحوث يستعرض على اسس حالة بحالة. دلائل السماح باجراء البحوث على الكائنات التي توجد طبيعيا ثم تطويرها وتوزيعها لاداء الراى والمراجعة والاستخدام على اسس واضحة فى موسم ١٩٨٨. الدلائل تتبع نفس المتطلبات العامة كما فى المنتجات الكيماوية. استمارة التقدم بطلب السماح باجراء البحوث مطلوبة لكل الوسائل الميكروبية بصرف النظر عن حجم التجربة. قد يتطلب الامر اجراء تجارب نويسيكولوجية مناسبة قبل اجراء الاختبارات الحقلية جنبا الى جنب مع اعداد البطاقة الاستدلالية وتوصيف الكائن ووصف الافة المستهدفة ووضع تفاصيل بروتوكول التجريب للتجربة المقدمة وكمية المنتج التي سوف تستخدم والمعدلات وحجم ووصف موقع او مواقع الاختبار. الخطوات والبيانات المطلوبة للسماح باجراء البحوث للكائنات المهندسة وراثيا ما زالت تحت التطوير. بالاضافة الى المتطلبات القياسية للسماح باجراء البحوث تم اخذ البيانات والمتطلبات التالية فى الاعتبار:

- ١- تفصيلات عن طريقة الهندسة الوراثية
- ٢- الصفات الجديدة الفينولوجية phenotypic والوراثية genotypic
- ٣- المقارنة مع الكائن او الكائنات الدقيقة من حيث النواحي البيولوجية والبقائية والتاثيرات البيئية
- ٤- تفصيلات عن خطوات الاستكشاف والكشف monitoring / detection
- ٥- خطط طوارئ للتعامل مع الموقف عند حدوث اى حادثة

## ب- متطلبات التسجيل Registration Requirements

المتطلبات الوسيطة لتسجيل المبيدات الميكروبية التي توجد طبيعياً مدونة في البند R- 1-229 في الدلائل عن تسجيل المبيدات الميكروبية/الحيوية " البيانات الأساسية والمعلومات المطلوبة تتضمن":

- ١- تعريف وتوصيف المنتج متطلباً مواصفات المادة الفعالة (أكثر الصور تركيزاً)، التصنيع، المعينات، وطرق التأكد من الجودة
- ٢- بطاريات المتطلبات التوكسيكولوجية
- ٣- دراسات المخلفات
- ٤- اختبارات السلوك والتأثيرات البيئية
- ٥- دراسات التوكسيكولوجيا البيئية
- ٦- البيانات الخاصة بالفاعلية والاداء

تجرى مراجعة هذه الدلائل للوقوف على الوضع من الناحية الميكروبيولوجية بغرض التحسين وتقديم كائن أكثر تخصصية بين الأنواع للاختبارات عن التأثيرات غير المستهدفة. وسائل مكافحة الآفات المهندسة وراثياً سوف تقيم على أساس حالة - بحالة باستخدام الدلائل الخاصة بوسائل المكافحة التي تحدث طبيعياً كنقطة بداية حتى يتم استكمال البحوث والدراسات لتطوير الدلائل الخاصة بتسجيل الوسائل المهندسة وراثياً. لقد تم نشر إعلان أسس ومتطلبات التشريع في المدونة R- 123. وفي عام ١٩٨٨ تم توزيع مسودة الدلائل لإبداء الرأي.

## REFERENCES

- 1- Federal Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act of 1972, 7 U. S. C. 136 et., as amended October 24 1988.
- 2- Data Requirement for Pesticide Registration, Title 40, Code of Federal Regulations, Part 158, 1988.
- 3- Pesticide Assessment Guidelines – M, National Technical Information Service, Springfield, Virginia, # PB83- 153965 (revised guidelines to be available in 1989).
- 4- Experimental Use permits, Title 40, Code of federal Regulations, Part 172, 1988.
- 5- Regulations for the Enforcement of the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, Title 40, Code of Federal Regulations Part 162, 1988.
- 6- Microbial pesticides; Interim policy on small- Scale Field Testing, FR 49 (202), 40659, 1984.
- 7- Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology; Announcement of policy and Notice for public Comment, FR 51 (123), 13302, 1986.
- 8- Control product Research programs, Trade Memorandum T-1-126. Pesticides Directorate, Agriculture Canada.
- 9- Guidelines for the Registration of Microbial/ Biological pesticides, Memorandum to Registrant R-1-229, Pesticides Directorate, Agriculture Canada.
- 10- Regulation of Pesticides Product by Biotechnology, Memorandum to Registrant R-1-123, Pesticides Directorate, Agriculture Canada.

## ثانيا: الاتحاد الاقتصادي الاوربي (EEC) The European Economic Community

EEC المعروفة بالاسم " السوق العام Common Market " وهي تمثل رابطة بين الدول الاوروبية بدون تعريفات جمركية او تحكم فى التجارة فيما بينها مع تعريفه خارجية عامة للمواد المستوردة. اتفق على تحرير حركة الاموال والعمالة داخل السوق مع درجة مناسبة من التنسيق المالى. عند تكوين الاتحاد الاقتصادي الاوربي ECC عام ١٩٥٨ كان عددا الاعضاء ستة هم بلجيكا وفرنسا وهولندا وايطاليا ولوكسمبورج والمانيا الغربية انذاك. بحلول عام ١٩٨٧ توسع الاتحاد ليشمل بريطانيا وايرلندا والدنمارك واليونان والبرتغال واسبانيا. بينما ادخلت بعض نواحي التنسيق التشريعية والبيروقراطية مع كثير من المحاولات الا ان العديد من نواحي انشطة الاتحاد EEC ظلت منفردة غير مترابطة discrete وخصوصية مفرطة الحساسية idiosyncratic.

لقد كانت هذه الوقائع واضحة بشكل كبير مع اقتراب الاتحاد فى اتجاه تسجيل او الموافقة على ادخال المبيدات. بالرغم من المحاولات المضنية من قبل EEC لوضع نظام عريض يكافئ ما هو معمول به فى وكالة حماية البيئة الامريكية EPA ظلت منظومة تسجيل المبيدات من حقوق كل دولة دون الاتفاق على الاساسيات او الانشطة المشتركة الحقيقية.

للاطلاع على الاتحاد الاقتصادي الاوربي للوسائل الميكروبية لمكافحة: بالرغم من تعدد التنسيق فيما بين حكومات هذه المنطقة قام المجلس الاوربي باصدار وثيقة بعنوان "الدليل عن تسجيل المواد البيولوجية المستخدمة كمبيدات". لقد صدرت الوثيقة لاعطاء دليل عريض للصانع عن اى البيانات المطلوبة من قبل وكالات التسجيل للموافقة على الوسائل التى توجد طبيعيا مثل البكتريا والبروتوزا والفطريات والفيروسات او طفراتها او اى وسائل حيوية اخرى لمكافحة الافات التى تصيب المحاصيل. الدلائل صنفبت بشكل خاص الميكروبات التى صممت للاستخدام ضد الافات التديبية او تلك التى تمت مناورتها وراثيا.

الاساس العام للدلائل تمت صياغته على النحو التالى... على المعلم او المبلغ notifier ان يوضح ان استخدام الوسيلة لن يوجد اى اضرار غير مقبولة على المستخدمين او المستهلكى المنتجات المعاملة او الحياة البرية والبيئة". هذا هو الاساس الذى يستخدم ليس

فقط مع الوسائل الحيوية ولكن مع الوسائل الكيميائية كذلك. هذا الدليل يستخدم على المستوى العالمي وفي الدول تحت الاستعراض العام لوسائل مكافحة الاقوات. الوثيقة تتضمن طلب عن البيانات التي ينظر فيها خارج التوكسيكولوجيا التقليدية والتي لا ترتبط بشكل متخصص مع امان اى وسيلة ميكروبية. هذه المعلومات مطلوبة من قبل كل سلطات التسجيل في دول الاتحاد الاوربي. هذه البيانات تشمل:

- ١- تفاصيل الخطوات والمعايير المستخدمة لتعريف الكائن تحت الاستعراض.
- ٢- بيانات عن المستحضر والشوائب الكيميائية.
- ٣- البيانات عن النقاوة الميكروبيولوجية متضمنة للتاريخ وطرق التحليل وتوضيح ان "اي مكونات توصف كمكونات يمكن السيطرة عليها كمستوى مقبول".
- ٤- "طرق توضح خلوها من اى مرض على الانسان والثدييات". في العادة اجراء اختبار توكسيكولوجى بجرعة واحدة مثل "جرعة العلاجية من الممرض التي تعطى للجردان بواسطة الحقن للبريتوني.
- ٥- بيانات التخصصية لتشمل مناقشة العلاقة التفسيرية مع الممرضات الفقلارية ومعدل حدوث الطفرات. •
- ٦- بيانات عن البقايا والمخلفات.

لن نناقش بيانات التوكسيكولوجى بالتفصيل فى هذا المقام. هذا بينما الدراسات عن العدوى والتضاعف فى داخل الجسم in vivo والمقدرة فى احداث الحساسية وخاصة مع جراثيم "الفطر الهوائية" تعتبر ضرورية. الوثيقة اقل تشددا عن الدراسات الحادة: "يكون مطلوب بعض جوانب تقييم السمية الحادة وتحت الحادة بشكل عادى". السرطانية carcinogenicity والتشوهات الخلقية Teratogenicity تؤخذ دراستها فى الاعتبار بشكل مناسب اذا كانت نواتج التمثيل السامة Metabolites معروف انها تنتج. لم تتضمن وثيقة EEC اية بروتوكولات ولم تقوم اى دولة باستخدام التوصيات مباشرة. هذا ولو ان الوثيقة يجب ان تؤخذ فى الاعتبار بالتوافق مع هيئة الصحة العالمية WHO فان المجموعة الدولية للهيئات القومية لصناع الكيماويات الزراعية، الهيئة الدولية للمكافحة الحيوية وكذلك EPA فانها جميعها تقوم بمناقشات مستفيضة لتطوير الطرق والخطوات المناسبة داخل كل دولة من دول الاتحاد الاوربي.

## • تشريعات المملكة المتحدة United Kingdom (U.K) regulations

لقد اخذت المملكة المتحدة الصدارة بين الدول الاوربية فى تطوير الدلائل الخاصة عن الوسائل الميكروبية للمكافحة واصدرتها عام ١٩٧٩. فى ذلك الوقت كان تسجيل المبيدات فى بريطانيا اختياريا اى ليس اجباريا وبالمجان. هذا وبما انه واقعا كل الشركات اذعنت للأمر تم إيقاف النظام الاختيارى بما يرضى النقاد والانتقادات. هذا الموقف عولج من خلال قانون حماية الغذاء والبيئة لعام ١٩٨٥ والذي بحث ويدفع الحكومة لوضع دلائل شرعية تعضيدية وتحصيل رسوم عن هذا العمل. لذلك فان الوسائل الميكروبية فى الوقت الراهن يجب ان تسجل. حيث ان دلائل المبيدات الميكروبية فى المملكة المتحدة كانت من اوائل الادلة ولا زالت الافضل بين الدول الاوربية فانها سوف تلقى بتفصيل اكثر عن المواقف فى الدول الاخرى.

أ. تعريفات Definitions: قامت المملكة المتحدة بتعريف المبيد على انه "اي مادة او تحضير او كائن يجهز بما يلائم استخدامه كمبيد" لذلك فان جميع الكائنات الحية التى يمكن ان تحل محل المبيدات الكيميائية التقليدية تتطلب تشريعات مهما كانت كيفية احداث الفعل. هذا بينما لو كان نفس النوع يستخدم لغرض اخر كسماد مثلا فانه لا يتطلب هذا التشريع. فى الناحية العملية والتطبيقية فان الدلائل تستخدم فقط مع البكتريا والفيروسات والفطريات والبروتوزا. النيماتودا لم توضع فى الدليل لانها عديدة الخلايا multicellular وهى تحتل مع المواد الحيوية الاخرى مثل المفترسات والطفيليات. الدلائل استبعدت بوجه خاص للكائنات المهندسة وراثيا او الكائنات غير المتوطنة. لقد اخذت هذه الكائنات فى الاعتبار من قبل سلطات مختلفة على اساس حالة بحالة.

ب- المتطلبات The Requirements: المعلومات عن الوسيلة الميكروبية المقدمة موجودة فى "استمارة البيانات data sheet" للاجابة عن ١٣ مرتبة من الاسئلة. معايير التسجيل موضحة ولكن درجة ومدى المعلوماتية وكود استمارة البيانات "المقدمة" ترجع الى مقدم الطلب. نظم المعلومات المطلوبة فى استمارة للبيانات معروفة فعلا لمقدم الطلب مثل طرق الانتاج والصفات البيولوجية والانواع المستهدفة ومعدلات الجرعة...الخ.

**بيانات الامان Safety data:** البيانات التوكسيكولوجية المطلوبة وبروتوكولات التجريب موجودة فى الاستعراض. السلطات البريطانية تشجع طالب التسجيل لمناقشة البروتوكولات معها ومن ثم يكونوا قائلين على استعراض ومراجعة نوع وطبيعة البيانات المطلوبة حالة بحالة. الدلائل تنص على "كل طلب سوف يؤخذ فى الاعتبار من حيث فوائده ونصح الخبراء فى اتجاهى متطلبات الاختبار والطرق التى تستخدم. تقترح الدلائل كذلك ان الاختبارات على المنتجات الفيروسية تختلف عن تلك الخاصة بالوسائل الميكروبية الاخرى.

#### ١- السمية الحادة واحداث العوى Acute toxicity and infectivity

هذه المجموعة من الاختبارات على المستحضر والمادة الفعالة يشمل:

- (أ) الجرعة الحادة عن طريق الفم (ب) الاستنشاق الحاد
- (ج) الحقن تحت الجلد فى السمية الحادة (د) اختبار التهاب الاعين
- (هـ) اختبار التهاب الجلد. البروتوكولات المقبولة لهذه الاختبارات تشابة فى نواحي كثيرة تلك الموصى بها من قبل وكالة EPA.

هذا ولو ان نقاط الاختلاف هذه جديرة بالاهتمام:

- المملكة المتحدة U.K. تطلب الجرعة القصوى العملية بدلا من وضع الرقم مثل ٥ جم/كجم. فى الناحية التطبيقية فان معدل ٥ جرام يكون مقبول للسلطات البريطانية.
- المملكة المتحدة تطلب اختبارات المعاملة تحت الجلد وفى العادة لا تطلب فى جهات اخرى.

- المملكة المتحدة تطلب السمية الحادة لمدة ٢٨ يوم بالمقارنة باختبار بدوم ١٤ يوم فى معظم الدول الاخرى. من المثير للاهتمام ان بعض المسؤولين لا يقبلون اختبارات دوام ٢٨ يوم واختبار ذبح واحد بما يسمح بفترة طويلة جدا للحويان حتى يشفى. من الناحية العملية فان اختبارات ١٤ يوم مقبولة فى المملكة المتحدة.

- للمملكة المتحدة تطلب عمل دراسات عن المرضية النسيجية histopathology على الاعضاء الكبرى مع محولات لاعادة عزل الكائن من للرئتان وسائل الملحمة Conjunctival.



اختبارات العدوى تحت خفض المناعة مطلوب كذلك ولكن نادرا ما ينفذ. لا توجد بروتوكولات فى الدلائل وقيمة البيانات الاضافية فى العادة تؤخذ فى الاعتبار خاصة فى عدم توفر اية دلائل وعلامات عن العدوى من اى مصدر اخر.

**الحساسية Allergenicity:** الدلائل تنص على "لا يوجد فى الوقت الحالى اختبارات تمكن التوصية بها للطلبات العامة " لذلك فان مقدم الطلب يسأل عن وثائق وادلة تشير الى الحساسية فى العمال (ربما من خلال استمارات الاستبيان) وفى الحيوانات وثيقة الصلة بالموضوع. على المتقدم للتسجيل ان يجهز نفسه لاجراء اختبارات Magnusson/Kligman للوقوف على فرط الحساسية المتأخرة بالملاسة. هذا الاختبار يجب ان يجرى تحت اى ظرف من الظروف لانه اختبار غير مكلف ويمكن اجراؤه فى اى دولة خاصة المانيا الغربية لتعزيز اى توجه حول عدم الحساسية.

**التوكسينات المعروفة Known toxins:** اذا كان معروف وجود توكسينات معروفة او تنتج بواسطة الميكروب تطلب السلطات البريطانية بيانات عن الورمية tumorigenicity بناء على التحول الخلوى فى داخل الجسم وكذلك التشوهات الخلقية teratogenicity والتركيب الكيميائى للتوكسين وثباته. اختبار الطفرية mutagenicity باستخدام الكائنات الدقيقة eukaryotic أو prokaryotic مطلوب كذلك اذا كان معروفا ان التوكسين ينتج بواسطة الميكروب. فى الناحية العملية لا يطلب اى من هذه الاختبارات من منتجات الباسيليس ثورينجيسيز. كشف مجموعة الاختبارات هذه مطلوبة مع الفيروسات وهذا يستلزم دراسات سمية ٩٠ يوم على الحيوانات.

• **التشريعات فى الدول الاخرى:** تطوير الدلائل الخاصة بتسجيل المواد الميكروبية خارج المملكة المتحدة تسير ببطى واضح. معظم دول الاتحاد الاوربى EEC لا يوجد لديها بروتوكولات او خطوات مكتوبة عن هذه الكائنات. هذا بينما فى بعض البلدان (مثل هولندا وايطاليا) تم اعداد مسودة لطلب التسجيل. فى بلدان اخرى وضعت مذكرة او تسجيل شفهي مع الفريق العلمى المسئول لارشاد وتوجيه طالب التسجيل. بالرغم من نقص الدلائل فان منتجات الباسيليس ثورينجيسيز لمكافحة يرقات حشرية الاجنحة (مثل مستحضرات الدايبيل والثورسيد والباكتوسيد) سمح بنزولها للاسواق على نطاق تجارى فى معظم الدول الاوربية. العديد من المركبات الميكروبية تباع فى بعض

البلدان الأوروبية أو قد تكون تحت التطوير في بلدان أخرى. لذلك فإنه بالرغم من التطوير والنقص في معيار التسجيل الخاصة إلا أن هذه المنتجات ووفق على استخدامها في هذه الدول. يبدو أن هناك نظم تطبيق بما يسمح بتسجيل ونزول هذه المركبات للاسواق. في معظم الدول الأوروبية تم السماح باستخدام الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات استنادا لمرجعية النظام المعمول به لتسجيل المبيدات الكيميائية.

نقص دلائل وتشريعات التسجيل القومي الخاص بالمبيدات الميكروبية لا يعنى بالضرورة عدم اهتمام هذه الدول بتسجيل هذه المركبات. الموقف يمكن بصورة أكثر حقيقية أو صحيحة مع المواد الميكروبية التي قدمت بغرض الاستخدامات على النطاق التجارى وهى عادة ولجد أو اثنين نخص بالذكر باسيليس ثورينجينسيز تحت النوع كورستاكي. معرفة هذا الكائن جيدا واستخداماته المكثفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ساعد كثيرا على إجازته والسماح باستخدامه في معظم الدول الأوروبية. في دولة واحدة فقط هى الدنمارك يمكن بيع المبيدات الميكروبية بدون الرجوع الى مرجعية السلطات المسؤلة عن تسجيل المبيدات. التشريعات في الدنمارك تقول وتنص صراحة على أن أى وسيلة مكافحة للآفات يحدث القتل بالحدوى وليس بواسطة التوكسين ويعتبر وسيلة مكافحة حيوية ومن ثم لا يتطلب تسجيل. بينما التعريف يتضمن الفطريات والفيروسات إلا أن تضمين الباسيليس ثورينجينسيز محل تساؤل. هذا بينما يوجد مركب واحد على الأقل يباع كى يستخدم على الخضروات فى عام ١٩٨٦. هذا الموقف قد يتغير فى المستقبل القريب حيث أعلنت السلطات أنها بصدد اصدار نظام تسجيل مشابه لما هو معمول به فى المملكة المتحدة.

✱ خطوات التشغيل: من الناحية العملية فإن الدول التى لا يوجد فيها دلائل خاصة تقوم بتسجيل المركب الميكروبي الذى يوجد عنه حزمة بيانات مشابهة لتلك التى تطلبها وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA. فى بعض البلدان يوجد اهتمام خاص عن الحساسية. فى معظم الحالات تكون شهادة التسجيل فى دولة المنشأ من الضروريات ولو أن هذه بنفسها ليست ضمان للموافقة على التسجيل. كذلك فإن الدليل على أن الكائن يوجد طبيعيا فى الدولة من المتطلبات الضرورية المتبعة. بيانات الامان المطلوبة بواسطة هذه الدول تتضمن نتائج دراسات السمية على الثدييات. فى معظم الحالات لم ينص على معدلات الجرعة. فى العادة فإن مسؤولى التسجيل يتبعون توصيات الوكالة

EPA مثال تجربة جرعة واحدة باستخدام ٥ جم من مادة الاختبار لكل كجم من وزن الجسم.

مدى الاختبارات التى تكفى للحصول على تصريح وموافقة على الاتجار فى هذه الدول (كما فى إيطاليا) تشمل:

- ١- السمية الحادة عن طريق الفم
- ٢- السمية الحادة تحت الجلد
- ٣- السمية الحادة عن طريق الحقن اليربوني
- ٤- دراسات التغذية تحت الحادة (٩٠ يوم) (من النادر ان تجرى فى العادة)
- ٥- دراسات الالتهابات على الجلد والاعين
- ٦- السمية عن طريق الاستنشاق
- ٧- الحساسية والالتهابات

هذا بينما ان البيانات المطلوبة بواسطة معظم الدول تقدر الى بعض النواحي نذكرها فيما يلى:

١) لقد برزت العديد من الاسئلة حول عدم الملاءمة مع الكائنات الدقيقة وكمثال فانه يطلب فى الغالب بيانات عن الضغط البخارى والذوبانية فى المذيبات او نقطة الغليان.

٢) من جهة اخرى فانه قد تبرز بعض المشاكل الخاصة ترتبط باستخدام الكائنات الدقيقة كمثال استجابات الحساسية او تلوث المنتج بواسطة الممرضات التى تصيب الانسان او الحيوان.

٣) بعض البيانات ينظر اليها على انها ضرورية لتقييم المبيدات الكيماوية كمثال مطلب دراسات التغذية المزمدة وهذه قد تكون غير ضرورية او غير ملائمة. مثال ذلك ان الطلب للموافقة على المبيدات الميكروبية فى اسبانيا يجب ان يتضمن البيانات عن التمثيل فى الحيوانات. لا توجد اية بيانات تشير الى وجودها فى صورة مناسبة لتسجيل المبيدات الميكروبية. سوف نشير الى وضع اقترايات لتسجيل واستخدام المبيدات الميكروبية فى كل دولة من دول الاتحاد الاوربي فيما يلى:

(١) **إيطاليا:** لقد وضعت السلطات الإيطالية استمارة للتعامل مع المبيدات الميكروبية. الاقتراب مبنى على النصائح من قبل السلطات البريطانية ولو ان هناك نقاط خلاف نذكرها فيما يلي:

- المعلوماتية عن صفات جودة التثوق Organoleptic (الطعم) للمنتجات
- الطازجة المعاملة مطلوبة في إيطاليا.
- مطلوب دراسات الحقن تحت الجلد.
- مطلوب دراسات التغذية تحت الحادة لمدة ٩٠ يوم.

من الناحية العملية مسجل قليل جدا من المبيدات الميكروبية. الوقت اللازم للسماح باستخدام المركب يستغرق من ٥-٧ سنوات. هذا التأخير يبدو انه يرتبط بشكل كبير بالبيروقراطية وليس لاي شئ متعلق بالمنتج.

(٢) **هولندا:** الهولنديون وضعوا استمارة شبيهة لتلك الموجودة من قبل الاقترابات الإيطالية. كذلك فإن الطلبات تشمل عدد من النواحي مشابه لتلك المطلوبة من قبل السلطات البريطانية والأمريكية. نظام التسجيل في هولندا يخضع لمسؤولية ثلاثة أفرع حكومية منفصلة. وزارة الصحة للقومية مسؤولة عن كل ما يتعلق بنواحي الامن.

(٣) **فرنسا:** الفرنسيون ليس لديهم دلائل خاصة للمكافحة الميكروبية مع هذا فإنهم سجلوا العديد من المبيدات الميكروبية. السلطات (مقارنة بالآخرين) على دراية خاصة بكفاءة انتاج التوكسينات الفطرية. الدليل على غياب هذه التوكسينات مطلوب.

(٤) **جمهورية ألمانيا الاتحادية:** الدلائل الخاصة بتسجيل الفيروسات الممرضة للحشرات وضعت عام ١٩٨٣ ومع هذا لم يسجل اى مركب حتى الان. المواد الميكروبية الاخرى ما زالت تحت المناقشة او تخضع للمناقشة by negotiation. بالرغم من انه لم تدرج اية طلبات خاصة لتسجيل المواد الميكروبية الا ان السلطات الألمانية تولي اهتمام بمشاكل الحساسية. هذه السلطات تأخذ في الاعتبار كذلك العديد من نواحي الامن البيئي والاختبارات المطلوبة في الغالب لكثير تشدد من الدول الاخرى.

(٥) **اليونان - إسبانيا - البرتغال:** التسجيل في هذه الدول الأوروبية الجنوبية يتبع الخطوات المعمول بها مع المبيدات الكيميائية. لا توجد اية أدلة عن وجود اية اعتبارات خاصة للمبيدات الميكروبية ولو ان الباسيلليس ثورينجيسينيز تحت النوع

كورسناكى مسجلة فى الدول الثلاثة (يفترض طلب بيانات اقل مما هو مطلوب مع المبيدات الكيميائية). تسجيل مبيد البعوض باسيليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرائيلينسيز اخذ وقتا طويلا. الوقت اللازم لتسجيل المنتجات فى اليونان اطول كثيرا حتى انه يمتد لفترة تقارب الخمس سنوات. مرة اخرى يبدو ان هذا لا يرتبط بالمناقشات عن الامان النسبى للمبيدات الميكروبية ولكن يرتبط بالببيروقراطية التى تسبب التأخير.

٤ اختبارات الجودة Quality control: فى معظم دول الاتحاد الاوربى تطلب بيانات اضافية لتعضيد حزمة التوكسيكولوجى القياسية وتأكيد الامان والنقاوة لكل قطعة انتاج. الطبيعة الدقيقة لاختبارات تأكيد الجودة هذه لا تذكر بالتفصيل من قبل اية سلطة فى دول الاتحاد الاوربى ومن ثم تترك لكل مقدم. لقد اقترح نظام لهذا العمل بواسطة Tate & lyle plc فى بداية الثمانينات وتمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الاوربى للطبيعة والكيمياء International union of physics and chemistry (IUPAC) للمبيدات الحشرية البكتيرية. النظام يبنى على مقاييس التلوث الميكروبي من قبل الاتحاد IUPAC فى اعلاف الحيوانات ويتكون من سلاسل من اختبارات النقاوة الميكروبيولوجية وحزمة واحدة من الاختبارات التوكسيكولوجية. المقاييس الخاصة باختبارات الميكروبيولوجية تتضمن:

- ١- الميزوفيل الحية النشطة  
اقل من  $10 \times 10^6$  /جم
  - ٢- الخميرة والاعفان الحية النشطة  
اقل من  $10^6$  /جم
  - ٣- الكوليفورم  
اقل من  $10^6$  /جم
  - ٤- ستافيلوكوكس اوريس  
اقل من  $10^6$  /جم
  - ٥- سالمونيلا  
اقل من  $10^6$  فى ١ جم
  - ٦- مجموعة لانفيلد D سترىتوكوكاى  
اقل من  $10 \times 10^4$  /جم
- تتكون حزمة الاختبارات التوكسيكولوجية اعطاء  $10 \times 10^6$  جراثيم حية او وحدات مكونة المستعمرات من المادة الفعالة فى كل من الفئران الخمسة حقنا تحت الجلد. بعد اسبوع يتم قتل الحيوانات وتعرض للفحص بعد الموت postmortem. يتم رفض الحزمة اذا حدث: ١- اى وفيات، ٢- وجود دليل على حدوث تلف فى الاعضاء، ٣- وجود تأثيرات صيدلانية انعكاسية والتى تعتبر ضارة. حزمة الاختبارات

هذه تؤخذ كأحد مدخلات التأكد من الجودة (حيث تعتبر الحكم النهائي Final arbiter على حدوث أى ممرضات تدمية لم يكشف عنها فى الاختبارات الميكروبيولوجية) وكذلك كاختبار للطريقة أو لظروف المزرعة التى قد تؤدى الى انتاج مادة سامة غير معروفة حتى الان hitherto بواسطة الكائن الدقيق المستخدم.

موقف التسجيل: توفر وجود العديد من المبيدات الميكروبية تقاوت بشكل واضح خلال العشرة سنوات الاخيرة وبسبب حالات الفشل مع العديد من المركبات وافلاس الشركات وغير ذلك من الاسباب. البيانات الموجودة فى جدول (١-٢) تتضمن المنتجات المتوفرة وقت اصدار هذا الكتاب ويعتقد انها سوف تسجل فى المستقبل القريب. الكائنات الحية تحت التجريب لا توجد فى الجداول. سوف أترك الجدول باللغة الانجليزية لسهولة قراءته.

**خلاصة القول** ان عملية تطوير تسجيل المبيدات الميكروبية ودلائل بيانات الامان بطيئة للغاية. بالاضافة الى ذلك لا يوجد برنامج أو بروتوكول واسع للتسجيل فى الدول الأوروبية. لقد نشر بروتوكول ونليل مباشر فى إنجلترا ولو ان العديد من الدول الأوروبية اعدت استمارات مناسبة لطلب التسجيل. معظم الدول تعتمد على دلائل الطلبات التى وضعت فى الاساس للمبيدات الكيميائية. من المشجع ان معظم الدول الأوروبية سوف تضع وتطور برامج وتوصيات خاصة للتعامل مع المبيدات الميكروبية وتمشيا وتواكبا مع زيادة المنتجات والضغط على مسؤولى التعامل مع وسائل مكافحة الآفات. فى الناحية العملية تأخذ الدول الأوروبية بعين الاعتبار كل اعتبارات ونصائح وبروتوكولات وكالة حماية البيئة الامريكية EPA.

جدول (١-٢): المبيدات الميكروبية المستحثة في الدول الأوروبية

<b>Austria (not EEC)</b>		
Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki Bactospeine (Solvay)	Bacterial	insecticide
<b>Cyprus (not EEC)</b>		
B. thuringiensis ssp. Kurstaki Bactospeine (Solvay)	Bacterial	insecticide
<b>France</b>		
Agrobacterium radiobacter Galeine A (Corvagi)	Bacterial	antagonist
Arthrobotrys irregularis Royal Champignon 350 (Royal Champignon)	Fungal	nematicide
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Dipel (Abbott).	Bacterial	insecticide
Thuricide HP and SC (Sandoz) Bactospeine (Solvay)		
B. thuringiensis ssp. Israelensis e.g., Vectobac (Abbott).	Bacterial	insecticide
Tcknar (Sandoz). Bactimos (Solvay)		
B. thuringiensis ssp. Aizawai B- 401 (Sandoz)	Bacterial	insecticide
Trichoderma viride phior P (Orsan)	Fungal	fungicide
<b>Greece</b>		
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Dipel (Abbott).	Bacterial	insecticide
Thuricide HP (Sandoz) Bactospeine (Solvay)		
B. thuringiensis ssp. Israelensis Taknar (Sandoz)	Bacterial	insecticide
<b>Italy</b>		
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Bactucide (CRC).	Bacterial	insecticide
Dipel (Abbott). Bactospeine (Solvay)		
B. thuringiensis ssp. Israelensis e.g., Bactis (CRC).	Bacterial	insecticide
Vectobac (Abbott). Taknar (Sandoz). Bactimos (Solvay)		
B. thuringiensis ssp. Aizawai B- 401 (Sandoz)	Bacterial	insecticide
<b>The Netherlands, Belgium, Luxembourg</b>		
B. thuringiensis ssp. Aizawai B- 401 (Sandoz)	Bacterial	insecticide
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g. Dipel (Abbott).		

تابع جدول (١-٢): المبيدات الميكروبية المستحضرة في الدول الأوروبية

Thuricide HP (Sandoz), Bactospeine (Solvay) insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Israelensis Bactimos (Solvay) insecticide	Bacterial
<b>Spain and Portugal</b>	
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Dipel (Abbott), Thuricide HP (Sandoz), Bactospeine (Solvay) insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Aizawai B- 401 Sandoz insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Israelensis Bactimos (Solvay) insecticide	Bacterial
<b>U.K.</b>	
B. thuringiensis ssp. Aizawai B- 401 (Sandoz) insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Dipel (Abbott), Thuricide HP (Sandoz), Bactospeine (Solvay) insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Israelensis e.g., Teknar (Sandoz), Bactimos (Solvay) insecticide	Bacterial
Neodiprion sertifer NPV Virox (Oxford Virology) insecticide	Viral
Trichoderma viride Benab T (Bio- Innovation) fungicide	Fungal
Verticillium lecanii e.g., Mycotol and Vertalec (no current producer) fungicide	Fungal
<b>Federal Republic of Germany</b>	
B. thuringiensis ssp. Kurstaki e.g., Dipel (Abbott), Thuricide HP (Sandoz) insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Kurstaki Pyrethrum Celamerck "Natural Insecticide" insecticide	Bacterial
B. thuringiensis ssp. Israelensis Teknar (Sandoz) insecticide	Bacterial



## ثالثا: متطلبات التسجيل واعتبارات الامان للوسائل الميكروبية في مكافحة الافات في روسيا الاتحادية وبعض الدول المجاورة

هذا الموضوع له شقان الاول ان الضمان العلمي مطلوب عن الامان الصحي والبيئي لوسائل مكافحة الميكروبية وفاعليتها بالمقارنة بالمبيدات الكيميائية ضد الافات المستهدفة. الشق الثاني يتضمن ضرورة اعتبار الاسئلة المثارة والتي قد تصل لحد المحاكمة كما في معايير مستحضرات هذه المركبات المتميزة وضمانات السماح باستخدامها والرؤى عن مراجعة التسجيلات الرسمية عند الضرورة. في الوقت الذي يكون تأثير المبيدات الكيميائية على الانسان والطبيعة ذات اهتمام كبير فان موضوع المبيدات الميكروبية مسألة وقت. التطور السريع في التكنولوجيا الحيوية تقدم لنا ليس فقط تنوع الوسائل الميكروبيولوجية في حماية المزروعات ولكن المواد البيولوجية وثيقة الصلة كذلك بما فيها منظمات النمو الحيوية bioregulators والهورمونات والمضادات الحيوية. تنامي الدلائل من البحوث والدراسات المكثفة التي اجريت بواسطة العديد من العلماء جعلت من السهولة والوضوح بوجه عام ان الكائنات الدقيقة الممرضة للحشرات اكثر امانا على الانسان وعلى الكائنات غير المستهدفة (NTO,s) بالمقارنة بالوسائل الكيميائية في مكافحة. قد يؤدي الانتاج الكبير والمكثف لهذه المبيدات الكيميائية والتطبيق المكثف الى حدوث مخاطر على صحة الانسان والحيوان تحت بعض الظروف والتي لا تتوفر مع وسائل مكافحة الميكروبية. لقد برزت انتقادات تقول انه يجب تركيز كل الجهود لاحلال الكيميكالات التقليدية بالمركبات الميكروبية.

السبب الرئيسي للاعتبار الاخير للمركبات الاقل ضررا عن المركبات الكيميائية تتمثل في التخصصية العنائية وفي تتابع عمليات الحصول على الممرضات على الحشرات في عوائل خاصة. بالاضافة الى ذلك فان خصائص التخمر ومتطلبات الحرارة المناسبة لممرضات الحشرات تميزها بشكل كبير عن الكائنات الدقيقة للحيوانات ذات الحرارة الثابتة homeothermic وفي الاجسام التي يصعب توقع نمو وتطور الممرضات متغيرة الحرارة poikilotherms فيها. في النهاية وحيث ان الكائنات الدقيقة بوجه عام وممرضات الحشرات في الموقف الراهن تعتبر من بين العشرة الاف myriad ومكون للنظم البيئية الطبيعية والتي من خلالها تعمل الحواجز البيولوجية تمنع تسبعا وكذلك فان الانتاج الكثيف فقط يصبح مجددا بعد العزل لانه يبدو ان

التطبيقات الحقلية الثقيلة سوف تؤدي الى تأثيرات ايكولوجية معاكسة كبرى للنوع الذى يتبع الرش الكثيف للمحصول والغابات مع المبيدات الكيميائية المخلفة الثابتة".

❑ **الطلبات العلمية المسبقة عن امان المبيدات الحشرية الميكروبية لمكافحة الافات الحشرية:**

(أ) **متطلبات الصحة خلال انتاج المبيدات الحشرية الميكروبية:**

الجدال او النقد الاساسى الذى فى صالح الوسائل الميكروبية فى مكافحة الافات الحشرية كما ذكر اعلاه يتمثل فى التخصص العوائلى واختيارية الهدف. إستخدام هذه الوسائل يشبه التتقيب rifle لانقاذ ضحية بدون احدثات اى ضرر على ما حوله كما تحدث الطلقة النارية shotgun blast. هذا المفهوم لا يميز الاهمية الفائقة للربط بين الامان والفاعلية بخصوص اى منتج حيوى. من المنير ايضا ان من يتلامسون يوميا مع ممرضات الحشرات من خلال اشتراكهم فى تصنيع هذه المنتجات بعيدين كثيرا عن التعرض لهذه الميكروبات عما هو الحال مع مجموع البشر او هؤلاء الذين يستخدمون المركب فى التطبيق الحقلى لعلقى لهذه النوعية من الوسائل الجديدة المماثلة.

حماية الصحة لمواطنى الاتحاد السوفيتى بما فيهم كل الافراد المشتركين فى مكافحة الافات الحشرية ذات الاهمية للزراعية تمثل الاعتبار الهام بالنظر للتطوير والاستخدام العملى لوسائل مكافحة الحيوية وثيقة الصلة فى روسيا. لذلك فان تحليل البحث الابتدائى يقدم بشكل متواصل فى اتجاه كل مجموعة او سلالة فردية من مسببات الامراض الحشرية والتى تعمل كاساس للمنتجات المناظرة. هذه التحليلات تشمل كل ناحية من التتابعات الممكنة للانسان فى توافق كامل وشامل لكل احتياجات الطب المعاصر. من نواحي السرور ان نقرر ان نتائج العديد من التجارب تجرى حول العالم وقد تأكد اليوم ان مستحضرات الفيروس والبكتيريا لا تملك اى خطورة على الناس بالاضافة الى ذلك فانه بينما بعض المنتجات الفطرية تحدث حساسية ابتدائية فى بعض الاحيان فان الفطريات الممرضة للحشرات بوجه عام ليست ضارة كذلك. من بين ممرضات الحشرات والتى تعتمد على الميكروبات فى وسائل المكافحة تبنى على الباسيلليس ثورينجينسيس. الانتاج الصناعى للمستحضرات التى تعتمد على هذا الكائن الدقيق تطور وتقدم خلال العقود الثلاثة الماضية وحتى الان دون اى ضرر على

الانسان (الا ان امكانية التغيرات الطفرية في البكتيريا قد تحدث في اتجاه غير مرغوب وهذا يبقى تحت التدقيق والنظر).

التلوث البيئي بسبب التطبيق الحقلى للباسبيليس ثورسنجينسيز تؤخذ فى الاعتبار وفى الحقيقة فان وكالة حماية البيئة الامريكية EPA ألغت الاحتياجات المبكرة لكميات كبيرة من هذا الكائن فى المنتجات الزراعية. البقايا الفعلية على النباتات بعد استخدام الباسبيليس ثورينجينسيز كانت ٢ مللجم/كجم من كتلة النبات وفى خلال اسبوع تنخفض هذه القيمة بمقدار ٢-٣ مرات. هذه التركيزات تحت المستويات التى اعلنتها هيئة الصحة العالمية WHO والتي لها تأثيرات صحية (هذه القيم تحمل فى طياتها ٥٠ مرة عامل امان) لذلك لا تكون هناك حاجة لوضع قيم قياسية خاصة للامان البيئى. نفس التوجه ينطبق ويطبق على الممرضات الحشرية الفيروسية التى درست حتى الان.

سواء كان عدم الضرر او حدوث الضرر لمستحضرات الفيروس او البكتيريا من الامور المطلقة فان البحوث تتناول دراسة كل سلالة جديدة معزولة تحت الاعتبار من منطلق التعامل معها كما فى المنتجات الحيوية للمكافحة وتصل لمرتبة الضرورة. فى هذا المقام فان مشكلة التطبيق العملى للبيتا - اوكسى توكسين من الباسبيليس ثورينجينسيز سوف تثير اليه باختصار شديد. فى اواخر السبعينات تم اجازة اجراء بحوث مكثفة وتطبيقات حقلية للبيتوكسى باسبيلين bitoxybacillin (الذى يحتوى على ٠,٦ - ٠,٨ % البيتا - اوكسى توكسين فقط) فى الاتحاد السوفيتى ائذاك. بعدئذ تم تطوير مستحضرات اضافية تتكون من البيتا - اوكسى توكسين فقط، ١% فى حالة الثورنجين Turingen و ١٠% فى الثورنجين - ٢. لقد طال انكار تسجيل هذه المنتجات فى الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى ولكن بحلول ١٩٨٣ اقترح البحث الامريكان قبول هذه المستحضرات كما فى حالة ABG- 6146 التى تحتوى ٥٥% بيتا - اوكسى توكسين شريطة ان تكون نواحي الامان وثيقة الصلة بالمركبات الاخرى. مرة اخرى طالبت التجارب والاختبارات بواسطة الباحث كارلبرج واخرون والتي اوضحت الامان الحقلى للبيتار اوكسى توكسين. لقد قام Muskabac بانتاج مستحضرات تحتوى على البيتا - توكسين والتي اصبحت شائعة فى رومانيا (ثورينتوكس Turintox) وفى ايطاليا (اكسوباك Exobac).

(ب) تأثيرات منتجات مكافحة الآفات الميكروبية على النباتات:

معظم المنتجات الميكروبية لمكافحة الآفات تستخدم ضد الآفات الحشرية التي تصيب النباتات عن طريق الرش والنباتات هي اول كائن غير مستهدف NTO's يستقبل هذه الوسائل الحيوية. لذلك فان للتأثيرات الضارة على النباتات phytotoxicity (المقدرة على احدث حروق... الخ) لكل المستحضرات الميكروبية الجديدة ضد الحشرات يجب ان تقيم بعناية. اية تأثيرات ضارة تحدث تستتبع بالضرورة تحويلات مناسبة للمنتجات هذه او حتى التخلي عنها.

(ج) تأثيرات المنتجات الميكروبية لمكافحة الآفات على اكلات الحشرات Entomophaga

ونحل العسل:

المشكلة هنا تتمثل في امكانية حدوث ضرر على الحشرات النافعة القريبة الارتباط بالعوائل المستهدفة من ممرضات الحشرات الخاصة. او ان هذه الممرضات الاخيرة على الكائنات حمير المستهدفة NOT's تعكس كمثال غياب المقدرة الانزيمية لتحويل السم الاولي protoxin لبكتريا باسيلليس ثورينجينسيس الى السم الاصيل او المقدرة على اذابة البولي هيدرا (مع تحديد الفيروس بالتبعية Virion) في عصارات المعدة بالاضافة الى ذلك فان طريقة تغذية الكائنات NOT's وطبيعة غذائها وظروف النمو والتطور النباتي "الفينولوجي phonological" وانواع عريضة من العوامل الحيوية وغير الحيوية جميعها تؤثر على اختيارية ممرضات الحشرات والمبيدات الحشرية الميكروبية التي تعتمد عليها.

رمزية العلاقة الخاصة shotgun/rifle ما زالت ذات صلة وثيقة بالموضوع على عزار ما تم تناوله قبلا. بينما استخدام مبيدات الآفات الكيميائية يضر بكلا "الملائكة والاشرار Saints and Sinners" فان استخدام الوسائل الميكروبية او الحيوية ذات التخصص العالي في مكافحة مثل بيتوكسي باميلين كمثال على البطاطس ضد خنفساء كلورادو البطاطس او على القطن ضد دودة كيزان النرة لا يسبب اية اضرار على اكلات الحشرات التي توجد فعلا على هذه النباتات. ليس معروفا الان ان اية مستحضرات باسيلليس ثورينجينسيس تسبب تأثيرات معاكسة على اشباه الطفيليات الحشرية والمفترسات والملقحات. معظم تحت انواع ممرضات الحشرات تحطم فقط وبشكل نسبي عدو من انواع الآفات الحشرية ومن ثم فان المستوى المقبول من

الاختيارية يمكن ان ينظر اليه في هذا المقام. نفس الكلام ينطبق على المبيدات الحشرية الفيروسية. يجب التنويه الى ان هذه المعلومات عن نواحي الامان للمبيدات الحشرية الميكروبية تبنى ليس فقط على الخبرات المكتسبة من جراء استخدام الجرعات الموصى بها ضد الافات النباتية من حرشية الاجنحة ولكن كذلك من خلال نتائج التجارب عن تعرض اكلات الحشرات ونحل العسل لجرعات كبيرة. يجب التنويه كذلك ان الخفض الحاد في حدوث الافات الحشرية على النباتات بسبب المكافحة الميكروبية الناجحة سوف تحدث خلل في مجموع اكلات الحشرات والطفيليات التي تحد من اعداد الافات. الخطة المقترحة للقصاء على الافات التي تضر بالنباتات phytophagous يجب الا تبنى على تقليل توفر العائل وامدادات الغذاء للحشرات النافعة. تفاعلات السلسلة الناتجة التي تخفض اعدادها يجب الاتخطئ التأثير القاتل المباشر من جراء استخدام مواد المكافحة الميكروبية.

#### تأثير المنتجات الميكروبية لمكافحة الحشرات على الاسماك وكائنات التغذية لها:

هذه التأثيرات تنتج من جراء نوعين مميزين من الاسباب الاول الانجراف drift من رش المواد الميكروبية بالطائرات ضد افات المحاصيل حيث يمكن ان تلوث الماء القريب. الثاني يتمثل في ان مواد المكافحة الحيوية (في هذا الوقت الباسيليس ثورينجينسز تحت النوع اسراييلينسيز = الضرر الميولوجى H-14) قد تستخدم مباشرة للمواقع المائية ضد البعوض والذباب الاسود وغيرها من ناقلات الامراض. في اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى انذاك اظهرت الاختبارات المكثفة على ممرضات الحشرات entomopathogens التي تمثل مجاميع متقاربة من الكائنات الدقيقة عدم بقائها في انسجة الاسماك. لذلك فان تطور وادخال هذه الوسائل في التطبيق العملى مثل المركبات المعروفة باكتوكوليسيد Bactoculicid (في روسيا) وموسكيتير Moscitur (في تشيكوسلوفاكيا) حقق الفرصة لاجراء دراسات عميقة عن الباسيليس ثورينجينسز تحت النوع اسراييلينسيز في البيئات المائية ولكن مرة اخرى دون ظهور اية اخطار على الاسماك والاحياء التي تتغذى عليها جنبا الى جنب مع يرقات البعوض والهاموش. التقلبات في مجاميع الاحياء غير المستهدفة NTO في الماء حيث استخدمت هذه المنتجات تعكس ظاهرة الهجرة والتقلبات الموسمية.

خلاصة القول انه اعتمادا على الجودة الخاصة للوسائل الميكروبية فى مكافحة فائها يمكن ان تستخدم بأسلوب الاغراق inundatively (كما فى حالة الباسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرائيلسينيز) لو اسلوب التلقيح او التطعيم inoculatively (كما فى حالة الكائنات الدقيقة التى تستخدم حية ومن ثم تستقر فى مجموع العائل المستهدف). فى الحالة الاخيرة فان استخدام الممرضات الحشرية يمكن ان يفكر فيه لخلق امراض وبائية حيوانية epizootics. كذلك فان تتابعات المعاملة للجبل المبكر من الانواع المستهدفة بالمبيدات الحشرية الميكروبية يمكن ان تستغل من خلال تطبيقات اخرى اختيارية. سوف نتناول هذا التوجه والاسلوب فى مواضع لاحقة من هذا الكتاب.

تسجيل الوسائل الميكروبية فى مكافحة الآفات فى اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي: لقد كانت دول اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي انذاك اكثر اهتماما بكل ما يخص جودة البيئة وكل حكومة من حكومات هذه الدول وضعت التشريعات المناسبة حيث كانت تفاصيلها تختلف من دولة لآخرى. لقد كان فى المانيا الشرقية فقط فى ذلك الوقت قوانين فورية مشددة بدأ تنفيذها عام ١٩٧١. فى الدول الاخرى من المنطقة كانت الامور المتعلقة بجودة البيئة من مسؤوليات مختلف هيئات الدولة وكانت مكافحة الحشرات الضارة بما فيها استخدام الوسائل الميكروبية يتم تحت مظلة مسؤولى الزراعة مع مكاتب اتصال دائمة بالمسلطات الطبية. المجلس المشترك للمساعدات الاقتصادية (CMEA) تنسق وتوحد الجهود الفردية وثيقة الصلة من قبل البلدان والاعضاء فى اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي ولذلك فان التداخلات الاقليمية تنسق خلال مجلس يمثل كل البلدان المشتركة فى المنطقة فى اتجاه الكشف عن انواع جديدة من المبيدات وتطوير وسائل حيوية وغيرها لحماية النباتات وتحفيز الدراسات التى تستهدف ايجاد الطرق التى تحسن حماية البيئة. بوزنان فى بولندا هى مكان مركز الادارة للمركز المشترك، كذلك كان معهد البحوث العلمية فى برايتسلافار تشيكوسلوفاكيا.

هذين المجلسين يقوموا بالتنسيق معا عند مجابهة اى مشكلة فيما يتعلق بمعايير الامان الصحى والبنى للمبيدات الحشرية الحيوية وكذلك توجيه المراحل المتتالية عن الوقوف على التأثيرات الممكنة لوسائل مكافحة الميكروبية على الناس من الناحية العملية تتضمن:

١- بحوث ودراسات عن العدوى الاولى وسمية ممرضات الحشرات وسمية المستحضرات التي تعتمد عليها وكذلك اجراء دراسات ترتبط بالجرعة وتوقيت التطبيق والفاعلية.

٢- وضع المعايير القياسية الصحية المرتبطة بالثبات البيئي لهذه المستحضرات.

٣- تحسين المتطلبات الصحية فيما يتعلق بتصنيع المركبات وثيقة الصلة التي تعتمد على الفيروسات المرضية على الحشرات والتوكسينات الميكروبية.

هذا البرنامج لا يستهدف فقط القاء الضوء ودراسة وتوضيح الاضرار المباشرة للعدوى والسمية على الانسان من جراء التعامل مع جميع المستحضرات الحيوية ولكن تعريف مدى الاخطار الممكنة التي تنشأ من الطفرية والسرطانية وغيرها. كذلك يقدم البرنامج فرصة لعلماء المانيا وبولندا للتعاون والتنسيق (اخذين في الاعتبار اراء العلماء في الدول الاخرى) ووضع المعايير الصحية لتسجيل مبيدات الافات الجديدة في دول اوربا الشرقية ويوغوسلافيا. كي نتفهم جيدا خطوات تسجيل المبيدات الحشرية الميكروبية في المنطقة يكون من المفيد وصف طريقة استكمال المتطلبات وثيقة الصلة في الاتحاد السوفيتي اذ ذلك والتي تستخدم انواع عريضة بشكل كبير ومسميات عريضة للمبيدات الحشرية الحيوية بين كل دول المعسكر الاشتراكي في ذلك الوقت.

لقد كانت كل التساؤلات عن جودة البيئة وما يتعلق بها تحت المسؤولية المباشرة والفورية والسيطرة من قبل الحكومة السوفيتية. لقد كان الاساس التشريعي لهذه السلطات هو القانون (١٨) للدستور السوفيتي والذي وضع اساس صلب لحماية الطبيعة من خلال الاعلان enunciating عن الاساليب الواضحة للادارة والتطور العلمي لحماية الطبيعة. الهياكل الحكومية المسؤولة تم تنظيمها من منطلق تجهيز ونشر الوثائق التي تعتبر اساسية للتصريح المناسب الخاص بتطبيق الوسائل الحيوية ضد الحشرات الضارة. بعض من هذه الوثائق تصور حماية جودة البيئة من خلال رؤى البدائل للملوثات الكيميائية من المبيدات في مقابل المنتجات الميكروبية للمكافحة عن طريق التكنولوجيا الحيوية المناسبة.

في هذا المقام قامت هيئات الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت بتوسيع دائرة الاتصالات الدولية على كل مستويات الدول وكذلك المستويات الدولية الواسعة. مثل ذلك ان العلماء السوفيت كانوا يلعبون ادورا نشطة تجاه تحقيق اهداف البرنامج الدولي.

لقد طرحت اسئلة عديدة تحت مظلة "الانسان والمحيط الحيوى Man and biosphere" والتي ترتبط بالبرامج الدولية يتم تناولها بواسطة مجلس العلماء التابع للمجلس الاعلى للاكاديمية العلمية فى الاتحاد السوفيتى. كذلك يجدر التنويه بان روسيا كانت تلعب دورا فعالا كجزء من برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الدولية عن مكافحة الحيوية (IOBC). لقد كان للاتحاد السوفيتى دورا رائدا فى تطوير وغرس قانون يمنع اية تأثيرات عكسية او من مسببات ضارة اخرى على الطبيعة والذى تم تطويره من خلال قانون المجلس الاعلى للسوفيت فى ١٦ مايو عام ١٩٨٧. بالاضافة الى ذلك طلب من اللجنة المركزية للانتاج الزراعى (الجوساجروبروم Gosagroprom) للإشراف على القانون وتصحيح خطوات مكافحة الكيمائية والحيوية فى الزراعة بينما يكون مطلوب الحصول على تصريح او اذن فعلى يسمح باستخدام المبيدات الحشرية الميكروبية من مهام مسنولى ومتخذى القرارات المشتركة فى مكاتب وهيئات مختلفة.

فى البداية يتم بحث طلبات انتاج مستحضرات ممرضات الحشرات بواسطة اللجنة المسنولة عن الوسائل الميكروبية فى حماية المزروعات. كل هذه الاجراءات فى جميع الاتحادات تتبع مهام الاكاديمية الزراعية والتي تحمل الاسم V.I. LENIN وتمثل جزء من الجوساجروبروم كما ذكر سابقا. كل الطلبات التى تقدم لهذه اللجنة تؤخذ فى الاعتبار تحت قواعد فحص المستحضرات والسلالات الجديدة. تقوم اللجنة بتقييم كلا فوائد المنتجات المقدمة من منطلق فاعليتها ضد الحشرات الضارة وملاءمة البيانات المقدمة من حيث امانها على الانسان وغيرها من الكائنات غير المستهدفة NOT's.

بمجرد وصول الخبراء المعنيون من قبل للجنة المسنولة عن الوسائل لحماية المزروعات لقرارات واستنتاجات معينة يتم تحويل وارسل الكائن الدقيق محل التساؤل الى مراكز البحوث المتخصصة (مرفق بالوثائق المطلوبة) لاجراء دراسات تفصيلية من جميع النواحي على الميكروب وتأثيراته الصحية والبيئية. هذه المراكز تشمل:

- ١- المعهد الاتحادى للنواحي للصحة والسامة للمبيدات والبوليمرات التابع لوزارة الصحة السوفيتية (لذلك) والذي يقع فى كييف. هذا المعهد هو الاساس الذى يقوم باجراء الدراسات لتحديد امان وسائل مكافحة الميكروبية على صحة الانسان وغيره من الثدييات متجانسة الحرارة Homeotherms فى كلا المرحلتين التصنيع وفى الاستخدام العملى. يقوم الخبراء بتوجيه كل عينة تحت الاختبار الى القسم المناسب



لاختبارات السمية فى روسيا والتي تعرف بالقياسية تحت عنوان "الامان الحيوى biological security " وتحديد اقصى تركيز مسموح به فى جو مصنع هذه المستحضرات الميكروبية. الاستنتاجات تتبع التجارب الخاصة بالسمية الحادة والمزمنة على حيوانات التجارب لتحديد التأثيرات المعاكسة الممكنة على ممرضات الحشرات او منتجات مكافحة الميكروبية المشتقة منها تحت مختلف ظروف التعرض مثل القم المعدة والانف والجو وغيرها من الطرق بما فيها الجلد والعيون. يقوم العلماء كذلك بدراسة الحساسية والسمية على الاجنة embryotoxicity والالتهابات...الخ. معهد دراسات الامراض الوبائية epidemiology والميكروبيولوجية والمرضية والمعدية infectious (تحمل الاسم L.V. Gromashevsky ويقع فى كييف) مسئول بوجه خاص لتقييم الفيروسات الممرضة للحشرات.

٢- المعهد القومى الاتحادى لبحوث الطرق الحيوية لحماية المزروعات (وتقع فى كيشينيف Kishinev) وكذلك المعهد العلمى لبحوث وقاية المزروعات فى بلوروسيا (يقع فى مينزك Minsk) وهما مسئولان بالاشتراك عن اختبارات الفاعلية لمستحضرات ممرضات الحشرات والمكافحة الحيوية ضد الحشرات التى تسبب ضرر اقتصادى او نقلات الامراض.

٣- معهد العلوم البحثية للمزارع المسمكية (يقع فى لزوف) يقوم باختيار مستحضرات ممرضات للحشرات والمكافحة الميكروبية ضد الاسماك.

٤- معهد علوم النحل Apiculture (يقع فى ريزان Ryazan) والاكاديمية البيطرية فى موسكو معهد بحوث الحرير Sericulture جميعها تشترك فى البحوث الخاصة بمعرفة الاضرار التى تسببها ممرضات الحشرات ومستحضرات المكافحة الميكروبية على النحل وبيدان الحرير.

على المستوى الاوسع فان موجدات ومخرجات كل هذه المجاميع تنشر خلال العديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتى ائذاك وتأخذ مجراها ودورها فى الصناعة القومية. المقاييس القومية الروسية تتطلب ادخال متطلبات الامان فى هذا الاتجاه:

- ١- مدى مقبول من مستويات السمية فى توافق مع الامان الحيوى من بين مطالب الامان.
- ٢- مستوى مقبول من التركيز الاقصى لاي مبيد حشرى ميكروبي للاستخدام الحقلى.
- ٣- حماية كاملة لكل العاملين فى المبيدات الحشرية.

٤- اعفاء كل الافراد الذين عندهم تاريخ مرضى ينادى بعدم تشغيلهم فى او بالقرب من المبيدات الحشرية الميكروبية.

بالنسبة لاي مادة ميكروبية لمكافحة الاقلات يجب ان تقيم تبعاً لهذه المتطلبات مع ضرورة تقديم وثائق تعضيدية تؤكد على امان هذه المركبات على صحة الانسان خلال عمليات الانتاج والتطبيق الحقلى وعدم تأثيرها على الصحة بحال من الاحوال. قوائم الاولويات تصل الجهات المسؤولة موصفة و...ضوعة بشكل مناسب مع المعايير القياسية السوفيتية فى ذلك الوقت. هذه القوائم تؤكد على انه لا توجد اى ناحية من المركب سواء عند التطوير او ما يستتبعه من التطبيق الميدانى سوف تضر باى من المشتغلين فى بحوث مكافحة الميكروبية. الهيئات المسؤولة تتضمن:

١- اى جهة تستخدم المستحضرات الحيوية الخاصة واى جهات تابعة للجوساجوربروم المشتركة فى التطبيق الحقلى.

٢- سلطات الاشراف والمجاميع المنبثقة عن مجلس الامان الصحى لجمهوريات الاتحاد السوفيتى حيث يتم انتاج المستحضرات الحية تحت التساؤل.

٣- كل المهتمين بنواحى الامان الصحى والبيئى خلال النقل من مكان الانتاج الى الحقول حيث تستخدم وسائل مكافحة الميكروبية الخاصة.

الجوساجوربروم Gosagroprom ومجلس الصناعة الدوائية والميكروبيولوجية مسؤول عن اعطاء الموافقة النهائية والسماح للتصنيع واستخدامات صلاحيتها تكون خلال فترة محدودة وفى العادة تكون خمسة سنوات. بالاضافة الى ذلك فان هذه المستحضرات التى ووفق عليها تتعرض باستمرار للمراجعة والتعديل عند الضرورة من نواحى الامان الصحى والبيئى.

كما فى حالة اى سلعة مصنعة فان انتاج اى مستحضرات حيوية يجب ان يتم ويجرى فى توافق وثيق مع نواحى ومتطلبات وقواعد ومعايير السماح (كما شرع من البداية او عدل رسمياً) مع ضرورة ان تكون هذه الوثيقة صالحة وسارية المفعول. اى مخالفة لهذه المتطلبات تستوجب توقيع عقوبة شديدة على المخالف فى الصناعة تبعاً للقانون.

الآن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار كل البيانات التى ذكرت اعلاه مع الاقرار بكل ما يتصل بالامان الصحى والبيئى بداية من الدراسات المعملية الاولى على ممرسات

الحشرات محل التساؤل خلال مرحلة التصنيع وحتى الاختبارات الحقلية. هذا الهيكل ينظم الاختبارات على المستوى القومى خلال الاقارع والمعامل التى تقع فى المناطق المختلفة فى الاتحاد السوفيتى. خلال مرحلة الاختبارات القومية تجرى على كل مبيد حشرى ميكروبى لتحديد الجرعة الفعالة وطريقة الاستخدام ضد كل افة حشرية مستهدفة. واحدة من المجاميع العديدة للخبراء (التي تتكون من اخصائى وقيادى وقاية المزروعات من بين اعضاء اللجنة القومية) يراجع ويشرف ويعزز هذا التقييم للمستحضرات الحيوية.

كلا اللجنتان او الهيئتان اللذان ذكرا اعلاه تكون ما يعرف "بالتشريع ذات المكونان Two Chambered legislature" حيث يتكون من الافراد ذوى الخبرة والتخصص المتميز حيث يكون واجبه الرئيسى والاشراف على كل ناحية من تطوير وتصنيع والتطبيق العلمى للمبيدات الحشرية والميكروبية ضد العزلة الاولى لكل سلالة مبشرة حتى التشريع الذى يؤكد امان وفاعلية المستحضرات الحيوية عند الاستخدام ضد الافات الحشرية.

يتم تحليل برنامج الاختبارات القومية بواسطة مجموعة اللجنة القومية عن المستحضرات الحيوية وتصانف تقارير الاجتماعات التى تم فيها قبول والموافقة على المبيدات الحشرية الحيوية ومنظمات النمو التى تستخدم ضد الافات الحشرية وامراض النباتات بشكل اقتصادى. القائمة التى صدرت وعمل بها من ١٩٨٦ وحتى ١٩٩٠ تشمل المبيدات الحشرية والاكروسية ومبيدات القواقع (اجمالى المركبات ١٠١) والمبيدات الفطرية (٦٧) والنيماطودية (١٢) ومبيدات القوارض (كيميائية ٩، حيوية ٢) والمستحضرات الحيوية (١٩ ستذكر بالتفصيل بعد) والفورمونات (٢) ومبيدات الحشائش (١٨٤) ومسقطات الاوراق (١١) ومنظمات النمو النباتية (٢٣). القائمة تشمل كذلك منتجات للاستخدام فى الصوب الزراعية وعلى النباتات ذات الاهمية الصيدلانية وعلى المنتجات الزراعية المخزونة. بالاضافة الى ذلك تشمل القائمة تعليمات عن التوقيت المناسب وعدد التطبيقات والجرعات القصوى/الدنيا على المستوى القومى العريض. هذه التعليمات واجبة الالتزام والتنفيذ بواسطة كل المعاهد العلمية البحثية التى تبحث على ايجاد وتطوير طرق التطبيق الخاصة بما يلائم الحاجة لمنطقة معينة ومشاكل معينة داخل المتطلبات القومية الواسعة.

تقوم اللجنة القومية بتأكيد القائمة فى تناسق مع وزارة الصحة فى الاتحاد السوفيتى آنذاك واللجنة القومية عن الارصاد الجوية والمائية Hydrometeorology وجودة البيئة. هذه الوثيقة تمثل الوضع الرسمى الشامل التى يرجع اليها اى مسئول للتسجيل لكل المبيدات الحشرية الميكروبية من بين العديد من المركبات الاخرى توافقا مع كل التشريعات القومية ومعايير الاستخدام الفعال. لقد نشرت القائمة فى مجلة وقاية المزروعات وتراجع سنويا على امتداد خمسة سنوات للوقوف على استمرارية صلاحيتها او حاجتها للتعديل. المراجعة النهائية تؤكد ان ما يليها قد استكمل واخذ فى الاعتبار كل المستجدات من خلال الاختبارات التى اجريت منذ صدور القائمة.

كما نكر سابقا فان القائمة التى صدرت فى ١٩٨٦ حتى ١٩٩٠ تشمل ١٩ مستحضر حيوى. لقد ظهرت اثنتان من هذه المنتجات تقع فى مرتبة مبيدات القوارض ولا تقع داخل التشريع. لذلك فان ٤ من بين ١٩ مستحضر حيوى يشار اليها على انها طورت ضد المشاكل المرضية النباتية القائمة ١٩٨٦ حتى ١٩٩٠ تشمل ١٥ مادة ميكروبية لمكافحة طورت حقيقيا ضد الافات الحشرية نذكرها فيما يلى:

١- مستحضرات البكتيريا: بيتوكسى باسيلين، ونور باسيلين (سلالتان)، لبيدوسيد،

اندوبلكتيرين، جوميلين، BIP (صفان)، بكتوسين، ديبيل.

٢- مستحضرات فيروسية (٦ منتجات)

٣- مستحضرات فطرية (بوفيرين)

يسبق الموافقة على استيراد المبيدات الحشرية الميكروبية والتصريح باستخدامها فى الاتحاد السوفيتى آنذاك تقييم من قبل الخبراء واجراء اختبارات محددة. لقد شارك مؤلفوا هذا الكتاب الاصلى فى اجراء هذه الاختبارات وتحليل النتائج على مركبات البكتوسين والديبيل وبعدها تم السماح باستخدام هذين المركبين على المستوى القومى. لقد اتبعت خطوات مشابهة فى روسيا على المبيدات الحشرية الميكروبية للاستخدام ضد الحشرات ذات الاهمية الطبية على نفس المنوال كما اتبع مع الحشرات التى تضر بالمحاصيل الزراعية والغابات. هذا العمل يقع تحت مسئولية اللجنة التشريعية المنوط بها العمل على مكافحة ناقلات الامراض فى وزارة الصحة السوفيتية آنذاك. تجتمع هذه اللجنة اربعة مرات سنويا للنظر فى الطلبات المعدة من الجهات المختلفة التى تريد تطوير مستحضرات حيوية للاستخدام العملى. بمجرد الحصول على

تأكيد لجنة الخبراء بمبيد حشري ميكروبي لمن وفعل فاتها تقرر وتوافق على تطوير نموذج لكل طرق الاختبارات المطلوبة (حيث تتم الموافقة على الهيئات المشاركة ومجموعة العمل البحثي بواسطة الوكالة أو اللجنة). بعد اجراء الاختبارات وتقييم النتائج يتم ارسال طلب اخر للجنة يتضمن هذه المرة تصنيع المستحضر الحيوي بكميات تجارية وكذلك التصريح باستخدام هذا المنتج فى الحقل (ما اذا كان المركب سيستخدم بالرش الجوى او الارضى يتم تقريره لاحقا بشكل منفصل). يقوم خبراء اللجنة بفحص خطوات الاختبارات المقترحة والاشتراك فى تجهيز الوثائق التى تعرف المعايير والطرق القياسية مع التركيز على النواحي الخاصة بالامان على الانسان وغيره من الاحياء متساوية الحرارة.

الخطوة الثانية تعنى اللجنة الخاصة بالتشريع لاقرار الانز الممنوح وتوثيقه ولكى يصل الموضوع للنهائية يضطلع مكتب اخر تابع لوزارة الصحة السوفيتية بتجهيز الانز المناسب على صورة امر من مجلس الصحة العامة. هذا الامر يشمل طلبات خاصة تتعلق بطرق التقدم وبعد الاعلان عن المستحضر الحيوى تحت التساؤل يتم تجهيزه للاستخدام ويضاف الى قائمة المبيدات الحشرية (بما فيها المبيدات الميكروبية) حتى يوافق عليه الاستخدام فى مجابهة الحشرات الطبية. هذه الوثيقة الخاصة بالتسمية هى الوثيقة الرسمية الاساسية التى تنشر تحت مسؤولية ومن خلال السلطات المخولة لمكتب الكيمياء الرئيسى وهيئة الصحة العامة فى الاتحاد السوفيتى سابقا والوثيقة تكافئ القوائم الاخرى التى ووفق عليها والخاصة بالمستحضرات التى تستخدم فى حماية المزروعات وفى الاغراض الطبية كما تحدد الوثيقة الفقرة التى تحقق حماية النباتات بعد التطبيق. هناك فقرات خاصة فى القوائم تتناول استخدام هذه المبيدات الحيوية فى الحشرات الطبية تتضمن كل وسائل الامان على العمال الذين يعاونون الحقوق بعد استخدام الممرضات الحشرية والمنتجات المشتقة منها. فى النهاية نص التشريع على ضرورة وضع عدد من الوثائق عن احتياطات الامان الواجب اتباعها عند التداول وقبول الدخول فى بيئة المبيدات الحشرية بما فيها المركبات الميكروبية.

**خلاصة القول** ان تسجيل المبيدات الحشرية الميكروبية فى هذا التداول قد لا تكون خاطئة على طول الخط ولكنها فعالة وكافية فى وقتنا هذا ويبدو انها ستستمر كذلك فى المستقبل بسبب مرونتها والقيود المفروضة عليها. فى المقام الاول فان حركة

وديناميكية هذه المواد تسمح بالتصويب السريع وتعديل خطوات العمل بهذه المستحضرات. الثانية ان الامان يتأكد عن طريق تعريف حدود التحمل بدقة عبر التعبير عن تطوير المركب وتصنيع مستحضراته وحتى كل نواحي التطبيق الميداني. مع هذا يجب توخي الحذر والحرص في كل مجالات الحياة مع التتابع السريع في تطوير التكنولوجيا الحيوية وهي سمة القرن والتي تمتد الى كل مناحي الصناعة. الكائنات الدقيقة التي اعتبرت لقرون بعيدة عن مناحي الحياة الحقيقية من النواحي الايجابية تتلقى الان فرصة تاريخية غير متوقعة. هذا يزيد من المخاوف ولو من الناحية النظرية من ان التضاعف الصناعي و/او اعادة تركيب الكائنات النقية سوف تؤدي الى نتائج معاكسة على صحة الانسان والبيئة. بوجه خاص فان الكائنات المهندسة وراثيا يجب ان ينظر اليها على انها مواد اكثر خطورة عن المبيدات الكيميائية المخلفة بسبب ان بعض المستحضرات ذات الجودة الضارة سوف تتضاعف وتنتشر في الطبيعة. هذه الانتقادات يجب ان تؤخذ في الاعتبار مع ضرورة استمرار مكافحة الافات.

## REFERENCES

- Anon.**, Chemical and Biological Means of plant protection, Reference book of Soviet normative- technical documents, international and foreign standards and bibliographical information, Moscow. 1985 (Russian).
- Bykov, B. A.**, to work in a new way. creatively, *Biotechnology*, 3 (9)1, 1986 (Russian)
- Guli, V. V., Talpalacky, P. L., and Rybina, S. U.**, the influence of the standard microbial insecticidal preparation on honey bees, *Bull. Siber. Res. Inst. Microbiol.*, 17. 1, 1974 (Russian).
- Kadar, B. A.**, Achievements of biotechnology for the benefit of man, *Int. Agric. J.*, 4, 3, 1986 (Russian).
- Larsky, P. P., Dermova, V. P., and Brinkman, L. I.**, medical dissection, *Medicine*, 1985 (Russian).
- Mursa, V. I.**, Information substantiating the maximum permissible concentration of bacterial insecticides in the industrial atmosphere. Current health problems in the use of pesticides, in *Proc. 5<sup>th</sup> All-Union Sci. Conf.*, Kiev, 1975 (Russian).
- Ogarkov, V. I.**, the basic biotechnological problems of the microbial industry, *Biotechnology*, 4 (10) 1, 1986 (Russian).
- Porchachevskaja, O. A.**, the means of protection of the individual in agriculture, *plant Prot Overseas Rev.*, 12, 60 1987 (Russian).
- Rosanovskaja, N.**, International cooperation on health aspects of pesticide use, *Int. Agric. J.*, 1, 64, 1983 (Russian).
- Sidorenko, G. I.**, International health cooperation, *Hyg. Sanit.*, 5, 4, 1982 (Russian)
- Talanov, G. A., Tonkonogenko, A. P., and Karavaeva, T.M.**, Investigation of the effect of the thermostable exotoxin of entomopathogenic bacterial on warm- blooded animals, *Prob. Vet. Health (Moscow)*, 43, 170, 1972 (Russian)
- Vasiljeva, V. L. and Gural, A. I.**, Present and possible future problems of the use of entomopathogenic viruses for plant protection, *Mol. Biol. (USSR)*, 22, 7, 1979 (Russian).
- Weiser, J.**, Registration of bioinsecticides in CSSR, manuscript, 1987.


رابعا: متطلبات تسجيل واعتبارات الامان لوسائل مكافحة الميكروبية فى اليابان  
فى مقالة للباحث shigeru kimuro بقسم البيولوجى مكتب التفتيش الثانى  
بمحطة التفتيش عن الكيمائيات الزراعية الصادرة عام ٢٠٠٠ فى مجلة اجروكيملكال  
اليابان ذكر سيادته ان الترايكوندريما كانت اول منتج ميكروبي لمكافحة الافات تم تسجيله  
فى اليابان عام ١٩٥٤ وبعده تم تسجيل عشرة منتجات اضافية فى الاربعين سنة التالية  
حتى ١٩٩٣. نظام تسجيل المبيدات التقليدية تم تحديده بما يتلائم مع الكشف والتسجيل  
لمنتجات مكافحة الافات الميكروبية اخذين فى الاعتبار الخصائص البيولوجية لهذه  
المنتجات. بعد عام ١٩٩٣ زاد معدل تسجيل المبيدات الميكروبية من جراء الاسراع فى  
تجهيز دلائل خاصة عن الوسائل الميكروبية لمكافحة الافات. الدلائل الجديدة معمول بها  
بتعريض قوى منذ ١٩٩٨ وحتى الان تم تسجيل ٣٢ منتج. فى هذا المقام سوف نلخص  
ما فى هذه الدلائل.

١- المركبات التى تتعرض لمتطلبات الدلائل: الدلائل قابلة للتطبيق على مدى محدود  
من الوسائل الميكروبية لمكافحة الافات مثل الفيروسات الحية والبكتريا والفطريات  
والبروتوزا والديدان الخيطية (فقط المنتجات التى تحتوى على بكتيريا تكافلية  
Symbiotic bacteria كمكون فعال) التى تصنع او تستورد وتسوق كمبيدات افات.  
هذا ولو ان الاعداء الطبيعية من اشباه الطفيليات parasitoides والمفترسات  
والمبيدات ذات الاصل الميكروبي مثل المضادات الحيوية antibiotics قد لا تقع فى  
هذا المدى. الميكروبات المحورة وراثيا لا تخضع لهذه الدلائل.


٢- المفهوم الاساسى لتقييم امان المنتجات الميكروبية لمكافحة الافات: الميكروبات  
المستخدمة تشمل فى الاساس تلك التى تنتشر نسبيا فى العالم الطبيعى والمعروف  
عنها عدم احداثها لاية تأثيرات معاكسة على نكائنات الحية المفيدة. لذلك يجب  
اجراء اختبارات متعلقة بالامان فى بطاريات التجريب كما فى الشكل (١-١، ١-٢).  
اذا تم تقييم البيانات المقدمة من طالب التسجيل على انها غير كافية لتغطية  
التأثيرات على الانسان والحيوان والبيئة تطلب بيانات اضافية اخرى. فى هذا  
الاقترب فان الجرعة الكافية التى تزيد عن اعلى تعرض ممكن.



**دراسة المرحلة الاولى   دراسات المرحلة الثانية   دراسات المرحلة الثالثة**



بسبب تعقيد الشكل وكثرة وتعدد التداخلات بين الاختبارات المدروسة فضلت ان اضع الشكل بالانجليزية كذلك حتى لا يحدث سوء فهم في هذه العلاقات.




Results of safety study in man

في البيئة الطبيعية يجب ان تؤخذ في بروتوكول الاختبار (اختبار أقصى ضرر Maximum hazard test) باستخدام طريق المعاملة الذي يعتقد انه سيحدث أقصى تأثير معاكس على الحيوانات او النباتات المختبرة. اذا اظهرت نتائج الاختبار عدم حدوث تأثيرات معاكسة لا تكون هناك ضرورة لاختبارات المرحلة التالية.

٣- الوثائق المطلوبة في طلبات التقدم للتسجيل: الوثائق المتعلقة بالمواصفات القياسية للمنتج والخصائص البيولوجية لوسائل مكافحة الميكروبية. يجب تقديم التعريف التقسيمي والصفات البيولوجية والمواصفات القياسية مثل التشابه وطريقة التصنيع والنواحي المتعلقة بالجودة.

دراسة المرحلة الاولى دراسة المرحلة الثانية دراسة المرحلة الثالثة



ملاحظة: قد لا يطلب اجراء هذه الاختبارات علي اساس الصفات البيولوجية للكائن او في حالة عدم وجود احتمالات للتعرض

شكل (١-٢) نتائج دراسات السمية والمرضية في كلغات البيئة والسلوك في البيئة

دراسات الامان المرتبطة بالتأثير على صحة الانسان (الشكل ١- ١).

**المرحلة الاولى First phase:** لتقييم تأثير الميكروبات على صحة الانسان فان الميكروب الذى يستخدم كمكون لمنتج مكافحة الافات الميكروبي يعطى لحيوانات التجارب لتقييم كفاءته فى احداث العدوى والمراضية والسمية والقدرة البقائية. لذلك تجرى دراسات على جرعة واحدة فردية تعطى للحيوان وكذلك دراسة عن الالتهابات والحساسية لتأكيد قدرة المركب فى احداث الالتهابات وفرط الحساسية. فى حالة الفيروسات تجرى دراسة اضافية للكشف عن وجود او غياب تأثيرات على وظائف المناعة او السرطانية وكذلك دراسة لتقدير وجود او غياب العدوى او تحول الفيروس باستخدام المزارع الخلوية الثنائية. هذه الدراسات قد تجرى تحت بروتوكول اختبارات اقصى ضرر واذا لم تظهر نتائج هذه الاختبارات اية تأثيرات معاكسة لا تكون هناك ضرورة لاجراء اختبارات المرحلة التالية.

**المرحلة الثانية والثالثة:** عند ملاحظة للعدوى والمقدرة على البقاء فى اختبارات المرحلة الاولى تجرى دراسة تكرر اجراء او اعطاء الجرعة فى المرحلة الثانية للكشف عن تفاصيل هذه التأثيرات. عند ملاحظة حدوث العدوى فى الدراسة على المدى الطويل او فى دراسة المزارع الخلوية يجب اجراء دراسة التكرارية reproducibility كما يجب ان تجرى دراسات السرطانية فى المرحلة الثالثة لتقدير هذه التأثيرات.

اذا لوحظت تأثيرات توكسيكولوجية فى المرحلة الاولى او الثانية يجب تعريف التوكسين المسئول وتعرضه للاختبارات التى تجرى على مبيدات الافات الكيميائية. دراسة المقدرة على البقاء (الثبات) survival ability study. اذا كان المركب تحت الاختبار يستخدم على المحاصيل التى تؤكل طازجة واذا لوحظت اية تأثيرات معاكسة على صحة الانسان فى المرحلة الاولى فان دراسة للقدرة على البقاء على هذه المحاصيل الطازجة يجب ان تقيم لتحديد مدى تأثيرها على صحة الانسان.

**دراسة السمية والمراضية فى الكائنات البيئية (شكل ١- ٢).**

يجب ان يختار النوع او الانواع المختيرة من بين الكائنات الارضية وفى التربة وفى الاوساط المائية مع اعطاء كل الاعتبارات عن نوع المبيد الميكروبي وطريقة الاستخدام وامكانيات التعرض اعتمادا على مكان المعاملة وتشابه الانواع مع الكائن المستهدف. هذه الدراسة ليست مطلوبة اذا كانت الخصائص البيولوجية تشير الى

عدم توقع اية اضرار من الميكروب او اذا لم يكن هناك امكانيات لتعرض الاحياء والكائنات البيئية للمبيد.

اذا اظهرت الدراسة فى المرحلة الاولى عدم وجود اية تأثيرات معاكسة على الكائنات الحية فى البيئة لا تكون هناك ضرورة لاية دراسات لاحقة عن السلوك فى البيئة للمركب الحيوى تحت الدراسة.

دراسة السلوك فى البيئة: اذا اظهرت نتائج للدراسة على الكائنات فى البيئة اية تأثيرات عكسية على اى كائن يجب ان تجرى دراسات لاحقة لتحديد القدرة على البقاء والتضاعف للمبيد الميكروبى فى البيئة عن طريق طريقة الاختبار التى تحقق تعريض مؤثر للكائن او الكائنات المدروسة مع اعطاء كل الاعتبارات عن الخصائص البيولوجية وطرق تطبيق المبيد الميكروبى وانواع والصفات البيولوجية للكائنات التى تأثرت عكسيا.

تقارير حالات تفاعلات الحساسية الفائقة التى تحدث خلال التصنيع او الاستخدام: لتحديد ما اذا كانت المنتجات الميكروبية لمكافحة الافات تسبب تفاعلات فرط الحساسية فى الانسان فان حدوث هذا التأثير فى الناس المشتركين فى تطوير وانتاج المركبات الميكروبية يجب ان تذكر فى التقدير.

٤- الاساسيات المتعلقة بوثائق تقييم الامان: تشرح تفاصيل الاستثمارات و محتوى الوثائق التى يجب تقديمها بغرض التسجيل مثل البيانات التى نوضحها فيما يلى مع اختيار طرق الاختبارات والطريقة المستخدمة فى حصر تفاعلات فرط الحساسية وهذا هو ملخص هذه الطلبات الاساسية:

١- الدلائل تشرح متطلبات الوثائق عن البيانات الخاصة بتقييم الامان التى يجب تقديمها مع طلب تسجيل المنتجات الميكروبية وهى لا تطلب من طالب التسجيل الالتزام الدقيق بالدلائل فى تجهيز البيانات المطلوبة ولكنها تسمح بعمل بعض التحديدات والمراجعات على بروتوكول الدراسة طالما كان ذلك لن يخل بتحقيق اهداف الدراسة.

## ٢- عينات الاختبار Test sample.

I. المنتج التجارى الذى يستخدم كعينة اختبار يجب ان يكون مكون المنتج نفسه. اذا لم يتطابق المنتج التجارى من الناحية الفنية مع عينة الاختبار فان الميكروب فى نفس الصورة كما فى المنتج النهائى (خلايا خضرية، جراثيم، بلورات...او غيرها) تستخدم بدلا من المركب التجارى.

II المستحضر تحت الاختبار يجب ان يستخدم مع اعلى تركيز يستخدم مع المبيد ضمنا لتحقيق الامان- اذا لم يتوافق المستحضر من الناحية الفنية كعينة التجريب قد يستخدم المركب التجارى Technical product بدلا من المستحضر.

III- فى كل الاختبارات يجب ان تؤخذ عينات الاختبار من نفس القطعة ولو انه فى الاساس قد تؤخذ عينة الاختبار من لوات مختلفة ولكن تركيبها يجب ان يكون مشابه للقطعة السابقة. اللوات المستخدمة يجب ان توصف فى تقرير العينات.

IV- فى كل الاختبارات يجب ان تعرف المواد المختبرة بدقة كبيرة.

٣- حيوان او نبات الاختبار: حيوانات ونباتات للتجارب يفضل ان تختار من نفس النوع او السلالة مع جميع الاختبارات بحيث تكون قريبة جدا من الانواع الموجودة فى النواحي العملية فيما يتعلق بضرورة تقييم الامان للمبيدات الميكروبية. يجب اختيار حيوانات او نباتات الاختبار فى دراسات السمية والمرضية فى الكائنات البينية مع الاخذ فى الاعتبار نوع الوسيلة الميكروبية المستخدمة فى مكافحة الافات وامكانية التعرض اعتمادا على طريقة ومكان استخدام المبيد الميكروبي مع علاقة المبيد مع الكائن المستهدف. اسباب اختيار كائنات الاختبارات يجب ان تذكر فى التقرير.

٤- تعريف / الكشف عن وسيلة مكافحة الميكروبية: يجب ان تستخدم طريقة خاصة ذات اختيارية عالية وحساسية وعقلانية عالية اعتمادا على نوع الميكروب لتعريف والكشف عن وسيلة مكافحة الميكروبية محل الدراسات.

## ← وضع المبيدات الميكروبية فى التشريعات والقوانين اليابانية:

فى مقالة للباحث اليابانى K.Aizawa المنشورة فى كتاب "امان المبيدات الحشرية الميكروبية" الصادر عن دار النشر CRC فى فلوريدا ذكر الباحث فى مقدمة المقال المرجعى التقديم انه تم تسجيل ثلاثة مبيدات حشرية ميكروبية فى اليابان: الاول هو باسيليس موريثاى لمكافحة الذباب المنزلى (كمضاف للغذاء بواسطة وزارة الزراعة والغابات التى اصبحت وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية عام ١٩٦٩) وبعد ذلك كمبيد حشرى لمكافحة الاقات الطبية (بواسطة وزارة الصحة والرفاهية عام ١٩٧٣)، الثانى هو تحضير فيروس البولى هيدروسيز السيوتوبلازمية لمكافحة دودة الصنوبر التى سجلت بواسطة وزارة الزراعة والغابات عام ١٩٧٤، الثالث هو تجهيز الباسيليس ثورنجنسيس المتجرثة المحلية المقتولة التى سجلت بواسطة وزارة الزراعة والغابات والاسماك عام ١٩٨٨ كما تم تسجيل مخلوط من الجراثيم البللورية المحلية والاجنبية بواسطة وزارة الزراعة عام ١٩٨٢. فى هذا المقام سوف نلقى الضوء مرة اخرى عن تسجيل المبيدات الميكروبية فى القانون اليابانى.

### (١) الكيماويات الزراعية فى التشريع القانونى فى اليابان:

الغرض من القانون اليابانى تعريف الكيماويات الزراعية والاعداء الطبيعية (بما فيها المتطفلات والمفترسات والكلينات الدقيقة الممرضة للحشرات) وتسجيل الكيماويات الزراعية بواسطة الصناع والمصدرين.

أ- الغرض من القانون: ذكر فى المادة (١) من القانون ان الغرض منه هو المساعدة فى استقرار الانتاج الزراعى وحماية صحة الانسان من خلال التأثير على جودة الكيماويات الزراعية والامان والاستخدامات الامنة عن طريق وضع نظام للتسجيل والسيطرة والاشراف على البيع والتطبيق لهذه الكيماويات.

ب- التعريف: (نذكر فى المواد ١-٢). ذكرت المادة (١) ان الكيماويات الزراعية فى هذا القانون تعنى المبيدات الفطرية والحشرية والكيماويات الاخرى (بما فيها تلك المركبات التى تطلب من قبل الحكومة من بين الكيماويات الزراعية التى تستخدم كمواد خام او مستحضرات نهائية للمكافحة) التى تستخدم لمكافحة الفطريات والنيماودا والاكاروسات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات والنباتات او الفيروسات التى تضر بالمحاصيل (يطلق عليها الامراض والافات الحشرية) وكذلك مسرعات

النمو ومخفضات الانبات وغيرها من الكيماويات المستخدمة لتحفيز او ابطاء الوظائف الفسيولوجية للمحاصيل المعاملة (بما فيها الاشجار والمنتجات الزراعية والغابات والتي يشار اليها في القانون بالمحاصيل). (٢- في هذا القانون تعتبر الاعداء الطبيعية التي تستخدم في مكافحة الافات كما وصفت قبلا تدخل في نطاق الكيماويات الزراعية.

### ج- التسجيل بواسطة صانعي ومستوردي الكيماويات الزراعية:

المادة (٢): طلب التقدم للتسجيل كما عرف اعلاه يتم تقديم طلب يحتوي على النواحي التالية: وثيقة تشير الى نتائج الاختبارات الخاصة بالفاعلية والسمية وثبات المركب الكيماوي مصحوبا بعينة من المركب.

قام قسم وقاية المزروعات- وزارة الزراعة والغابات والاسماك باصدار الدلائل عن بيانات دراسات السمية للتقدم بتسجيل الكيماويات الزراعية في ٢٨ يناير ١٩٨٥. منذ اول ابريل عام ١٩٨٥ أصبح للزاميا او اجباريا تقديم البيانات التوكسيكولوجية عن الكيماويات الزراعية في توافق مع متطلبات تقييم امان الكيماويات الزراعية. هذه البيانات الاساسية عن تقييم الامان تشمل الاتي:

- ١- السمية الحادة عن طريق الفم ٢- الجلد
  - ٣- الاستنشاق ٤- الالتهابات الأولية على الاعين
  - ٥- الجلد ٦- حساسية الجلد
  - ٧- السمية الحادة العصبية المتأخرة ٨- السمية تحت المزمدة عن طريق الفم
  - ٩- الاستنشاق ١٠- السمية العصبية تحت المزمدة
  - ١١- التشوهات الخلقية ١٢- احداث الطفرات
  - ١٣- بيانات الدراسات الصيدلانية
- بيانات الدراسات التوكسيكولوجية المطلوبة لتقييم امان المخلفات الثابتة تتضمن:
- ١- السمية الحادة عن طريق الفم ٢- الجلد
  - ٣- السمية تحت المزمدة ٤- السمية المزمدة
  - ٥- احداث الاورام ٦- التآكل
  - ٧- التشوهات الخلقية ٨- الطفرية
  - ٩- التمثيل ١٠- بيانات الدراسات الصيدلانية

تسجيل المبيدات الحشرية الثلاثة الميكروبية التي ذكرت في المقدمة تمت قبل عام ١٩٧٣. في ذلك الوقت كانت متطلبات الامان اقل حدة عما هي الان وكانت اعتبارات التقدم بطلب التسجيل (من منطلق ان وسائل مكافحة الميكروبية تحدث طبيعيا) تعتبر على اساس حالة حالة.



## (٢) مستحضر باسيليس موريتاي لمكافحة الذباب المنزلي:

لقد تم عزل سلالات باسيليس موريتاي ايزاوا وفوجيوشي الفعالة في مكافحة الذباب المنزلي عام ١٩٦٢ من التربة. اظهرت باسيليس موريتاي مقدرة على احداث المرضية ضد الذبابة السوداء لوفيرا لوكوستوما والذبابة الخضراء من النوع لوسيليا كذلك. هذا بينما لم تظهر مقدرة في احداث المرضية على دودة الحرير ولا نحل العسل.

لتسجيل مستحضر باسيليس موريتاي لمكافحة الذباب المنزلي كمبيد حشري ضد الحشرات ذات الالهمية على الصحة العامة فان بيانات الامان (خاصة السمية تحت المزمدة وانتشار خلايا البكتريا في الاعضاء) تطلب بواسطة وزارة الصحة والرفاهية. الاختبارات الخاصة بالامان الاتية مطلوبة:-

### أ- الاختبارات على الفئران Mice:

السمية الحادة عن طريق الفم: يتم اعطاء الحيوانات معلق جرثيم باسيليس موريتاي ( $10 \times 10^7$  ،  $10 \times 10^7$  ،  $10 \times 10^7$  جرثيم لكل فار، تعامل خمسة فئران لكل تركيز) عن طريق الانبوب المعدى. لم تلاحظ اية وفيات او تأثيرات معاكسة ولم تحدث زيادة شاذة في الوزن. توضع جرثيم باسيليس موريتاي مع الغذاء ومعلق الجرثيم لمدة ٧ ايام وتربى الفئران مع الطعام العادى لمدة شهر بعد ذلك تعطى ثلاثة مستويات من الجرثيم الكلية لكل حيوان لمدة ٧ ايام على النحو التالى  $10 \times 10^8$  جرثومة مع الغذاء +  $10 \times 10^3$  جرثومة مع الماء،  $10 \times 10^3$  جرثومة مع الغذاء +  $10 \times 10^2$  جرثومة مع الماء،  $10 \times 10^5$  جرثومة مع الغذاء +  $10 \times 10^6$  جرثومة مع الغذاء. لم تحدث اية وفيات ولا زيادة شاذة في وزن الحيوانات.

استخدام الجرثيم على الجلد المجروح: تم استخدام ٣٠٠ ملليجرام من عجينة تحتوى على  $10 \times 10^8$  جرثيم على الجلد المجروح لفئران التجارب. الضرر يشفى تماما. الحقن تحت الجلد Intracutaneous injection: تم حقن معلق الجرثيم ( $10 \times 10^8$  جرثيم لكل فار) تحت الجلد في خمسة حيوانات. لم تلاحظ اية تأثيرات معاكسة.

الحقن في الغشاء البريتوني Intraperitoneal (ip) injection: تم حقن معلق جرثيم ( $10 \times 10^8$  ،  $10 \times 10^7$  ،  $10 \times 10^6$  ،  $10 \times 10^5$  لكل فار) في

الغشاء البريتوني. لقد وصلت الوفيات بعد ٧ ايام الى صفر/ ٨ ، ٨/٢ ، ٥/٤ ، ٥/٥ ، ١١/١١ على التوالي. فى تجربة اخرى عن السمية الحادة مع اعطاء الجرثائم عن طريق الفم كانت الجرعة المصفية القاتلة LD<sub>50</sub> أكبر من ١٠x٤,٣ جرثائم لكل كيلو جرام من وزن الجسم بينما كانت LD<sub>50</sub> عن طريق الحقن البريتونى ١٠x١,٢ جرثائم لكل كيلو جرام من وزن الجسم وهذه مقارنة مع الباسيليس ثوريينسيس. الاستنشاق Inhalation: تم تعريض الفئران لمسحوق الجرثائم (١٠x١,٨ جرثائم لكل جرام ، ٢٤٢-٢٦٣ جرام / م<sup>٣</sup>) لمدة ساعتان او ساعة / يوم لمدة ٧ ايام(استخدمت عشرة فئران لكل اختبار). لم تحدث اية وفيات او تلاحظ تأثيرات معاكسة. لقد اختفت خلايا باسيليس موريثاى من الكبد والكلى والطحال والقلب بعد اسبوع من انتهاء الاستنشاق ولكن خلايا البكتريا فى الرئتان تناقصت تدريجيا.

#### اختبارات السمية تحت المزمدة Subchronic toxicity test :-

احداث المرضية Pathogenicity: تم اعطاء الجرثائم بتركيزات ١٠x٥ ، ١٠x١ ، ١٠x٥ لكل جرام غذاء لمدة ٧ شهور. استخدمت عشرين فأر مع كل تركيز جرثائم وتم تسجيل البيانات عن وزن الجسم وحرارة الجسم والغذاء المستهلك كل اسبوع. تم تشريح خمسة فئران بعد ثلاثة اشهر من التغذية وعشرة فئران بعد ٧ شهور من التغذية لتقدير وزن الاعضاء الداخلية (الكبد والطحال والكلى والقلب والرئتان) وكذلك حصر اعداد الخلايا البكتيرية وكذلك الفحص النسيجي المرضى. الفئران المتبقية تم تشريحها لاجراء نفس الاختبارات التى ذكرت اعلاه مع التغذية لمدة ٧ شهور على الجرثائم مع اسبوعان اضافيان من التربية على غذاء عادى لم تسجل اية اختلافات بين المقارنة والمعاملات. هذا بينما كانت اعداد الوفيات فى الفئران بعد ٣-٧ شهور حيوان واحد فى تركيز ١٠x٥ جرثائم لكل جرام غذاء، حيوانان فى المقارنة (١) (بدون معاملة) وحيوان فى المقارنة (٢) (غذاء فى المزرعة) على التوالي. لم يقدر ان موت الفئران تسبب بواسطة التغذية على جرثائم باسيليس موريثاى. لقد تحصل على نتائج مشابهة فى تجارب اخرى.

اختفاء خلايا البكتيريا من اعضاء ودم الفئران: فى التقييم الحيوى لجرثائم باسيليس موريثاى بتركيزات ١٠x٥ ، ١٠x١ ، ١٠x٥ جرثومة لكل جرام غذاء فان عدد خلايا البكتيريا لكل عضو فى الكبد والطحال والكلى والقلب والرئتان بعد سبعة اشهر

من التغذية كانت منخفضة (صفر - ٢٥٠) عما هو الحال مع تغذية ٣ شهور (صفر - ٣٤٠٠). هذا ولو ان خلايا البكتريا فى الاعضاء اختفت بعد اسبوعان من ايقاف التغذية بعد ٧ شهور ما عدا حالة واحدة (١٩ خلية بكتيرية فى الكبد عند تركيزات  $10 \times 10^5$  جرثيم لكل جرام غذاء).

لقد وصلت اعداد المستعمرات لكل مليلتر فى دم الفئران بعد ٣، ٧، اشهر و٢ اسبوع من التغذية على غذاء عادى بعد ٧ شهور من التجريب الى صفر وحتى ١،٥. لقد تحصل على نتائج مشابهه فى تجربة اخرى. لقد اشار الباحث ميباشى الى اختفاء خلايا باسيليس موريتاى من الدم بعد الحقن فى الوريد وفى الغشاء البريتونى للجراثيم وبعد ثلاثة سلاسل من الحقن الوريدى. لقد درس اختفاء باسيليس موريتاى فى الاعضاء والدم كل شهر خلال ١٢ شهر تغذية الفئران على الجراثيم ( $10 \times 10^5$  جرثومة لكل جرام غذاء).

فى الشهر الاول لوحظ انتشار خلايا البكتريا فى الاعضاء ولكن اعداد الخلايا فى الاعضاء بدأت فى النقصان بالتدريج بعد ٢-٣ شهور وكان الخفض واضحا بعد ٧-٨ شهور فيما عدا الرنتان. لوحظ اختفاء خلايا البكتريا بعد ١٢ شهر.

#### ب- الاختبارات على الارانب:

السمة الحادة عن طريق الفم: تعطى الفئران  $10 \times 10^5$  او  $10 \times 10^5$  جرثومة لكل جرام غذاء لمدة ١٠ أيام. لقد استخدمت خمسة فئران مع كل مستوى تغذية ومع المقارنة لم تلاحظ تأثيرات معاكسة فى حرارة الجسم او فى معايير الدم وزيادة وزن الجسم. لم توجد بكتريا فى الدم.

اختبار السمية تحت المزمرة: أعطيت الارانب جرثيم باسيليس موريتاى لمدة ١٠٠ يوم تحت نفس الظروف التجريبية فى اختبار السمية عن طريق الفم.

خلال الاختبار تم تغذية فلر واحد  $10 \times 10^5$  جرثيم لكل جرام غذاء وأحدث نقص فى الوزن وارتفاع كبير فى درجة الحرارة hyperthermia. وقيم منخفضة فى معايير الدم وحدثت حواجز سمكة فى الرنتان فى نهاية الاختبار. لقد تم استبعاد هذا الفلر من بيانات بعض النتائج النهائية لان السمك لم يعتبر نتيجة للتغذية على الجراثيم. لم تلاحظ اختلافات معنوية فى استهلاك الطعام<sup>١</sup> أو زيادة وزن الجسم فى اى مجموعة حيوانات مختبرة بما فيها المقارنة. لقد كانت درجة حرارة المستقيم كما سجلت اسبوعيا

عادية. فى المرحلة المبكرة من الاختبار كانت درجة قيم معايير الدم عند مستوى  $10 \times 2$  جرثومة لكل جرام غذاء وفى المقارنة فى المدى المنخفض. فى النهاية ولو انه تحصل على قيم عادية فى جاذبية الدم والكلى وتركيز الهيموجلوبين والصفائح الدموية وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء. لم تلاحظ اختلافات كبيرة مؤثرة فى نسبة العضو - الجسم فى الكبد والكلى والطحال والقلب والخصيات بين المعاملات والمقارنة. لقد تم الكشف عن البكتريا فى الدم قبل شهر من نهاية الاختبار ولو انه لم يتم تعريف القليل من المستعمرات التى تكونت على انها باسيليس موريثاى.

ج- اختبارات الحساسية والاعوار فى خنازير غينيا: لقد تم احداث الحساسية بواسطة عشرة حقنات تحت الجلد بمعلق الجراثيم ولكن تحفيز الحساسية allergy لم يكن ملحوظا بشكل واضح ولكن حدثت نفس درجة الاستجابة بواسطة باسيليس سبتيليس (باسيليس ناتو) التى استخدمت الخمير "natto" (تخمير فول الصويا مع باسيليس سبتيليس). لم تحفز الحساسية فى خنازير غينيا التى تغذت على طعام يحتوى على  $10 \times 1$  جرثومة لكل جرام لمدة اسبوع وتلك التى تعرضت لمسحوق الجراثيم بواسطة الاستنشاق ( $10 \times 2,3$ ) جرثومة لكل جرام، ١٥ جم/٨١، ١٥ دقيقة لكل يوم لمدة ٧ أيام). الاعوار Anaphylaxis لم يحفز فى اى من الاختبارات التى استخدمت جراثيم باسيليس موريثاى او المقارنة مع استخدام جراثيم باسيليس سبتيليس.

د- اختبار الامان على الدواجن التى تضع البيض: لقد تم اعطاء الدواجن معلق الجراثيم ( $10 \times 1$  جرثومة لكل مليلتر) (٤ مليلتر/يوم) لمدة شهر. لم تلاحظ تأثيرات معاكسة وكانت الاعضاء طبيعية. لم تلاحظ اى عدوى بالبكتريا فى البيض. الدواجن البياضة (١١ شهر) غذيت على الجراثيم ( $10 \times 1,1$ ،  $10 \times 2,2$  جرثومة لكل جرام غذاء، مع معاملة ٤٠ نجاجة مع كل تركيز جراثيم) لمدة ٤ شهور. لم تلاحظ اية اختلافات فى الغذاء المستهلك وانتاج البيض ووزن البيض بين المعاملات والمقارنة. الدجاج (٤ أسابيع فى العمر) غذيت على الجراثيم ( $10 \times 5$  و  $10 \times 2,5$  جرثومة لكل جرام عليقة مع ٢٠ نجاجة لكل تركيز جراثيم) لمدة ٦ شهور. لم تلاحظ اية اختلافات فى النمو والغذاء المستهلك وانتاج البيض بين المعاملات والمقارنة.

هـ- اختبارات الامان على البقر: لقد تم تغذية احدى الابقار هولستين بالجراثيم ( $10 \times 10^2$ ) جرثومة لكل جرام غذاء) لمدة ٣ شهور. لقد تم فحص اخراج الخلايا البكتيرية في البراز والبول وانتقال خلايا البكتريا في الدم واختبار جودة اللبن. لقد وصلت اعداد الخلايا البكتيرية التي تم اخراجها في البراز  $10 \times 10^7$  جرثومة لكل جرام براز خلال التغذية على الجراثيم وتناقصت الى ٠.٠١% بعد ثلاثة ايام من نهاية التجربة. لقد كانت اعداد خلايا البكتريا في الدم تسلي ١,٥، ٨,٨، ١,٥ خلية لكل مليلتر بعد ١، ٢، ٣ شهور على التوالي. لقد كانت صورة الدم طبيعية بعد ٣ شهور من التغذية.

و- اختبارات الامان مع السمك: تم تربية سمك الشبوط في ماء محتوي على جراثيم ( $10 \times 10^5$ ) جرثومة لكل مليلتر) لمدة ٤٨ ساعة ولم تلاحظ اية اعراض شاذة بعد ٧٢ ساعة.

س- اختبارات الامان على الطيور: لقد تم تغذية اربعة عصافير كاناري بالجراثيم ( $10 \times 10^4$  وحتى  $10 \times 10^5$  جرثومة لكل طائر) اربعة تغذيات مع كل تركيز، كناري واحد لكل تركيز) وتمت ملاحظة العصافير لمدة شهرين. لم تلاحظ اية تأثيرات معاكسة.

ص- اختبارات التغذية على الانسان: لقد اجرى هذا الاختبار على اربعة ذكور متطوعين بعمر من ٣١ - ٤٨ سنة. لقد وضع ثلاثة رجال في مجموعة التجريب وواحد للمقارنة. لقد تم اعطاء المتطوعين واحد جرام من جراثيم بيسيلليس موريثاي ( $10 \times 10^7$ ) جرثومة) في كبسولة جيلتين للثلاثة متطوعين قبل الفطور ولمدة ٥ ايام. لقد تم اعطاء نفس كمية الجراثيم المعقمة بالايوتوكلاف بواسطة رجل المقارنة. الفحص البدني الطبيعي: لم تظهر اية علامات على حدوث تأثيرات معاكسة من جراء تناول جراثيم بيسيلليس موريثاي.

الفحص المعملي: اتضح ان جميع الاختبارات ايجابية كانت نتائجها طبيعية مع عدم ظهور اية علامات عن العدوى بالبكتريا: تحليل الدم (كرات الدم، الهيموجلوبين، دليل اللون، كرات الدم البيضاء، الصفائح الدموية، بروتين البلازما)، تحليل البول (البروتين، الجلوكوز، يوروبيليتوجين، يوروبيلين)، وظيفة الكبد (دليل اليرقان icterus index، بيلورين، عكارة كيرينات الزنك، عكارة النيمول، الكوليسترول الكلي، GOT،

(ALP، LDH، GPT) ووظائف الكلى (BUN، صوديوم، كلورين، بوتاسيوم، حامض اليوريك، PSP).

إخراج الجراثيم في البراز: يبدأ إخراج الجراثيم في البراز بعد يوم من تناول للجراثيم. لقد وصلت اعداد الجراثيم في الاربعة ايام التالية  $1.6 \times 10^7$  / يوم. بعد انتهاء تناول حدث خفض سريع في إخراج الجراثيم ولم يتم الكشف عن جراثيم باسيليس موريتاي في اليوم السابع. الاسترجاع الكلى للجراثيم التي تم تناولها في البراز بعد ٧ أيام من آخر تناول وصل الى ٩٦% مما أدى الى الاقتراح بحدوث إخراج كامل للجراثيم.

← مستحضرات فيروس بولى هيدروسيز السيئولازمى لمكافحة يرقات الصنوبر: لقد تأكد من فاعلية هذا الفيروس في مكافحة يرقات الصنوبر اندروليمس سكيتابيلس في الغابات. لقد تم تسجيل مستحضر تجلرى في اليابان عام ١٩٧٤. لقد تم اجراء اختبارات الامان التالية:

(أ) حقن جسيمات الفيروس او البولى هيدرا السيئولازمية في الحيوانات: تم الحقن في الفئران والجرذان والهامستر والارانب عن طريق الحقن الوريدي وفي الغشاء البريتونى وفي المخ ولم تلاحظ اية اعراض مرضية، لقد خلص الباحث Katagiri عام ١٩٨٨ الى عدم حدوث مرضية من جراء مرور الفيروس خلال لجنة الفئران والدواجن.

(ب) السمية الحادة وتحت الحادة: لقد تم تغذية الفئران والجرذان على اكثر من  $10 \times 10^3$  بولى هيدرا لكل كيلو جرام من وزن الجسم لمدة ٧ أيام. لقد تم حقن الفئران والجرذان بالبولى هيدرا السيئولازمية عن طريق الاتيوب المعدى لمدة ٩٠ يوم بتركيز  $1.8 \times 10^1$ ،  $9.0 \times 10^1$ ،  $4.5 \times 10^1$ ،  $2.3 \times 10^1$  لكل كجم من وزن الجسم. لقد كان النو طبيعيا فيما عدا حدوث خفض طفيف مع تركيز يبدأ من  $4.5 \times 10^1$  بولى هيدرا لكل كيلو جرام. لم تحدث زيادة شاذة في الوزن او اية تشوهات مرضية في الاعضاء الداخلية فيما عدا الطحال والمبايض في اناث الجرذان التى حدث فيها تضخم بسيط هذا مع حدوث بعض الاختناقات الدموية في الامعاء والكلى في الفئران المعاملة مع كمية صغيرة من ترشيع كرات الدم البيضاء في معدة الجرذان المعاملة.

(ج) السمية على الاسماك: لم تموت اى من الاسماك التى حفظت فى الماء المضاف اليها البولى هيدرا (٢١٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٠ بولى هيدرا لكل مليلتر لمدة ٧٢ ساعة).

مستحضرات الباسيلليس ثورينجينسيز: لقد تم عزل البكتريا بواسطة الباحث Berliner عام ١٩١١ من اليرقات المريضة لفراشة دقيق البحر الابيض المتوسط ايفستيا كوهنيلا وسميت باسيلليس ثورينجينسيز فى عام ١٩١٥. ماذا بينما تم الكشف الحقيقى عن هذه البكتريا بواسطة الباحث ايشيوانتا عام ١٩٠١ فى اليرقات المريضة من دودة الحرير (مرض الفلاشبرى) فى اليابان. لقد اطلق الباحث ايشيوانتا على هذه البكتريا المكونة للجراثيم سوتو Sotto ثورينجينسيز تحت النوع سوتو (الطرز الميولوجى 4a ، 4b).

عندما تم التطوير الاول لمستحضرات باسيلليس ثورينجينسيز فى امريكا وفرنسا تم استيرادها فى اليابان. بسبب سميتها على دودة الحرير تم ايقاف استيراد اية سلالات من هذه البكتريا عزلت خارج اليابان وكذلك اية مستحضرات تعتمد عليها عن طريق الحجر الزراعى فيما عدا لاغراض البحث والتجريب شريطة موافقة وزارة الزراعة والغابات فى اليابان. بسبب المخاوف فى ذلك الوقت من ان تودى الباسيلليس ثورينجينسيز الى حدوث وباء مرضى فى مزارع دودة الحرير اصبح المطلب الاولى للسماح باية استخدامات عملية لهذه المبيدات الحشرية الميكروبية فى اليابان ضرورة اجراء بحوث مكثفة للوقوف على امكانية حدوث اية تأثيرات معاكسة على ديدان الحرير وعلى صناعة الحرير بشكل عام. فى هذا المقام تم بحث النواحي التالية:

١- حساسية سلالات دودة الحرير ضد سلالات باسيلليس ثورينجينسيز ومستحضراتها.

٢- تربية يرقات دودة الحرير على اوراق التوت المرشوشة بجرعات تحت مميئة من الباسيلليس ثورينجينسيز.

٣- عزل هذه الكائنات الدقيقة من مخلفات مزارع تربية ديدان الحرير.

٤- العلاقة بين حدوث امراض دودة الحرير ووجود جراثيم باسيلليس على مزارع تربية دودة الحرير.

٥- توزيع الطرز الميولوجية لهذا الكائن الدقيق.

٦- تضاعف هذا الميكروب فى يرقات دودة الحرير الميئة.

٧- تضاعف الباسيلليس ثورينجينسيز فى التربة.

٨- معاملة وحدات التربية المستخدمة في تربية ديدان الحرير باتفورمالين وغيره من المظهرات الأخرى.

٩- توضيح الاخطار وثيقة الصلة بالجفاف الرش الى زراعات التوت.

١٠- اختيار سلالات باسيليس ثورينجينسيز ذات السمية المنخفضة على دودة الحرير للاستخدام في مكافحة الآفات الحشرية في اليابان.

لقد اجريت هذه الدراسات الموضحة اعلاه على امتداد عشر سنوات. لقد ادت نتائج هذه الدراسات الى اتخاذ قرار باعفاء سلالات الباسيليس الاجنبية من اجراءات الحجر النباتي في عام ١٩٧١ ونفس الشيء على مستحضراتها بالتبعية قامت رابطة حماية المزروعات اليابانية في عام ١٩٧٢ بتشكيل لجنة دراسة مستحضرات باسيليس ثورينجينسيز في خمسة اقسام كل منها يتناول ناحية من النواحي التالية: بحوث اساسية وثيقة الصلة بهذا الميكروب، فاعلية وامان هذه المبيدات الحشرية الميكروبية، النواحي المتعلقة بصناعة الحرير ونحل العسل والتطبيقات العملية.

لقد قامت اللجنة بدراسة كفاءة وامان مستحضرات الباسيليس ثورينجينسيز وتأثيراتها على البيئة خاصة ما يتعلق بمزارع دودة الحرير. اذا استخدمت هذه المستحضرات بعناية لوحظ يمكن ادخالها في بيئات تربية ديدان الحرير دون ان تحدث بها اية اضرار. حدوث امراض ديدان الحرير يمكن تحديدها ما اذا كانت تحدث بسبب نشر واستخدام مستحضرات الباسيليس ام لا. تقوم اللجنة كذلك بإيضاح مغزى تقييم كفاءة مستحضرات باسيليس ثورينجينسيز كما قامت بوضع وتطوير الخطوات التالية لتقنين وتشريع كفاءة هذا الميكروب.

لقد تم تربية يرقات دودة الحرير (بوميكس موراي- سلالة شوجتوبوميكس سلالة شونري) على غذاء صناعي على درجة حرارة ٢٤- ٢٥ م. تخفيف مستحضرات الباسيليس عادة يكون من ٣/٤ وحتى مرتان ، تم خلط نصف مليلتر من العينة المخففة مع ١٠ جرام من الغذاء الصناعي في طبق بترى. استخدمت ٣٠ يرقة (١٠ يرقات في ٣ اطباق بترى) في اليوم الثاني من العمر الثالث مع كل تخفيف في العينة. تم تربية اليرقات لمدة ٣ أيام على غذاء في العينة ولمدة يومان اضافيان على غذاء طبيعي عادي. تم تسجيل الوفيات. اذا حدثت وفاة لاكثر من يرقان من بين ٣٠ يرقة تستبعد النتائج.



تم تجهيز معيار قياسي ذاتي Self- Standard لكل قائم بتجهيز المستحضرات بوضع في محطة التفتيش عن الكيمائيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية. كفاءة كل مقياس ذاتي كانت 1000 Bm U/mg (وحدات بودة الحرير) بصرف النظر عن السمية على بودة الحرير. يتم حساب الكفاءة من المعادلة التالية:

$$\text{التركيز النصفى القاتل } \text{Lc50 (ميكروجرام/مليلتر) المقياس الخاص} = \text{كفاءة العينة}$$

التركيز النصفى القاتل Lc50 (ميكروجرام/مليلتر) عينة

كفاءة المستحضرات التجارية مطلوبة ان تقع بين ٨٥ و ضعف القيمة المدونة ١٠٠% للعامل BmU عند التحليل الحيوى للعينات بواسطة محطة تفتيش الكيمائيات الزراعية. كل مقياس ذاتي قياسي يجب ان يعبر عنه كوحدة دولية IU او International Unit لكل ملليجرام واذا كان ضروريا يستخدم المعيار E-61 (المعيار القياسي الدولي International standard) او المعيار القياسي الامريكى (HD- I- S-). (1971).

هذه الطريقة والخطوات تستخدم فقط لتشريع وتنظيم كفاءة المستحضرات الموضحة. الكمية العملية للمستحضر التى تصلح لمكافحة الحشرات المستهدفة يجب ان تحدد من خلال اختبارات مستقلة. عند تقدم طلبات التسجيل لمستحضرات الباسيليليس ثورينجينسيز المتوطنة والاجنبية الى وزارة الزراعة والغابات قبل ١٩٧٣ ترفع بالبيانات المنشورة واية معلومات من خارج اليابان وتؤخذ فى الاعتبار. يتم استعراض كل البيانات عن السمية الحادة عن طريق الفم، السمية الحادة عن طريق الحقن البريتونى، السمية الحادة عن طريق الجلد، السمية الحادة عن طريق الاستنشاق والسمية الاولى على التهابات العين.

كل البيانات الواردة من الصناع اليابانيين تتشر. لا يمكن ان نقوم بتقدير متوسط اعداد خلايا الباسيليليس ثورينجينسيز فى اعضاء الفار بعدم ٣- ٧ أيام من التغذية على جراثيم الكائن الدقيق بتركيز ١٠x١ جرثومة لكل جرام غذاء وبعد اسبوعان نهاية التغذية لمدة ٧ شهور. هذه المعلومات تشير الى ان اعداد الخلايا وثيقة الصلة لكل عضو بعد ٣ شهور من برنامج التغذية كانت فى الكبد (٦٧٠) والطحال

(٣٦٠) والكلى (١١٠) والقلب (٧٥). برنلمج السبعة شهور تغذية انتج فيما متتابعة ١٦، صفر، ١٧، صفر. بالاضافة الى ذلك فان اعداد باسيليس ثورينجينسيز لكل مليلتر دم كانت صفر بعد ثلاثة شهور تغذية، ١،١ بعد ٧ شهور تغذية، ١،٣ بعد اسبوعين من اكتمال الشهور السبعة تغذية. لقد تحصل على نفس النتائج من عدم المرضية على الفئران من جراء التغذية لمدة ٧ شهور من تجربة اخرى.

لقد تم استعراض التأثيرات البيئية للباسيليس ثورينجينسيز في النواحي الاتية:

- ١- التتابعات على النباتات والحيوانات غير المستهدفة
  - ٢- الايكولوجيا الميكروبية للمركب في الاراضى والمياه
  - ٣- تجارب الانجراف الهوائى مع مستحضرات الباسيليس
  - ٤- استخدام التجارب الخاصة بالانجراف في بيئات تربية دودة الحرير
- حيث ان بعض سلالات باسيليس ثورينجينسيز تسبب تراكم المائل في فصوص لفائف الارانب، انتاج التوكسين المعدى في هذه السلالات التى تستخدم فعلا في تطوير المستحضرات التجارية فان هذا واجب الفحص. لذلك فانه قد استغرق السماح بتسجيل الباسيليس ما يقارب من حقبة زمنية في اليابان. لقد كانت هذه حالة خاصة تم وزنها بواسطة اهتمام الاقتصاد اليابانى بصناعة الحرير.

## REFERENCES

- Aizawa, K. and Fujiyoshi. N.**, Selection and breeding of bacteria for control of insect pests in the sericultural countries. In *proc. Joint U. S.-Japan Seminar on Microbial Contr. Insect pests. U.S.-Japan Committee Scientific Cooperation*. 79. 1968.
- Aizawa, K.**, Recent development in the production and utilization of microbial insecticides in Japan, in *proc. 1st Int. Colloq. Invertebr. Pathol.*: 9<sup>th</sup> Annu. Meet. Soc. Invertebraie pathology. Queen's University. Kingston. 1976. 59.
- Berliner, E.**, Uper die Schlafsucht der Mehlmottenraupe, *Z. Gesamte Getreidewes.*, 3, 63. 1911.
- Fujiyoshi, N.**, Studies on the utilization of sporeforming bacteria for the control of houseflies and mosquitoes, Research Report Seibu Chemical Industry Co., Special Issue, 1, 1, 1973.
- Ishiwata, S.**, On a kind of severe flacherie (sorro disease). I. *Dianihon Sanshi kaiho*. 114, 1, 1901.
- Katagiri, K.**, pest control by cytoplasmic polyhedrosis viruses, in *Microbial Control of pests and plant Diseases*. Burges. H. D., Ed.. Academic press, New York, 1981. 433.
- Maebasni. H.** On the pathogenicity to mammals of the new bacterial insecticide- *J. Hyg.*, 27, 267, 1972.
- Spira, W. H. and Goepfert, J. M.**, *Bacillus cereus*- induced fluid accumulation in rabbit ileal loops. *Apple. Microbial.*, 24, 341, 1972.
- Tanka, N., Naiki, M., and Mitsui, T.**, Toxicity of a cytoplasmic polyhedrosis virus of the pine caterpillar, *Dendrolimus spectabilis* against warm- blooded animals. I. pathogenicity of purified virus. *Abstr. Annu Meet. Jpn. Soc. Appl. Entomal. Zool.*, 36, 1967.

## خامسا: تسجيل المبيدات الكيميائية والحيوية الميكروبية (دون تفرقة) في مصر

عندما حان وقت الكلام عن متطلبات وقواعد تسجيل وسبل تحقيق الامان مع المبيدات الحيوية الميكروبية في مصر لم اجد سوى برونوكولات التجريب والتقييم الحيوى على الافات للضارة المستهدفة والتأثيرات الجانبية على الكائنات النافعة غير المستهدفة خاصة نحل العسل. للأسف الشديد بحثت عن قواعد تسجيل المبيدات الحشرية الميكروبية في مصر ولم اجد شيئا واردت التأكيد فسألت الزميل المسئول الاول عن مكافحة في مصر آنذاك أ. د. خليل المالكى الذى أكد لى بعدم وجود مثل هذه القواعد فى الوقت الحالى ولكن الوزارة بصدد استكمال هذا النقص بالرغم من ان تسجيل وسائل مكافحة الافات الكيميائية والحيوية كذلك تتمشى وتتوافق مع ما هو معمول به فى وكالة حماية البيئة الامريكية EPA - U.S. لذلك لم يكن امامى سوى الاشارة الى اخر القرارات الوزارية وهو القرار رقم ٣٠٥٩ الصادر عام ٢٠٠٤ فى شأن مبيدات الافات الزراعية وكذلك التوسع فى تغطية الموضوع من خلال تناول تسجيل وسبل تحقيق امان المبيدات الميكروبية فى كندا ومحاولة الاشارة الى اخر اصدارات وكالة EPA فى هذا الشأن. كذلك أشير الى القرار الوزاري رقم ٣٠٦٠ بشأن تولي اللجنة حصر جميع أنواع المبيدات التي تم تسجيلها في مصر منذ ١٩٩٩ (تاريخ إلغاء لجنة المبيدات) وحتى صدور هذا القرار.

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية مصر العربية

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مكتب الوزير

## قرار وزارى

رقم ٣٠٥٩ لسنة ٢٠٠٤

فى شأن مبيدات الآفات الزراعية

\*\*\*\*\*

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:-

- بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦،
- وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية،
- وعلى القرار الوزارى رقم ٣٢٠٩ لسنة ٢٠٠٣،
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٤،
- وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية،
- وعلى عرض رئيس اللجنة.

## قـرـر

- مادة (١) : يحظر انتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تداول أو الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية أو الإفراج عنها من الجمارك إلا إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة طبقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار وتعد من المبيدات جميع المواد والمركبات التى تستخدم فى مكافحة الآفات الزراعية حتى ولو كان لها استعمال آخر.
- مادة (٢) : يكون تسجيل المبيدات بمراعاة القواعد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة.

مادة (٣) : يقدم طالب التسجيل على النموذج المبين بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويرفق بالطلب ما يثبت أداء الطالب لرسم التسجيل بواقع عشرة جنيه لكل مادة أو مستحضر مطلوب تسجيله والملف الخاص بالمبيد والذي يشمل المستندات والبيانات الفنية الموثقة (ملحق رقم ٢) وعلى الأخص ما يأتي:

- شهادة تسجيله واستخدامه في بلد المنشأ.
- شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المصنعة.
- طرق تحليل المبيد والشوائب المصاحبة وطرق تحليل متبقياته على وفي المحصول الذي تتم معاملته به.
- دراسات تقييم المخاطر وخاصة ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية السلبية الأخرى.
- عدد عشرون نسخة من النشرات الفنية الخاصة بالمبيد.
- طلب إجراء التجارب على المركب المطلوب تسجيله وإجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد على النموذجين المبينين بالملحقين رقمي (٣، ٤) المرفقين
- تعهد من الطالب بأداء المصروفات الفعلية لإجراء التحاليل والتجارب التي تحددها اللجنة ويخطر الطالب بأدائها في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- دراسات السمية البيئية - السمية على الثدييات - الخواص الطبيعية والكيميائية على المركب.

مادة (٤) : يلتزم طالب التسجيل بأن يقدم دون مقابل العينات اللازمة لإجراء التجارب والتحليل على المبيد المطلوب تسجيله بصورته النقية Pure والخام Technical والمجهزة Formulated وذلك بالكميات التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

مادة (٥) : لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته لمواصفات الكيمائية والطبيعية وأخذ بصمته التي يتم تسجيله عليها بناء على نتائج التحاليل التي تجرى بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب التي تجرى بمعرفة محطات ومراكز البحوث التي تحددها اللجنة المختصة وذلك لمدة ثلاث مواسم زراعية متتالية

ومتتالية ويستثنى من ذلك المبيدات الحيوية فيكون التجريب لمدة موسمين زراعيين متتاليين ومتتاليين، وكذلك مركبات النحاس والكبريت والزيوت لمدة موسم زراعى واحد، وفى جميع الأحوال يكون الموسم الأخير للتجريب على المستوى التوسعى وفى جميع الأحوال يصدر إخطار بالتوصية يعتمد من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

مادة (٦) : تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية قرارها بالموافقة على تسجيل المبيد بعد اعتماد محضرها من وزير الزراعة وتصدر شهادة التسجيل بتوقيع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على النموذج المبين بالملحق رقم (٥) من ثلاث نسخ تسلم الأولى لطالب التسجيل وتحفظ الثانية بأمانة اللجنة وترسل الثالثة الى المعمل المركزى للمبيدات.

ويراعى عدم تكرار الاسم التجارى للمبيد أو إعطاء اسم تجارى مشابه لإسم مبيد آخر مسجل أو تسمية المبيد بالاسم العام (المادة الفعالة) للمركب.

مادة (٧) : يتولى أمين اللجنة اعتماد البطاقة الاستدلالية الخاصة بالمبيد والتي تسرى لمدة عام ولا تجدد غلا بعد مراجعتها وتلصق على عبواته وتحدد نوعيته بما يتفق مع المواصفات الفنية الخاصة به ويجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية بخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة: الإسم للتجارى - الإسم العام - التركيب - المواد الفعالة ونسبتها - المواد ذات النشاط السطحى - المذيب أو المادة المائلة - الاستعمالات وطريقة الاستخدام - احتياطات الأمان - الاسعافات الأولية - العقار المضاد للتسمم - فترة ما قبل الحصاد طبقا لما يحدده قسم بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئة بالمعمل المركزى للمبيدات - توصيف المركب تبعاً للمخاطر وفقاً لتقسيم منظمة الصحة العالمية - بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب - طرق التخلص من العبوات الفارغة - الشركة المنتجة وعنوانها - الشركة المستوردة وعنوانها - تاريخ التصنيع - تاريخ إنتهاء الصلاحية - رقم التشغيل - رقم اللوط - رقم التسجيل المحلى - سعة العبوة - العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المركب (البكتوجرام).

مادة (٨) : تسرى شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ويجوز تجديد التسجيل على أن يقدم صاحب الشأن طلباً لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية فى

بداية السنة الثالثة لسريان الشهادة، ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل، ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد التي تم تسجيله عليها ويقتصر إجراء تجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسم زراعي واحد.

مادة (٩) : لا يجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إلى الغير وبعد موافقة لجنة مبيدات الأفات الزراعية.

مادة (١٠) : يعد سجل خاص بمعرفة لجنة مبيدات الأفات الزراعية تقيد فيه المبيدات التي تقرر تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القرار وذلك بأرقام متسلسلة بحسب تواريخ اعتماد التسجيل.

مادة (١١) : يلغى تسجيل المبيد أو يقيد استخدامه بقرار يصدر من لجنة مبيدات الأفات الزراعية في أى من الحالات الآتية:-

أ- مخالفة شروط التسجيل.

ب- تدهور الفاعلية في المجال المسجل عليه.

ج- حظر استخدامه بتوصيات صادرة من المنظمات الدولية ذات الصلة.

د- إلغاء تسجيل أو تقيد استخدامه في بلد المنشأ.

هـ- حدوث أضرار متوقعة على الصحة العامة أو البيئة نتيجة استخدامه على الوجه المسجل به.

ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال ١٥ يوما من اعتماد القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الوارد بطلب التسجيل.

مادة (١٢) : لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الإلغاء أو تقيد الاستخدام خلال ٦٠ يوما من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبيت نهائيا بعد اعتماده من وزير الزراعة ويتم التأشير بالإلغاء أو تقيد الاستخدام في السجل الخاص بالتسجيل بعد انقضاء ميعاد التظلم من قرار الإلغاء أو تقيد الاستخدام أو بالبيت فيه على الوجه المتقدم.

مادة (١٣) : لا يجوز الموافقة من الناحية الفنية على استيراد أى مبيد من مبيدات الأفات الزراعية إلا إذا كان مسجلا بوزارة الزراعة وفي حالة الاستيراد بغرض الاتجار فيجب أن يكون طالب الاستيراد أو من يتم الاستيراد



لحسابه حصلا على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقا لأحكام هذا القرار وتصدر الموافقة الفنية عن قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة. وتسرى الموافقة الفنية والإفراج عن المبيدات لمدة ستة أشهر وتلغى تلقائيا بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من اللجنة بمد سريانها لمدة أخرى لا تجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الرسالة خلال فترة سريان الموافقة الفنية وتصدر الموافقة المشار إليها بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية. ويكون الإفراج النهائي عن الرسائن المستوردة بموافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بناء على نتائج التحاليل التي ترد إلى اللجنة من المعمل المركزي للمبيدات والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد، ويصدر ترخيص الإفراج النهائي بتوقيع أمين اللجنة.

مادة (١٤) : يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات تحددها من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناء على طلب إحدى الجامعات أو مراكز البحث العلمي المتخصصة على أن تجرى التجارب والبحوث في محطات التجارب الخاصة بها وتوثق اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون ملزمة للجنة ولا يعتد بها عند تقييم المبيد للتسجيل طبقا لأحكام هذا القرار.

ولا يجوز استيراد هذه المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها إلا بعد إتمام تسجيلها طبقا لأحكام هذا القرار.

ويجوز للجنة أن تصرح باستيراد بعض أنواع المبيدات غير المسجلة للإستعمال الخاص في المزارع المخصصة للتصدير بالكميات التي تحددها وتتناسب مع المساحة المطلوبة وذلك بالشروط الآتية.

أ- أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلا في بلد المنشأ ويستعمل فيها وفي البلد المطلوب التصدير إليه وأنه يلزم إستعماله في إنتاج المحصول التصديرى المطلوب.

ب- أن لا يدخل في تركيب المبيد المطلوب أية مادة محظور إستخدامها دوليا.

ج- تقديم شهادة معتمدة من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة التي يحوزها الطالب والمحاصيل التي تزرع والمطلوب استخدام المبيد فيها.

د- أن يثبت على عبوات المبيد باللغة العربية بخط واضح ومميز ولا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة " غير قابل للتداول مع بيئات اسم الجهة المستورد لحسابها الخاص" وذلك بالإضافة الى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار. ويكون التصريح باستيراد المبيد للاستعمال الخاص طبقاً لحكم هذه الفقرة بمثابة تصريح مؤقت لمدة سنة ولا يسمح بتجديده إلا بعد تقديم ما يفيد تصدير المحصول المستعمل فيه المبيد بالكامل، ولا يجوز التصريح باستيراد هذا المبيد بعد مضي المدة المقررة للتسهيل طبقاً لأحكام هذا القرار " ثلاث سنوات" إلا إذا تم تسجيله.

ويكون الافراج الجمركي عن المبيدات المنصوص عليها في هذه المادة بموافقة المعمل المركزي للمبيدات.

مادة (١٥) : لا يجوز استيراد المبيدات والمواد المساعدة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيد إلا إذا كانت داخله في مكوناته المسجل بها وتتضمنها المستندات المقدمة في طلب التسجيل وبعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالكميات اللازمة التي تحددها اللجنة.

مادة (١٦): يحظر تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة على المعمل المركزي للمبيدات على النموذج المبين بالملحق رقم (٦) مصحوباً بموافقة وزارة الصناعة وجهاز شئون البيئة والوحدة المحلية المختصة طبقاً للقوانين المنظمة للصناعة والبيئة والمحال للصناعة والتجارية المعلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما يفيد التقييد بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالطالب، وبيان المدير الفني المسؤول عن المصنع من بين المهندسين الزراعيين المعيّدين بنقابة المهن الزراعية.

ويتم البت في الطلب من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتصدر الموافقة على النموذج المبيد بالملحق رقم (٧).

ويصدر الترخيص من المعمل المركزي للمبيدات ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده بذات الشروط والاجراءات على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل،

ويلغى الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في حالة مخالفة أى شرط من شروطه.

مادة (١٧) : لا يجوز تداول أية تشغيلية مصنعة أو مجهزة أو معد تعبئتها من أنواع المبيدات محليا إلا بعد تحليل عينات منها بمعرفة قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات والتحقق من مطابقة التشغيلية المصنعة للمبيد التى تم على أساس تسجيله وإصدار شهادة تحليل من المعمل المركزى للمبيد للمواصفات والسماح بتداوله.

مادة (١٨) : يجب أن يكون تداول مبيدات الآفات الزراعية فى عبوات معينة محكمة الغلق تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرش طبقا للمواصفات القياسية المصرية وتكون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلا يغير من تركيبها أو خواصها ويتعين اختبار هذه العبوات قبل استخدامها بقسم بحوث مستحضرات المبيدات بالمعمل المركزى للمبيد وفقا للملحق رقم (٨)، ويجب أن تلتصق على العبوة البطاقة الاستدلالية المنصوص عليها فى المادة (٧) من هذا القرار.

مادة (١٩) : لا يجوز الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية إلا فى محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوف لإشتراطات الترخيص اللازم طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شام المحال الصناعية والتجارية المشار إليها. ويقدم طلب الترخيص بالاتجار عن كل محل أو مخزن على النموذج المبين بالملحق رقم (٩) إلى مديرية الزراعة المختصة مرفقا بها الترخيص سابق من الوحدة المحلية المختصة طبقا لأحكام القانون رقم (٤٥٣) لسنة ١٩٥٤ المشار إليه وما يفيد القيد بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيان المدير الفنى المسئول عن كل محل أو مخزن من بين المهندسين الزراعيين المعيّدين بنقلية المهن الزراعية.

ويشترط اجتياز المدير الفنى المسئول للبرنامج التدريبى المعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويصدر الترخيص بالاتجار عن كل محل أو مخزن من مدير مديرية الزراعة المختصة بعدم أداء الرسم المقرر قانونا (ملحق رقم ١٠).

ويسرى الترخيص بالاتجار لمدة ثلاث سنوات من اريخ صدوره ويجوز تجديده بذات الشروط والاجراءات على أن يقدم طب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل.

ويتعين على المرخص له غططار مديرية الزراعة كتابة باى تعديل يربع فى اجراءه فى المحل أو المخزن المرخص به وذلك خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ اجراء التعديل وإلا إعتبر الترخيص — وفى حالة الموافقة على التعديل يتم التأشير به فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال والمخاون المرخص بالاتجار فيها.

مادة (٢٠) : لا يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فى مبيدات الافات الزراعية أن يراول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة المسجلة طبقا لأحكام هذا القرار والمحددة بالملحق رقم (١١) إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من لجنة مبيدات الافات الزراعية ويسرى فى هذا الإذن لمدة سريين الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار، ويتم تجديد الإذن بذات الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، وأن تميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات استدلالية لباقي المبيدات، ويجب أن يجتاز المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر لبرنامج تدريبى متقدم ومعتمد من لجنة مبيدات الافات الزراعية.

مادة (٢١) : لا يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها لتصنيع أو تجهيز أو الاتجار فى المبيدات طبقا لأحكام هذا القرار تصنيع أو تجهيز أو الاتجار فى أية مواد اخرى غير المبيدات المسجلة المرخص بها.

مادة (٢٢) : على كل من يرخص له بتصنيع أو تجهيز أو الاتجار فى المبيدات الزراعية أن يمسك سجلا مرقما ومختوما بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لتقيد المبيدات المصنعة أو المجهزة أو التى يتم الاتجار فيها. ويحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.

مادة (٢٣) : لا يجوز بيع المبيدات فائقة وعالية الخطورة المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القرار إلا بموجب تذكرة صادرة ومختومة بخاتم مديرية الزراعة وتحرر بمعرفة مدير ادارة مكافحة بناء على توصية المشرف

الزراعى بعد معاينة المساحة المطلوب علاجها والمحصول الموجود بها، وتتضمن التذكرة ما يأتى:

أ- تحديد المساحة المطلوب علاجها وموقعها ونوع المحصول الموجود بها

ب- اسم الآفة أو الآفات المستهدف مكافحتها.

ج- اسم المبيد وكميته ومعدل استخدامه.

وفى جميع الأحوال يجب ان يعطى التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها اسم المبيد وكميته ونسبة المادة الفعالة فيه وصورة المستحضر مع إثبات رقم وتاريخ التذكرة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة وان يحتفظ التاجر بصورة من كل فاتورة يصدرها لمدة خمس سنوات وأن يرفق بها تذكرة المكافحة بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة المشار اليها.

مادة (٢٤) : يجب أن يكون الاعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تسجيلها وتداولها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها، وذلك بعد موافقة لجنة مبيدات الاقات الزراعية على صيغة الاعلان وتعتمد صيغة الاعلام من أمين اللجنة.

مادة (٢٥) : يتولى قسم الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات أخذ عينات من الرسائل المستوردة ومن كل تصنيعة للمبيدات المصنعة والمجهزة والمعبأة محليا وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وإصدار شهادة التحليل ويتم بموجبها الافراج عن الرسالة المستوردة طبقا لحكم المادة (١٣) او التصريح بتداول المصنع أو المجهز او المعبا منها محليا أو لتمديد فترة صلاحيتها.

مادة (٢٦) : يكون لمندوبى الرقابة على المبيدات ممن لهم صفة الضبطية القضائية اخذ عينات دون مقابل من المبيدات المتداولة على الوجه المبين بهذا القرار للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المسجلة بها وذلك ايا كان مكان وجودها فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن والتخزين عليها فى حالة الاشتباه فى غشها فى أماكن تتوفر فيها شروط التخزين السليم التى يحددها المعمل المركزى للمبيدات ويتم للتحفظ بمحضر يوقع عليه من أخذ العينة وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل العينات محرزة مع صورة من محضر أخذ العينة أو التحفظ الى المعمل المركزى للمبيدات لتحليلها ولا

يتم السماح بتداولها إلا بعد ظهور نتائج التحليل وثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم (١٢).

وفي حالة ثبوت عدم الصلاحية أو المطابقة يتم اتخاذ اللازم لإخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات المتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وفي حالة ثبوت الصلاحية والمطابقة ترسل صورة من شهادة التحليل إلى صاحب الشأن وتخطر لجنة مبيدات الآفات الزراعية للإحاطة.

مادة (٢٧) : يتولى مهندس المكافحة مع مسئول الرقابة على المبيدات بالادارة الزراعية المختصة بكل مديرية زراعة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محال الاتجار والمخازن التي توجد بها المبيدات الزراعية والكائنات في نطاق اختصاص المديرية للتحقق من استيفاء هذه المحال والمخازن لشروط الترخيص أو الإذن المنصوص عليهما في المادتين (١٩)، (٢٠) من هذا القرار. ولهما أخذ عينات من المبيدات من المحال والمخازن ووسائل النقل والتحفظ عليها في حالة الاشتباه في غشها طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة (٢٨) : يلغى الترخيص والاذن بالاتجار في المبيدات الزراعية المنصوص عليهما في المادتين (١٩)، (٢٠) إذا ثبت إخلال من رخص أو أذن له بأى شرط من شروطهما أو مخالفة أحكام هذا القرار ويتم الإلغاء بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بناء على تقرير موقع من مدير مديرية الزراعة المختص ببيان الأسباب الداعية إلى طلب إلغاء الترخيص أو الإذن سالف الذكر وبعد أخذ رأى المعمل المركزى للمبيدات ويخطر من صدر له إلغاء بالترخيص أو الإذن المشار اليهما مسببا على عنوانه المبين فى طلب الترخيص أو الإذن، ولا يجوز النظر فى طلب الترخيص أو الإذن مجددا قبل مضى سنة من تاريخ الإخطار بالإلغاء.

مادة (٢٩) : يجب أن يتم نقل المبيدات فى سيارات مطابقة للمواصفات واشترائط الفنية والبيئية مع وجود الفواتير أو المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهة المنقولة منها والجهة المنقول إليها وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة من المعمل المركزى للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش واخذ

العينات على الوجه المنصوص عليه في هذا القرار والتحفظ عليها في حالة الاشتباه في غشها على الوجه المبين فيه.

مادة (٣٠) : يجب على مندوب الرقابة على المبيدات أن يحرر محضر يثبت فيه أخذ العينات (خمس عينات) طبقاً للملحق رقم (١٣).

يرسل محضر أخذ العينات بعد التوقيع عليه من اللجنة مع إحدى نسخ العينة إلى قسم بحوث تحليل لمبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات فوراً لإجراء التحاليل عليها وتحفظ النسختان الثانية والثالثة لدى قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات للرجوع اليهما في حالة حدوث نزاع حول نتيجة التحليل وتسلم النسختان الرابعة والخامسة لصاحب الشأن للاحتفاظ بهما مع توقيعه بسلامتهما على محضر أخذ العينة ولا يجوز أخذ عينات أخرى من المبيدات في حالة المنازعة في نتيجة التحليل وتجري إعادة التحليل على نسخ العينات المأخوذة على الوجه المتقدم.

مادة (٣١) : يتولى قسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات تحليل العينة وفقاً لطريقة تحليل المبيد المتعارف عليها عالمياً أو المدونة بملف تسجيله وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع بيان ملاحظاته عليها فور الانتهاء منها ويخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل، ويجري التحليل بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو إعادة التعبئة أو السماح بالتداول أو التجريب بعد أداء صاحب الشأن المصروفات الفعلية، ويجري التحليل بدون مقابل في حالة التفتيش ويتعين حفظ عيوات العينات بقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات للمدة اللازمة ولحين استغراق باب المنازعة في نتائج التحليل الخاصة بها.

مادة (٣٢) : لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها والا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية، ويقدم التظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات بطلب يقدم من صاحب الشأن شخصياً أو ممن ينوب عنه ويرفق بالتظلم ما يأتي:

- أ- أصل شهادة التحليل المبلغة إليه.
- ب- إحدى عبوتى العينة المحفوظتين لديه.
- ج- الإيصال الدال على أداء رسم التظلم.

د- الإيصال الدال على أداء مصروفات إعادة التحليل.

وتجرى إعادة التحليل بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات بمعرفة لجنة فنية تشكل من غير اللذين اشتركوا فى إجراء التحليل الأول بحضور المتظلم أو ندوبه على إحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن وذلك بعد مطابقتها للعينتين المحفوظتين لدى قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبى قسم التحليل والرقابة والمنظم قبل إجراء إعادة التحليل وتكون إعادة التحليل نهائية ولا يجوز التظلم منها.

مادة (٣٣) : تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه.

مادة (٣٤) : يلغى القراران الوزاريان رقمى ٣٢٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ١٧٣ لسنة ٢٠٠٤ وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.

ومع ذلك تظل تراخيص التصنيع أو الاتجار فى المبيدات الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية طبقاً للقرارات التى صدرت فى ظلها، ويكون تجديد التراخيص المشار إليها بالشروط والجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار.

مادة (٣٥) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى ٢٠٠٤/١٢/٣٠

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  
مهندس/ أحمد عبد المنعم الليثى



## قرار وزارى

رقم ٣٠٦٠ لسنة ٢٠٠٤

### وزير الزراعة واستصلاح الاراضى

- بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإلغاء عمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية
- بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

## قرر

مادة (١): تتولى لجنة مبيدات الآفات الزراعية حصر جميع أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى تم تسجيلها فى الفترة من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإلغاء لجنة مبيدات الآفات الزراعية وحتى تاريخ صدور هذا القرار - وعلى اللجنة مراجعة شروط وإجراءات تسجيلها والتحقق من عدم احتوائها على مواد محظورة إستعمالها دوليا طبقا للقواعد الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) التابعتين لهيئة الأمم المتحدة وإعداد تقرير مفصل لموقف كل منها وتوصيات اللجنة فى شأن استمرار أو إلغاء تسجيلها وتداولها طبقا للقواعد والشروط المطبقة قانونا فى هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ صدر هذا القرار.

مادة (٢): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه

صدر فى ٣٠/١٢/٢٠٠٤

## ملاحق

القرار الوزاري رقم ٣٠٥٩ لسنة ٢٠٠٤  
في شأن مبيدات الآفات الزراعية

ملحق رقم (١)

متطلبات تسجيل المبيد

نموذج (أ)

طلب تسجيل مبيد آفات زراعية بالنظام العادي

اسم طالب التسجيل :

(إذا كان شركة يبين نوع واسم الممثل القانوني ١،١):

عنوانه :

الاسم التجاري للمبيد :

الاسم الشائع :

الاسم الكيميائي :

تركيز المادة الفعالة في المستحضر:

مصدر ومنشأ المادة الفعالة:

صورة مستحضر المبيد :

نوع الاستخدام :

بيانات عن المبيد المماثل :

اسم ورقم تسجيل المبيد المماثل:

- الآفة والمحصول.

- معدل الاستخدام للفدان الموصى به.

- المادة الفعالة وتركيزها.

جهة التصنيع (استيراد أو تصنيع محلي) :

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات بوزارة الزراعة

تحية طيبة وبعد...

أرجو التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المبيد المشار إليه بعاليه بالنظام العادي/بالنظام بالمثل ومستعد لاداء الرسوم والمصاريف المقررة ومرفق ملف البيانات والنشرات الفنية الخاصة به والعينات اللازمة للتحليل. مستعد لتقديم اية دراسات او بيانات فنية اخرى تطلبها اللجنة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

### توقيع الطالب

### ارشادات لكتابة النموذج (أ)

يطلب هذا النموذج من امانة لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات بوزارة الزراعة ويتم استيفاء بياناته كالآتي:

- اسم طالب التسجيل باللغة العربية او الانجليزية او كليهما واذا كان شركة يبين نوعها واسم الممثل القانوني لها سواء كان وكلا او مكتبا علميا او مصنع انتاج او تجهيز او تعبئة.
- عنوان طالب التسجيل داخل جمهورية مصر العربية.
- الاسم الشائع والاسم التجارى المقترح من الشركة مع ملاحظة عدم استخدام اسم تجارى سبق استخدامه لمبيد اخر او لمستحضر لنفس المبيد من مصدر اخر او اى اسم يحدث لبسا(مادة ٤).
- الاسم الكيميائى للمادة الفعالة فى المبيد والنسبة المئوية لتركيزها فى المستحضر او الخام.
- صورة مستحضر المبيد (مسحوق او مستحلب او اى صورة اخرى).
- نوع الاستخدام وينكر به الافة والمحصول والمعدل.
- جهة التصنيع (استيراد او تصنيع محلى).
- فى حالة الاستيراد يذكر اسم الجهة والبلد المستورد منها اما فى حالة التصنيع المحلى يذكر اسم المصنع ورقم ترخيصه بسجل المعمل المركزى للمبيدات ويرفق صورة الترخيص وتعامل مستحضرات مصانع المناطق الحرة معاملة المستورد.

- احتياطات التداول الامن والاسعافات الاولية.
- يقدم هذا النموذج بعد استيفاء كافة البيانات الى رئيس لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات بعد توقيعه من قبل طالب التسجيل تقديم اى مستندات او معلومات او بيانات تطلبها منه لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات لفرض التسجيل.

البيانات الفنية التي ترفق بملف طلب تسجيل المبيد

بيانات المبيد (المادة الفعالة)

- \* الاسم الشائع للمبيد المسجل بكل منظمة. (BSI) British Standard Institute Inter.
- (IUPAC) (ISO) International Organization for Standardization
- \* الاسم التجارى المقترح من الشركة للمبيد مع ملاحظة عدم استخدام اسم تجارى سبق استخدامه لمبيد اخر او مستحضر لنفس المبيد من مصدر اخر.

\* رقم التسجيل المكون الفعال فى CAS Number.

\* الاسم الشائع والاسم الكيميائى للمادة الفعالة فى المبيد من منظمة

(IUPAC) International Union for pure and Applied Chemistry

المكون الكيميائى للمادة الفعالة.

التركيب البنائى للمادة الفعالة.

الرمز الكيميائى للمادة الفعالة.

الرقم الكودى المسجل عليه المركب فى بلد المنشأ.

التصنيف الكيميائى للمركب طبقاً للمجموعة الكيميائية التى يندرج تحتها المبيد.

الوزن الجزيئى للمبيد.

بيانات طالب التسجيل

اسم طالب التسجيل باللغة العربية والانجليزية.

عنوان طالب التسجيل داخل او خارج جمهورية مصر العربية.

البريد الالكترونى E-mail.

رقم التليفون رقم الفاكس

جنسية طالب التسجيل.

خطاب تفويض من ممثل الشركة او المكتب العلمى المفوض للتعامل مع لجنة

التوصيات وتسجيل المبيدات.

البيانات التفصيلية للمصنع فى حالة التصنيع او التجهيز او اعادة التعبئة محليا.  
اسم المصنع رقم الترخيص بداية الترخيص نهاية الترخيص  
عنوان المصنع.  
البريد الالكترونى E-mail.

رقم التليفون رقم الفاكس  
فى حالة تغيير اى من هذه البيانات تخطر بذلك لجنة مبيدات الافات الزراعية  
لاعتقاد البطاقة الاستدلالية الجديدة وذلك بعد اتمام التسجيل.

### بيانات المنتج النهائى

تعريف المنتج النهائى  
اسم المنتج النهائى للمستحضر.  
صورة المستحضر النهائى.  
اسم او اسماء المواد الفعالة وتركيزها.  
الخواص الكيميائية والطبيعية للمنتج النهائى:

Colour	اللون
Odour	الرائحة
Bulk density	الكثافة الكلية (بالنسبة للمواد الصلبة)
Density / Specific gravity	الكثافة والكثافة النوعية للسوائل
Vicosity	اللزوجة فى حالة السوائل
Vapour pressure	الضغط البخارى
Volatility	التطاير
Flash point	درجة الوميض
Corrosive Hazard	درجة احداث الناكل

### ثبات المستحضر

نوع العبوة المستخدمة طبقا للمواصفات القياسية المصرية  
صورة المستحضر  
ظروف التخزين  
فترة صلاحية التخزين

طرق التحليل المستخدمة والنتائج

الخواص الكيميائية والطبيعية للمبيد (المكونات الفعالة النقية- المواد الفعالة التقنية-

مركبات التصنيع)

Purity	درجة النقاوة
Colour	اللون
Odor	الرائحة
Physical State	الصورة الطبيعية
Melting point or rang (solid)	نقط الانصهار أو التبلور أو مداها (المواد الصلبة)
Melting or Crystallization point (liquids)	نقط الانصهار أو التبلور (المواد السائلة)
Condensation point (gases)	درجة التكثيف في حالة المادة الغازية
Boiling point (liquids)	نقطة الغليان في حالة المادة السائلة
Octanok/ Water partition coefficient	معامل التوزيع بين الماء والاوكتانول
Vapour pressure	الضغط البخارى
Refractive index	معامل الانكسار في السوائل
	طيف التوزيع في اشعة X للمواد غير العضوية
X- ray diffraction spectrum (inorganics)	
UV/ visible spectrum	طيف توزيع للأشعة فوق بنفسجية والطيف المرئى
IR spectrum	طيف توزيع للأشعة تحت الحمراء
Mass spectrum	مطياف الكتلة
NMR spectrum	الرنين المغناطيسى
Solubility in water	الذوبان في الماء
Solubility in organic solvent	الذوبان في المذيبات العضوية
Density/ specific gravity	الكثافة والكثافة النوعية
Hydrolysis	درجة التحلل المائى
photolysis	درجة التحلل الضوئى
Viscosity (liquids)	اللزوجة (للسوائل)
Oxidation stability	الثبات للاكسدة في الهواء

Thermal stability

الثبات الحرارى

Dissocaiton constant

ثابت التفكك

### بيانات المستحضر

نوع المستحضر

المحتويات الفعالة فى المستحضر

التركيز او التركيزات

### بيانات عبوة المنتج النهائى

بيانات الحجم وشكل وتركيب وتبطين العبوة المناسبة المستخدمة لتعبئة المنتج النهائى.  
مطابقة مواصفات العبوة طبقا للمواصفات القياسية المصرية لبروتوكول وزارة  
الزراعة - مركز البحوث الزراعية (بروتوكول اختبار وكفاءة عبوات مبيدات الافات  
الزراعية) وذلك طبقا للمادة (١٠) من القرار ٣٠٥٩ لسنة ٢٠٠٤ لعبوات المنتج  
النهائى.

### الاستخدام

نوع الافة او الافات المستخدم لمكافحةها المستحضر.

المحصول.

معدل الاستخدام.

القابلية للخلط.

### دراسات السمية

ويراعى ان تكون الدراسات المقدمة من طالب التسجيل حديثه من معامل معترف بها.

يجب ان تقدم دراسات السمية التالية:

١- ملخص عن سمية المبيد.

٢- دراسات السمية الحادة.

دراسات على المادة الخام للمكونات الفعالة (TGAC) وكذلك المادة الفعالة.

دراسات على المنتج النهائى للمركب (EUP).

٣- دراسات قصيرة المدى للجرعات المتكررة.

٤- دراسات السمية تحت المزمدة.

٥- دراسات السمية طويلة المدى.

دراسات السمية المزمنة على النغد الصماء.

دراسات متعلقة بالأورام.

دراسات السمية المزمنة بالإضافة الى دراسات متعلقة بالأورام.

٦- دراسات السمية الخاصة بالتأثير على التكاثر.

٧- دراسات السمية الخاصة بالتأثير على النمو والتطور.

٨- دراسات السمية الخاصة بالتأثيرات الوراثية.

٩- دراسات اضافية.

سمية نواتج الايض والشوائب.

تأثيرات معاكسة اخرى.

سمية المخاليط.

١٠- دراسات سمية متعلقة بالانسان.

١١- دراسات متعلقة بالحد غير الملاحظ لتأثير المركب (NOEL).

١٢- دراسات خاصة بالتناول اليومي المسموح به.

١٣- دراسات متعلقة بأمان المركب.

1

الاعتبارات العامة التي يجب مراعاتها في البيئات الخاصة بدراسات السمية:

يجب ان تكون وثائق الدراسات المقدمة كاملة ومنظمة وبها تفاصيل كافية  
لتسمح بالتقييم العلمي لها مع مراعاة وجود النسخ الاصلية من تقارير هذه الدراسات  
وفي حالة تقديم الابحاث العلمية المنشورة يجب ان يقدم البحث كاملا وليس ملخصا له.

يجب ان تتضمن الاوراق المقدمة جميع نتائج الدراسات التوكسيكولوجية  
وتفاصيل الدراسات المخطط لعملها او الجارى عملها والتاريخ المتوقع لانتهاء منها  
ومتى تم اجراء التقديم المبدئى للتسجيل فانه يجب توفير الدراسات الاضافية المتعلقة  
بالمبيد ولن ينظر فى الدراسات الضعيفة التى ليست لها علاقة بالصحة العامة وعلى  
طالب التسجيل ان يقدم هذه المعلومات مجتمعة.

يجب على طالب التسجيل تقديم صور من شهادة تسجيل المبيد فى البلاد

الاخرى.



يجب على طالب التسجيل تقديم كافة البيانات المتعلقة بامان المركب ورافاق جميع هذه البيانات والدراسات بملف المبيد.

يجب على طالب التسجيل تقديم ملخص عام عن سمية المركب يشتمل على جميع المجالات المتعلقة بالسمية مع ذكر المراجع الخاصة بالدراسات المقدمة.

يجب ان يتضمن ملف تسجيل المركب قاعدة بيانات خاصة بسمية المركب تشمل على:

- التعريف بالمادة المختبرة (الخام- المنتج النهائي).

- نوع الاختبار.

- دراسات للسمية الحادة.

- نوع حيوان التجارب المستخدم.

- اسم المعمل القائم بالاختبار.

- عنوان التقرير ورقمه وتاريخه.

- تاريخ اجراء للدراسة.

يجب ان يرفق بملف سمية المبيد المعلومات الخاصة بكيمياء المركب وتصنيفه وتفاصيل الخواص الكيميائية والطبيعية للمادة الفعالة وكذلك صورة الشوائب ومكونات المستحضر.

يجب تعريف الشوائب ذات الدلالة المعنوية على السمية الموجودة في المادة الخام (TGAC) المستخدمة في المستحضر ايا كانت نسبتها.

يجب توضيح وتعريف مكونات المستحضر والاسم ورقم CAS، كما يجب ان يحتوى على ملف التسجيل على تقارير وبحوث معملية كاملة على حيوان التجارب واى بيانات خاصة بالاتى:

- سمية للمركب للانسان.

- السمية الحادة للمركب.

- سمية الجرعات المتكررة على مدى قصير.

- سمية الجرعات تحت المزمدة.

- دراسات السمية على المدى الطويل.

وكذلك بحوث السمية الخاصة بالتأثير على التكاثر والتطور والقدرة على السرطنة والتأثير الطفرى وحركية السوموم والايض.

يجب ان تجرى دراسات السمية على حيوانات تجارب بالعدد اللازم للحصول على نتائج سليمة ومقبولة.

يجب ان تؤدى الدراسات الخاصة بالسمية الى بيان حد التأثير غير الملحوظ للمركب (NOEL) وان تقدم الدليل على قدرة المركب فى احداث المخاطر على فترات قصيرة وطويلة بما يمكن من حساب الامان النسبى للمركب.

يجب ان تجرى الدراسات على المادة الخام والمستحضر على ان تتضمن تفاصيل تركيب المادة المستخدمة بما فيها من مزيبات واضافات.

يجب ان تتضمن دراسات السمية الخاصة بالمركب تفاصيل عن كل من طريقة التعرض ومستويات الجرعات وعدد الحيوانات لكل مستوى جرعة ومنشأ الحيوان وجنسه (ذكر او انثى) ووزنه وعمره وجميع القياسات والملاحظات التى تمت على مدى كل دراسة ومدى تكرار حدوث هذه الملاحظات والفترة التى استغرقتها كل دراسة ومدى التعرض وعلاقته بالملاحظات والتأثيرات.

يجب ان يوضح على كل دراسة اسم وعنوان المعمل ورقم التقرير وتاريخ اجراء الدراسة وتاريخ كتابة التقرير.

٢

#### دراسة المتبقيات:

يجب ان تقدم نتائج دراسات المتبقيات كما يلى:-

- ملخص لدراسات المتبقيات.
- نموذج قاعدة بيانات المتبقيات.
- المتبقيات على المحاصيل.
- متبقيات المبيدات على المحاصيل المستخدمة فى تغذية الانسان.
- متبقيات المبيدات على المحاصيل المستخدمة كعلية للحيوان.
- المتبقيات فى حيوانات المزرعة (الدواجن... المشاة... ونوتجها... البيض والبن)
- نتيجة التغذية على المحاصيل المعاملة.
- نتيجة المعاملة المباشرة.
- طرق تحليل المتبقيات.
- مصير المتبقيات خلال التخزين والتصنيع والطهى.

- الحدود القصوى للمبيدات وفقا لتوصيات الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي (EOS) ولجنة دستور الاغذية (CCPR) Codex Alimentaries وبعض الدول وكذا الحد الاقصى المقترح من طالب التسجيل.
- فترة ما قبل الحصاد.
- معاملات ما بعد الحصاد.

#### متطلبات خاصة بمعاملة البذور

فى حالة معاملة بذور محاصيل الحبوب يجب تقديم دراسات عن متبقيات المبيدات فى النباتات والثمار الناتجة منها مع تقديم معلومات عن مصير المركب فى الماشية والدواجن التى تغتذ عليها.

#### دراسات اخرى

يجب تقديم بيانات لتوضيح اثر المركب على طعم المنتج المخصص للتغذية واثرة على عمليات التصنيع.

#### الصحة المهنية والامان

يجب تقديم بيانات كافية عن الصحة المهنية والامان على الوجه التالى:

- ١- بيانات التعرض المهني
  - أ- عدد وفئات العمال.
  - ب- طبيعة العمل.
  - ج- حالات حماية التعرض للعمال
- ٢- الحالة الصحية التى تستلزم منع العامل من التعامل مع المركب
  - ٣- رصد للصحة المهنية
    - أ- رصد للجو المحيط.
    - ب- الرصد البيولوجي.
  - ٤- توفير الوسائل والمعلومات
    - أ- بطاقة البيانات.
    - ب- صفحة بيانات امان المادة.
    - ج- التعليم والتدريب

#### الدراسات البيئية

### كيمياء ومصير المبيد في البيئة

#### طريقة القياس

يجب تقديم المعلومات وتقارير ECCP, IPCS, CSCD, US, EPA وغيرها عن

كيمياء ومصير المبيدات في البيئة كما يلي:

#### قياس مدى التعرض البيئي والقدرة على إحداثه

أ- كمية المبيد المستخدم.

ب- تصنيع المركب الخام المصنع.

ج- مصنع تجهيز للمنتج النهائي.

د- كفاءة التخلص من المبيد.

هـ- الترسب العرضي للمبيد.

#### الهدم الكيميائي والطبيعي

- التحلل المائي

- التحلل الضوئي في الماء أو التربة

#### التحلل الحيوي

- تربة (هوائي ≠ لا هوائي)

- ماء

#### القدرة على الانتقال

- إمكانية الانتقال

- التطاير

- الامصاص والتحرر

- تكون الأورام

#### الاختفاء في الحقل

- تربة

- ماء

- نباتات

#### التراكم والابيض

أ- التراكم الحيوي في الأسماك /الاحياء المائية

- ب- امكانية التراكم فى التربة  
ج- تراكم او ابيض فى النظم الاخرى مثل الطيور وديدان الارض

### اتموذج (ب)

#### طلب اجراء التجارب لتسجيل مبيد افات زراعية

- اسم مقدم الطلب:  
عنوان مقدم الطلب:  
رقم السجل التجارى:  
رقم الترخيص بالاتجار فى المبيدات:  
اسم المبيد التجارى:  
الاسم الشائع:  
مجموعة المبيد:  
تركيز المادة الفعالة:  
صورته:  
مصدره (محلى او مستورد):  
اسم الاقه:  
الانتاج محلى او مستورد:  
معدل الاستعمال (بالنسبة للفدان او كل ١٠٠ لتر ماء او غير ذلك بحسب الاحوال):  
اسم المحصول (يذكر نوع النبات) المطلوب استخدامه عليه:  
موسم التجريب:  
ملاحظات عن طريقة الاستعمال:  
نتيجة التحليل الكيماوى لعينة التجريب:

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات

تحية طيبة وبعد ...

ارجو اجراء التجارب للمبيد المشار اليه بالطلب توطئة لتسجيله فى ضوء  
الملف الخاص بالمبيد والعينات المرفقة بطلب التسجيل ومستعد لدفع الرسوم  
والمصاريف المقررة وتقديم اى بيانات.

توقيع الطالب

\* اذا كان الطالب شركة يذكر اسم الشركة ونوعها واسم الممثل القانونى لها

- يقدم طلب عن كل مبيد

- يقدم الطالب مع طلب التجريب نتيجة التحليل الكيميائى والطبيعى لعينة التجريب.

### نموذج (ج)

#### طلب اجراء التحليل لمبيد افات زراعية

تاريخ تقديم الطلب:

اسم الطالب:

عنوان الطالب:

كمية المبيد:

رقم وتاريخ التسجيل بوزارة الزراعة:

الغرض من طلب التحليل:

تاريخ الوصول (فى حالة الاستيراد):

او تاريخ ورقم التشغيل (فى حالة المصنع محليا):

اسم الجهة المستورد منها:

او المصنع فيها المبيد محليا:

ميناء الوصول:

او تاريخ الانتاج المحلى:

رقم وتاريخ الترخيص بالاستيراد:

او رقم الترخيص بتشغيل المصنع المحلي:

المسيد الاستاذ الدكتور/ مدير المعمل المركزي للمبيدات

تحية طيبة وبعد ...

ارجو التفضل باجراء التحليل اللازمة للمبيد المشار اليه عالية واصدار شهادة التحليل الخاصة به طبقا للبيانات الموضحة بهذا الطلب ومستعد لاداء المصروفات المقررة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع الطالب

- اذا كان شركة يبين نوعها واسم الممثل القانوني لها.
- يذكر ما اذا كان الطلب للافراج من الجمارك او للسماح بتداول تشغيل المصنع منه محليا او للتاكيد وتمديد لصلاحيته او التسجيل.

### نموذج (د)

#### اخطار توصية بمبيد

اسم الشركة/

م	المبيد	الشكل والتركيز	معدل الاستعمال	المحصول	الاقه	تاريخ التوصية
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						

عضو الامانة الفنية المختص

يعتمد

امين اللجنة

جمهورية مصر العربية  
وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى  
لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات

## ملحق رقم (٢)

### شهادة تسجيل مبيد

#### PESTICIDE REGISTRATION CERTIFICATE

New Registration	تسجيل جديد
Renewal Registration	تجديد تسجيل
A. R. E. Registration no:	رقم التسجيل المحلى:
Common name:	الاسم الشائع:
Chemical name:	الاسم الكيماوى:
Code no:	الرقم الكودى:
Trade name:	الاسم التجارى المحلى:
Chemical group:	المجموعة الكيماوية:
Pesticide class:	مجموعة المبيد:
Mode of action:	طريقة التأثير:
Conc. Of active ingredient (a. i. ):	تركيز المادة (المواد) الفعالة:
Formulation:	المستحضر:
Crop (s):	المحصول او المحاصيل:
Rate (s) of Application:	معدل او معدلات الاستخدام:
Company:	الشركة المنتجة:
Local company:	الشركة المحلية:
Toxicity classification of formulation. (WHO)	تصنيف سمية المستحضر
Pre- harvest Interval:	فترة ما قبل الحصاد:



تشهد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ان المبيد المشار اليه عليه قد تم تسجيله بالوزارة وذلك بناء على طلب التسجيل المقدم من:

الاسم:

العنوان:

تسرى هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من / / وتنتهى فى / /

لا يجوز تداول او استيراد او تصنيع

او الاتجار فى المبيد المشار اليه الا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

فى / /

امين اللجنة

### البطاقة الاستدلالية للمبيد

تصدر البطاقة الاستدلالية من لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات وتعتمد من امين اللجنة.

وتعد بيانات البطاقة الاستدلالية بمعرفة صاحب الشأن ويتعين لصقها على عبوات المبيد لتحديد نوعيته بما يتفق مع مواصفاته الفنية ومحاذير وشروط الاستخدام وفترات ما قبل الحصاد طبقا لما يحدده المعمل المركزى للمبيدات وعلى ان تقسم البطاقة على ثلاثة اقسام كما يلى:

القسم الايمن يشتمل على:

- الاستخدامات من حيث المحصول ومعدل الاستخدام والافه المستهدفه وطريقة الاستخدام وشروط المعاملة واى ملاحظات اخرى خاصة بالاستخدام.
- فترة ما قبل الحصاد (فترة الامان) لكل محصول بالايام.
- فترة الضمان ولا تزيد عن سنتين تحت ظروف التخزين الجيدة.
- سعة العبوة.

القسم الاوسط يشتمل على:

- الاسم التجارى للمركب وتركيزه وصورة المستحضر.
- الاسم الشائع للمادة الفعالة والنسبة المئوية لها (وزن/ وزن) او (وزن/ حجم) او (حجم/ حجم)

- النسبة المئوية للمواد الخاملة في المستحضر.
- العلامات التحذيرية للمبيد في ضوء تصنيفه بمنظمة الصحة العالمية.
- الشركة المنتجة وعنوانها ورقم التليفون والفاكس.
- الشركة صاحبة التسجيل وعنوانها.
- الشركة المستوردة للمستحضر او المادة الفعالة وعنوانها ورقم التليفون والفاكس والبريد الالكتروني.
- الشركة المجهزة او المعبئة وعنوانها في حالة وجودها ورقم التليفون والفاكس والبريد الالكتروني.

#### القسم الايسر يشتمل على:

- بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب من حيث:
  - مخاطر التداول وشروط التخزين والنقل وكيفية التعامل مع العبوة وطرق اعدام العبوات او وسيلة ارجاعها لمصادرهما.
  - الاسعافات الاولية ومذكرة الاطباءات وتشتمل على:
    - اجراءات الاسعافات الاولية في حالات القسم وتوجيهات ارشادية للاطباء والمقار المضاد للتسمم وكيفية استخدامه.
    - تاريخ الانتاج.
    - تاريخ انتهاء فترة الضمان.
    - رقم التشغيل او اللوط.
    - رقم التسجيل المحلي طبقا لشهادة التسجيل.

في الهامش السفلي للبطاقة توضع العلامة التحذيرية طبقا للجدول التالي:

التقسيم	لون البطاقة	العلامة الارشادية	كلمة تحذير	ملاحظة LD50	صلبة LD50
<b>IA</b>	حمراء	جمجمة وعظمتين	شديدة السمية	٥ او اقل جزء في المليون	٢٠ - ٢٠٠ جزء/ مليون
<b>IB</b>	حمراء	جمجمة وعظمتين	سام جدا	٥٠ - ٥٠٠ جزء/ مليون	٢٠ - ٢٠٠ جزء/ مليون
<b>II</b>	صفراء	علامة X	ضار	٥٠٠ - ٥٠٠٠ جزء/ مليون	٢٠٠ - ٢٠٠٠ جزء/ مليون
<b>III</b>	زرقاء	علامة X	تحذير	٥٠٠ - ٢٠٠٠ جزء/ مليون	٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ جزء/ مليون
<b>IV</b>	خضراء	علامة X	تحذير	٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ جزء/ مليون	٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠ جزء/ مليون

يتم تحديد لون البطاقة طبقا لجدول منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة

الامريكية وبناء على المنتج النهائي للمبيد.

ساسا: دلائل تسجيل الوسائل الميكروبية في مكافحة الآفات في كندا

Pest management Regulatory Agency

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

Regulatory Directive

DIR2001- 02

### Guidelines for the Registration of

### Microbial pest Control Agents and products

This directive outlines the requirements for the registration of microbial pest control agents and products proposed for pest management in Canada at this time. The Canadian data requirements are essentially harmonized with the United States Environmental Protection Agency. Microbial pest control agents are naturally occurring or genetically modified microorganisms, including bacteria, algae, fungi, protozoa, viruses, mycoplasmae, and related organisms.

Several regulatory proposals, including Pro98- 01, *guidelines for the Registration of Microbial pest Control Agents and products*, dated January 30, 1998 and PRO93- 05, *Research permit Guidelines for Microbial pest Control Agents*, dated November 25, 1993, invited comments on proposed registration requirement for Microbial pest control agents. Approximately 65 detailed comments on PRO93- 05 were received from interested parties in the biotechnology, agri- food and forestry sectors, and eight comments were received on PRO98- 01 and incorporated as appropriate.

(publié aussi en français)

March 30, 2001

This document is published by the Submission Management and Information Division, pest Management Regulatory Agency. For further information, please contact:

- Publications Coordinator
- Pest Management Regulatory Agency
- Health Canada
- 2720 Riverside Drive
- A.L . 6602A
- Ottawa, Ontario
- KIA 0K9

- \* Internet:  
[pmra- publications@hc-sc.gc.ca](mailto:pmra-publications@hc-sc.gc.ca)
- \* [www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/](http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/)
- \* Information Service:  
1-800-267-6315 or (613) 736-3799
- \* Facsimile: (613) 736-3798

لوسائل الميكروبية لمكافحة الاقاقات (MPCA's) والنواتج النهائية للاستخدام EP's تتعرض لقانون منتجات مكافحة الاقاقات PCPA والتشريعات وقانون الغذاء والدواء (FDA) والتشريعات. المنتجات PCPA والتي تقدم وتعرض بواسطة وكالة تنظيم ادارة التعامل مع الاقاقات PMRA في وزارة الصحة الكندية (HC) تتطلب ان كل منتجات مكافحة الاقاقات بما فيها MPCA's ونتج EP's يجب ان تسجل قبل ان تستورد او تباع او تستخدم في كندا. التشريعات في القانون PCPA يتضمن كل ما يتعلق بمتطلبات وخطوات التسجيل. FDA تنظم المنتجات بما فيها MPCA's و EP's التي قد تغش الغذاء وتعتبر مواد غاشة adulterants. التشريعات قد تتطلب من القانون FDA وضع الحدود القصوى المسموح بها من مواد الغش (MRL's) في الغذاء.

الغرض من هذه الدلائل الاستعراض العلمي والتقني المعلوماتي المطلوب لتسجيل النواتج الميكروبية. على طالب التسجيل الاستعراض المتأني لهذه الوثيقة والكتاب الوثائقي المرجعي للتسجيل مع ضرورة قيامه باستشارة وكالة ادارة التعامل مع الاقاقات PMRA قبل تقديم طلب التسجيل. متطلبات التسجيل في هذا المقترح التنظيمي والتشريعي طورت حتى توضح كل ما يتعلق بنواحي الامان والفوائد وقيمة المنتجات الغذائية Ep's. الوسائل الميكروبية لمكافحة الاقاقات MPCA's تتضمن الكائنات الموجودة طبيعيا او المحورة وراثيا من البكتريا، الطحالب، الفطريات، البروتوزا، الفيروسات، الميكوبلازما او الريكتسيا والكائنات الاخرى المرتبطة بها. الهيئة المنوط بها المعلوماتية تتناول بالتوازي المركبات الاخرى لمكافحة الاقاقات ولكنها تتناول نواحي متميزة عن الوسائل الميكروبية MPCA's مثل الصفات الحيوية والمدى العوائلي والمقدرة على احداث المرضية والحوى والثبات والتضاعف multiply والنشر -disseminate.

حيث ان المنتجات الميكروبية MPCA's تشمل مدى متنوع وعريض من الكائنات الدقيقة فانه ليست كل الدراسات او البيانات المطلوبة مناسبة لكائن دقيق خاص. لذلك يكون على طالب التسجيل ان يأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للكائنات الدقيقة التي يسطعون بها عند تجهيز وتحديد المتطلبات والبروتوكولات التي يعملون من خلالها كما يكون عليهم التشاور مع وكالة الادارة مع التسجيل PMRA قبل

بدلية الاختيار. بالإضافة الى ذلك فان تأجيل بعض البيانات المطلوبة تؤخذ في الاعتبار (waivers) عندما يكون ذلك مصحوبا بأسباب علمية عقلانية.

الوكالة الكندية المعنية بإدارة التعامل مع الاقوات PMRA تعمل بالتناقص والاستراك مع وكالة حماية البيئة الامريكية EPA في الاستعراض المشترك وتقاسم مسؤولية تقييم المبيدات الميكروبية على اساس تشريعي.

وتتابع لهذا التعاون تم وضع برنامج مشترك بين PMRA و EPA للتعامل المشترك مع المبيدات الميكروبية من خلال نظام مقترح لنظام استخدام هذه المركبات بشيوع في الدولتين. الاستعراض المشترك يزيد من كفاءة عملية التسجيل ويسمى التسجيل المتزامن لهذه المبيدات الميكروبية في كندا وامريكا وزيادة الحصول على وسائل جديدة تفيد في برنامج السيطرة على الاقوات في الدولتان. التقاسم الفعال يتطلب مشاركة فهم مسؤوليات كل وكالة وكذلك الخطوات الشائعة وجدولة العمل. من يريد مزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع الرجوع الى الموقع الخاص بوزارة الصحة الكندية على شبكة المعلومات بالحاسب الالى.

#### ١- تعريفات يجب الامام بها Definitions:

● المادة الفعالة أو الوسيلة الميكروبية لمكافحة الاقوات (MPCA): الكائن الدقيق (بكتريا- طحلب- فطر- بروتوزا- فيروس- ميكوبلازما او ريكتسيا والكائنات المرتبطة بها) وای نواتج تمثيل مرتبطة او قريبة والتي يعزى اليها التأثيرات الخاصة بمكافحة الاقوات.

● كود البيانات (Data code (DACP: كود عددي يستخدم لتعريف متطلبات البيانات الخاصة (البيانات والدراسات المعملة). يمكن الرجوع الى التذييل (I)، كود البيانات (DACO) جدول خاص عن المنتجات الميكروبية لمكافحة الاقوات وذلك للقائمة الكاملة للكود المعلوماتي عن الميكروبات.

● المنطقة الايكولوجية Ecozone: المنطقة الكبيرة والمميزه بعمومية عريضة جدا من الناحية الايكولوجية بناء على شكل المنطقة وعوامل الماء والتربة والكائنات الحية والدقيقة والعوامل الانسانية. الحواجز بين المناطق الايكولوجية يجب ان ينظر اليها على انها مناطق انتقالية وليست خطوط فاصلة مميزة (يمكن الرجوع الى التذييل السابع VII عن المناطق الايكولوجية للمبيدات الميكروبية في كندا).

- المنتج النهائي للاستخدام (EP) End- use product: الوسيلة الميكروبية لمكافحة الآفات (MPCA) تحتوي على منتج عليه ملصق ارشادي Labelling يشمل تعليمات الاستخدام المباشر او للتطبيق المتعمد لاجراض مكافحة الآفات ولكنه لا يشير الى ان المنتج قد يستخدم لتصنيع او تجهيز منتجات اخرى لمكافحة الآفات. فى بعض الحالات فان هذا المنتج النهائي (EP) يكون متطابقا مع المنتج الخاص الاستخدام للتصنيع Manufacturing use products ويختصر (Mp) او المنتج التجارى للمادة الفعالة Technical grade of Active ingredient (TGAI) او وسيط المستحضر Formulation intermediate (FI). فى حالات اخرى يتم تجهيز مستحضر EP من MP عن طريق اضافة مواد المستحضر مثل مثبتات الاشعة فوق البنفسجية او مضافات الرش Spray adjuvants والمواد المعلقة Suspending agents والمواد الحاملة ومواد الكبسلة encapsulated والمواد المبيلة والمركبات مانعة التعجن وهى مطلوبة لانتاج منتج مناسب للاستخدام فى مكافحة الآفات. فى العديد من الحالات يتم تصنيع المنتج النهائي من خلال عملية متكاملة لتجهيز المستحضر حيث ان MP المنتج النهائي المستخدم للمستحضر لا يعتبر مركب ذات تسجيل منفصل او مستقل.
- وسيط المستحضر Formulation intermediate (FI): تجهيز ميكروبي يحتوى على TGAI يضاف اليه مواد اخرى مثل المواد الحافظة او المثبتات او المواد المخففة لانتاج مستحضر ميكروبي مناسب للاستخدام فى تصنيع المنتج النهائي للتطبيق الميداني (EP).
- الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا Genetically- Engineered Microorg anism (GEM): كائن دقيق محور وراثيا من خلال استخدام تكنولوجيا دمج الجانوس النووى فى الخارج متضمنة او بما فيها غرس العلامات الوراثية genetic markers.
- فطرى او اهلى Indigenous: وسيلة ميكروبية لمكافحة الآفات عزلت من او معروف حدوثها فى منطقة ايكولوجية مقصودة الاستخدام.
- الحد الأقصى للمخلفات Maximum Residue Limit (MRL): أقصى تركيز من مخلفات المبيد (ملاي جرام/ كجم) مسموح به رسميا وقانونيا فى او على الاغذية واعلاف الحيوانات.

• **المخلفات أو المتبقيات Residues:** عدد الكائنات الميكروبية أو الأجزاء المعروفة التي تترك على الهدف بعد التطبيق. كبديل عندما يكون ملائماً فإن المخلفات قد ترتبط بكمية مقاسة من المركب الكيميائي الممثل أو ناتج تمثيلي من الوسيلة الميكروبية لمكافحة الآفات (MCPA).

• **المنتج الخام للمادة الفعالة Technical grade of the active ingredient (TGAI):** المادة التي تحتوي على الوسيلة الميكروبية لمكافحة الآفات محل التساؤل التي تنتج تجارياً أو على نطاق صغير استرشادي pilot scale بطريقة و أسلوب مكافئ لعملية الإنتاج التجاري المخططة والتي لا يضاف إليها أي مادة أخرى عن قصد فيما عدا أعراض نمو الوسيلة الميكروبية MCPA أو لغرض التضاعف والتكرارية أو التنقية التقليدية. الناتج للتجاري الخام TGAI يعتبر انقى تحضير ناتج من عملية الإنتاج التقليدية وهو التجهيز المعد للتوزيع أو التجهيز في الوسيط FI أو النهائي EP.

• **نظام الترتيب أو التصنيف في البطاريات Tiering:** النظام متعدد المستويات أو نظام الترتيب للطلبات المعلوماتية تعتبر من ملامح الاختبارات البيئية كما في الجزء (٨) من الدلائل على المال البيئي والجزء (٩) عن: التوكسيكولوجيا البيئية. الطلبات والبيانات الابتدائية يجب ان تشمل نتائج كل الاختبارات المطلوبة بمستوياتها المختلفة خاصة البطارية Tier-I. تجدر ملاحظة ان متطلبات الاختبار تحدد بعد التشاور مع PMRA. اذا اوضح هذا الاختبار الاولى عدم وجود اضرار مؤثرة لا تكون هناك ضرورة لاية اختبارات لاحقة. اذا لوحظت تأثيرات مع اختبارات الصف الاول Tier-I فانه يطلب معلومات مناسبة من الصف الثاني Tier II وهكذا تتصاعد صفوف او بطاريات الاختبارات كلما كان ذلك ضروريا وبناء على مخرجات الدراسات السابقة.

## ٢- استشارات مسبقة عن البيانات المطلوبة للتسجيل:

هذه الدلائل تحتوي على معلومات عن البيانات المطلوبة لمختلف الوسائل الميكروبية والمنتجات الغذائية EP's. حيث ان البيانات المطلوبة للتسجيل تعتمد على النوعية والترتيب والخصائص البيولوجية لوسائل مكافحة الحيوية MCPA وكذلك على طبيعة المنتج ونظام الاستخدام المستهدف فانه يجب تشجيع طالب التسجيل على

الاتصال بالوكالة المنظمة لإدارة التعامل مع الاقاقات PMRA لتلقى المشورة قبل تقديم الملف وخلال مرحلة تطوير المنتج. الاهداف الرئيسية لهذه الاستشارات تحديد المواد المناسبة للاختبارات ودراسة البروتوكولات والبيانات التي تطلب لتسجيل منتج مقترح وكذلك نوع المعلومات المطلوبة لتعويض التخلي عن البيانات data waivers. يجب على طالب التسجيل الاتصال بجهاز الخدمات المعلوماتية عن ادارة التعامل مع الاقاقات للحصول على النصائح الخاصة بالاتصالات المناسبة فيما قبل تقديم الطلب او الاستشارات.

قبل طلب الاستشارة من وكالة التشريع لإدارة التعامل مع الاقاقات (PMRA) يجب على طالبى تسجيل المبيدات الميكروبية معيشة للدلائل وتجهيز وتقيم لاختبار المعلومات والبيانات المناسبة والتي تتوافق مع متطلبات التسجيل المطلوبة. يجب تقديم حزمة المعلومات (نسختان) قبل ٤٥ يوم على الأقل من الميعاد المقترح للاجتماع. كذلك يقدم خطاب يطلب تحديد مقابلة قبل تقديم الطلب ومناقشة اجندة الموضوعات التي ستناقش كما يجب ان تتضمن خدمة المعلومات كحد ادنى المعلومات المطلوبة في القسم (٥) الجزء الاول عن البطاقة الاستدلالية، كل ما يتعلق بالمنتج product profile ومجالات الاستخدامات المقترحة والوضع التشريعي الدولي وكذلك القسم (٥) الجزء v.c. عن توصيف الوسائل الميكروبية في مكافحة الاقاقات في هذه الدلائل. اعتمادا على مرحلة تطور المنتج المقترح يجب ان يتضمن الطلب مختصرات بسيطة عن المعلومات المتوفرة عن الفاعلية وعمليات التصنيع ومواصفات المنتج والامان على البيئة وصحة الانسان وكذلك النواحي العلمية التي تعضد التخلي عن بعض البيانات المقترحة في بعض الحالات. يجب تقديم بروتوكولات الدراسة المقترحة اذا كانت متوفرة.

التذييل Appendix-I في هذه الدلائل يحتوى على كود البيانات DACO في جدول يتضمن كل البيانات التي تطلب لتسجيل المنتج الميكروبي. على مقدمى الطلبات proponents نسخ جدول كود البيانات DACO ووضع علامة ✓ امام الخانة المناسبة في العمود يشير الى المعلومات التي قدمت في الحزمة المسبقة. في الاستشارات عن المنتجات المقترحة في المراحل الاخيرة من التطور يجب ان يوضح هذا العمود اي البيانات متوفرة واين يطلب التخلي عن البيانات. بعد



الاستشارة السابقة لتقديم الطلب فإن البيانات المطلوبة لمنتج خاص ونظام الاستخدام يسجل في جدول كودى DACO محور وتعطى نسخة لمقدم الطلب. صورة من هذا الجدول يجب ان ترفق مع طلب وبيانات التسجيل.

### ٣- تنظيم وتشكيل حزمة من بيانات كاملة عن المبيد الميكروبي للتقديم:

مع انشاء الوكالة التشريعية المنوطة بإدارة التعامل مع الاقات PMRA ودمج مختلف الوكالات المسؤولة عن تشريع المبيدات فإن فرص تحسين الكفاءة تم تعريفها من بين هذه الفرص للفحص والغربة المكثفة للبيانات المقدمة مبكرا فى عملية التسجيل. غربة وفحص ما هو مقدم يساهم بشكل كبير فى نظام التشريع من خلال تقديم وثائق وبيانات مجهزة بشكل سليم مما يعمل على المراجعة والاستعراض الجيدة خلال تحسين التداول والمسار وكذلك الاسترداد retrieval. الغربة تسهل من تعريف اوجه النقص لطالبي التسجيل مبكرا فى عملية الاستعراض والتأكيد على انه لن يسمح باستمرار المراجعة الا للبيانات والملفات الكاملة والمقبولة.

أ- تأكيد صحة الملفات المقدمة: خلال سبعة ايام من استلام الملفات يتم مراجعتها للتأكد من استيفاء دفع الرسوم والاشكال والبطاقات الاستدلالية والمعلومات المطلوبة تبعاً لكتيب التسجيل. للنقص والقصور يؤدى الى ارجاع الملفات لطالبي التسجيل مع تحميله لكافة التكاليف. طالب التسجيل الذى يتأكد صحة ملفاته يقدم له كارت شكر يشمل عدد الاصدار او ما يهدف Submission number. هذا العدد يجب ان يظهر على كل ما يتعلق بهذا الملف. بمجرد التأكد من صحة الملف يتم تحويله للغربة Screening.

ب- غربة الملف المقدم Submission Screen. بمجرد الاستلام من قبل قسم غربة وفحص الملفات المقدمة يتم فحص وغربة الملف سواء كان خاصا بوسيلة حيوية لمكافحة الاقات new MPCA او باستخدام جديد new use لمنتج نهائى EP خلال ٤٥ يوم.

إذا لم يكن هناك نقص او قصور يتم قبول الملف المقدم ويرسل الى الاقسام العلمية وثيقة الصلة بالموضوع للاستعراض والمراجعة. فى حالة وجود نقص تم تعريفه فى مكتب الغربة يتم تلخيص هذا القصور وإرساله فى خطاب موثق لطالبي التسجيل. يعطى مقدم التسجيل مهلة ٤٥ يوم لاستكمال كل لوجه النقص والقصور.

إذا لم يستجيب مقدم طلب وملف التسجيل لما هو مطلوب منه أو إذا كانت استجابته غير كاملة أو غير مناسبة يتم سحب الملف وإعلانه إلى طالب التسجيل وعلى نفقته الخاصة. عدد الإصدار لا يستمر صالحاً لفترات طويلة. يمكن لطالب التسجيل معاودة تقديم حزمة البيانات كمكلف جديد.

ج- عناصر الحزمة الكاملة للملف المقدم: يتم مراجعة الملفات الكاملة فقط بواسطة الوكالة. في العادة يتكون الملف من خطاب بالموضوع وصورة الطلب والرسوم واستمارة مواصفات المركب وخطابات تعضيد وتقويض عديدة وصورة البطاقة الاستدلالية ودليل تعضيد البيانات والدراسات العلمية وكذلك جميع البيانات العلمية. البيانات قد تكون مطلوبة أي (R) require أو مطلوبة مشروطة Conditionally (CR) required اعتماداً على الغرض من طلب التسجيل. تجدر الرجوع إلى التنزيل II لمعرفة البيانات المطلوبة وتلك المشروطة الطلب. كل البيانات تُعرف كمطلوبة (وكذلك بيانات مقدمة مطلوبة بشروط) خلال مرحلة الاستشارة ما قبل التقدم بمنهج خاص ويجب أن تكون مصحوبة بالمعلومات المناسبة والإشارة إلى مرجعية البيانات التي سبق تقديمها أو طلبات التخلي عن البيانات. يجب تقديم نسخة من جدول الكود DACO يتضمن البيانات المطلوبة

### (١-٣) تنظيم البيانات التعضيدية:

البيانات التعضيدية للتسجيل تقسم إلى عشرة أقسام عامة كما سيرد بعد ذلك أعداد هذه الأجزاء تعتبر مرادفات للمبيدات الكيميائية التقليدية لتسهيل إدارة التعامل مع البيانات داخل الوكالة. بعض الأجزاء لم تُعرف (أجزاء ٣، ٦، ١١) لأنها غير مطلوبة في المنتجات النهائية EP's. كل جزء كبير يقسم إلى تحت أجزاء كما هو موضح في هذه الوثيقة وفي جدول الأرقام الكودية DACO في التنزيل (I) على النحو التالي:

الجزء (صفر) : الدليل

الجزء (١) : البطاقة الاسترشادية ، تركيب المنتج ، نظم الاستخدام

المقترحة والوضع التشريعي الدولي

الجزء (٢) : توصيف وتحليل المركب

الجزء (٤) : اختبارات صحة الاتساق والامن

الجزء (٥) : تقويم التعرض

- الجزء (٧) : متطلبات المخلفات في الاغذية والاعلاف  
 الجزء (٨) : السلوك والمال البيئي  
 الجزء (٩) : للتوكسيكولوجيا البيئية  
 الجزء (١٠) : للقيمة  
 الجزء (١٢) : ملخص شامل ومكتف للبيانات

أ- طلبات التخلي عن او تأجيل تقديم الطلبات الخاصة بالبيانات **Waivers**: في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة يتم تقديم طلب للتخلي عن او تأجيل عمل وتقديم هذه البيانات يجب ان يتم بواسطة طالب التسجيل. هذه الطلبات يجب ان تسجل في الدليل وتعتمد بيانات بديلة او منطقية علميا مكان البيانات المطلوبة "التعليقات" **comments** مجال الدليل يجب ان تستخدم لتوضيح طبيعة المعلومات مثل طلب التخلي او التأجيل، دراسة البديل ... الخ. طلب التخلي او التأجيل مع البيانات التعضيدية العقلانية او البديلة يجب ان توضع في ملفات البيانات تحت الرقم الكودي المناسب **DACO**.

ب- استخدام نفس البيانات لتعضيد اكثر من كود واحد **one DACO**: عندما تستخدم البيانات مع اكثر من كود واحد يتطلب ان توضع تحت كود واحد فقط ويشار الى الكود او الكودات الاخرى. عندما تستخدم البيانات لتعضيد طلبات الكود في اكثر من جزء من ملف البيانات يجب ان توضع في كلا الجزئين حيث لا يمكن الاشارة الى البيانات بين اقسام البيانات المختلفة في الملف كما في حالة تقسيم المحتويات في الملف بين الاقسام المرجعية.

ج- استخدام الدراسات المرجعية للتعبير عن البيانات المطلوبة: يجب تسليم صور فوتوغرافية قانونية لكلا المطبوعات والاوراق الوثيقة الصلة بها الى وكالة التشريع الخاصة بادرارة التعامل مع الاقات **PMRA**. كل تقرير يجب ان يسلم تحت الرقم الكودي المناسب **DACO** ويوضع في دليل كما في التذييل III توجيهات لعمل دليل البيانات". تعليقات مجال الدليل يجب ان تستكمل مع الاشارة للدراسات على انها منشورة **published**. عندما تتضمن حزمة المعلومات اكثر من عشرة دراسات مرجعية بناء على البحث المرجعي المكثف ويصبح مقبولا تلخيص هذه الاوراق في

تقرير يتضمن معايير البحث والدليل التقليدي لكل ورقة مستقلة مع الإشارة الى تقدير الملخص كوثيقة فردية في الحليل تحت الكود المناسب DACP.

د- بيانات عديدة او اضافية: عندما تسلم دراستان او اكثر لكود خاص فان جميع البيانات يجب ان تقدم تحت نفس الكود وتصل بواسطة صفحات فاصلة مع لسان توصيف جانبي Side tabs. يمكن الرجوع او الاشارة للقسم (٢٠٤) تحت التعليمات الخاصة بلسان البطاقات الاستدلالية في الصفحات المفصلة. اى خطوات تشغيل قياسية او اية معلومات اخرى (فيما عدا الدراسات المرجعية الاجنبية) تسلم مع كود DACO خاص يجب ان توضع تحت نفس الكود وتصل بأوراق فاصلة. التعليقات الخاصة بمجال الدليل Field of index يجب ان تستخدم لتوضيح طبيعة المعلومات مثل ان يذكر "دراسة منشورة". عندما لا تكون الدراسة المقدمة مقابلة لكود خاص فانها تقدم تحت كود دراسات او بيانات اخرى في داخل ونطاق الجزء الاساسي للبيانات كما في حالة نظم التشغيل القياسي في الجزء (٤) عن اختبارات صحة الانسان والامان والتي يجب ان تقدم تحت الكود ٩٠٤ في الجزء ٥٠١٢ من هذه الوثيقة.

المراجع الاجنبية Foreign reviews: المراجع والدراسات الاجنبية توضع في الكود DACO (٥٠١٢) كما في التذييل ا، كود البيانات DACO للمنتجات الميكروبية لمكافحة الافات ويوضع في الملف الاخير مع جزء من البيانات وثيقة الصلة مثل المراجع الاجنبية عن بيانات السمية "توكسيكولوجي" في الجزء (٤) وتوضع تحت الكود DACO 12.5.4 ولكنها توضع في نهاية الملف الاخير للجزء (٤) في اختبارات صحة الانسان والامان في القسم (٥) الجزء ٥٠١٢ من هذه الوثيقة.

### (٢-٣) تنظيم حزمة البيانات المقدمة:

مكونات الملف المقدم يجب ان تنظم كما سيلتي فيما بعد. يجب تقسيم حزم مستقلة عن كل مركب مقترح مثال المادة الخام TGAI والمادة التي تستخدم في التصنيع MP والمادة الوسيطة للمستحضر FI والمنتج النهائي للاستخدام EP. كل حزمة يجب ان تتضمن خطاب تقديم وصورة الاستخدام ومواصفات المنتج وصورة الرسوم والوثائق التعريفية والبطاقة الاستدلالية والدليل. البيانات وثيقة الصلة يجب ان تتضمن مع كل ملف وفيما عدا او باستثناء ما اذا كانت مادة التصنيع MP والمادة الخام

TGAI متطابقة مع المنتج النهائي EP كما يجب تقديم حزمة فردية من البيانات وثيقة الصلة للملفات المرتبطة. مكونات الملف يجب ان تقدم اما في ظرف او تجمع في ملف في صناديق على النحو التالي:

- أ- المظروف Envelope: العناصر التالية من مكون عدم البيانات تقدم في ظرف:
  - خطاب تغطية والاستمارات المطلوبة ووثيقة الرسوم والتعصيدي(عند طلب استمارة المواصفات يجب تقديم خمسة نسخ).
  - نسختان من البطاقة (على ورق مطبوع)
  - نسخة من الدليل والبطاقة (صورة الكترونية- ديسكات) تنبيل ٣، ٤.
  - نسخة من استمارة بيانات الامان للمادة (MSDS) للمنتج المقترح وكل مستحضر.

ب- الملفات Binders: اجزاء البيانات وغيرها من المعلومات المقدمة تحت الرقم الكودي DACO's مثل طلبات التأجيل او الاعفاء، المراجع الاجنبية، دراسة الغريلة... الخ يجب ان تنظم في ثلاثة ملفات حلقية (٨,٥ x ١١ بوصة) مع اعراض مختلفة كما يقتضى الامر وبعد اقصى ٣ بوصات على النحو التالي:

ملحوظة: ملف الملخص ليس هو نفسه الملخصات المكثفة للبيانات. ملخصات البيانات تقدم في ملف منفصل يصفونه "ملخصات البيانات المكثفة" يمكن الرجوع للبيانات المطلوبة في الجزء (١٢) تحت القسم (٥) جزء ٧٠١٢ من هذه الوثيقة:

- نسخة من خطاب التقديم

- الجزء (صفر) الدليل (نسخة ورقية)
- الجزء (١): البطاقة الاستدلالية (نسخة ورقية)، بروفيال المنتج، حالة التشريع الدولي (اجزاء ١٠١، ٢٠١، ٣٠١).
- ملخصات الاجزاء ٤، ٨، ٩، ١٠ (مثل الاجزاء ١٠٤، ١٠٨، ١٠٩، ١٠١٠): هذه الملخصات يجب ان تتضمن مع اجزاء البيانات المقابلة تحت الكود المناسب DACO.

- استمارة بيانات امان المركب MSDS's للمنتج وكل مستحضر
- جدول الكود DACO: نتيجة للاستمارات السابقة للتقديم فان طالب التسجيل عليه ان يسلم نسخة من البيانات المطلوبة للتسجيل في صورة جدول وهو

تحديد لروية جدول DACO (التنزيل ا). هذه الكود DACO المعدلة يجب ان تتضمن مع الملف المقدم للتسجيل.

البيانات الاخرى كما فى الاجزاء ١٠٠٢ تنظم فى ملفات بحيث ان اجزاء البيانات المختلفة لا تنمى فى نفس الملف. عندما يكون ضروريا فلن اجزاء البيانات قد تنظم فى اجزاء Volumes وكمثل فلن الاجزاء الخاصة كما فى التوكسيكولوجى قد تجهز فى عدد من الاجزاء. كل ملف يجب ان يعلم بوضوح على الغلاف وظهر الملف spine كما سيتضح فيما بعد. تقسم صفحات الملف بواسطة فصولات او زوائد جانبية توضح الرقم الكودى بما يفصل بين محتويات البيانات او الارقام الكودية. عند تقديم اكثر من دراسة واحدة لكود خاص فان الامتدادات بين الفواصل يجب ان تتضمن عدد مرجعى الذى هو مستخدم فى جدول المحتويات لتوضيح موقع الدراسة الخاصة فى الملف مثل الكود DACO ٢٠٢٠٤-١ بما يوضح ان هذه هى الدراسة الاولى التى قدمت تحت الكود ٢٠٢٠٤. هذه الطريقة المرجعية تستخدم فقط فى ملفات البيانات وليس فى الدليل.

البيانات الفردية او الكودية والمرفات يجب ان ترقم وتوضح فى صفحات بشكل منطقي مع تتابع ترقيم الصفحات بداية من الصفحة (١). كل المعلومات والبيانات المقدمة يجب ان تكون صالحة واضحة ومقروء Legible.

ج- تعليم الملف Labelling of binders: المعلومات التالية يجب ان توضع على غلاف وخلفية كل ملف:- اسم طالب التسجيل، اسم المنتج، الاسم العلمى للوسيلة الميكروبية فى المكافحة MPCA، عدد الجزء والعنوان، عدد الملف (من بين العدد الكلى للملفات) للجزء خاص، الرقم الكودى المتضمن فى الملف. فيما يلى امثلة عن معلومات بطاقة الملف.

XYZBiologicals Inc LEP BE-GONE flowable for forestry Active Ingredient: <i>Bacillus thuringiensis</i> Var. <i>Kurstaki</i> , strain RL.99 Part 2, Product Characterization And Analysis Volume 1 of 2 DOCOS 2.1-2.7 May 19, 1996	XYZ Biologicals Inc LEP BE-GONE flowable for forestry Active Ingredient: <i>Bacillus thuringiensis</i> Var. <i>Kurstaki</i> , strain RL.99 Part 2, Product Characterization and Analysis Volume 2 of 2 DOCOS 2.8-2.12 May 19, 1996
--	--

د- محتويات الجدول: يوضع جدول مختصر عن محتويات كل ملف عند بداية كل ملف. محتويات الجدول تشمل الرقم الكودي DACO (التي تعمل كرقم تعظيمي لموقع الدراسة او المعلومات داخل الملف) وعنوان DACO ودراسة الاستشهاد (المؤلف - السنة - العنوان). فيما يلي مثال عن مدخل فردي

Short Term Dermal Hartly, M. and Murray, W.(1994) S-1234  
(Technical Grade) twenty- one day dermal study in rabbit.

هـ- عدد نسخ البيانات المطلوبة: يتم الرجوع الى التذييل الخامس في الاستدلال على عدد النسخ المطلوبة من اجزاء البيانات وغيرها من المعلومات المعضدة الأخرى.  
س- تسليم البيانات: يجب التقديم المباشر لخدمة كاملة من الطلبات تتضمن صور استمارات الرسوم والبيانات والمعلومات المعضدة والوثائق الى:

Submission Management and Information Division  
Pest Management Regulatory Agency  
Health Canada  
A. L. 6605E1  
2720 Riverside Drive  
Ottawa On K1A 0K9

عندما ترسل البيانات في صناديق يجب الا يزيد وزن كل صندوق عن ٥ كجم (٣٠ كجم للكل). يجب ان تقدم كل الحزم مرة واحدة ولن يسمح بتقديم جزء من البيانات مع الاشارة الى تقديم الباقي لاحقاً.

٤ - البيانات المطلوبة لتسجيل المبيدات الميكروبية ومنتجاتها (سلكتي بالتبديل فقط)  
التبديل الأول: كود البيانات (داكو) لمنتجات الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات:

Appendix I Data Code (DACO) for Microbial Pest Control products

Data Code (part)	Title العنوان	Data Required البيانات المطلوبة	U. S. EPA Guidelines Reference Number	Additional Information Or Conditions معلومات إضافية أو شروط إضافية
الدليل				
M0				
M1	البطاقة (بروفيل المنتج) الاستخدامات المقترحة والوضع التشريعي الدولي			
M 1.1	البطاقة الاسترشادية		40CFR152.50 40CFR 156	
M 1.2	بروفيل المركب ونظام الاستخدام المقترح		40CFR 158.740a 40CFR 152.50 40cfr 156	
M 1.3	وضع التشريعات الأولية للوسائل الميكروبية والمنتج النهائي			
توصيف وتحليل المنتج				
M 2.1	اسم وعنوان طالب التسجيل		40CFR 152.50	
M 2.2	اسم وعنوان المصنع للمادة الخام			
M 2.3	اسم وعنوان مصنع تمييز المستحضرات (13) كل من مطلبين ٢٠٢			
M 2.4	الاسم التجاري		885.1100	
M 2.5	الاسم المزيج (مركب ميكروبي)			
M 2.6	معلومات عن وضع الاختبار في كندا			
M 2.7	توصيف الوسائل الميكروبية في مكافحة الآفات			
M 2.7.1	أصل أو اشتقاق وتعريف الوسائل الميكروبية للمكافحة		885.1100	
M 2.7.2	الخصائص الحيوية للوسائل الميكروبية في مكافحة الآفات		885.1100	
M 2.7.3	توصيف الوسائل الميكروبية المشتقة من خلال تكنولوجيا جمع الجاسم النوى			
M 2.7.3.1	الوضع التقسيمي وتوصيف المائل والمائع من بين الكائنات الدقيقة			
M 2.7.3.2	تكوين الكائن الدقيق المندمج			
M 2.7.3.3	طبيعة وتعبير المادة المحورة وراثيا			
M 2.7.3.4	التوصيف الفينولوجي للكائنات الدقيقة المحورة			
M 2.8	طرق التصنيع وضمان الجودة		885.1100 885.1200	
M 2.9	اكتشاف المواد الفعالة			
M 2.9.1	مواصفات المنتج		885.1500	
M 2.9.2	تقدير الكفاءة وضمان المنتج		885.1500	
M 2.9.3	المواد الفعالة غير المقصودة		885.1500	
M 2.10	بيانات وطرق التحليل			



تابع التذييل الأول: كود البيانات (داكو) لمنتجات الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات:

Appendix I Data Code (DACO) for Microbial Pest Control products

M 2.10.1	المادة الفعالة أو الوسيطة للميكروبية	885.1300	
M 2.10.2	تحليل المكونات الميكروبية	885.1300	
M 2.10.3	تحليل المواد غير المقصودة	885.1300	
M 2.11	اختبارات ثبات التخزين	885.2400	
M 2.12	اختبارات الصفات الطبيعية والكيميائية	885.1600	
M 2.13	متطلبات توصيف وتحليل منتج نهائي جديد من المركبات الميكروبية		
M 4	اختبارات صحة الأمان والأمان		
M 4.1	ملخص		
M 4.2	العدوى والسمية		
M 4.2.1	ملخص	885.3050	
M 4.2.2	العدوى القمية الحادة والسمية	885.3050	
M 4.2.3	العدوى الحادة الرئوية والسمية	885.3150	
M 4.3	العدوى الحادة (في الوريد أو اليربوني)		
M 4.3.1	ملخص		
M 4.3.2	العدوى في الوريد (بكتريا أو فيروس)	885.3200	
M 4.3.3	العدوى في الفشاء اليربوني (اللقط - البروتوزا)	885.3200	
M 4.4	السمية الجلدية الحادة	885.3100	
M 4.5	الالتهابات		
M 4.5.1	ملخص		
M 4.5.2	دراسة التهابات الجلد	870.2500	
M 4.6	تقرير عن حدوث فرط الحساسية	885.3400	
M 4.7	مزارع الأنسجة (الفروست فقط)		
M 4.8	الفترة علي السمية الحينية		
M 4.9	دراسات وبيانات أخرى		
M 5.0	تقديم التعرض		
M 8	دراسات المخلفات في الأغذية والأعلاف		
M 8.1	ملخص		
M 8.2	دراسات مصلفة		
M 8.2.1	اختبارات المزارع النقية		
M 8.2.2	اختبارات الميكروكوزم		
M 8.3	دراسات الصوب		
M 8.4	دراسات حقلية	885.5200	
M 9	التوكسينولوجيا البيئية		
كل دراسة يجب ان تضم برنام كودي DACO متنوعا لعلامة عديدة رومانية (مثل I, II, III, VI) لتوضيح مستوى لاختبارات البيانات			
M 9.1	ملخص		

تابع التذييل الأول: كود البيانات (دلكو) لمنتجات الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات:

Appendix I Data Code (DACO) for Microbial Pest Control products

M 9.2	الطيور			توصيف الاختبار المطلوب يعتمد على مستوى الاختبار مستوى I: يستخدم القسبي تركيز تحدي Mcc مستوى II: أقل تركيز تحدي LCC حالة بحالة أعضاء على نتائج المستوى I مستوى III سمية محددة مستوى IV دراسات حقلية مصفوفة
M9.2.1	السمية القمية على الطيور		885.4050	
M9.2.2	طيور عن طريق الرنة أو الاستنشاق أو الحمض		885.4100	
M 9.3	تحيات برية		885.4150	See 9.2. above.
M 9.4	السمك			
M 9.4.1	اسماك المياه العذبة		885.4200	See 9.2. above.
M 9.4.2	اسماك البحر والأنهار		885.4280	See 9.2. above.
M 9.5	مفصليات الأرجل			
M 9.5.1	مفصليات الأرجل الأرضية		885.4340	See 9.2. above.
M 9.5.2	مفصليات الأرجل المائية		885.4240	See 9.2. above.
M 9.6	اللافقاريات غير المفصليّة			See 9.2. above.
M 9.7	الكائنات الدقيقة			See 9.2. above.
M 9.8	النباتات			
M 9.8.1	النباتات الأرضية		885.4300	See 9.2. above.
M9.8.2	النباتات المائية		885.4300	See 9.2. above.
M 9.9	دراسات وبيانات أخرى			
M 10	القيمة (بما فيها الفاعلية)			
M 10.1	ملخص			
M 10.2	تقويم الأداء			
M 10.2	دراسات معمّلة أو في غرفة النمو			
M 10.2.2	دراسات حقلية		810.1000	
M 10.3	دراسات المعاملات			
M 10.3.1	التأثير السام على النباتات والمرضية النباتية			
M 10.3.2	التوافق الخلطي مع عمليات وإدارة حماية المزروعات			
M 10.3.2.1	التأثيرات على أداء الوسائل الميكروبية			
M 10.3.2.2	التأثيرات على المنتج النهائي			
M 10.4	الفوائد المحصولية والإنتاج			
M 10.4.1	بروفيل المنتج النهائي			
M 10.4.2	طبيعة واقتصاديات مشاكل الآفات والأمراض في كندا			
M 10.4.3	الوسائل والمصنّعات الجارية في مكافحة الآفات			

تابع التذييل الأول: كود البيانات (دالكو) لمنتجات الوسائل الميكروبية لمكافحة الآفات:

**Appendix I Data Code (DACO) for Microbial Pest Control products**

M 10.4.4	الاسهام في استراتيجيات ادارة وتطبيقات مكافحة الآفات			
M 10.5	دراسات وبيانات اخرى			
M 12	ملخصات			
M 12.5	المراجع الاجنبية			يؤخذ الكود ٥٠١ (دالكو) الكندية جزء رقم عند نهاية جزء الطلب
M12.7	ملخصات شاملة		885.0001	

التذييل الثاني: عناصر الملف الكامل للتسجيل وتعديل او اجراء بحوث على منتج مكافحة الآفات

بعض العناصر المجدولة ادناه مطلوبة تحت ظروف معينة او مشروطة conditionally required اعتمادا على الغرض من الملف المقدم. للحصول على معلومات اضافية يرجع الى كتاب تسجيل منتجات مكافحة الآفات والتشريعات. العناصر المطلوبة تشمل:

**خطاب الغلاف Covering letter:** يستعرض الخطاب الغرض من الملف المقدم ووصف مختصر للحزمة المقدمة. الخطاب يشمل اسم المنتج ووصف مختصر من الغرض من الاستخدام المستهدف، الاشارة الى الطلبات المرتبطة، التاريخ وثيق الصلة بالطلب اذا كانت صالحة. البيانات لا يجب ان تتضمن جزء من خطاب التقديم. يجب ان يرفق بكل ملف خطاب مميز، خطاب الغلاف يجب ان يسلم مع الظرف (ارجع للقسم ٢٠٤). يجب ان يتضمن ملف الملخص نسخة من خطاب التقديم. نسخ خطاب التقديم. نسخ خطاب الغلاف لا يجب ان تتضمن في ملفات البيانات.

**صورة الطلب:** يجب ان تكون كاملة وموقعة ومزيلة بالتاريخ الرسمي: كما هو موضح في استمارة التقدم في صورة شيك مقبول الدفع للجنة الرسمية العناصر المطلوبة المشروطة conditionally تشمل:

- استمارة مواصفات المركب
- خطاب او خطابات التأكيد: مصدر المادة او المواد الفعالة.
- خطاب او خطابات التوثيق: توضح البيانات التي قدمت قبل ذلك من شركة اخرى.

- خطاب او خطابات التوثيق: التعريف بالمركب والقائم بتجهيز المستحضرات والمستشار ... الخ.
- خطاب او خطابات التوثيق لتقاسم مرجعيات البيانات مع الدول الاخرى.
- صورة البطاقة: فى استمارات وصور الكترونية وورقية. يرجع للقسم ٥ جزء ١٠١ والتذييل الرابع IV.
- الدليل: بيانات التعضيد فى صور الكترونية وورقية. يرجع للتذييل III.
- البيانات والدراسات العلمية: تعضيد فاعلية وامان المنتجات المقترحة او التعديلات.
- المرجعيات الاجنبية: للبيانات والدراسات المقدمة اذا كانت متاحة.
- ملخص شامل للبيانات: فى توافق مع دلائل الدول الاوربية EC. يرجع الى القوانين التشريعية DIR97-01 , DIR96-05 وملخصات شاملة للبيانات.
- طلبات التأجيل او الاعفاء: من متطلبات الدراسات والبيانات العلمية واجبة التقديم.
- هذه الطلبات يجب ان تسجل فى الدليل وتعضد ببيانات بديلة او معلومات علمية فى مكان الكود DACO او الدراسة.

#### التذييل الثالث: توجيهات لعمل دليل البيانات:

##### الصورة الالكترونية Electronic Format

كل البيانات والمعلومات المعضدة المقدمة التى تشمل طلبات التخلي او التأجيل والدراسات البديلة والمرجعيات الاجنبية والبروتوكولات وغريلة البيانات والدراسات والمرجعيات يجب ان تكون فى دليل فى الصورة الموضحة أدناه. العناوين الحقلية لا يجب ان توضع فى الدليل. يمكن الرجوع للامثلة:

المجال	المعلومات
- عدد الكود DACO	: ما يتمشى مع الكود "داكو" العددي- يرجع الى التذييل
- المؤلف "المؤلفون"	: اسم العائلة ، الاسم الابتدائي
- التاريخ "السنة"	: تقرير سنوى مكتوب بواسطة المعمل ليس سنة تقديم الملف
- العنوان	: العنوان الكامل كما فى التقرير

- اسم معمل الاختبار : عندما يكون مختلف عن اسم الشركة
- عدد اوراق تقرير معمل الاختبار : رقم تقرير المعمل المجهز والموقع بواسطة معمل الاختبار
- التاريخ الكامل : موعد التقرير يوم- شهر- سنة في مكان كتابة التواريخ بالتعصيد
- اسم الشركة : التي قدمت الملف- صاحبة البيانات
- رقم تقرير الشركة : رقم تقرير الشركة الموقع بواسطة الشركة
- رقم الجزء لجزء البيانات : رقم العدد او الملف لجزء البيانات الخاص
- عدد الصفحات : العدد الكلي لصفحات الدراسة
- المدينة : لمقدم البيانات / صاحب المبيدات
- البلد : لمقدم البيانات/ صاحب المبيدات
- منشورة/ غير منشورة : يوم- شهر- سنة
- رقم EPA/ MRID : اذا كان متوفرا
- تعليقات : تعليقات الشركة مثل المراجعيات الاجنبية
- والمراجع العنصرية
- \* على المتقدم ان يقدم ٣,٥ ديسكات مع دليل معلوماتي محفوظ في استمارة دليلية Ascii او Word perfect. عندما يرغب المتقدمون في عنوانه الدليل في اوساط الكترونية مختلفة يكون ذلك تحت مسؤوليتهم للتاكيد على انه لم تقتصر اى محتويات او تحدث اى تغيرات في الاستثمارات لسبب التحول. الاستثمارات يجب ان تكون في صورة ورقية مع كل خط. الديسكات يجب ان تعلم بالمعلومات الآتية:
- اسم طالب التسجيل
- اسم المنتج
- الاسم العلمى ودلالة السلالة للوسائل الميكروبية للمبيدات لمكافحة الافات
- عدد الجزء والعنوان
- تاريخ التقدم بالملف
- صورة الديسكات مثل Wordperfect or Ascii
- عندما يكون الموقع القياسى للمعلومات ليس متاحا او غير واضح يكون الدخول غير الدقيق N/ S مقبول. الاستثناءات تشمل:
- عندما يكون المؤلفون غير معرفين ، تستخدم مرادفات

- عندما يكون رقم التقرير معروف والمؤلفون غير معروفون يكون من الممكن الرجوع الى اسم مسئول الدراسة.

\* الفيروسات: ملحوظة: على المتقدمين تقديم ديسكات تؤكد على الخلو من الفيروس.  
اي ديسكات وجد به فيروس يجب ان يعاد الى المتقدم

#### Examples of Index Entries

4.3.5

Hartly, M. and Murray, W.

(1994)

S- 1234 (Technical Grade) twenty- one day dermal study in rabbit

Happy Labs., United Kingdom

Report Number 007

Report Date 25 january 1994

Pesticide Company 1

N/ S

N/ S

58 pages

Bi;thoven

Netherlands

Unpublished

26 March, 1994

N/ S

4.6.4

Anonymous

(1985)

Eye Sensitivity Studies with 20% EC

Huntington Research Centre

Report No. FMT6- 85539

Report Date January 16 1985

Pesticide Company 2

Company Report No. 5

Volume 23

88 Pages

N/S

England

Unpublished

April 12. 1994

N/ S

N/ S

### Hard Copy (paper) Format

An abbreviate index may be submitted as the hard copy version provided it contains the following information:

DACO

Author

Date (year)

Title (underlined)

Location of study (i. e., part number, volume number, tab number in the volume)

Total number of pages of the study or DACO

Submission Date

Comments

Example: 4.3.5 Hartly, M. and Murray, W. (1994) S- 1234 (technical Grade) twenty one day dermal study in rabbit, part 4, Vol. 1, tab 4.3.5 (58 pages). March 21 1997.

### التذييل الرابع: توجيهات لعمل مسودة البطاقة الاستدلالية

المتطلبات الاساسية للبطاقة الاستدلالية سوف تستعرض فيما ادناه. للحصول على معلومات تفصيلية عن تجهيز بطاقة المنتج يرجع الى كتاب تسجيل منتجات مكافحة الافات والتشريعات (كتاب التسجيل (Registration Handbook)).

← لوحة الاعلان الاساسية Principle display panel:

١- اسم المنتج Product name

- يجب ان يتوافق مع الموجود في استمارة الطلب المقدم

- يجب ان يكون خاص مع المنتج ويوصف الصورة الطبيعية والغرض
- يجب الا يثير اى سوء فهم او يحتوى على صفات غير مقبولة او غير معصدة مثل طبيعى او عضوى...الخ.

## ٢- تحديد ووضع القسم التابع له Class designation

- بناء على الاستخدام المقصود والاضرار المؤثرة
- يجب ان يتوافق مع القسم المذكور فى استمارة الطلب المقدم
- فى العادة يقبل قسم واحد فقط لكل منتج (توجد بعض الاستثناءات مع جمع الاسم التجارى والصناعى ، والتجارى والمقيد... الخ).
- تحديد القسم يجب ان يكون واحد من الاتى:

- \* محلى
- \* تجارى (زراعى - صناعى - او مؤسسى)
- \* مقيد
- \* صناعى او تصنيعى

## ٣- رموز وعلامات وكلمات الاحتياطات Percautionary.

هذه المعلومات ليست ضرورية فى العادة مع المنتجات الميكروبية، هذا بينما اذا كانت مطلوبة تبعا للمعايير الموجودة فى كتاب التسجيل مثل "سم، قابل للاستعمال، قابل للانفجار، له اضرار واحداث التآكل وغير ذلك من كلمات ورسومات تظهر جميعها على البطاقة الاستدلالية.

٤- قراءة البطاقة الاستدلالية قبل استخدام اى عبارة: اذا كانت بطاقات المنتج الاستدلالية تشمل كتيب او نشرة فانها يجب ان توضع على البطاقة مثل: اقرأ البطاقة والكتيب قبل ان تستخدم المركب.

٥- عبارة الضمان: الضمان المذكور على البطاقة الاستدلالية يجب ان تتوافق مع ما هو مذكور فى استمارة مواصفات المنتج وكلاهما يعكس تركيز المادة او المواد الفعالة كما هي موصوفة الجزء ٢٠٩٠٣ من هذه الدلائل.

٦- رقم التسجيل: رقم التسجيل على البطاقة يجب ان يتفق مع ما هو مكتوب وموافق عليه. يجب ان يظهر الرقم على صورة رقم التسجيل \*\*\*\*\* قانون منتجات مكافحة الافات، واذا كان للمركب تحت قسم محلى domestic والحجم عامل محدد يكون رقم التسجيل \*\*\*\*\* P.C.P.ACT (قانون منتج مكافحة الافات).

٧- المحتويات الصافية Net contents.



- يجب ان يعبر عنها فى وحدات مترية (قد يكتب رقم رياضى بين اقواس بعد القياس المترى)

- يعبر عن السوائل فى المليلترات (مليلتر ml) او لترات (L) ويعبر عن المركب الصلب فى جرامات (جم) او كيلو جرامات (كجم).

٨- الاسم والعنوان البريدى الكامل لطلاب التسجيل:

- يجب ان يتوافق كما فى الصندوق (٦) فى استمارة الطلب المقدم

- اسم وعنوان الوكيل الكندى يجب ان يذكر على البطاقة اذا كان مكان طالب التسجيل خارج كندا.

- رقم تليفون صاحب التسجيل يذكر على بطاقة المركبات الخام او المصنعة.

ملحوظة: مع المنتجات المصنعة تحت القسم محلى ذات الحجم الصغير فان المتطلبات ٥، ٦، ٧، ٨ المذكورة اعلاه يجب ان تظهر على لوحة الاعلان الثانوية.

لوحة الاعلان الثانوية secondary display panel:

١- توجيهات الاستخدام Directions for use

- يجب ان تشمل معلومات كاملة عن معدلات الاستخدام، كيف يستخدم المنتج ومحددات او حدوديات الاستخدام.

- مع المنتجات الخام او التصنيعية تكون التعليمات القياسية للاستخدام على النحو التالى: يستخدم فقط فى تصنيع المبيد المسجل تحت قانون منتجات مكافحة الاقات. اقرأ النشرة الفنية عن تفاصيل المعلومات (يجب ملاحظة ان الكلمة مبيد افات يمكن ان يحل محلها مبيد حشرى حيوى او مبيد حشائش او فطرى حيوى).

٢- الاحتياطات precaution

- يجب ان تتضمن معلومات عن اية اضرار ترتبط بتداول وتخزين ونشر او توزيع المنتج وسبل تقليل او تجنب الاضرار.

- يجب ان تتضمن اية اضرار مؤثرة على صحة الانسان والحياة البرية او البيئة التى قد تنتج من استخدام المنتج على امتداد التعليمات عن كيفية تقليل الاضرار.

- يجب ان تتضمن الجملة: "يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال".

٣، ٤: الاسعافات الاولى والمعلومات التوكسيكولوجية:

هذه المعلومات ليس بالضرورة مطلوبة في العادة مع بطاقات المنتجات الميكروبية ولكن مطلوب وضع جملة واضحة ودقيقة عن وسائل الاسعافات الاولى في الحالات التي يملك المركب مقدرة على احداث ضرر كما يحدث في حالات التلامس العرضي مع الجلد او الاعين او التناول او الاستنشاق.

٥- تعليمات التخزين: يجب ان تشمل معلومات عن ظروف التخزين الملائمة (مثل مدى الحرارة وقيود التعرض الضوئي) أو أي معلومات وثيقة الصلة تستهدف تأكيد ثبوت المنتج واداءه وامانه.

#### ٦- التخلص من المركب:

أ- المركبات المصنعة تحت القسم المحلي domestic لا يجب استخدام العبوات المستعملة الفارغة. يتم التخلص من العبوات الفارغة مع قمامة المنازل.

ب- المركبات المصنعة تحت القسم التجارى Commercial

#### الموائل:

- ١- تغسل العبوات الفارغة جيدا ويضاف ناتج الصبيل لمحلول الرش في الخزان
- ٢- يجب اتباع التعليمات مع اية اجراءات اضافية لتنظيف العبوات قبل التخلص منها
- ٣- تحطيم العبوات الفارغة بحيث لا تصلح لآية استخدامات لاحقة
- ٤- يتم التخلص من العبوات في توافق مع المتطلبات المتعارف عليها.
- ٥- لآية معلومات تتعلق بالتخلص من المنتج الذي لم يستخدم او غير المرغوب فيه وتنظيف الاجزاء التي انتشرت يجب الاتصال بالوكالة التشريعية المختصة بهذا العمل او الاتصال بالصانع.

#### المواد الصلبة:

- ١- يتم تفرغ المحتويات في وسيلة التطبيق.
  - ٢- يتم تحطيم العبوة وجعلها غير صالحة لمزيد من الاستعمال.
  - ٣- يتم التخلص من العبوات في توافق مع التعليمات المتعارف عليها.
  - ٤- لمزيد من المعلومات عن التخلص من العبوات التي لم تستخدم او غير المطلوبة يتم الاتصال بالجهة المسؤولة او الصانع.
- المركبات المصنعة في قسم الخامات او مواد التصنيع:

القائمين بتجهيز المستحضرات من هذه المادة الخام يجب ان يتخلصوا من المادة الفعالة غير المرغوبة والعبوات بطريقة تتوافق مع التشريعات الخاصة بالبلديات او المحليات. لمزيد من المعلومات وكذلك التخص من المواد التي انتشرت يتم الاتصال بوكالة التشريع المحلية او الصانع.

ملاحظات لمستخدم المركبات الميكروبية:

- الملاحظات التالية ضرورية ومطلوبة مع كل المركبات التي تم تصنيفها: تجارية ، مقودة وتصنيعية.

هذا المنتج الخاص بمكافحة الافات يجب ان يستخدم فقط تبعا للتعليمات الموجودة على البطاقة الاستدلالية. من الامور التي يعاقب عليها القانون الخاص بمنتجات مكافحة الافات استخدام منتج مكافحة الافات تحت ظروف غير امنة.

ملاحظات لمشتري المبيدات الميكروبية (اختيارية)

اذا كان طالب التسجيل يرغب في وضع تعليمات او ملاحظات للمشتري على البطاقة الاستدلالية تكون الكلمات على النحو التالي: ضمانات البائع تقتصر على كل ما هو مكتوب على البطاقة الاستدلالية وعلى المشتري ان يأخذ في الاعتبار الاخطار على الاشخاص والممتلكات التي تنشأ من استخدام وتداول هذا المنتج وعليه ان يقبل المركب على هذه الصورة

نموذج مسودة البطاقة الاستدلالية  
اللوحه الاساسية

LEP BE- GONE

مبيد حشري حيوي قابل للانسياب في الماء

مقيد الاستخدام في الغابات

اقرأ للبطاقة قبل الاستخدام

يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

الضمان: باسبليس ثورينجينسيز الصنف كورسناكي السلالة ٩٩ :١٠.٠٠٠

وحدة دولية فعالة لكل مللجم (تكافئ ١٢ بليون وحدة دولية فعالة لكل لتر)

رقم التسجيل \*\*\*\*\* قانون منتجات مكافحة الافات

علامات ورموز الاحتياطات والكلمات التحذيرية (اذا كان ذلك ملائما)

المحتويات الصافية: ١ لتر

رقم التشغيل (اذا كانت مطلوبة)

مؤسسة xyz للمركبات الحيوية

تاريخ انتهاء الصلاحية (—)

العنوان البريدي

الكود البريدي في المدينة والمقاطعة

### اللوحة الثاقوية:

ملاحظات للمستخدم: هذا المركب الخاص بمكافحة الاقوات يستخدم فقط في توافق مع التعليمات الموجودة على البطاقة الاستدلالية. من المحظور وما يستوجب العقاب في كل قانون منتجات مكافحة الاقوات التعامل مع هذه المواد تحت ظروف غير امنة.

طبيعة التسجيل: هذا المركب يستخدم فقط بطريقة موقفة ومسئولة. يجب استشارة سلطات التشريع المحلية الخاصة بالمبيدات عن السماح بالاستخدام اذا كانت مطلوبة.

الاستخدام المقيد: يستخدم ضد يرقات ديدان البراعم في الغلات.

تعليمات: يستخدم المركب عندما تكون اليرقات في مرحلة التغذية. لا يخلط المركب مع اية مواد اخرى. يتم رش المجموع الخضري بمعدل ١ لتر هكتار حيث يحقق راسب متجانس على المجموع الخضري حيث يجب ان تاكل اليرقات راسب المركب LEP BE- GONE حتى تتأثر. حجم القطرة الموصى به ١٠٠ ميكرون.

احتياطات: يحفظ بعيدا عن الوصول للأطفال. تجنب ملامسة الجلد والاعين والملابس. تصل المناطق الملوثة بالصابون والماء بعد الاستخدام.

الاسعافات الاولى: في حالة للتلامس يتم غسل الجلد والاعين بالماء النظيف. اذا داوم حدوث الالتهابات يجب الحصول على العناية الطبية او الاتصال بمركز مكافحة التسمم.

التخزين: يخزن على درجات حرارة بين صفرم، ١٥م. تخزن العبوات في الاتجاه لاعلى وتحفظ مغلفة تماما في حالة عدم الاستخدام. بعد التخزين الطويل يتم رج المحتويات للتأكد من تجانس المعلق.

التخلص: لا يجب معاودة استخدام العبوات. تتبع تعليمات المقاطعة لمتطلبات تنظيف العبوات قبل التخلص منها. تحطيم العبوات غير المناسبة للاستخدام ويتم التخلص منها في توافق مع متطلبات المقاطعة. للحصول على معلومات عن التخلص الامن من المنتج غير المطلوب وتنظيف الاجزاء الملوثة يتم الاتصال واستشارة الوكالة المختصة في المكان او الصانع.

التذييل الخامس: الاعداد المطلوبة من نسخ المعلومات التي تعضد ملف المنتجات الميكروبية لمكافحة الافات.

Part No.	Data and information	Reviewing Division				Total No. and Copies
		SMID	HED	EAD	PSCD	
0	الدليل	1	1	1	1	4
1	البطاقة الاستدلالية بروهل المركب ومجالات الاستخدام ملخصات استمارة بيانات امان المادة	1	1	1	1	4
2	خصائص وتحليل المركب	1			1	2
4	اختبارات صحة الانسان والامان	1	1			2
5	تقويم التعرض	1	1			2
7	دراسات المخلفات في الغذاء والاعلاف	1	1			2
8	المصير في البيئة	1		1		2
9	التوكسيكولوجيا البيئية	1		1		2
10	القيمة	1			1	2
12	الملخصات الشاملة للبيانات	1	1	1	1	4

\* مطلوب نسخة الكترونية ونسخة ورقية في الاستمارات التي ذكرت قبلا في هذه الوثيقة.

- \* نسختان ورقيتان اضافيتان للبطاقة مطلوبتان ويجب ان يقدم في الظرف مع خطاب وليس في الملف ولا مع مكونات البيانات المطلوبة في الملف
- \* هذه النواحي تضم في ملف الملخص

## Acronyms

EAD: Environmental Assessment Division

HED: Health Evaluation Division

PSCD: Product Sustainability and Coordination Division

SMID: Submission Management and Information Division

التذييل السادس: متطلبات اختبارات صحة الانسان والامان


	DACO	Data Required	Test Substance
Part 4 Human Health and Safety Testing	اختبارات صحة الانسان والامان		
ملخص	4.1	R	
الحدوى والسمية	4.2		
ملخص	4.2.1	R	

سمية حادة جرران (تفضل) الفم	4.2.2	R	TGAI
حادة رئوية جرذان (يفضل)	4.2.3	R	TGAI
حادة في الوريد او في الغشاء البريتوني	4.3		
ملخص	4.3.1	R	
عدوى في الوريد (بكتريا او فيروس): فتران او هامستر حديثة الفطام	4.3.2	R	MPCA
العدوى في البروتين (فطر او بروتوزا): فتران او جرذان	4.3.3	R	MPCA
سمية حادة عن طريق الجلد: جرذان	4.4	R	EP
الالتهابات	4.5		
ملخص	4.5.1	R	
دراسة التهابات الجلد: جرذان	4.5.2	R	EP
تقدير حدوث فرط الحساسية	4.6	R	MPCA or EP
مزارع الانسجة (وسائل فيروسية فقط)	4.7	R	MPCA
السمية الجينية المؤثرة (فطريات او اكتينوميسيتس)	4.8		MPCA

التذييل السابع: المناطق الايكولوجية للمبيدات الميكروبية في كندا:



التنزيل الثامن: مراحل ويطاريات اختبارات التوكسيكولوجيا البيئية والسلوك في البيئة



التذييل التاسع: متطلبات اختبارات التوكسيكولوجيا البيئية والسلوك البيئي:

Test	DACO	Use Pattern				Test Substance	Type of Test
		Terrestrial	Aquatic		Greenhouse		
Tier I							
الطيور مع اللحم	9.2.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
الطيور عن طريق الرئة والاستنشاق والحقق	9.2.2	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
الثدييات البرية	9.3	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	MCC
أسماك المياه العذبة	9.4.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
أسماك البحار والأنهار	9.4.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	MCC
مفصليات الأرجل: (أرضية)	9.5.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
مفصليات الأرجل: (مائية)	9.5.2	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
غير مفصليات الأرجل	9.6.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
اللافقريات الأرضية	9.6.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
للافقريات غير مفصليات الأرجل: مائية	9.6.2	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
الكائنات الدقيقة	9.7	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	MCC
النباتات: الأرضية	9.8.1	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
النباتات: المائية	9.8.2	R	R	R	CR	TGA1 or EP	MCC
البطارية II							
الطيور / اللحم	9.2.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
الطيور عن طريق الرئة الاستنشاق والحقق	9.2.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
الثدييات البرية	9.3	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
أسماك المياه العذبة	9.4.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
أسماك البحار والأنهار	9.4.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
مفصليات الأرجل: أرضية	9.5.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
مفصليات الأرجل: مائية	9.5.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
لافقريات غير مفصليات الأرجل: أرضية	9.6.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
لافقريات غير مفصليات الأرجل: مائية	9.6.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
كائنات دقيقة	9.7	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
النباتات: الأرضية	9.8.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
النباتات: مائية	9.8.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	LCC
المصير في البيئة	8.2.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	NA
اختبار المزرعة النقية	8.2.1	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	NA
المصير في البيئة	8.2.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	MCC
اختبار الميكروكوزم	8.2.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	MCC
المصير في البيئة	8.2.4	CR	CR	CR	CR	EP	MAR
دراسات حقلية على المستوى الصغير	8.2.4	CR	CR	CR	CR	EP	MAR
Tier III							
سمية محددة لاختبار على الكائنات غير المستهدفة	9.2.1-9.8.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	Multiple Concentration
دورة الحياة لدراسات على الكائنات غير المستهدفة	9.2.1-9.8.2	CR	CR	CR	CR	TGA1 or EP	EEC
المصير في البيئة-تجارب حقلية على المستوى الصغير	8.2.4	CR	CR	CR	CR	EP	MAR
Tier IV							
التوكسيكولوجيا البيئية: دراسات حقلية مصغرة	9.2.1-9.8.2	CR	CR	CR	CR	EP	MAR



للاستخدامات في الصوب الزراعية فإن الحاجة للاختبارات البيئية تعتمد بدرجة كبيرة على النوع (التصميم وامكانيات تشغيل الصوبة التي يستخدم فيها المنتج النهائي EP) ودرجة التعرض البيئي (المستوي....) المشترك تحت ظروف التشغيل والاستخدام يوصى بالاستشارة المسيق مع وكالة PMRA لتعريف متطلبات البيانات الخاصة للوسيلة (الميكروبية لمكافحة الآفات تحت التناول (MPRA).

التذييل العاشر: الاختبارات التوكسيكولوجية غير المستهدفة:

Tier البطارية	Type of Test نوع الاختبار	Form of Microbial Agent صورة المستحضر الميكروبي	Non- target to be Tested للكائن غير المستهدف
I	التركيز الأقصى للتحدي	TGA1 or EP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المرتبطة تقسيما</li> <li>- معدية بواسطة الوسيلة الميكروبية</li> <li>- تعرض عالي مؤثر</li> <li>- نفس الفسيولوجية</li> <li>- حساسة للمرضات المرتبطة</li> <li>- انواع ممثلة من (V)</li> <li>- مجاميع تقسيمية عريضة</li> </ul>
II	التركيز القليل للتحدي	TGA1 or EP	الانواع التي تأثرت عكسيا من اختبارات توكسيكولوجيا البطارية I
III	تقدير الجرعة للنسبة LDS% والتركيز النسفي LIS% القاتل والتركيز الفعال ECS% واختبارات دورة الحياة	TGA1 or EP	الانواع التي تأثرت عكسيا من اختبارات توكسيكولوجي البطارية II
IV	دراسات حقلية صغيرة (توكسيكولوجيا بيئية)	EP	الانواع التي تأثرت عكسيا من اختبارات توكسيكولوجي البطارية II

\* Tier III testing is not required for indigenous MPCAs

اختبارات البطارية الثالثة غير مطلوبة اذا كانت الوسيلة الميكروبية متوطنة داخليا

التذييل الحادي عشر: المقترح التقسيمي لاختيار المفصليات الأرجل غير المستهدفة

Group المجموعة	Freshwater المياه العذبة	Estuarine or Marine مياه الشواطئ والبحار	Terrestrial الأرضية
Arachnida	Araneae		Araneae Scorpionida
Acari			Eriophyidae Phytosilidae Stigmaeidae Tetranychidae Tydeidae
Crustacei	Cladocera Copepoda Decapoda Amphipoda	Anostraca Copepoda Cirripedia Mysidacea Amphipoda Decapoda	isopoda
Insecta	Ephemeroptera Odonata Plecoptera Megaloptera Trichoptera Lepidoptera Coleoptera Diptera Hymenoptera		Collembola Thysanura Dictyoptera Ispotera Grelloptera Orthoptera Psocoptera Hemiptera Heteroptera Homoptera Thysanoptera Neuroptera Coleoptera Diptera Hymenoptera Lepidoptera

التذييل الثاني عشر: المقترح التقسيمي لاختيار الأنواع النباتية غير المستهدفة.

Terrestrial الأرضية	Aquatic المائية
Apiaceae (Umbelliferae)	Lemnaceae
Asteraceae (Compositae)	Potamogetonaceae
Brassicaceae (Cruciferae)	Haloragaceae
Chenopodiaceae	Typhaceae
Cucurbitaceae	Cyperaceae
Fabaceae (Leguminosae)	Alismaceae
Liliaceae	
Malvaceae	
Poaceae (Gramineae)	
Polygonaceae	
Rosaceae	
Solanaceae	

التذييل الثالث عشر: قائمة الإصدارات وثيقة الصلة بالموضوع

**Regulatory Authority**

Pest Control Products Act and Regulations

Food and Drugs Act and Regulations

**PMRA Companion Guidance Documents**

Registration Handbook for pest Control Products Under the Pest Control Products Act and Regulations (Registration Handbook).

Regulatory Proposal PRO93-05 Research Permit Guidelines for Microbial Pest Control Products.

Regulatory Directive DIR93-07a: Guidelines for Efficacy Assessment of Chemical Pesticides.

Regulatory Directive DIR93- 07b. Guidelines for Efficacy Assessment of Herbicides and plant Growth Regulators

Regulatory Directive DIR93- 17 Assessment of the Economic Benefits of Pesticides.

Regulatory Directive DIR96- 01 Guidelines for Efficacy Assessment of Fungicides, Bactericides, and Nematicides.

Regulatory Proposal PRO96-01 Management of Submissions Policy.

Regulatory Directive DIR98- 01 Good Laboratory Practice.

Regulatory Directive DIR96- 05 and DIR97- 01, Comprehensive Data Summaries.

Instructions for Organizing and Formatting a Complete Submission Package for Pest Control Products (Pending Publication).

**Other Publications of interest**

International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF). 1978. Microorganisms in foods, 1. Their Significance and Methods of Enumeration. 2<sup>nd</sup> Edition. International Commission on Microbiological Specifications for Foods. University of Toronto Press, Toronto (ISBN 0-8020- 3922-6).

International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF). 1986. Microorganisms in Foods, 2. Sampling for Microbiological Specification for Foods. University to Toronto Press, Toronto (ISBN 0- 8020- 5693- 8).

Laboratory Biosafety Guidelines (2nd Edition, 1996, Health Canada, Ottawa, Ontario, ISBN: 0662- 24214- 9).



## **الباب الثاني**

### **المنظور الأيكولوجي**

#### **التأثيرات المحتملة للمبيدات الحشرية الميكروبية**

الفصل الأول: التأثيرات المحتملة للمبيدات الحشرية الميكروبية على مفصليات الأرجل

النافعة في البيئات الأرضية

الفصل الثاني: تأثير المبيدات الحشرية الميكروبية على بيئة المياه العذبة مع التناول

الخاص لبرنامج مكافحة داء الذنابات الملتحية الذي تضطلع به منظمة

الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي

الفصل الثالث: التأثير الفعال للمبيدات الحشرية الميكروبية على البيئات البحرية

ومصببات الأنهار



## الفصل الأول

### التأثيرات المحتملة للمبيدات الحشرية الميكروبية على مفصليات الارجل النافعة في البيئات الأرضية

من مقالة للباحث S.Bradleigh Vinson بقسم الحشرات بجامعة تكساس A&M محطة كوليج - تكساس. المكافحة الحيوية للآفات الحشرية ذات تاريخ طويل يشمل استخدام الممرضات. مع الكشف عن المبيدات الحشرية المخلفة فشلت اتجاهات استخدام الممرضات ووسائل المكافحة الحيوية في الحفاظ على مكانتها بين اقترايات الكيمائيات الفعالة غير المكلفة والمتاحة. تطور المقاومة بواسطة انواع الآفات الهامة وزيادة تكلفة المركبات الجديدة مع زيادة الاهتمام بالتتابعات البيئية من استخدام للمبيدات الكيميائية ادى الى تشجيع البحث والاستثمار في مجال المكافحة البيولوجية. ولو ان استخدام الممرضات في مكافحة الآفات ما زالت تشكل جزء صغير من صناعة مكافحة الآفات الا ان استخداماتها في تزايد مع وجود فرص عديدة لتحسين الممرضات الموجودة. هذا ولو ان هناك معطيات خاطئة حول امان الوسائل الميكروبية للمكافحة خاصة مع اللافقاريات غير المستهدفة (NTO's). من الامور ذات الاهتمام الخاص التأثيرات المؤثرة المعاكسة لاستخدام الميكروبات على مجتمع مفصليات الارجل النافعة:

التأثيرات الممكنة لممرضات الحشرات عندما تستخدم قد تكون على مجتمع الحشرات النافعة وفي الغالب تكون معقدة علاوة على انها لاقت اهتمام متوسط. الممرضات لا تؤدي فقط خفض مضار العائل او الضحية ولكنها قد تحدث عدوى مباشرة للكائنات النافعة تؤدي الى الوفاة. كذلك فان الممرض يخفض من لياقة العائل او الضحية كمصدر غذائي. هذا معناه ان التعقيد يتجاوز خفض لياقة مجموع الحشرات النافعة. بعض اشباه الطفيليات Parasitoids والمفترسات Predators قد تنشر الممرضات ميكانيكيا بين مجاميع العائل او الضحية وبعض اشباه الطفيليات قد تسبب نقل بعض الممرضات. لذلك فان الاحياء النافعة قد تلعب دورا هاما في نشر الممرضات في المجاميع البعيدة في اتجاهي المسلحة والوقت. هذا ولو ان نشر الممرضات في الغالب ذات تأثيرات سلبية على مجموع الاحياء النافعة المشتركة في العملية.

لقد تركزت كثير من الاهتمامات والبحوث على تأثيرات ممرضات الحشرات على حشرات غشائية الاجنحة المتطفلة. سواء كان ذلك يرجع او لا يرجع الى قلق ذات طبيعة خاصة لدى الباحثين فان هناك حقيقة تتمثل في ان غشائية الاجنحة المتطفلة في الغالب من اكثر الحشرات التي يمكن تربيتها في المعمل (كما ان حساسيتها للأمراض تأكدت كثيرا) او ان أكلات الحشرات هذه قد تعاني من خطر مرضى عالي بشكل غير عادى غير واضح. الكائنات الحية غير المستهدفة الأخرى قد تكون في خطر خلال استخدام الكائنات الممرضة في مكافحة الكائنات الحية غير المستهدفة NTO's تشمل الكائنات Scavengers والانواع العامة كغذاء ومجموعة كبيرة من الحشرات النادرة. مع استثناء نحل العسل ثم اهمال الملقحات. بالنسبة للمفترسات تم اختيار قليل من الانواع للدراسة. في هذا المقام سوف نتناول التداخلات المعقدة بين الحشرات النافعة (اشباه الطفيليات، المفترسات، الملقحات) والممرضات الكبرى للحشرات (بكتيريا، بروتوزا، الفطريات والنيماطودا والفيروسات). يوجد العديد من الاقترابات سوف نتناولها في هذا السياق ولكن العلاقات الداخلية بين كل انواع الممرضات واشباه الطفيليات والمفترسات سوف تؤخذ في الاعتبار متبوعا بالقاء الضوء عن تأثيرات الممرضات من منطلق الحشرات النافعة بما فيها الملقحات.

#### ← الوسائل المسببة للأمراض وتداخلاتها مع المفترسات واشباه الطفيليات

**البكتريا Bacteria:** من أول الوسائل الميكروبية التي انتجت تجاريا بغرض مكافحة الافات كانت باسيلس بوبليا، باسيلس ثورينجينسيز والتي استخدمت لما يزيد عن ٤٠ او ٣٠ عاما على التوالي. الكثير من البحوث عن الكائنات النافعة والبكتريا تضمنت الباسيلس ثورينجينسيز في واحد من المنتجات التجارية الخاصة هو الديبيل (معامل لبوت شيكاغو). لقد قام الباحث Hamel ١٩٧٧ بفحص تأثيرات مستحضر ديبيل في صورة مسحوق قابل للبلل على دودة البراع وودودة القرون واشباه الطفيليات الخاصة بهما. بعد استخدام الديبيل زاد تطفل العمر الاول لديدان البراع بواسطة الطفيليات كوستسيا فيوميفيرانا، جلبيتا فيومفيرانا بينما تطفل الاطوار المتأخرة والعذارى بواسطة الانواع مثل فيوجينيسيس هارولس، سيروماسيا او ريكودتا، ملاريميا سوندرسل تنافست. النقص في التطفل في يرقات العمر الاخير والعذارى ربما ترجع الى قتل الممرض للعائل مما يقلل من توفر العائل او بواسطة القتل الاختياري للعائل المتطفل عليه.



لقد استنتج الباحث هامل ١٩٧٧ ان زيادة التطفل بواسطة (ابانتيلس) بعد استخدام الديبيل كانت ترجع الى التطور المبكر لاشباه الطفيليات في عوائل الطور الثاني المنبثقة وكذلك السلوك المتغير للحشرات المتطفل عليها والتي تقلل من التعرض للدبيل. على نفس المنوال فان يرقات الفراشة الفجرية يتطفل عليها بشكل كثيف بواسطة الدبابير ابانتيلس التي فيها فقط حدثت زيادة في النسبة المئوية للتطفل في دودة البراعم. تفسير هذا التنشيط Synergism جاء من قبل Weseloh and Andreadis ١٩٨٢ حيث وجد انه بينما انثى اشباه الطفيل *C.melanoscelus* لا تميز بين العوائل المعرضة للباسيليلس والسليمة بعد ٣ أيام من التعرض ولكنها اظهرت تفضيل مع الحشرات بعمر ١٠ أيام. هذه الحشرات الاخيرة تتأخر في التطور وتكون متوفرة للتطفل لفترات طويلة. حيث ان الجرعات غير المميتة من باسيليلس ثورينجينسيز تطلب من فترة تطور الفراشة الفجرية مما يزيد من نجاح اشباه الطفيليات ومن ثم فان تأثيرات الباسيليلس على استقرار وتطور انواع خارجية التطفل مشابهة مثل *C.melanoscelus* تحدث. لقد تم اختيار روجاس ليمنتاريا لاثنا تفضل الاطوار من الاول للثالث. مع ان عدد اشباه الطفيليات البالغة تزداد عندما تربي من اليرقات المعاملة بالباسيليلس فان الحجم الصغير للعائل تغير من النسبة الجنسية تجاه الذكور.

ولو ان بعض الفوائد تحققت فان تعرض يرقات الفراشة الفجرية المتطفل عليها بواسطة *C.melanoscelus* الى الباسيليلس سببت زيادة في موت العائل ومن ثم موت شبيه الطفيل. لقد سببت تعرض الباسيليلس كذلك الى تأخير في وقت التطور ثلاثة ايام لشبيه الطفيل المستمر في المعيشة. علاوة على ذلك يحدث نقص خروج والكفاءة التناسلية لاشباه الطفيليات التي تخرج من العوائل المعرضة للباسيليلس. العوائل المتطفل عليها يبدو انها عرضة بوجه خاص للاصابة بالباسيليلس. ولو ان استخدام الديبيل لا يتوافق مع حشرات غشائية الاجنحة المتطفلة فان المستحضر لا يقوم بالحدوى المباشرة ليرقات هذه الحشرات لكنها تقتل العائل مما يؤدي الى موت اشباه الطفيليات البالغة التي تغذت على الديبيل تأكدت من بعض الدراسات بينما اشار باحثين اخرين الى ان الجرعات المنخفضة من الديبيل التي تغذى عليها اشباه الطفيليات البالغة تؤدي الى عدم حدوث تأثير.

نقص النسبة المئوية للتطفل في العوائل المعرضة للباسيليلس تم اثباتها. ليس واضحا ما اذا كان التطفل المنخفض يرجع الى زيادة تحمل العوائل المتطفل عليها الى الباسيليلس او ما اذا كانت اشباه الطفيليات تستطيع ان تميز بين العوائل الصحية

ذات نفس الحجم مع العوائل المريضة. البديل الاخير هذا يبدو انه في صالح اشباه الطفيليات.

البكتريا *S.marcescens* ذات تأثير على الكائنات والاحياء النافعة. النقل الميكانيكى لهذه البكتريا فى عذارى دودة الشمع ويرقات دودة اللوز الامريكية بواسطة الة وضع بيض الطفل من الايكونوميدي *I.conquisitor* والبراكونيد *M.Croceipes* على التوالي قد تأكدت كذلك. بينما كانت طفيل البراكونيد الذى تغذى على البكتريا حساسة فان العائل لم يكن كذلك الا اذا حدث له اجهاد. عندما تعدى البكتريا يرقات دودة اللوز الامريكية المتطفل عليها يحدث موت للعائل (وكذلك تطور شبيه الطفيل كذلك). على نفس المنوال فان بقاء معيشة اشباه الطفيليات من ثنائية الاجنحة نقل فى العوائل المعدية ببكتريا *S.marcescens*.

دراسة تأثيرات الممرضات البكتيرية على المفترسات تضمنت فى البداية باسيليس ثوريجينسيس. كلا المفترس كريبوبا كارنيا وابو العديد ذات الاحدى عشر نقطة تستهلك غذاء اقل كما زادت فترة دوايم الاطوار غير الكاملة عندما تغذت على يرقات دودة ورق القطن المعدية ببكتريا الباسيليس. هذا بينما بعض المفترسات الاخرى مثل الرواعة وغيرها لم تتأثر. بينما الاختبارات الحقلية على الباسيليس ثوريجينسيس فى مكافحة دودة ورق القطن ادت الى خفض فى مجموع المفترس فان هذا التأثير يرجع الى خفض توفر العائل وليس بسبب اية تأثيرات مرضية مباشرة على المفترسات. فى محاولة لتقدير ما اذا كانت الضحية المعدية بالباسيليس تضر بتغذية المفترسات ثم تغذية يرقات نطاط الكربن تراكوبولوزيانى فى المعدية على فرس النوى الصينى لمدة خمسة ايام بدون اية تأثيرات مرضية. لقد اوضح الباحثان Wicht and Rodriguez (١٩٨٢) ان الباسيليس ثوريجينسيس ليس لها اية تأثيرات خطيرة على نوعين من الاكاروسات المفترسة والى تفترس بيض الذباب المنزلى ويرقات العمر الاول. كذلك وجد حامد ١٩٧٩ ان الباسيليس كورسناكى ليس لها تأثير على البق المفترس. حتى المواد الحاملة الزيتية التى استخدمت مع معلق الديليل القابل للاستحلاب لم تغير من امان الباسيليس ثوريجينسيس على الكريوبا كارنيا ولا على الهيدوميما كونفيرجينز.

ولو ان البكتريا مثل الباسيليس ثوريجينسيس لا تضر بالمفترسات الا انها قد تداوم المعيشة فى داخلها وتحدث فى اخراج الفضلات. لقد اشار الباحثان Capinera and Barbosa (١٩٧٥) الى ان مفترس الفراشة الغجرية كالوسوما سيكوفانتا تغذى

على يرقات مريضة تحتوي على خلايا مطابقة تماما للاستريبتوتوكس فيكا ليس وهو مرض *L. dispar*. من البيانات المتاحة يبدو ان المفترسات تقاوم العدوى بعد اصابتها ضحاياها بالبكتريا ولكنها قد تلعب دورا في انتشار المرض.

**البروتوزا Protozoa:** لقد استعرض Brooks (١٩٧٣) الدراسات المرجعية المتعلقة بالتدخلات بين اشباه الطفيليات والبروتوزا وعوائل اشباه الطفيليات. لقد لاحظ ان الباحث Paillot (١٩٢٣) كان اول من اقترح ان اشباه الطفيليات قد تعمل كنفقات للامراض البروتوزية. لقد لاحظ بايلوت ان كل ديدان القارضة اجروس برونوباتا المصابة بالسوطيات لبيتوموناس شاتوني كان متطفل عليها ايضا بواسطة امبليشارماثوريس من عائلة ايكونوميدي. لقد اشار هذا الباحث كذلك ان ابي دقيق الكرب المعدى بالبروتوزا كان متطفل عليه عادة بواسطة كوتيسيا (ابانتيليس) جلوميراتا. لقد تأكدت افكار بايلوت بعد ذلك بواسطة الباحثان ايسى وماسلينكوف (١٩٦٦) اللذان اظهرا ان التوتيسيا جلوميراتا كانت مسؤولة عن توزيع ونشر مرض النوزيما مسينيلي في مجموع ابي دقيق للكرب. بعد دراسات بايلوت اقترح العديد من الباحث ان اشباه القلويات كانت قادرة على نقل الامراض البروتوزية ولكن البيانات المتاحة عن هذا الموضوع قليلة. من التقدير المبكر للباحثان ايسى وماسلينكوف اشار العديد من الباحثين الى ان الطفيليات تنقل البروتوزا نميكاتيكيا من العوائل المصابة الى العوائل غير المصابة.

هذا ولو انه من الواضح ان ليست كل اشباه الطفيليات قادرة على نقل البروتوزا. لم يتمكن الباحثان لوجي سليمير وأدمز اثبات نقل النيوجرجارين بواسطة الدبور براكون ميليثور من يرقات سوسة لوز القطن المصابة الى السليمة. عدم قدرة اشباه الطفيليات على نقل البروتوزا من العوائل المصابة الى السليمة تأكدت بواسطة العديد من الباحث. احد تفسيرات هذا الوضع جاء من الباحث Masera (١٩٤٨) الذي اشار الى ان ابي دقيق للكرب المصاب بالنوزيما لا يتطفل عليه بواسطة *C. glomerata*. بينما كانت كل اليرقات المتطفل عليها خالية من النوزيما مما ادى الى الاقتراح بان الكوتيسيا جلوميراتا تختار يرقات العائل السليمة.

بالرغم من ان بعض الباحثين لم يتمكنوا من اثبات نقل البروتوزا بواسطة اشباه الطفيليات من العوائل المصابة الى السليمة عن طريق النقل الميكاتيكى على سبيل المثال الا انهم قدموا الدليل على ان دبور البراكون البالغ المتطفل على سوسة لوز القطن يستطيع نقل المرض عن طريق المبايض. فى السابق اشار الباحث Lipa

(١٩٥٧) ان الابانتيلس ينقل النوزيما عن طريق المبيض للعائل مما ادى الى الاقتراح بان الجراثيم من العائل تدخل شبيه الطفيل المتطور وتهاجر الى المبيض حيث تفرسها في البيض. نقص العدوى في شبيه الطفيل ادى بالباحث بروك الى التساؤل عن اقتراح الباحث ليا عن كيف تدخل الجراثيم الى بيض شبيه الطفيل. لقد لاحظ الباحث Blunk (١٩٤٩) وجود جراثيم الميكروسبورديا في بيض اشباه الطفيليات المصابة. منذ ذلك الحين والعديد من الباحثين اشاروا الى ان اشباه الطفيليات تستطيع نقل البروتوزا عن طريق المبيض الى العوائل السليمة.

بينما ان اشباه الطفيليات قد تنتشر البروتوزا خلال مرحلة التبويض Oviposition الى العوائل السليمة بواسطة كلا النقل الميكانيكي وعن طريق المبيض فان تطور كلا الكائنات داخل العائل ليس متوافقا. تأثير البروتوزا على اشباه الطفيليات وعوائلها تأكد اولا بواسطة الباحثان Allen and Brunson (١٩٤٥) اللذان اشارا الى ان العدوى بالميكروسبورديوم في فراشة درنات البطاطس أدت الى انتاج اشباه طفيليات مشوهة ذات فترة حياة قصيرة مع خفض في الكفاءة التناسلية. لقد اشار الباحث Grosch (١٩٤٩) الى ان اليرقات الناضجة للنبور هايروبركون كانت غير قادرة على التشكل بسبب امتلاء المعى الاوسط بالجراثيم. لقد اشار الباحث Thompson (١٩٨٥) ان اثنان من اشباه الطفيليات لدودة اليراع الشرقية فشلت في التحذر عندما تطورت في العوائل المصابة بالشبيه الطفيل جلوجيا فوميفيرانا وقد عزى الفشل الى عدم التوازن الغذائي المتسبب عن تراكم جراثيم البروتوزا في المعدة. تراكم الجراثيم تمثل مشكلة خطيرة في تطور اشباه الطفيليات التابعة لرتبة غشائية الاجنحة بسبب ان المعى الامامى والاوسط يكون حقيبة او او كيس اعورى غير مرتبط بالمعى الخلفى حتى التحذر.

شبيه الطفيل كوتسيا مارجينيفرتس الناتج من دودة ورق القطن المصابة بالميكروسبورديوم مقتت عادة في الطور اليرقى او العذرى او انتجت اشباه طفيليات بالغة صغيرة الحجم وذات عمر قصير. العدوى بالميكروسبورديوم في حشرات ابي دقيق الكرنب تؤدي الى وفاة شبيه الطفيل المتطور بثيرومالاس بيوباروم. لقد تأكد ان اشباه طفيليات غشائية الاجنحة حساسة للمرضات البروتوزوية ولكن ما اذا كانت هذه العدوى تحدث عن طريق الفم او اى طريق اخر غير معروفة. لقد تم دراسة العلاقة بين المرضات نوزيما هليوسبيرس، نوزيما كلمبوليتيديس واثنان من اشباه طفيليات فرط التطفل hyperparasitoid. لقد وجد ان العديد من هذه الاشباه طفيليات لابي دقيق

الكرب ثم اصابته بشكل كثيف بالميكروسبورديوم الخاص بعائلها وان وجود الجراثيم فى البيض أدى الى الاقتراح الى انها على غرار اشباه الطفيليات الأولية فان اشباه فرط التطفل قادرة كذلك على التطفل عبر المبيض.

كثير من الدراسات تناول عوائل اليرقات وقد اشار الباحث Huger (١٩٨٤) الى ان شبيه طفيل البيض تريكوجراما ليفانيسيس يسهل عليه وضع البيض فى كتل بيض الحشرة *O.nubilalis* المعدية بالمرض نوزيما بيروستا البروتوزوى. هذا بينما تطور شبيه الطفيل داخل كتل البيض المصابة لم تتأثر الا ان اشباه طفيليات الجيل الاول F1 تم اعدادها ووصلت كفاءتها التناسلية الى ضعف كفاءة الاناث السليمة. المعلومات المتاحة الان تشير الى ان الامراض البروتوزوية تخفض من بقاء او معيشة اشباه الطفيليات وطوال فترة الحياة والكفاءة التناسلية. لقد وجد ان شبيه الطفيل بيديوبيس فوفيو لاش ضد خنفساء الفول المكسيكية كان ذات حساسية عالية لاثنتان من امراض النوزيما. يمكن القول بان التداخلات بين الامراض البروتوزوية واشباه الطفيليات ليست دائما ضارة على اشباه الطفيليات. لم تتأثر الكوتسيا فوميفارانا عندما حدثت عدوى لعائلها بالنوزيما لان شبيه الطفيل هذا يقف من المراحل المبكرة للعائل وقبل ان يقتل المرض العائل.

القليل جدا من المعلومات متاحة عن المفترسات. لقد تم الوصف الكامل لوجود الميكروسبورديوم من العديد من المفترسات الحشرية. لا توجد اية ادلة تشير الى ان العدوى كانت ترجع الى الفريسة ولو ان هذا الطريق لاحداث العدوى قد اقترح. الدليل المتوفر حاليا يشير الى ان المفترسات قد تكون مقاومة للعدوى بالمرضات البروتوزوية لفرانسها. هذا بينما انه عندما تتغذى المفترسات على عوائل مصابة بانواع فيريمورفا فان المفترسات قد تصاب ولكن تراكم الجراثيم المقاومة المهضومة فى الجهاز الهضمي لها تسبب التراجع. اذا تغذت هذه المفترسات على عوائل سليمة وصحية بعد تناولها العوائل المصابة فانها تشفى.

الفطريات *Fungi*: بعض انواع الممرضات الفطرية للحشرات مثل الاسبرجللس يهاجم عدد عريض من انواع الحشرات ولكن كما لاحظ الباحث Chapman (١٩٧٩) ان هذا الجنس يجب تجنب استخدامه ضمن الوسائل الحيوية فى مكافحة الافات *biocontrol* agents بسبب مقدرته الكبيرة على انتاج السموم الفطرية *Mycotoxin*. هذا ولو ان العديد من الفطريات الممرضة للحشرات فى العادة ذات مدى عوائل ضيق مما يقلل

من مخاطر عدوى الانواع النافعة التى تتبع اقسام تقسيمية مختلفة من الهدف. لذلك فان التعرض المباشر للملحقات البالغة والمفترسات واشباه الطفيليات للوسائل الفطرية لا يتوقع ان تسبب مشاكل خطيرة. هذا بينما المشاكل قد تحدث عندما تتداخل المفترسات واشباه الطفيليات مع العوائل المصابة.

المرض الفطرى يتداخل مع اشباه الطفيليات كما هو الحال مع الامراض الاخرى وقد نشر هذا بواسطة بحث كثيرون. عدم التوافق هذا incompatibility يرجع الى غزو الفطر وموت العائل وليس لغزو الفطر بشبيه الطفيل النامى فى العائل. على نفس المنوال فان انسجة شبيه الطفيل من النوع Angitia sp. لا يتم غزوها بواسطة الفطر انتميوثورا سفيروسبيرما الذى يهاجم الفراشة ذات الظهر الماسى. خلص البحث كذلك الى ان الفطر عادة لا تغزو انسجة اشباه الطفيليات الداخلية فى العوائل المصابة ولو انه تمت الإشارة الى حالتان من بين ٢٦ حالة حدث فيهما غزو الفطر لشيبه الطفيليات.

توجد بعض التقارير تشير الى ان العوائل التى تلوى اشباه الطفيليات يكون فيها حساسية زائدة للعدوى بالفطر. لقد اشار Fuhrer واخرون (١٩٧٨) ان التطفل الملتهم للحشرات فى ابي دقيق الكرنب يجعل اليرقات الغازية عرضة للعدوى بالفطر بوفارياباسيها. على نفس المنوال فان عدوى يرقات دودة اللوز H-zea بواسطة نوميوپاريلاي تريد لو اذا كانت اليرقات سبق للتطفل عليها او ترامن حدوث التطفل بواسطة ماكروبلينس كروميسيس. لقد ذكر Powell واخرون (١٩٨٦) كذلك ان العوائل بعمر ٢ يوم المتطفل عليها عرضة للعدوى بالفطر. لقد خلص بعض البحوث الى ان الممرضات الفطرية قد تكون ذات قدرة افضل على عدوى العوائل المتطفل عليها عن العوائل الصحية السليمة. لقد ذكر بعد ذلك بان جليد يرقات سيديبوميفيلا غير المتطفل عليها يستجيب لنفاذ البوفيريا لسيانا بواسطة التغلظ Malanization ولكن التفاعل الدفاعي هذا ينخفض بواسطة شبيه الطفيل امكوجاستر كودارى زينتاتس. هذا بينما زيادة حساسية العائل للفطر قد تحدث فقط لفترة قصيرة بعد وضع البيض.

عندما يتعرض الذباب الابيض للتطفل بواسطة الانكارسيا فورموزا بعمر ٤ ايام للطفيل اشيرسونيا اليوروريس يكون الفطر اقل نجاحا فى عدوى العوائل. لقد حدث نفس الوضع مع كلا من الجمل الوردى ميتوبولومنيوم ديرهودوم وشبيه الطفيل الخاص به افيديس روبالوسيفاي لقد تعطل تطور الفطر عن تعرض المن المتطفل عليه لمدة ٤ ايام على الاقل الى الفطر لرينيا نيوافيديس.

نقص حساسية العوائل المتطفل عليها الى العدوى بالفطر قد ترجع الى مادة مضادة للفطر antifungal agent تتطلق وتتفرد خلال تطور شبيه الطفيل. لقد اكتشف Fuhrer and El- sufy (1979) ان المادة التي توقف النمو الخضرى للفطر مؤقتا Fungistatic توجد فى هيموليف ابى نقيق الكرنب بعد قفس يرقات كوتسيا جلوميراتا. لقد ثبت ان هذه المادة تتفرد بواسطة الخلايا العجيبة المسماة teratocytes (خلايا الغشاء الجنينى لشبيه الطفيل التي تنتج مع اليرقة عند القفس ثم تتجه للنمو بشكل مستقل فى هيموليف العائل). لقد وجدت مادة مضاد حيوى antibiotic فى هيموليف عذارى ابى نقيق الكرنب المصابة بهجوم ابرة العجوزة بميلانوريرنيلا من عائلة ايكونوميدي التي لا تنتج الخلايا العجيبة المسخية. فى هذه الحالة فان المادة الفعالة تدخل هيموليف العائل كاخراج شرجى ليرقات شبيه الطفيل فان نشاطه يساهم فى التأثير التثبىطى عند DOPA- ثيروسينيز.

لو انه ظهر مؤكدا ان اشباه الطفيليات لا تستطيع الكشف عن العوائل المصابة حديثا فانها تستطيع تمييزها عند مرحلة او مراحل متقدمة من العدوى. بعد عدوى الذباب الابيض تراهىيروس فابوراريورم لمدة سبعة ايام فان اناث شبيه الطفيل انكارسيا فورموزا تستجيب عن طريق غرس الة وضع البيض فى العوائل المصابة ولكنها لا تضع بيض. لذلك فان اناث انكارسيا فورموزا قادرة على الاحجام الاختيارى لوضع البيض فى العوائل المصابة لاكثر من سبعة ايام ولكن ملاستها العوائل المصابة تفتح امكانية نقل العدوى. لقد اقترح الباحث فوكاسوفيتس (1925) ان اشباه الطفيليات تنقل الفطر سبيكاريفارينوزا الى عذارى بولى كروزيس بوترانا خلال عملية التبويض او وضع البيض ولكن لا يوجد دليل يؤكد ذلك. ولو انه من المقبول بوجه عام ان اشباه الطفيليات قد تعمل كناقلات ميكانيكية لبعض الممرضات فان الاثلة عن نقل الفطريات ما زالت غير متوفرة. لم يتمكن الباحثان Franes and Vanlertem (1987) من اثبات ان انكارسيا فورموزا تنقل الفطر من العوائل المصابة الى السليمة ولو ان اشباه الطفيليات تقوم بجس العوائل المصابة بالفطريات بشكل منتظم.

تأثيرات الفريسة المصابة بالفطر على المفترسات لاقت قليل من الاهتمام. ولو ان الذباب الابيض المصاب بالفطر A.ateyroides كان يستهلك بواسطة الاكاروس المفترس فيتوسيلس الا انه لم تلاحظ تأثيرات ضارة على الاكاروس. لا يوجد احتمال لنقل الاطوار الخضرية للفطريات عن طريق جنس Probing شبيه الطفيل من غشائية الاجنحة او تغذية المفترسات ولكن نشر الجراثيم مثل حبوب اللقاح بواسطة الحشرات

تكون متوقعة اذا قامت المفترسات او اشباه الطفيليات بملاسة العوائل في مرحلة متقدمة من المرض. من المدهش انه اذا كانت بعض جراثيم بعض الفطريات الممرضة لا تجذب بعض المفترسات او اشباه الطفيليات التي يمكن ان تحمل الجراثيم ميكانيكيا لمجاميع العائل.

من الامور المثيرة للاهتمام ما لوحظ ان البينوميل وهو مبيد فطري كارباماتي من مجموعة بنزيميدازول يخفض خروج شبيه الطفيل كونسيا مارجينيفيزيس من عائلة دودة اللوز الامريكية. على نفس المنوال اشار Sewall and Croft (١٩٨٧) ان البينوميل لم يكن ساما على العمر الثالث لحشرة نورتنس البرنقال ارجيروثينا ستيرانا عند تركيز ٣٠٠ جزء في المليون ولكنها تؤدي الى موت شبيه الطفيل الفردي اباتيليس اريستوتيليا داخل العائل.

النيماتودا Nematodes: نقد قام الباحث ايسهياشي واخرون (١٩٨٧) بمعاملة مالاكوسوما نيوستريا بسلالة DD-136 سننيزنما فيلاتيا. بعد ذلك تم تعريفها للمفترس. لقد حدث قتل ٢٠% من المفترسات بعد استهلاك الضحية المصابة ٢٤ ساعة ولكنها لا تتغذى على الضحية غير المعدية التي كانت موجودة في الاطوار المتأخرة من العدوى. على نفس المنوال فان ابي دقيق عندما تعرضت للنيماتودا DD-136 لمدة ٤ ساعات فانها اصبحت غير نشطة ولم تهاجم بواسطة شبيه الطفيل تريكومالاس اباتيلوكتينيس. هذا ولو ان النيماتودا ليس لها اي تأثير على اشباه الطفيليات. عند تعريض البرقات المصابة بالنيماتودا قبل ان تصبح غير نشطة فانها يحدث فيها تطفل ولو ان السبب غير واضح فان خروج شبيه الطفيل انخفض. لقد وجد احد الباحث الذي قام باستخدام سلالة DD-136 ان الاباتيليس مات بسبب موت العائل قبل خروج شبيه الطفيل. اذا كان شبيه الطفيل قد يبدأ من الخروج او الانبثاق egression يقوم بغزل الشرقة فانه يكون في امان بعيدا عن العدوى. في دراسات لاحقة تم الوصول الى ان شرائق العديد من اشباه طفيليات غشائية الاجنحة تقاوم العدوى وان الشرقة العادية تتكون من طبقة من الحرير خالية من الثقوب والتي لا تخترق اطوار النيماتودا المصرية. لقد وجد باحثون اخرون ان عند تعريض هيبوسوتراكسيجوا بعد ثمانية ايام من التطفل داخل العائل للنيماتودا فانه بين ١٤-٣٤% من اشباه الطفيليات تم عدواها بالنيماتودا بمعدل ٥٠٠ او ١٠٠٠ نيماتودا لكل مليلتر على التوالي. لقد اشار تريجياني ان



A.Ultor كانت غير قادرة على استكمال تطورها في دودة الشمع المصابة بأى من S.Feltioc أو H.heliiothisdis.

يبدو ان اشباه الطفيليات ليس لها تأثير على تطور الـنيماتودا. لقد وجد ان الـنيماتودا تتطور فى العوائل الحية والتي تخرج وتبقى منها اشباه الطفيليات كما يحدث بعد التطفل مع بعض البراكوييندى كما فى مجموعة الـاباتيليس. لقد قام الباحث Kaya (١٩٨٧) بفحص تأثيرات S.feltine على C.comimata من عائلة ناكينيدى. لقد اشار الباحث ان العوائل المتطفل عليها التى تعرضت للـنيماتودا بعد ١، ٢، ٣ أيام من التطفل ادت الى موت العائل وشبيه الطفيل. هذا ولو انه اذا حدث تعذر لشبيه الطفيل فانه لا يتأثر. اذا تعرض الـناكينيدى myxexoristops sp الى الـنيماتودا S.kraussei مبكرا فى مرحلة تطورها داخل العائل فاقا يحدث لها غزو بواسطة الـنيماتودا وتموت. هذا بينما اذا تعرضت متأخرا فى مرحلة التطور الى الـنيماتودا فلن الـناكينيدى تقاوم العدوى وتكون قادرة على استكمال تطورها. البيانات المتوفرة تقترح انه اذا تعرضت المفترسات للـطوار المعدي من الـنيماتودا فلن بعض العدوى قد تحدث ولكن العدوى خلال التغذية على الضحية المصابة تبدو غير شائعة.

**الفيروسات Viruses:** يبدو ان الفيروسات هى الممرضات الاكثر اشتراكا مع كلا اشباه الطفيليات والمفترسات وعوائلها وضحاياها. توجد العديد من انواع الفيروسات فى الحشرات التى تتباين فى تأثيراتها المرضية من الضارة الى النافعة. معظم البيانات المتاحة تتعلق بفيروسات الحشرات والكائنات النافعة والافات التى تتضمن الفيروسات العصوية baculoviruses. الفيروسات العصوية تشمل مجموعة من الفيروسات التكافلية Symbiotic التى تحدث فى بعض اشباه الطفيليات من رتبة غشائية الاجنحة فى بعض انسجة عوائلها الحشرية. هذه تعرف بفيروسات البولى هيدرا وهى عائلة الفيروسات التى فيها جينومات الحامض النووى "دنا" عديدة الانتشار. هذه الفيروسات متعددة الدنا polydnaviruses تتضاعف فى الخلايا الطلائية الكاسية بشبيه الطفيل وتتفرد فى لومنيا الجهاز التناسلى والتي منها تحقن فى العوائل على طول بقية اشباه الطفيليات. فى احد المرات فى العائل تم التعبير عن البولى هيدروزييس فى نسيج العائل. لقد اتضح ان فيروسات الدنا المتعددة تلعب دورا هاما فى العلاقة بين شبيه الطفيل والعائل ولا يبدو انها تسبب اى ضرر لاشباه الطفيليات التى تعولها وهذا بينما تؤثر على عائل شبيه الطفيل الا انها لا تتضاعف فى انسجة العائل. لم يثبت ان الفيروسات متعددة الدنا لها

اية تأثيرات او قدرات فى المكافحة الحيوية. هذا ولو انه توجد بعض الفيروسات الاخرى توجد فى الجهاز التماسلى لاشباه الطفيليات تقوم بالتضاعف فى عائل شبيه الطفيل وقد يكون لها دور مؤثر فى المكافحة.

لقد وجدت جسيمات مماثلة للفيروس العصوى الخيطى غير المسدود (Cm Fv) فى خلايا انث شبيه الطفيل الكاسية وتتضاعف فى خلايا البشرة وخلايا القسبة الهوائية للعديد من يرقات حرشفة الاجنحة المتطفل عليها بواسطة كوسيا مارجينيفنتريس. لم تميز تأثيرات خاصة للفيروس Cm FV فى العائل حيث انها تصاب بالفيروس عديد الدنا. لم يثبت اى تأثير مرضى كما ان دور هذا الفيروس فى العائل غير معروف.

هناك عدد من الفيروسات العسوية الممرضة والتي يمكن اعتبارها كى تستخدم فى المكافحة الحيوية ولقد اقترح الباحثون ان هذه الفيروسات يمكن ان تنقل بواسطة اشباه الطفيليات. هذا ولو انه ليست كل العوائل المصابة بالفيروس تكون مقبولة كمواقع للتبويض. لقد اشار Kelsey (١٩٦٢) ان شبيه الطفيل C.glomerata لا يضع بيض فى يرقات ابي دقيق الكربن المعدي بالفيروس ونفس الشئ مع C.melanoscelus التى تكون مهاجمتها اقل للحشرة ليمتتاريا ديسبار المعدي بالفيروس. لذلك فان مصدر العدوى الفيروسية لاشباه الطفيليات البالغة قد تكون محدودة على اشباه القلوبات التى تهجم العوائل فى الاطوار المبكرة من العدوى او التى تتطور داخل العوائل المرضية. هذا بينما نسل اشباه الطفيليات التى تضع للبيض فى العوائل فى الاطوار المبكرة من العدوى بالفيروس لا يحتمل ان تستمر فى البقاء. تطور شبيه الطفيل الا يكونوميدي C.sonorensis نادرا ما يتقدم فيما وراء العمر الاول عندما يتم عدوى عائل دودة اللوز الامريكية بغيروس البولى هيدروزيى النووى (NPV). فى معظم الحالات يكون موت شبيه الطفيل راجعا وببساطة الى موت العائل المصاب بالفيروس فى مرحلة قبل النضج. على سبيل المثال فان C.sonorensis و H.exigua و C.marginivensis تموت مع وفاة عائلها اذا كان معديا بالفيروس او فى وقت يقترب من تبويض شبيه الطفيل. شبيه الطفيل بيض - يرقات Chelonus insularis يموت كذلك فى العوائل المعدي بالفيروس NPV حتى لو اصبح العائل معديا بعد بضع ايام من التطفل. عندما يسبق التطفل التعرض لفيروس NPV بوقت ٤٨ ساعة فان العديد من اشباه الطفيليات يبدو انها تدوم المعيشة دون ان تتأثر ولو ان البولى هيدرا تتراكم فى المعى الاوسط لليرقات خلال تطورها. هذه البولى هيدرا تحجب مادة الميكونيوم خلال التعذروالتي تحدث داخل شرائق اشباه الطفيليات. وجود البولى هيدرا فى الميكونيوم قد يكون مسئولا عن مقدرة

الاناث لنقل الفيروس NPV في بعض الاحيان ولو ان اناث اشباه الطفيليات لا يبدو انها تعدى ولا تلامس العائل المصاب. من الممكن ان الاناث تهرب من الشرنقة ومن ثم تصبح الة وضع البيض لها ملوثة بالفيروس من مادة الميكونيوم.

فيروس الدنا مزدوج التخطيط المظروف المكتشف حديثا "اسكوفيروس Ascovirus" يبدو انه ينتقل ميكانيكيا بواسطة اشباه الطفيليات مثل كوتسيا مارجينيفيزيس من يرقات دودة ورق القطن المصابة الى السليمة. على غرار الفيروس NPV فانه عندما تكون العوائل مصابة بالاسكوفيروس بعد 4-5 أيام من التطفل فان بعض اشباه الطفيليات تنقص. هذا ولو ان موت اشباه الطفيليات التي تقتل في الفقس لا يبدو انها ترجع وببساطة الى قتل الفيروس للعائل قبل ان تستكمل اشباه الطفيليات تطورها. الفيروس قد ينقص على المواد الغذائية حيث ان يرقات العائل المعدية بالفيروس تعيش اطول من غير المعدية بالفيروس كما ان يرقات شبيهة الطفيل التي تقتل من العوائل المعدية بالفيروس تكون صغيرة. في بعض الحالات فان اشباه الطفيليات تتطور اسرع في العوائل المعرضة للفيروس وقد يكون هذا راجعا الى ان الفيروس يضعف من المقررة الدفاعية للعوائل او يجعل المواد المغذية اكثر اتاحة. لقد وجد الباحثان Hotchkin and akaya (١٩٨٣) أن *H. exiguae* ذات فترة تطور قصيرة في العوائل الاخرى المصابة بالفيروس مثل *C. sonorensis* وكوتسيا مارجينيفيزيس. لقد ادت هذه النتائج الى القول بان الفيروس قد يتنافس على المواد المغذية الضرورية.

هذا ولو ان التنافس على المواد الغذائية المحدودة للعائل او العدوى لا نفس دائما تأثيرات العوائل المعدية بالفيروس على تطور اشباه الطفيليات. الابانتيليس ميلينارييس تموت في العوائل المصابة بالفيروس قبل العائل. ما اذا كان موت اشباه الطفيليات هذه بواسطة العدوى ما زال غير واضحا. بسبب ان شبيه الطفيل المتطور يموت داخل وقبل العائل لا يمكن من القول بان الفيروس يحدث قتل مباشر لشبيه الطفيل. لقد وجد الباحثان Kaya and Tanada (١٩٨٣) وجد ان سلالة الفيروس البولى هيدروزييس النووى من السلالة ذات فرط التغذية Hypertrophy (HNPV) تنتج كذلك عامل سام في هيموليمف العائل الخاص بها. العوائل التي فيها هيموليمف سام بسبب الاصابة الفيروسية تسبب في تحوصل *G. militaris* ثم يموت شبيه الطفيل قبل العائل.

التطفل قد يؤثر كذلك على حساسية العائل للعدوى بالفيروسات. لقد اشار الباحث Tower (١٩٦٦) ان يرقات الدودة القارضة *M. unipuncta* المتطفل عليها بواسطة شبيه الطفيل *G. militaris* تستهلك فقط نصف الغذاء الذى تستهلكه اليرقات غير

المتطفل عليها بينما يرقات ابي دقيق الكرب المستوردة المتطفل عليها بواسطة *C.glomerata* تستهلك طعام اكثر من اليرقات غير المتطفل عليها. تأثيرات التطفل هذا على تغذية العائل من الامور الشائعة وهذا التباين في استهلاك الطعام قد يلعب دورا في التعرض وحساسية العائل للامراض الفيروسية. تباين تعرض العائل لعدوى الفيروس التي تنتسب عن التطفل نادرا ما درست. لقد وجد ان اليرقات غير المتطفل عليها ذات حساسية مضاعفة للفيروس NPV عن تلك المتطفل عليها بواسطة *H.exiguae* والتي قد ترجع الى قلة التغذية على العائل المتطفل عليه وكذلك يتعرض لعوى اقل بالفيروس. على العكس وجدت علاقة وارتباط موجب بين NPV وشبيه الطفيل من غشائية الاجنحة *C.melanoscelus*. لقد اتضح كذلك ان يرقات الفراشة العجربة اكثر حساسية للفيروس NPV اذا كان متطفل عليها ولكن التأثير لا يعزى الى زيادة التغذية لان العوائل المتطفل عليها تتغذى اقل. لقد وجد تداخل موجب بين ثنائية الاجنحة *P.selvestris* واعراض تطور الفيروس NPV في العوائل. من المحتمل ان النفذية الى معى العائل بواسطة اليرقات المتطفل عليها تساعد في العدوى بالفيروس كما اقترح مع العدوى البكتيرية.

اظهرت الدراسة على شبيه الطفيل من ثنائية الاجنحة *C.concinnata* انها تتبقي باعداد كبيرة من العوائل المصابة بالفيروس عن العقارنة. لقد وجد ان هذا يرجع الى خفض تبويض هذا الطفيل في العوائل المصابة بالفيروس والاقل نشاطا. هذه العوائل تنتج كذلك فوريارودليس سليمة وصحية. عندما يسمح لاناث الفوريارودليس بوضع البيض في الاطوار المبكرة في العوائل المصابة حديثا او تلك التي اصبحت بعد وضع البيض مباشرة فان شبيه الطفيل المتطور يتعثر مبكرا عما هو متوقع. اما قبل او بعد موت العائل مباشرة. يبدو ان ثنائية الاجنحة المتطفلة تتكيف افضل نحو الاستجابة لموت العائل قبل النضج.

#### ← التداخل المؤثر بين الكائنات النافعة والممرضات الحشرية:

توجد العديد من الكائنات غير المستهدفة (NTO's) التي تتعرض لمرضات الحشرات متى وعندما تستخدم. هذا بينما العديد من هذه الممرضات ذات درجة من التخصصية تمكن من خفض تأثيراتها على العديد من الكائنات غير المستهدفة غير المرتبط بها. من اعظم الاهتمامات تلك الخاصة بالانواع غير الاقات القريبة تقسيما والممرضات ذات المدى العوائل العريض. ثانيا فان نظام استخدام الممرضات يؤثر

على الأنواع غير المستهدفة التي تتعرض. قد يستخدم الممرض في وقت أو في منطقة تخفض من كفاءة على NTO's الحساسة. ثالثاً فإن معظم الممرضات تكون متخصصة بالنظر إلى الأطوار التي تقوم بعواها ومن ثم تقلل من إمكانية أن NTO's سوف توجه وتتعرض في الطور أو المرحلة الحساسة من دورة حياتها. ولو أن العديد من الممرضات تميل إلى الوجود والتعامل الغير متوافق مع المفترسات وأشباه الطفيليات التي تستخدم نفس أنواع العائل. هذا التضارب قد يكون ضار أو نافع. لقد قام الباحث Tamachiro بتقسيم التداخل بين الممرض/الطفيل (شبيه الطفيل) - للعائل في أربعة تأثيرات: تأثيرات ضارة مباشرة direct deleterious وغير مباشرة ونافعة beneficial ولا تأثير. هذا بينما التأثيرات تعتمد بشكل كبير على الموقف والرؤية المستقبلية. من نظرة عريضة فإن التأثيرات قد تتراوح من عدم وجود تداخل من خلال النفع المباشر أو غير المباشر للتوافق مع أو التداخلات المحايدة أو مع التداخلات الضارة المباشرة أو غير المباشرة.

من منظور الممرضات فإن التداخلات تميل لأن تكون ناعمة. هذه التداخلات لا تؤدي فقط إلى زيادة المدى العائلي ولكنها قد تزيد من حساسية العائل وانتشار الممرض ونشره ونجاحه. من منظور العائل فإن التداخلات بوجه عام تكون سلبية. يموت العائل إما من المرض أو في قتال مع شبيه الطفيل أو المفترس. تأثير التداخل من منظور المفترسات وأشباه الطفيليات من أكثر الأمور المعقدة. المجموعة الأخرى من الكائنات النافعة وهي الملقحات قد تتأثر من جراء استخدام الممرضات في مكافحة الحيوية للآفات. في هذا المقام سوف نتناول ما إذا كانت الملقحات تلامس الممرض وما إذا كانت الممرضات تحدث عدوى مباشرة للملقح وفي حالة الأنواع الاجتماعية ما إذا إن الممرض يحمل مرة أخرى إلى المستعمرة كي يعدي الأطوار غير الكاملة.

(أ) الملقحات **Polinators**: العديد من أنواع الحشرات تعمل كملقحات وهي تشمل الفراشات وثنائية الأجنحة والخنافس وغطائية الأجنحة. هذا بينما يوجد القليل جداً من المعلومات عنها فيما عدا نحل العسل *Apis mellifera*. هذا النقص في المعلومات جعل من الصعوبة التنبؤ بتأثير استخدام الممرضات على هذه الكائنات. الملقحات في العادة تكون حشرات بالغة بينما العديد من الممرضات تكون أكثر عدوى للأطوار غير الكاملة والتي بسبب تخصصية العديد من الممرضات قد تقلل من خطر

التأثيرات المباشرة. هذه المخاطر نقل أكثر إذا لم يستخدم الممرض على النباتات المزهرة. هذا بينما الملقحات تكون في خطر إذا لامست النباتات الملوثة.

نحل العسل واحد من الحشرات القليلة غير المستهدفة وهي الملقح الوحيد الذي درس بعناية خاصة في لقاء الضوء عن تأثيره بالمرضات. لقد وجد بعض الباحثين ان نحل العسل البالغ غير حساس للنيماتودا *S.feltiae* ولكن البرقات التي تتعرض مباشرة للنيماتودا في المعمل كانت حساسة. عندما تم رش هذه النيماتودا مباشرة على الواح الحضنة لم تتأثر الحضنة بشكل خطير وحدث موت للنحل البالغ فقط خلال الايام الثلاثة الاولى. بعد تغذية النيماتودا في محلول سكري الى نحل العسل البرى اصبحت الشغالات في الخلايا مصابة بينما الحضنة لم تصاب. لم تصاب الحضنة بسبب ارتفاع الحرارة في مكان تربية الحضنة في الخلية.

لقد تم تغذية عدد من فيروسات البولي هيروزيس المحبب الى نحل العسل في محلول سكروز. لم تلاحظ اى تأثيرات على النحل او الحضنة في الخلية. الممرضات البكتيرية بداية بالباسبيلس ثورينجينسيز درست بكثافة. من بين اختبارات العديد من تحت الانواع والسلالات وخلائط مختلف تجهيزات bt اظهرت تلك التي فيها بيتا- اكسوتوكسين فاعلية ضد نحل العسل في الاختبارات المعملية. لم يشير اى من الباحثين الى حدوث تأثيرات معاكسة للباسبيلس على نحل العسل عند الرش على المجموع الخضري. لقد اشار Cantwell ومعاونوه (١٩٧٢) ان تركيز ٢٢رطل/أكر مطلوب على الاقل لاحداث تأثير. لقد استخدمت bt كمكافحة دودة الشمع في خلايا النحل.

لقد لاقت الامراض البروتوزوية قليل من الاهتمام ولو ان *Nosema apis* سببت مرض خطير للنحل. لقد اشار Cantwell (١٩٧٢) الى الامراض التي ترجع الى النوزيما منها *N.apis* وكذلك المرض الذي يشبب عن النوع *Thelohania* الذي يهاجم البعوض والذي اختبر ضد نحل العسل. باستثناء *N.apis* لم تتطور ممرضات خطيرة. لم تظهر اى من المبيدات الحشرية الحيوية تأثيرات خطيرة على نحل العسل. بينما يبدو ان نحل العسل مقاوم للعديد من الممرضات الحشرية فانه لا يعرف الا القليل عن الانواع الاخرى من الملقحات. قبل استخدام ممرضات الحشرات في مكافحة الاقلت يجب تقييم الانواع الاخرى من الملقحات التي تتعرض لها.

(ب) المفترسات Predators: المفترسات سواء كانت ماصة أو قارضة يبدو عادة انها مقاومة للدوى. لقد اشار سلامة وآخرون (١٩٨٢) ان ابي العبيد ذى الاحدى عشر نقطة تتناول كمية اقل عندما تتغذى على العوائل المعرضة للباسبيليس ثورينجينسيز كما ان خفض المفترسات فى الحقل ترجع الى خفض تعداد الضحايا عنه مع اية تأثيرات مباشرة للممرضات. الضحية المصابة بالنيماطودا لا يبدو انها تغزو المفترسات المتغذية ولو ان بعض المفترسات المعرضة فى التربة الرطبة للاطوار المعدية من النيماطودا قد تصبح معدية. هذا التعرض قد يكون فى الحد الأدنى. لا يبدو ان المفترسات حساسة للعوائل المعدية بالفيروسات. جزء من هذه المقاومة قد يرجع الى نظام هضم اكثر حامضية فى المفترسات والتي تكون الفيروسات مقاومة لها ومن ثم لا تكون الفيريونات حرة. لا يعرف الا القليل عن الفطريات ولا يميل الكثيرين للقول بان المفترسات حساسة للاطوار الخضرية النامية فى الضحية المصابة. على نفس المنوال فان التأثير الذى يحدث من جراء التدخل الخاص بالبروتوزا والضحية على المفترسات ناقصة. لقد تم وصف الميكروسبورديا فى العديد من الحشرات المفترسة ولكن ما اذا كانت هذه الامراض ذات علاقة مع الضحية لم توصف او تدرس بعد. من المؤكد ان الفيروس والبكتريا وجدت فى اخراجات المفترسات كما ان الفيروسات تقاوم التناول والهضم وتتفرد مع الفيريونات اما البكتريا تعتبر غازيات فقيرة.

#### (ج) اشباه الطفيليات Parasitoids:

١- اشباه القلويات من ثنائية الاجنحة Dipterous: غالبية حشرات ثنائية الاجنحة المتطفلة سواء تلك التى تضع عدد كبير من البيض فان بعضها يستهلك بواسطة العائل او تلك التى تضع عدد قليل من البيض على او بالقرب من العائل فانها تنفس بعد وضع البيض مباشرة او تضع يرقات Larvideposit. فى كل من هذه المواقف فان الطور اليرقى هو الذى يخترق جدار المعدة العائل كي يتغذى. العديد من يرقات شبيه الطفيل المتطورة يجب ان تحصل على مصدر للهواء. ان وصولها الى نظام القصبة الهوائية فى العائل او تخترق جداره قد تقدم طرق اضافية لدخول الممرض ولو ان هذا مجرد حدس. على وجه الخصوص فانه فى الاطوار المتأخرة من تطورها فان ثنائية الاجنحة هذه تميل الى التزم Saprophytic وبعضها قد يخرج من العوائل التى تموت قبل ان تتضخم.

مع ان العائل في المرحلة المتقدمة من المرض قد يتحقق الا ان بعض الاناث البالغة من اشباه الطفيليات من ثنائية الاجنحة تتجنب التبويض. من المعروف ان هذه البالغات تتغذى على العوائل. الميتة والجافة او تكتسب العدوى من خلال هذين الطريقتين. هذه البالغات المصابة قد تنشر الممرضات من خلال اجزاء فيها الملوثة والرسغ وكمثال من خلال المجموع الخضرى الملوث.

٢- اشباه الطفيليات من غشائية الاجنحة Hymenopterous: لقد ناقش الباحث Starr (١٩٨٥) دور الواحزات Stingers فى نشوء الاجتماعيات Sociality بين غشائية الاجنحة. يجب الا نفرط فى النظر الا ان نشوء ميكانيكية الوخز قد تؤدى ايضا الى تشجيع مسكن التطفل فى غشائية الاجنحة والمقدرة على النقل Vectorial capacity. هذا الاتجاه الاخير يمثل اتجاه جيد للفيروسات الممرضة للحشرات والبكتريا والبروتوزا ولو انه لم يتأكد ما اذا كانت الفطريات او الديدان تنشر او تنتقل حقيقة بواسطة اشباه انطفيليات. ليس من المهم فى هذا المقام ما اذا كان نقل الفيروسات (فيما عدا الفيروسات عديدة الدنا التكافلية Symbiotic) وغيرها من مسببات امراض الحشرات يسبب اضرار على اشباه الطفيليات من غشائية الاجنحة المنافسة على مصادر الغذاء التى يمثلها العوائل قد تؤثر كذلك على التأثيرات التى تحدثها الممرضات عندما تحدث فى نفس العائل على غرار شبه الطفيل وقد تهاجم اشباه الطفيليات العوائل التى فيها كميات مناسبة من المواد الغذائية. بالإضافة الى ذلك فان الممرضات البكتيرية والبروتوزية تؤثر على النسب الجينية فى العائل وفى بعض الاحيان تحول جنس الى اخر. مثال ذلك الكائنات الدقيقة المشابهة للبكتريا تحول الذكور الى اناث فى احد السلالات isopod ومن المعروف ان اثنان من الميكروسبورينيوم تقوم بتحويل الذكور فى amphipod الى اناث نشطة وظيفيا وتكون قادرة على نشر هذه الوسائل المرضية اكثر. فى حالات اخرى تتغير النسب الجنسية من خلال موت متفاوت للجنس مع توقف انتاج الذكور. لقد اشار Huger (١٩٨٥) الى العدوى الجهازية "المزمنة" فى N. Vitripennis البالغة مع صفة وخاصة قتل الاشياء اكثر من ٨٠% من بيض الذكور فى الاناث المصابة بفشل فى الفقس ويتم نقل الوسيلة المرضية عن طريق الام. مرة اخرى نقول ان بعض الممرضات الحشرية تخفض من نمو العائل وتقليل الحجم وتوجيه النسبة الجنسية فى اتجاه الذكور.



## REFERENCES

- Abas, M. S. T. and Boucias, D. G., Interaction between nuclear polyhedrosis virus-infected *Anticarsia gemmatilis* (Lepidoptera: Noctuidae) larvae and predator *Podisus maculiventris* (Say) (Hemiptera: Pentatomidae). *Environ. Entomol.*, 13, 599, 1984.
- Bell, J., King, E., and Hamall, R. H., Interactions between bollworms and parasite and the bacterium *Serratia marcescens*. *Ann. Entomol. Soc. Am.*, 67, 712, 1974.
- Cantwell, G. E., Lehnert, T., and Fowler, J., are biological insecticides harmful to the honey bee *Am. Bee J.*, p. 255, 1972.
- El-Sufy, R. and Fuhrer, E., Parasitäre Veränderungen der Wirtskutikula bei *Pieris brassicae* und *Cydia pomonella* durch entomophage Endoparasiten, *Entomol. Exp. Appl.*, 30, 134, 1981.
- Fuhrer, E. and Willers, D., The anal secretion of the endoparasitic larva *Pimpla turionellae*: sites of production and effects *J. Insect Physiol.*, 32, 361, 1986.
- Hamel, D. R., The effects of *Bacillus thuringiensis* on parasitoids of the western spruce budworm, *Choristoneura occidentalis* (Lepidoptera: Tortricidae), and the spruce coneworm, *Dioryctria reniculoides* (Lepidoptera: Pyralidae), in Montana, *Can. Entomol.*, 109, 1409, 1977.
- King, K. M. and Atkinson, N. J., the biological control factors of the immature stages of *Euura ochrogaster* Gn. In Saskatchewan, *Ann. Entomol. Soc. Am.*, 21, 167, 1928.
- Pailot, A., Le probleme de l'equilibre naturel chez les insectes phytophages, *Rev. Gen. Sci. Bull. Sac. Philomath.* 36, 206, 1925.
- Stoltz, D. B., Guzo, D., and Cook, D., Studies on polydnavirus transmission, *Virology*, 155, 120, 1986.
- Tower, D. G., Comparative study of amount of food eaten by parasitized and non-parasitized larvae of *Cirphis unipuncta*, *J. Agric. Res.*, 6, 455, 1916.
- Voukassovitch, p., Contribution a l'etude d'un champignon entomophyte *Spicaria farinosa* (Fries) var. *verticilloides* Fron. *Ann. Inst. Natl. Rech. Agron.*, C., 2, 73, 1925.
- Walter, G. N., Differences in host relationships between male and female heteronomous parasitoids: a review of host location, oviposition and pre-imaginal physiology and morphology, *J. Entomol. Soc. S. Afr.*, 46, 261, 1983.
- young, O. P. and Hamm, J. J., The compatibility of two fall armyworm pathogens with a predaceous beetle, *Calosoma sayi* (Coleoptera: Carabidae), *J. Entomol. Sci.*, 20, 212, 1985.



## الفصل الثاني

تأثير المبيدات الحشرية الميكروبية على بيئة المياه العذبة مع تناول  
الخاص لبرنامج مكافحة داء المذنبات الملتهبة الذي تضطلع به منظمة  
الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي

من مقالة للباحثان C.Dejoux and J.M.Elouard اللذان قدما بالقول بأن المياه  
على سطح الكرة الأرضية سواء كانت منسابة (lotic) او الساكنة (lenitic) تعتبر من  
مواقع جمع تركيز النواتج الثانوية المتعددة من جراء الأنشطة الأمية. الاستخدام  
المكثف للأسمدة في البحيرات لو البرك متبوعا بالانجراف يؤدي الى غنى خطير  
وضار بالعناصر الغذائية eutrophication. على نفس النسق ما هو حادث من تلوث او  
اتساخ الانهار بالمخلفات الصناعية. من الامور الاكثر اغراء والشائعة كثيرا التراكم  
البطيء في المياه القارية للمنتجات او المركبات الناتجة منها حيث تستخدم بعيدا بعشرات  
وربما مئات الكيلومترات ثم تصعد الى الجو قبل ان تسقط على سطح الارض بواسطة  
الامطار الحامضية، انجراف مساحيق المبيدات الحشرية بعد التطبيق الجوى.....الخ.

مرة اخرى فان مكافحة ناقلات الامراض ذات اطوار التطور المائية قد تتطلب  
بالضرورة استخدام المبيدات الحشرية مباشرة في المياه حيث لا تكون اختيارية هذه  
المبيدات على الأنواع المستهدفة مطلقة. في جميع الحالات يكون من الضروري  
والحتمى تقليل مستوى التلوث والاتساخ الذى يحدث بكثافة في النظم البيئية المائية.

لسنوات عديدة ظل التطبيق العملى للمبيدات الحشرية الميكروبية مقيدا على  
الزراعة والغابات مع قليل من الاهتمام عن تأثير سميتها على احياء المياه العذبة. لقد  
تم اجراء اختبارات معملية على قليل من الاحياء مثل انواع الدافنيا وكذلك تم تسجيل  
الجرعات النصفية القاتلة LD50's لهذه القشريات وإضافتها الى البيانات الاخرى  
المطلوبة للتضيق الوثائقي الخاص بتسجيل المنتجات الميكروبية لمكافحة الآفات. مع  
زيادة الاهتمام بالأضرار الناتجة عن انتقال جزيئات المبيدات تجاه الاحياء المائية  
وكذلك عن الاضافة المباشرة للمركبات مع خصائص مضادات ناقلات الامراض في  
امكن ابواء اليرقات مما يستدعى الحاجة لفهم افضل عن تأثير المبيد الحشرى على  
الكائنات والاحياء المائية والغلاف المائى بشكل لومع.

طبيعة الاختبارات التوكميكولوجية الخاصة التي يجب ان تقدم مع المبيدات الحشرية الميكروبية في مسار تقويم الامان تعتمد على الطريقة التي سوف تستخدم فيها هذه الوسائل في التطبيق العملي. من الواضح كمثال ان معايير التسجيل الخاصة باستخدام الباسيلليس موريثاي ايزاوا وفوجيوشي (بالضرورة تستخدم ضد الذباب المنزلي في البيئات المحلية) تكون مختلفة عن تلك المطلوبة لانواع الباسيلليس ثوريجينيسيز من النوع اسرانيونيسيز دي بارجك 'ا' كان من الضروري استخدامها في المياه الساكنة او المتدفقة لمكافحة بعوض كيوليسيدي والهاموش سيموليدي على التوالي.

التابعات تتمثل في دراسات السمية وهي في الغالب مقيدة على بعض الاختبارات العملية التي تجرى على واحد او اثنان من الكائنات المائية (بوجه عام دافنيا ماجنا وجيمبوزيا افينيس). في حالة المبيدات الحشرية التي تستخدم مباشرة في الماء يجب ان توجه البحوث في اتجاه مستويات مختلفة من النواحي البيولوجية والايكولوجية مع ضرورة ملاحظة التأثيرات السامة على النظم البيئية.

#### \* طرق تقييم تأثير المبيدات الحشرية الميكروبية على الكائنات المائية غير المستهدفة (NTO's)

مفهوم التقييم المعملی لسمية المبيدات الحشرية الجديدة على الكائنات المائية غير المستهدفة NTO's ليس بالامر بالجديد. لقد اصر بعض الخبراء المشتركين في اللقاء العلمي لمجموعة خبراء هيئة الصحة العالمية WHO على الضرورة المطلقة لهذا التقييم. مثال ذلك ما اوصى به احد الخبراء من ان "..... جميع المنتجات ذات الاصل الطبيعي قادرة على ان تحل محل المبيدات الحشرية الكيميائية سواء كانت حية او ميتة يجب ان تختبر بعق كى تستبعد اى خطورة من السمية سواء على الاتساع و ابة كائنات اخرى عن الانواع المستهدفة".

For example, one such meeting recommended that, ".....all products of natural origin, able to replace chemical insecticides, living or dead, have to be tested in depth in order to discard any risk of toxicity either to man or to any organisms other than the target species."

حينئذا تكررت نفس الفكرة وتعاضلت في تقدير اخر من هيئة الصحة العالمية WHO من الاعتبارات الهامة لتقدير منتجات مكافحة الناقلات دراسة مدى الامان

innocuity للمركبات المقترحة على الكائنات والاحياء النافعة غير المستهدفة التي ترافق وتتواجد مع الناقلات وتضع ضغوط تشريعية عليها. هذا حقيقى مع المركبات الكيميائية وكذلك مع المركبات الحيوية. الامان الايكولوجى ecological innocuity يقاس ليس فقط بواسطة الاستجابة الفورية لافراد الكائن المعزولة او مجاميع الكائنات والاحياء المتباينة (مفترسات وكذلك detrivors) التي تعيش فى نفس biotopes كنانواع مستهدفة).

اذا كانت هذه الاساسيات صالحة فان اختبارات السمية لتسجيل المبيد الحشرى الميكروبي سوف تختلف من مركب لآخر مع الأخذ فى الحسبان مجالات الاستخدامات المستقبلة. مع هذا يجب ان يظل فى الالذهان ان المركب الذى يستهدف نوع خاص من الاستخدام فى البداية قد يستخدم لاحقا بسبب المستجدات والظروف الاخرى لاغراض اخرى تختلف عما كان مخطط له فى البداية كما يحدث مع تحويل المستحضر او المصدر. بصرف النظر عن اعتبارات الوقت والتكلفة فلأنها تؤدي الى استخدام المركبات التى لم يكن مخطط لها عن قصد كى تستخدم مع الاحياء المائية ومع هذا يجب ان تختبر ضد بعض الكائنات والاحياء المعملية القياسية فقط. المركبات المقرر استخدامها فى مكافحة ناقلات الأمراض المائية يجب ان تتعرض لمجاميع من الاختبارات الخاصة. من الواضح ان المركبات التى تأكد من كفاءتها ضد مجموعة الافات المستهدفة فقط يجب ان تتعرض لاختبارات الغرلة الكاملة ضد الكائنات والاحياء المائية.

\* التأثيرات الايكولوجية للمبيدات الحشرية الميكروبية الاساسية على كائنات واحياء المياه العذبة:

أ- باسيليس ثوريجينسيس *Bacillus thuringiensis* Berliner

لم تكن موجودة حتى الخمسينات وبعد اربعة حقب زمنية بعد ان تم عزلها من فراشة دقيق البحر المتوسط " ايفستيا كوهنيلا" ووصفها ثم ادخالها فى التطبيق الفعلى كمبيد حيوى. الان اصبحت البكتريا المتجرثة Sporulating bacterium اكثر شيوعا فى حماية المزروعات ومن خلال تحت النوع israelensis فى مكافحة ناقلات الامراض Vector control. فى البداية استخدمت فى مسحوق اولى وبعد ذلك فى صورة مستحضرات وبعد ذلك تم القبول العام للباسيليس ثوريجينسيس كوسيلة مكافحة امنة بيئيا. بسبب الفاعلية ضد يرقات البعوض "كيوليبيدى" والهاموش "سيميويلدى" تم

استخدام تحت النوع اسرئيلينسيز مباشرة في المصادر المائية سواء كانت ساكنة او متحركة. تحت هذه الظروف تتطلب العديد من دراسات السمية بداية في المعمل وبعد ذلك في الحقل للوقوف على تأثيراتها على النظم البيئية للماء العذب. فيما يلي مختصر للحصر العلم للتجارب وثيقة الصلة بالموضوع على المستويات المختلفة.

#### ١- الاختبارات المعملية Laboratory tests

##### ١-١ تأثير العوامل اللاحيوية Abiotic factors

من الهمية بمكان فهم ان بعض العوامل البيئية قادرة على التأثير على كفاءة هذه الوسيلة الحيوية ضد الناقلات المستهدفة كما انها قد تلعب دورا مهما على بعض الكائنات غير المستهدفة NTO's. مثال ذلك ان تأثير الحرارة على الباسيلليس تحت النوع اسرئيلينسيز درست باستفاضة. لقد خلص الجميع ان هذه الوسيلة يقل نشاطها بسرعة عندما تتناقص درجة حرارة الماء. هذه النتيجة الخاصة ذات مردود سالب على البيئة حيث ان المناطق الاستوائية تتعرض اساسا لاستخدامات ثقيلة لمكافحة البعوض والذباب الاسود. لقد ذكر البعض ان تخزين اكثر المستحضرات الشائعة الاستخدام (فيكتوباك، باكتيموس، تكتار) تحت ظروف الحقل لا تغير من كفاءتها. التغييرات في نشاط ايون الايدروجين على الاقل بين رقم الحموضة ٦،١٠ لا تؤثر على نشاط الباسيلليس ثورينجينسيز. لا توجد معلومات متاحة عن امكانية التأثيرات المعاكسة للتوصيل الكهربى العالى او الاملاح المذابة ولو ان كفاءة الباسيلليس تحت النوع اسرئيلينسيز ضد يرقات بعوض المياه المالحة اظهرت ان محتوى ملح البحر ليس خطيرا بوجه خاص. هذا بينما المحتوى العالى من الحديدوز يبدو انه يبطئ التأثير القاتل على اليرقات من تحت النوع الاخير ضد الايدس ديتريسن. لقد لوحظت نتائج مشابهة في حالة الكلورين والتي يبدو انها تحطم الدلتا- اندوتوكسين.

المحتوى العالى من المادة المعلقة في المياه الطبيعية تمسك بحيث تضاد منخلات مكافحة اليرقات البعوض حيث تؤدي الى تكوين مخلفات من مستحضر الباسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرئيلينسيز مع الجسيمات العضوية وهذه التجمعات agglomeration سرعان ما تترسب ومن ثم تتوقف لتاحة المركب ليرقات البعوض واسعة الانتشار. هذه الظاهرة يجب ان تؤخذ

فى الاعتبار كمعيار سالب للكائنات غير المستهدفة الساكنة NTO's وهذه تكون أكثر تعرضاً لجراثيم المركبات الميكروبية عما لو وجدت فى المعلق. التعرض المكثف لضوء الشمس/الاشعة فوق البنفسجية تؤدى الى خفض سريع فى المحتوى النشط والحي من الجراثيم ولكنها لا تنقص من الفاعلية على البرقات بواسطة الباسيلليس تحت النوع اسرانيلىنسىز. لذلك فان فعل الاشعة فوق البنفسجية UV لا يمكن ان تؤخذ فى الاعتبار كعامل أساسى فى خفض السمية على الكائنات الدقيقة التى تتغذى على أوراق الترشيح.

## ٢-١ السمية فى التقييم الحيوى Toxicity in bioassays

العديد من الدراسات المعملية أوضحت عدم حدوث تأثيرات معاكسة للباسيلليس اسرانيلىنسىز على الكائنات غير المستهدفة (colbo — Garcia ، ١٩٨٠Dunn ، ١٩٨١Gallagher ، ١٩٨٠Undeen ، ١٩٨٠Mostri ، ١٩٧٠.... وغيرهم) الذين لاحظوا ان الديكسيدى Dixidae كانت حساسة للباسيلليس كما فى كيوليسيدى ولم تظهر أية تأثيرات ضارة على يرقات الهاموش "كيرونوميد" أقل ٧١٠ خلايا لكل مليلتر. لقد أشار Dejour وآخرون (١٩٨٥) حدوث تأثيرات معاكسة لأنواع الهيدرا فقط عندما تعرضت لمبيد تكثر بمعدلات ٢٥، ١٠٠ جزء فى المليون بينما أشار chnetter وآخرون (١٩٨١) عندما استخدم مزرعة من الباسيلليس اسرانيلىنسىز تم تسجيل ١٠٠% موت فى نوعان من الهاموش ونوعان من Chaoboridae و Ceratogogonidae بجرعات تتراوح من ١,٦ الى ١٦٠ ملجم/لتر بينما حدث أقل ضرر على يرقات Tipulidae.

على مستوى العالم على امتداد العشرين سنة الماضية أجريت تجارب عديدة على سمية الباسيلليس ثورينجينسىز. للأسف فان هذه التجارب لم ترقى لمستوى المقارنة العلمى. فى بعض الحالات لم تكن هذه التجارب بالدقة المطلوبة. مع هذا فان النتائج أوضحت بوجه عام ما أدى الى الاقتراح بأن ادخال الباسيلليس اسرانيلىنسىز فى الماء يؤثر فقط على عدد قليل من الانواع. لقد درس الانتشار العريض للفقاريات فى هذه الظروف. لقد قدم بعض الباحثين الدليل الاولى عن تعرض وقابلية الانواع تحت قسم نيماتوسيدا للمرضات الحشرية للبعوض/الهاموش. لقد قام الباحث Burges (١٩٧٠) -

١٩٨٠) بتلخيص نتائج التجارب الحقلية والمعملية. لقد أدت هذه النتائج الى الربط بين غياب السمية مع ظروف الاختبارات المعروفة خاصة المستحضرات او للتركيزات الخاصة. لقد اقترح كذلك ان الاطوار المائية لحشرات ثنائية الاجنحة بداية بالكيوليسيدى والسيموليدى وأقاربهم (ديكسيدى، شلوبوريدى) وبعض الكيرونوميدى تمثل العائلات المستهدفة والكتائنات غير المستهدفة الاكثر قابلية وعرضة لهجوم بكتريا باسيليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرانيينسيز.

## ٢- التجارب الحقلية Field trials

### ١-٢. الدراسات قصيرة المدى short-term studies

الدراسات والبحوث عن التأثير سريع الزوال ephemeral effects لبكتريا الباسيليس ثورينجينسيز من تحت النوع اسرانيينسيز على الكتائنات غير المستهدفة NTO's كانت كثيرة وفاقت ما أجرى على المدى الطويل. لقد تم تغطية هذه التجارب فى اصدار الصحة العالمية (١٩٨٢) بالتفصيل وقد خلص التقدير الى حدوث تأثيرات معاكسة اقل من حد الخطر على النظم البيئية للمياه العذبة بالرغم من ان نتائج هذه الدراسات تحققت من خلال طرق لم تصمم جيدا كي تتواءم مع الفرض المنشود. بالطبع وفى حالة التأثير الفاجع الكبير Catastrophic والذي يظهر فيه الموت بشكل فوري فى الاحياء والكتائنات المائية يعتبر ذلك دليل ذاتى مؤكد عن التأثير.

عندما يكون التأثير اقل حدة فان الدراسات الكمية والمقارنة فقط قبل وبعد المعاملة هى القدرة على توضيح حدوث اى تأثير ضار. فى هذه الحالة فان الطرق التى تستخدم عموما تتكون من المجاميع او السلاسل التى جمعت من عينات القاعدة Surber و/أو العينات المركزية Core فى الاماكن المناسبة فى الحال وقبل وصول المبيد للأحياء المائية والحصول على سلاسل اخرى من نفس الموقع على فترات منتظمة بعد المعاملة. استخدام الوسائط Substrates الصناعية فى نفس الطريق يمكن أن تعتبر كطريقة مفيدة فى حالة التجارب قصيرة المدى وكذلك من دراسة تباينات الانجراف الدخلى خلال ٢٤ ساعة وتغطية فترة مساوية (٢٤، ٤٨ ساعة..... الخ) قبل وبعد استخدام المبيد الحشرى فى حالة معاملة المياه الجارية. هذه الطريقة تقدم دليل مفيد عن



الاستجابة الفورية للنظم البيئية المائية للمبيدات الحشرية سواء كانت ميكروبية أو كيميائية. هذه الطريقة استخدمت وما زالت تستخدم بشكل روتيني ومنظم منذ بداية المشاريع والبرامج التي اضطلعت بها منظمة الصحة العالمية/برنامج الامم المتحدة للتنمية/البنك الدولي/ برنامج مكافحة داء المذنبات الملتهبة onchocerciasis (WHO/ocp) في حوض نهر الفولتا. نتائج هذه الدراسات الحقلية من جراء الاستخدام العريض للباسيليس ثورينجينسيز تحت السلالة اسرائيلينسيز وحتى اليوم اظهرت أقل الاضرار على الاطلاق على أى من الكائنات غير المستهدفة تحت الاختبار. الزيادة للضعف او الثلاثة أمثال في كثافة أو شدة الانجراف النهاري أو الليلي تم تسجيلها أحيانا. مما يمثل أدنى تأثير بينى معاكس بالمقارنة بزيادة الانجراف ٢٠ - ٤٠ مرة نهائيا بشكل منظم في مناطق التدفق في تجارب WHO/ OCP بعد استخدام المركبات الكيميائية المختلفة تحت ظروف بيئية معروفة تماما.

من احدى نقاط الضعف في هذه الطريقة استحالة تحقيق الدقة وتحديد أى جزء من النظام البيئي اشترك في الانجراف نتيجة لاستخدام المبيد الحشري (سواء كان كيميائي أو ميكروبي). لاستيضاح هذا التساؤل تم تصميم نظام المزاريب gutter الذى يمكن من تحديد نظام الانجراف قبل وبعد الاستخدام. هذا النظام يسمح بالتحليل العميق لاشترك كل من الكائنات غير المستهدفة NTO فرادى او فى مجاميع فى زيادة الانجراف drift بما يسمح بتقييم دقيق وفى نهاية كل تجربة يمكن تقييم وتحليل تأثيرات كل وسيلة من وسائل المكافحة على مختلف الكائنات. لقد تم تلخيص مخرجات هذا التقييم وغيره فى اصدار الصحة العالمية (١٩٨٢) والذى خلص الى حدوث موت شديد لحشرات الهاموش "سيمبوليدى" مصحوبة بعدم زيادة معنوية فى معدل الانجراف للاحياء غير المستهدفة NTO فيما عدا الكيرونوميدي والارثوكلايدنى مع قليل من التأثيرات المعاكسة على مجتمع الحشرات (مقرسات السيمبوليدى). الكائنات غير الحشرية الوحيدة التى وجدت حساسة بشكل واضح للباسيليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرائيلينسيز هى القواقع من عائلة Aneyliidae.

لقد تحصل على ملاحظات وثيقة الصلة عن أملكن اخرى بخلاف غرب أفريقيا حيث أشارت التقارير الى عدم حدوث تأثيرات معاكسة من

الباسيليس الكيرونوميدي ومدى واسع من الكائنات غير المستهدفة بما فيها بعض التقارير من المجارى المائية الجارية الصغيرة فى نيو فونلاند، كندا التى عوملت بالمزارع المحلية وفى نيويورك حيث عوملت بمسحوق روجربيلون-8-153 وساندوز sandoz/WDC وغيرها من البرك كما فى كاماراج وفرنسا التى عوملت بمستحضر فيكتوباك. فى تجارب مستحضر نكنار فى المجارى المائية فى كيويك وجد Back وآخرون (١٩٨٥) عدم حدوث زيادة معنوية فى معدل انجراف حشرات عثلات كيرونوميدي، ايفيميروبترا، بليوكوبترا بينما حدث نقص من ٢٦ الى ٣٩% فى يرقات الكيرونوميدي من جنس Eukieffecella و Polyfedilum على التوالي فى الاوساط الصناعية. لقد لوحظ كذلك حدوث مستوى عالى من انجراف حشرات ثنائية الاجنحة/بليفاروكيردى بعد تطبيقان متتابعان من المستحضر البكتيرى. فى تجارب استخدم فيها ساندوز سان ٤٠٢/الامن فى قطع تجريبية ٠,٢ هكتار فى كاليفورنيا وجد أنه بينما لم تتأثر العديد من الكائنات غير المستهدفة NTO فان يرقات الكيرونوميدي التى جمعت فور الانتهاء من المعاملة ماتت جميعها بعد يومان فقط. لقد سجلت تأثيرات معاكسة شديدة على الكيرونوميدي من جراء استخدام مسحوق أبوت ABG-6108 فى فلوريدا (على ١٩٨١) حيث تراوحت نسب للموت ٢٣-٦١% (٢ كيلوجرام/هكتار) وحتى ٥٣ الى ٨٨% (١٠ كيلوجرام/هكتار) فى البرك التجريبية ٦٤x متر ٤٥-٦٠سم عمق على امتداد أربعة أسابيع وفى نفس الفترة تحققت مكافحة من ٢٧ وحتى ٦٥% فى يرقات الهاموش كيرونوميدي التى تعرضت لتركيز ٣ كيلوجرام/هكتار فى بركة واحد هكتار.

## ٢-٢. الدراسات متوسطة المدى Medium-term Studies

الدراسات على هذا المستوى أقل من تلك التى أجريت على المدى القصير والتى استهدفت لقاء الضوء عن تأثيرات المبيدات الميكروبية على النظم البيئية المائية وهذا قد يرجع الى التكاليف العالية والحاجة لأفراد مدربين جيداً وذوى خبرات على امتداد فترات طويلة. اذا أخذ فى الاعتبار القيام بملاحظات منتظمة على امتداد شهور عديدة فى دراسة ذات المدى المتوسط تبرز صعوبة تمييز التأثير الفعلى للمركب تحت الاختبار والنشوء الطبيعى للمجاميع الحشرية تحت الملاحظة.

من الامثلة التقليدية الدراسة التي قام بها الباحث Yamego (١٩٨٠) في قطاع صغير من المجارى المائية في وسط ساحل العاج. لقد تم تطبيق اسبوعى للباسيليس الاسرائيلية (مستحضر ساندوز ٤٠٢ IW.Dc) على امتداد شهرين. لقد درس نشوء المجاميع المعاملة من اللاقاريات خلال هذه الفترة وقرنت بنفس المجموع في القسم غير المعامل في نفس المكان. لقد استخدمت الطرق التقليدية في التقييم مثل أخذ عينات القاع والمركز والوسائط الصناعية والقياسات الداخلية لشدة الاتجراف. لقد خلص الباحث الى حدوث استجابة فورية لهاموش الكيرونوميدي (أورثوكلايني) بعد المعاملة الاولى (زيادة كبيرة في الاتجراف) ولم يحدث تأثير محسوس مع التطبيقات اللاحقة حيث زادت شدتها على الوسائط الصناعية وعلى الصخور في التيار الجارى بشكل منظم. لقد أظهرت حشرات تراكوبتر/هيدروبتيلا نفس نظام النشوء. هذا بينما حدث خفض معنوي كبير في مجاميع حشرات تراكوبتر/هيدروبتيلا وفيلوبوتاميدي في العدد خلال شهرى الملاحظات.

فحص مجاميع اللاقاريات التي تعيش على الصخور في المجارى المائية يظهر حدوث زيادة عامة في كثافة اللاقاريات خلال فترة الملاحظة في القسم المعامل وغير المعامل من تيار الماء مع كثافة أقل في القسم المعامل وهذه النتائج لم تتأكد احصائيا. لم تتأثر الكيرونوميدي بشكل كامل من جراء المعاملة وظلت كثيفة في كلا القسمين. لقد وجدت السيراتوبوجونيدي أكثر كثافة في القسم المعامل بينما حدث نقص واضح في كثافة هيدروبتيلا ونيبوليدي في المناطق المعاملة. لقد حدثت نتائج مشابهة في الاوساط الصناعية واختلفت النتائج بشكل بسيط في حالة عينات القاع الرملية. لذلك كان الخفض في أعداد الكيرونوميدي والتانترسيني واضحا وقد يرجع ذلك الى الترسيب العالي للمستحضر الميكروبي على القاع الرملي عما هو الحال على الاحجار والصخور والتي تنظف وتطهر بشكل منظم بواسطة تيار الماء الجارى.

**خلاصة القول** انه يبدو انه يحدث تحول في المجاميع بعد شهرين فقط من المعاملات المنتظمة. هذا الاستنتاج مبنى أساسا على نقص كثافة المجاميع التي لم تظهر حساسية على الاطلاق في الدراسات قصيرة المدى. على العكس فان الكيرونوميدي التي أظهرت حساسية في التجارب قصيرة المدى لم تتأثر

اطلاقاً من خلال المعاملات على المدى المتوسط. في هذه الحالات الخاصة يوجد احتمال قوى بأن النقص في أعداد الهيدروبسيكيدى المفترسة كانت نافعة لمجاميع الكرونوميدى وتعوض أى تأثير محتمل للباسبيليس ثورينجينسيز الاسرائيلية على هذه الحشرات.

### ٣-٢. الدراسات على المدى الطويل Long-term studies

مع بداية برنامج WHO/ocp عام ١٩٧٤ لمكافحة ناقل أخطر الامراض وهو سميلوم داموسوم والذى حقق نجاحاً خلال المعاملات الاسبوعية لمستحضر Abate (مبيد فوسفورى عضوى يسمى Temephos) في مواقع التوالد على امتداد حوض نهر فولتا. الظهور أو التطور العريض لظاهرة المقاومة لتيميغوس والمقاومة المشتركة للمبيد الكيمائى البديل الاول كلوروفوكسيم فى الانواع السيولوجية من معقد S.damnasum أكدت على ضرورة البحث واستخدام وسائل مكافحة اخرى مناسبة بما فيها الباسبيليس ثورينجينسيز. لقد تناولت دراسات التأثيرات البيئية على المدى الطويل فى برنامج WHO/ocp فى الاساس تأثيرات المبيد الحشرى. لقد كان هناك نصيب كبير للمستحضر الميكروبي خلال الثمانينات وبعدها حدث توسع فى استخدام مستحضر تكتار: بتركيز ١,٢ مللجم/لتر/١٠<sup>-</sup> من خلال التطبيقات الاسبوعية المنتظمة بطائرات الهليكوبتر أو ثابتة الجناح. الانهار الصغيرة كانت تعامل بكثافة على امتداد العلم. بينما الانهار الكبيرة كانت تعامل بالبدائل أو التبادل مع التكتار خلال موسم الجفاف (فترة الصرف أو التفريغ القليل) والمركبات الكيميائية العضوية (تيميغوس والكلوروفوكسيم) خلال موسم فيض الماء مع نزوة الانسياب. لسوء الحظ فإن تبادل المبيدات الميكروبية مع الكيميائية (القلل اختيارية) جعلت من المستحيل توصيف التأثيرات المعاكسة على الكائنات غير المستهدفة من جراء استخدام مركب عن وسيلة أخرى.

استخدام الباسبيليس ثورينجينسيز الاسرائيلية فى المجرى المائية حيث معدل التصرف أقل من ٥٠-٧٥ م<sup>٣</sup>/ثانية يعكس الحجم الطبيعى لمستحضر التكتار بالمقارنة بالتيميغوس. هذا بينما ان مجتمعات اللاقناريات المعرضة للمبيدات الحشرية تتغير لحد ما بين المواسم الجافة والرطبة مما لا يسمح بتقدير التأثيرات الموسمية للمركب الميكروبي على كائنات غير مستهدفة خاصة وكذلك على تركيب المجتمع المائى. مع هذا أمكن الحصول على نتائج

مثيرة من جراء مقارنة أحياء الانهار بعد المعاملة بالتكاثر لسنوات عديدة من خلال الاحياء المعروف وجودها قبل اجراء عمليات المكافحة.

**خلاصة القول** أنه تأكد ان بكتريا باسيلليس ثوريينجيميز الاسرائيلية من أكثر الوسائل الميكروبية كفاءة وفاعلية ومن ثم استخدمت على النطاق التجارى ضد افات نيماتوسيرا ونقلاات الامراض حيث تأكد أمنها على الكائنات غير المستهدفة NTO's وكل النظم البيئية. مع هذا ثار جدل كبير حول ضرورة توحيد قياسية الاختبارات الحقلية والمعملية على مستوى العالم على أساس قوانين كائنات الاختبار العريضة التواجد في المياه العذبة.

#### ب- بكتريا باسيلليس سفيريكس *Bacillus sphaericus* Neide 1904

عندما تؤخذ الكائنات غير المستهدفة في الاعتبار NTO's يجب أن يؤخذ في الحسبان كذلك مقدرة الباسيلليس سفيريكس ١٥٩٣ على البقاء والتكاثر في المياه الملوثة. البقاء ومدلومة المعيشة قد تستمر في تسعة شهور تحت بعض الظروف دون أى نقص في سمية النوكسين. من جهة أخرى فإن الباسيلليس سفيريكس حساسة لحد ما للأشعة فوق البنفسجية وقد وجد كذلك أن وجود كميات كبيرة من المواد العالقة في الماء (خاصة المادة العضوية) تحفز حدوث خفض في نشاط البرقات ضد البعوض. هذا العامل قد يعتبر موجبا أو ايجابيا مع كائنات NTO's اذا كانت جسيمات الرواسب العضوية بعد تكوين المخليبات مع الباسيلليس سفيريكس لن تؤكل بواسطة كائنات الاعماق وفي النهاية لوحظ أن سمية الباسيلليس سفيريكس لم تزيد بشكل معنوى عندما ارتفعت درجة الحرارة على عكس الباسيلليس الاسرائيلية. لقد لاحظ الباحثين أن تقلب أو رج مستحضر الباسيلليس سفيريكس كثيرا خلال النقل على سبيل المثال يمكن أن يزيد من تحطم الخلايا الجرثومية. هذا يؤدي الى خفض الكفاءة. على نفس المنوال فإن هذه الظاهرة يمكن أن تقلل من أى تأثير سام على الكائنات غير المستهدفة. من الاهمية بمكان أن تأخذ في الاعتبار كذلك أن الصعوبة تظل باقية في سبيل قياسية تخمر الجراثيم وإنتاج قطفات ذات كفاءة متساوية تجاه الكائنات المستهدفة. تمشيا مع هذا الوضع يمكن القول باختلاف سمية كل قطفة ناتجة من التخمر.

دراسات السمية على الباسيلليس سفيريكس ليست كثيرة بالمقارنة بما أجرى على الباسيلليس الاسرائيلية ولكن النتائج العامة التى تحصل عليها من التجارب المعملية

والحقلية أدت إلى استنتاجات مشابهة مما يوضح عدم ضرر السلالات المختلفة الشائعة الاستخدام في مكافحة الآفات.

لقد تركز الاهتمام على الكائنات غير المستهدفة NTO's في أماكن معيشة البعوض. مع الأخذ في الاعتبار النواحي التقسيمية أظهرت الدراسات التي أجريت على القشريات البلانكتونية أنه لا الحيوانات مجدافية الأرجل copepods ولا cladocerans تأثرت بتركيزات  $10^6$  من الخلايا البكتيرية لكل مليلتر. لقد كان ذلك هو نفس الوضع في حالات المجاميع الطبيعية لأنواع المونيا وأنواع السيبرس وغيرها في برك كاليفورنيا حيث استخدمت سلالات ١٩٥٣، ٢٣٦٢. على نفس المنوال لم تحدث أية تأثيرات معاكسة على الحبليات odonata وايغميروبترا (كاليبشيس) وغير متجانسة الأجنحة Heteroptera (كوريكسيدي، نونوكيدي) أو غمدية الأجنحة (دايتسيدي، هيدرونيليدي). من بين نصفية الأجنحة لم تلاحظ أية تأثيرات معاكسة على الهاموش كبرونوموس ستيجماتريس. كذلك اتضح أن أنواع الكبرونوميدي غير حساسة لأنواع الباسيلليس الاسرائيلية كما اتضح أن يرقات الجنس كيوليسويذر تأثر فقط ببكتريا باسيلليس سفيريكس بجرعات أعلى من تلك المطلوبة لقتل البعوض.

في دراسة حديثة حاول الباحث Sinere وآخرون (١٩٨٧) مكافحة مجاميع الهاموش في برك المياه الراكدة الضحلة في كاماراج بفرنسا بسبب أن الفوران في الحشرات كان يسبب مضايقات كثيرة. لقد تم استخدام السائل BSP2 المحتوى على السلالة 2762 من الباسيلليس سفيريكس عند جرعة تتراوح من ١-٩ لتر/هكتار (حوالي ٣ جزء في المليون) ولم تظهر المعاملة أية تأثيرات ضارة على أنواع الكبرونوموس سالينيناريس، هالوفيلس، بلاموسس وكذلك بعض الأنواع الأخرى من تانيزرساني وتانيوبوديي. لقد أدت هذه النتائج إلى الاقتراح بأن الباسيلليس سفيريكس أقل سمية على الهاموش من الباسيلليس الاسرائيلية.

لم تحدث أية سمية على الاسماك مع الجرعات العادية كما لم تلاحظ أية تأثيرات معاكسة على سمك الجامبوزيا أفينيس كما تأكد في تجربة استخدم فيها المسحوق القابل للبلل استوفّر للباسيلليس سفيريكس سلالة ١٥٩٣ وبعد أن ظل السمك في تلامس مع المحلول المحتوى على  $10 \times 10^6$  جرثومة لكل مليلتر لمدة ٩٦ ساعة. من أكثر التجارب اهتماما تلك التي أجريت بواسطة الصحة العالمية WHO حيث اتضح من التجارب الحقلية أن بكتريا باسيلليس سفيريكس (١٥٩٣، ٢٣٦٢) لم تسبب أية تأثيرات ملحوظة حيث أجريت تجربة معملية كذلك وفيها تم تقديم يرقات

البعوض المعدية بالباسبيليس سفيريكس فقط كمصدر وحيد لغذاء العديد من الاحياء المفترسة. لقد قدمت بركات الكيوليكس (L4) المعرضة لكمية ١٠٠٠ ملجم (١٠٠ مرة مثل المعدل القاتل لليرقات) لمدة أيام للمفترسات مثل ذباب الدراجون وذبابة الداسيل حيث تم توفير كل متطلبات هذه المفترسات بواسطة اليرقات التي كانت أمعائها مليئة بالجرعة القاتلة للباسبيليس سفيريكس (BSP-1, 2362). الافتراض على اليرقات المعاملة لم تحفز حدوث أية تأثيرات معاكسة جادة ولم تغير من معدلات تطور الكائنات المفترسة.

هذه النتائج ذات أهمية أولية خاصة اذا علمنا أن طريقة أو كيفية دخول الباسبيليس سفيريكس في جسم الحيوانات المائية يكون عن طريق التناول. عدم حدوث أية تأثيرات لهذه التركيزات العالية مع كل الكائنات المختبرة يوضح السمية الاختيارية العالية لهذه المستحضرات البكتيرية.

#### ج- عدوى الفيروسات العسوية infectivity of Baculoviruses

هذه الفيروسات فعالة في الاساس ضد الحشرات التي تحدث سقوط للأوراق. فيروسات البولي هيدروسيوز النووية (NPV's) من الجنس Baculovirus (Baculoviridae) أصبحت أكثر استخداما منذ تسجيلها حديثا ولو أن فعلها المرضي معروف منذ ما يزيد عن ٣٠ عاما. الاستخدامات عن طريق الرش الجوي أدت الى وصول تجهيزات الفيروسات العسوية الى الانهار والبحيرات أثناء المعاملة في الغابات ولهذا السبب تم دراسة المرضية التي قد تحدثها على الكائنات المائية. كذلك بالرغم من التخصصية النسبية الا انها أثبتت تأثيرات قاتلة على العديد من الحشرات (خاصة حرشفية الاجنحة) التي قد تسقط في الماء وتؤكل بواسطة الاسماك. بعض أنواع حرشفية الاجنحة المستهدفة (مثل عائلة pyralidae) تعمل خلال الطور اليرقي مكون أساسى من أحياء الاعماق في بعض أماكن المعيشة المائية. الخفض الهام في الكتلة الحيوية لهذه الكائنات قد يحفز حدث خلل محلي في السلسلة الغذائية ومن ثم يؤثر بشكل غير مباشر على مجموع الاسماك.

قبل أن نأخذ في الاعتبار مرضية الفيروسات العسوية على أحياء المياه العذبة يجب أن نأخذ في الحسبان كما أشار الباحث Groner وأخرون (١٩٨١) الى أن التركيزات العالية (حتى ٢٠/١٠، وحدات/هكتار) قد توجد بشكل متكرر في البيئة دون أن تحدث أية أضرار على المجاميع الطبيعية (الفقاريات واللافقاريات) التي توجد

طبيعيا في هذه البيئات. عندما تؤخذ السمية في الاحياء المائية يبدو واضحا أن البحوث المطلوبة الاجراء للكشف عن التأثيرات المعاكسة على الاسماك أكثر منها على اللاقاريات المائية بشكل متكرر يتم اجراء اختبارات مكثفة على الكثير من أنواع اللاقاريات المائية مثل الدافنياماجنا، نوتونكتا أنديولاتا وغيرها من حشرات نصفية الاجنحة وثنائية الاجنحة (كبرونومس). تم تعريض هذه الكائنات لتركيزات عالية ولكنها غامضة من الفيروس NPV للفراشة العجورية (تقريبا التركيز الذي يحدث عندما يتم رش البركة الضحلة جدا بمعدل  $3,75 \times 10^3$  PIB لكل هكتار. لم يلاحظ موت مباشر لهذه الكائنات. من الاهمية بمكان أن الدافنيا والنوتونكتا لا يحدث فيها تراكم لفيروس الفراشة العجورية كما ظهر تجارب التقييم الحيوى.

لقد تحصل على نتائج مشابهة بواسطة Geraci and Hicks (١٩٧٩) على الدافنيا بوليكس التي وجدت في المياه الملوثة بفيروس نبلية القش الصنوبر حمرء الراس والتي لوحظت لمدة ١٤ يوم. لقد تأكدت النتائج بواسطة باحثين آخرين عندما استخدموا تركيزات  $2,4 \times 10^3$  PIB من نفس الفيروس لكل مليلتر. في غياب الموت المباشر لم تلاحظ أية تأثيرات معاكسة على الكفاءة التناسلية كما لم تحدث أية تشوهات على الجسم. لقد اختبرت بعض اللاقاريات الاخرى كذلك كما في الاطوار الصغيرة من الجمبرى Penacid. في هذه الحالة تم اختبار فيروس NPV لنطاط البرسيم "اوتوجرافا كاليفورنيا" حيث تم الحقن او اعطاه مع الغذاء. في حالة الحقن العضلى كان تركيز الفيروس NPV المستخدم حوالى  $4,7 \times 10^3$  قضيبي فيروس لكل حيوان جمبرى. بعد ٣٠ يوم من الملاحظة لم نرى أية وفيات بسبب العدوى بالفيروس وليس من جراء الحقن أو تناول الفمى للفيروس. لفحص الدقيق للأنسجة الملوثة بحفقات الفيروس لم تؤدي للكشف عن أى بوليهيدرا نووية.

لقد كانت السمية على الاسماك محل بحوث ودراسات مكثفة كما أجريت دراسات خاصة عن التأثيرات الفسيولوجية للتلوث المباشر بواسطة الفيروسات العسوية (المعاملة بالانبوب، الحقن، التناول ....الخ).

لقد أظهرت جميع النتائج غياب السمية النسيجية التشريحية في هذه الكائنات. لقد اختير ١٢ نوع من الاسماك أسما الملمونيدى بنفس البروتوكول ونفس الشئ على الضفادع وتوصل على نتائج متطابقة. مزارع خلايا السمك التي تعرضت للفيروسات العسوية (فيروس فراشة توسوك دوجلاس) لمدة ٢٤ ساعة لم تظهر أية تغيرات مرضية كما لم تحدث تغيرات في معدل النمو.



كل هذه النتائج أشارت الى الاستنتاج العام بأن الفيروسات العضوية غير سامة على اللافقريات المائية والأسماك ولو أنه لم تجرى دراسات على المدى الطويل. للأسف الشديد لا توجد دراسات على المستوى العالمى للنظام البيئى وما فيه من تحورات مع وجود الفيروسات.

#### د- عدوى الميكروسبورديا infectivity of microsporidians

لمعلوماتنا لم يجرى الا القليل جدا من الدراسات عن مرضية البروتوزوا على الكائنات المائية غير المستهدفة NTO's وكذلك عن خصائصها الابدائية على الحشرات. بعض الميكروسبورديا الفعالة ضد يرقات البعوض أو هاموش عائلة سيموليدى تستطيع العيش والبقاء فى الحشرات الميته أو فى البيض المعدى الخصب لأكثر من عشرة شهور. النوزيما سيتجومايا والنوزيما الجيريا وجدت فى الطور الساكن فى بيض الأيديس لفترة تزيد عن العام ومن ثم تصبح بعد قدرة على تلويث المفترسات. جراثيم نوزيما الجيريا تظل حية لمدة ١- ٢ شهر على درجة حرارة ٢٠°م. لقد وجد أن النوزيما الجيريا وفافرا لا كيوليسيس قادرة على التأثير على العوائل المختلفة بما فيها الرخويات وسمك الكراى.

فى احدى الدراسات تمت تغذية تسعة مفترسات مائية على يرقات البعوض التى سبق عداها بكثافة بالنوزيما الجيريا. من بين هذه الكائنات غير المستهدفة استطاع أن ٥٠% من النوتونكتا انديولاتا (غير متجاسة الاجنحة) التى أختبرت طورت عدوى المفترسات الاخرى مثل الدراجون فلاى، هيدروفيليد ، نيبيد، ميجالوبتيران، ويمكايد وسمك أكل اليرقات جامبوزيا أفينيس تأثرت. اذا تم الاخذ فى الاعتبار أن تغذية الكائنات مباشرة بجرعة عالية من الممرض أكثر خطورة عما لو لامت مرة الماء الملوث مما جعل الباحثون يعملون الى الاستنتاج بأن النوزيما الجيريا آمنة للعديد من الكائنات المائية الاخرى. من جهة أخرى فإن المعدل المنخفض للوفيات فى اليرقات التى تتعرض للنوزيما الجيريا والفافرا كيوليسيز (فيما عدا فى حالة بعض الاتوفيلس) لا تشجع التوسع فى استخدام هذه الميكروسبورا.

**خلاصة القول** حول أخطار واضرار المبيدات الحشرية الميكروبية على احياء المياه العذبة: بعد هذا الاستعراض قد يكون من المفيد الإشارة الى بعض وأهم الاستنتاجات التى توصل إليها باحثون آخرون عن الأحياء المائية.

" ليس هناك خطر من التأثيرات المرضية للمبيدات الحشرية الميكروبية على الكائنات غير المستهدفة .... " يعتقد الكاتب أن الممرض يجب أن يسجل كوسيلة أمنة عندما يكون هناك دليل يؤكد ذلك وإذا لم يكن هناك دليل قوى لا يسجل المركب. بالطبع لا وجود لموقف "عدم الخطر no risk" وبالتأكيد هذا ليس موجود مع المبيدات الكيميائية وحتى مع الوسائل الحيوية حيث لا يمكن إثبات التأثيرات الموجبة بشكل مطلق.

"There is no danger of ill- effect of microbial insecticides on nontarget organisms..."

"I believe that a pathogen should be registered as safe when there is reasonable evidence that it is so and in the absence of concrete evidence that it is not. A "no risk" situation does not exist, certainly not with chemical pesticides, and even with biological agents one cannot absolutely prove a negative."

الآن أصبح واضحا أن مكافحة ناقلات الأمراض وكذلك الآفات الزراعية وتلك التي تصيب الغابات لا يمكن أن تعتمد كلية على استخدام الكيمائيات بسبب التخصصية المنخفضة لها وخطورة التلوث البيئي وكذلك زيادة ظاهرة المقاومة في الحشرات بعد الاستخدام المكثف. الممرضات الميكروبية ذات مقدرة فائقة ولكنها بالضرورة خاصة مع النظم البيئية للمياه العذبة تحتاج عناية أكثر من تأثيراتها المحتملة.

بالرغم من الكم الهائل نسبيا من الدراسات والتطبيقات الخاصة ببيكتريا الباسيلليس ثورينجينسيس الاسرائيلية الا انه يبدو ظهور وبروز كم هائل أيضا من الأسئلة التي تحصل عنها اجابات جزئية غير كاملة. لقد سجلت ونشرت هذه الأسئلة بواسطة الباحث Forsberg وآخرون (١٩٧٦) في معرض الحديث عن سمية الباسيلليس ثورينجينسيس والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- ١- ماهي التأثيرات السامة لمكونات المستحضرات التجارية للمبيدات الحشرية الميكروبية على المدى المتوسط والطويل؟
- ٢- ما هي كمية المستحضر التي تدخل الى البيئة ولاى مدى تظل ثابتة من حيث المكونات السامة فى كل من النظم المختلفة للتطبيق؟
- ٣- ما هي التأثيرات على النظم البيئية التي ترتبط بالاستخدامات الحقلية الواسعة وعلى المدى الطويل للمبيدات الحشرية الميكروبية؟

٤- هل الاستخدام المكثف للمرضات الحشرية تؤدي الى حدوث طفرات فيها؟ هل الوسائل الميكروبية حساسة للتحورات بواسطة النقل الوراثي في صور أخرى؟ هل هذه الصور الجديدة قادرة على انتاج مكونات سامة او مكونات ذات سمية محورة او تخصصية للعائل؟

هذه الأسئلة تفتح مجال خصب للدراسات والبحوث على المستوى الاساسي والتطبيقي بما يتواصل مع حملات الاستخدامات الهادفة لهذه الوسائل الميكروبية. خلاصة القول أنه قد يكون هناك واقع وجود فيض كبير من الاختبارات المعملية على بكتريا الباسيلليس الاسرائيلية ومع هذا نعانى من نقص شامل في اتجاه قياسية الدراسات المعملية والحقلية قادرة على تغطية كل المبيدات الحشرية الميكروبية. إن الاتفاق على اختبارات غريبة وتفعيل دقيقة ومنطقية سوف تمكن من الحصول على بيانات مقارنة بما يؤدي الى الحصول على تقييم أفضل للسمية تحت مختلف ظروف التطبيق. في هذا المقام فان طرق وخطوات اختبارات الأمان للوسائل البكتيرية والفطرية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية WHO (١٩٨١) يعتبر دليلا جيدا يحتذى به لوضع مواصفات قياسية أكثر عقلانية عن الأمان البيئي للبيئات المائية.

## REFERENCES

- Ali, A., *Bacillus thuringiensis* serovar. *Israelensis* (ABG- 6108) against chironomids and some non-traget aquatic vertebrates, *J. Invertebr. Pathol.*, 38, 264, 1981.
- Back, C., Boisvert, J., Lacoursiere, J. O., and Charpentier, G., High- dosage treatment of a Quebec stream with *Bacillus thuringiensis* serovar. *Israelensis*: efficacy against black fly larvae (Diptera: Simuliidae) and inpoat on non- target insects, *Con. Entomol.*, 117, 1523, 1985.
- Colbo, M. H. and Undeen, A. H., Effect of *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* on non- target insects in stream trials for control of Simuliidae. *Mosq. News*, 40, 368, 1980.
- Dejoux, C., Gibon, F. M., and Yameogo. L., Toxicite pour la faune non- cible de quelques insecticides nouveaux utilizes en milieu aquatique tropical IV. Le *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*, *Rev. Hydrobiol. Trop.*, 81, 31, 1985.
- Foresberg, C. W., Henderson, M., Henry, E., and Roberts, J. R., *Bacillus thuringiensis*: Its Effects on Environmental Quality. Report 15385. National Research Conucil of Canada. ACSCEQ. 1976.
- Garcia, R., Federici, B. A., Hall, I. M., Mulla, M. S., and Schaeffer, C. H., BTI. A potent new biological weapon, *Calif. Agric.*, 34, 18, 1980.
- LACEY, L. A., Escaffre, Philippon, B., Seketeli, A., and Guillet, P., Large river treatment with *Bacillus thuringiensis* (H- 14) for the control of *Simulium damnosum* s.l. in the Onchocerciasis Control Programme, *Z. Tropenmed. Parasitol.*, 33, 97, 1982.
- Mastri, C., Four- day fish toxicity study on *Bacillus thuringiensis*, Industrial Biotes Laboratories Ltd., information supplied by abbot Laboratories, North Chicago, Ill., 1970.
- Purcell, B. H., Effects of *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* on *Aedes taeniorhynchus* and some non- target organisms in he salt march, *Mosq. News*, 41, 476, 1981.
- Schnetter, W., Engler, S., Morawcsik, J., and Backer, N., Wirksamkeit von *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* gegen Stechmuckenlarven und Nontarget- Organismen, *Mitt Dtsch. Ges. Angew. Entomol.*, 2, 195, 1981.
- WHO, Informal Consultation on the Development of *Bacillus sphaericus* as a Microbial Larvicide, WHO/ TDR/ BCB/ *sphaericus*/ 85.3, mimeographed document, World Health Orhanization, 1085.
- Yameogo, L., Modification des Entomocenoses d'un Cours d'Eau Tropical Soumis a Traitement An- tisimulidien avec *Bacillus thuringiensis* var. *Israelensis*, Mem. D'ingenieur de l'Universite de Ouagadougou, mimeograph, 1980.

## الفصل الثالث

### التأثير الفعال للمبيدات الحشرية الميكروبية على البيئات البحرية ومصبات الانهار

من مقالة للباحث Couch and Foss اللذان قدما المقالة بالقول أن المناطق الشاطئية وعند مصبات الانهار تعتبر بوجه خاص مناطق تأثير للمنتجات وغيرها من تتابعات المشاريع الانسانية. لحق زمنية كثيرة كانت هذه المناطق أماكن امتصاص تأثيرات الكيمائيات الصناعية والزراعية مثل ذلك أن المبيدات الكيميائية تدخل المياه العذبة ومناطق مصبات الانهار والشلطان على مستوى العالم منذ ما يسبق الحرب العالمية الثانية. في السنوات العشرين الأخيرة تم تطوير وسائل مكافحة آفات حية وجديدة (فيروسية، بكتيرية، فطرية، بروتوزوا) كي تستخدم في برامج مكافحة المتكاملة للآفات من مفصليات الأرجل وناقلات الامراض. هذه الوسائل الميكروبية تقدم بدائل واعدة يمكن أن تحل محل المبيدات العضوية المخلقة الضارة. بسبب أن الوسائل الميكروبية يجب أن تظهر مستويات عالية من الأمان على الكائنات غير المستهدفة (NTO's) والنظم البيئية قبل أن تستخدم على نطاق واسع فقد تركزت الاضواء والاهتمامات في الوقت الراهن بشكل مثير للانتباه عن امكانيات تأثيراتها البيئية في المناطق الشاطئية خاصة عند مصبات الانهار والتي تحول مئات من أنواع الكائنات الحية غير المستهدفة. الاسماك واللافقاريات (خاصة الرخويات ذات الصلمان والقشريات) عندها مقومات التعرض للوسائل الميكروبية التي تدخل الى منطقة خلط المياه العذبة والمالحة عند مصبات الانهار. من الاهتمامات الخاصة حقيقة أن المنطقة التي يحتمل وجود معظم الوسائل هذه (مثل الفيروسات والبكتريا والفطريات والبروتوزوا) تحتوى أنواع مرافقة عامة مشكلة congenetic وهي عبارة عن طفيليات طبيعية و/أو ممرضات في العوائل الفقارية واللافقارية غير المستهدفة في الشواطئ ومصبات الانهار.

أنواع كل الحشرات والقشريات جميعا مفصليات أرجل دقيقة تعتبر في الغالب من العوائل الشائعة للممرضات الميكروبية من نفس القبيلة الميكروبية العالية (الجنس وما أعلاه). هذه الاجناس الميكروبية (التي توجد في الحشرات والقشريات) لا ترتبط من الناحية التقسيمية فقط ولكن أنواعها تنقسم نفس طرق احداث العدوى والمرضية وأحيانا السمية. بسبب أن معظمها يقع تحت المتطفلات والممرضات الا أن تحورات نشوء النطف أدت الى العديد من التأثيرات المشابهة على عوائلها المختلفة. مع حقيقة

نقسم الخصائص المرضية الا أنه توجد اختلافات كبيرة تشير وتؤكد ظاهرة التخصص العوائلى. فى معظم الحالات وبسبب استقرار وجود التخصص العوائلى لا يوجد من يتوقع وجود متطفلات ذات علاقات تطور ونشوء طويلة فى العوائل سواء كانت حشرية أو قشرية مع فجائية قبول واستغلال مجموعة جديدة من العوائل فى الطبيعة حتى ولو كانت العوائل المؤثرة تقع فى نفس المملكة التصنيفية. لذلك فان الكثير من الاهتمامات حول الاخطار المؤثرة لوسائل مكافحة الميكروبية للأفات على الانواع غير المستهدفة تركز على الاستثناءات الممكنة عن المتوقع خاصة عندما ترتبط الانواع غير المستهدفة عن قرب مع العائل الطبيعى العادى والتى قد تتعرض فجائيا لجرعات عالية من هذه الوسيلة الميكروبية.

هذه النقاط النظرية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط لتقدير وتحديد امان الوسائل الميكروبية المستخدمة فى مكافحة الافات على الكائنات غير المستهدفة NTO's فى أى بيئة أو مكان معيشة. هذه الدراسات تجرى فى الجامعات وفى المعامل الحكومية والخاصة على مستوى العالم. هذه الدراسات تبنى على فرضية باطلية محتواها أن العدوى والتأثيرات المرتبطة بها لا تحدث فى الكائنات غير المستهدفة. فى الوقت الراهن لم ترفض هذه الفرضية بناء على نتائج التعرض التجريبي للأنواع البحرية وعند مصبات الانهار غير المستهدفة فى مقابل طرق التعرض الطبيعى للتركيزات العالية نسبيا للاطوار المعدية من المبيدات الحشرية الميكروبية.

#### وسائل مكافحة الميكروبية ودراسات الامان:

فى الوقت الحالى تم اختبار عدد قليل من الميكروبات لتحديد الامان على أنواع الكائنات البحرية وعند مصبات الانهار غير المستهدفة. الغرض من هذا القسم يتمثل فى استعراض الدراسات وثيقة الصلة بالموضوع والتى شملت الاقترابات وتصميم التجارب وأنواع الميكروبات المختبرة والنظم المستخدمة والنهايات والنتائج التى تم تقييمها لتقدير مخاطر هذه الوسائل على الانواع البحرية غير المستهدفة. هذا الاستعراض المرجعى يرتب فى مراتب تبعا لنوع الوسائل الميكروبية على النحو التالى: فيروسات، بكتيريا، فطريات، بروتوزوا.

#### أ- الفيروسات (كمثال الفيروس العصى لحشرة أوتوجرافا كاليغورنيكا = (ACB)

لقد كان أساس الاختيار المدى العوائلى العريض بين حشرات حرشقية الاجنحة عما هو معروف جيدا عن الفيروسات العصبية وكمثال دودة الذرة *Heliothis zea*. لقد

تم تطوير عدد من الفيروسات العسوية من الحشرات للاستخدام العملي في مكافحة الآفات الزراعية. حديثاً وجد أنه يوجد على الأقل ثلاثة أنواع enzootic من الفيروسات العسوية في الجمبرى والسلطعون crabs لاقت اهتمام نحو تحديد الامان من الحشرات الى القشريات وغيرها من الكائنات غير المستهدفة عند مصبات الانهار.

١- كيفية إحداث الفعل المفترض في العوائل الطبيعية:

الاجسام الضمنية inclusion في الفيروس العسوى تحتوى العديد من الفيرونيات ذات الشكل القضيبى من مادة البروتين. الاجسام الضمنية هي الوسيلة التى توجد وتبقى فيها الفيرونيات المعدية حتى تصل الى المسكن الدقيق الملائم وهو معدة الحشرة القابلة للاصابة. تحصل الحشرات على الاجسام الضمنية عن طريق التغذية على مواد ملوثة بالبراز من جنث الحشرات المريضة أو فى حالة المبيدات الميكروبية بعد الانتاج الكثيف فى المعمل والتطبيق فى الحقل. بمجرد الوصول الى معدة الحشرة المستهدفة وعند درجة حموضة عالية (١٠-١٢) يتم ذوبان مادة بروتين الجسم الضمين. يتم تحرير وانفراد الفيرونيات فى تجويف المعدة فى منطقة قريبة من الخلايا الطلائية القابلة للاصابة. المستقبلات على غلاف الفيرون أو الخلية يسمح بالارتباط بقسم microvilli الخلية الطلائية. الكابسيد النووى nucleocapsid للفيروس تتخل السيتوبلازم القمى للخلايا من خلال ميكانيكيات غير معروفة ثم نهاجر الى الغلاف النووى. بعد ذلك يقوم الكابسيد النووى بتوجيه وضبط نفسه عند الثقب النووى وبحقن (غير مغلف) الحامض النووى الدنا الخاصة به فى البلازم النووى. يحدث تكامل للدنا الفيروسي فى جينوم خلية العائل وكذلك تضاعف الفيروس ثم يبدأ انتاج الجسم الضمين خلال ساعات من التكامل.

التأثيرات الخلوية المرضية Cytopathic تحدث فى هذا الوقت فى خلايا الحشرات المصابة بما فيها تحلل Lysis أو تكسر breakdown الخلية بسبب نمو الاجسام الضمنية وفقد تكامل تركيب الخلية مع امكانية التغيرات الكيميائية غير العكسية irreversible التى لا شفاء منها فى الخلية. فهم هذه الاحداث فى العوائل الطبيعية للفيروسات العسوية مثل الحشرات والقشريات تقدم ملاحح لنهائيات التأثير فى دورة العدوى والحالة المرضية التى يجب أن تستخدم فى الدراسات المنظمة على الحيوانات غير المستهدفة. من الواضح أهمية استخدام بعض الطرق الهامة مثل الميكروسكوب الضوئى والميكروسكوب الالكترونى (EM) والاختبارات

السيولوجية وطرق المجس الوراثى فى قياس نهايات التأثيرات المختارة endpoints.

## ٢- دراسات الامان:

لقد قلم Lightner وآخرون (١٩٧٣) بلجراء أول اختبار على الفيروس العصى الحشرى فى مفصليات الارجل غير الحشرية وهو الجمبرى الابيض P.setiferus والجمبرى البنى P.aztecus. لقد تم تعريف الاطوار الشابة لمبكرة والمتأخرة juvenile stages الى الفيروس العصى من حشرة نطاط الرسم "أوتوجرافا كاليفورنيا" عن طريق الحقن العضلى والتغذية ببولى هيدرا الفيروس. لقد تم اجراء فحص تفصيلى بالميكروسكوب الضوئى والالكترونى للنسجة الاساسية من الجمبرى المعرض واتضح عدم حدوث عدوى مؤثرة أو مرضية مرتبطة بالفيروس. كذلك لم يحدث موت مرتبط بالتعرض. لقد تم نشر دراسات مكثفة عن احتمالات تأثير فيروس الحشرات على الاحياء البحرية بواسطة Couch وآخرون (١٩٨٤) حيث قاموا بتقدير امكانية حدوث العدوى والمرضية أو السمية من الفيروس العصى A.californica فى نوعين من جمبرى مصبات الانهار P.pugio، P.vulgaris وسوف نشير لهذه الدراسات لاحقا بالتفصيل.

## ٣- حيوانات وظروف الاختبارات:

لقد تم جمع الجمبرى البالغ من مراند تولجده وتم أقلمته لمدة ٣٠ يوم فى حوض كبير فى الخارج. لقد تأكد من عدم وجود مسبق للاجسام الضمنية للفيروس أو غيره من الممرضات من خلال العينات الروتينية للفحص النسيجى والتي تتخذ كأساس. الانسجة تحت الفحص تضمنت المعدة والمعى الاوسط والمعى الخلفى والبنكرياس الكبدى والعضلات والغدد. تم ملأ الجارات الزجاجية بقشر المحار النظيف مع نظم ترشيح بمياه البحر المرشحة (٢٥%). خلال اختبار الثبات static test كان يجرى تعويض الفقد بالبخر بواسطة المياه غير المتأينة. تم اختيار الجمبرى من المجموعة المتأقلمة ضمنا لتجانس الحجم وعدم أخذ الجمبرى الحبلى أى أخذ الافراد غير الحبلى nongravid وتوضع فى أوعية اسطوانية مغطاة بالشاش المتقّب. بعد ذلك تم وضع الاوعية المقفولة على صوانى زجاجية فى المربى المائى aquaria التجريبي والمقارنة حيث كان يضبط مستوى الماء تحت قمة الاوانى مباشرة. فيما عدا حالات الحقن اتضح أن تعرض حيوانات الاختبار من خلال التغذية هى افضل الطرق الطبيعية كما انها الطريقة المؤكدة للتأكد من



التعرض الداخلى للفيروس. خلال فترة الثلاثين يوما من الأقامة فى مربى الاختبار تم اجراء محاولات تغذية مختلفة لتعظيم المعيشة وضمان صلاحية التحليل الاحصائى للاختبار. الامداد غير الملائم للغذاء يسبب الافتراس بينما الافتراط فى الغذاء يسبب التلوث البكتيرى والتي تنتهى حياة الجمبرى. لقد وجد أن تعرض الفيروس يتأكد ويكون مضمونا اذا تمت تغذية الجمبرى على كريات الطعام الملوثة بالفيروس مرتان فى الاسبوع (كرية واحدة مع كل وعاء مع كل تغذية) مع التخلص من الطعام الزائد من الاوانى فى اليوم التالى.

خلال الاختبار كان يتم فحص الجمبرى مرتان فى اليوم للتأكد من أن الافراد الضعيفة أو الميتة تم أخذها فى الوقت المناسب للفحص النسيجى. كل الحيوانات التى تموت خلال الاختبار يتم تثبيتها فى خليط مثبت للفحص بالميكروسكوب الضوئى والالكترونى.

#### ٤- الفيروس - التجهيز والتغذية

لقد تم تغذية الجمبرى على تحضير نقى من فيروس البولى هيدروزيس النووى A. californica والفيروس العصى الممرض الذى ينتج فى الحشرة العائل "الدودة القارضة" *Spodoptera exigua*. لقد تم تجهيز الغذاء المحتوى على الفيروس بطحن فثور عليفة السمك القياسية فى صورة مسحوق دقيق واطافة الكمية المعلومة من الفيروس ثم ضغط المسحوق فى كريات مع وحدة عمل الكريات التجارية.

الكريات الخاصة بالمقارنة كانت خالية من الفيروس. كل كرية كانت تزن حوالى ٢٠. جرام بالتقريب. لقد كانت تتم تغذية الجمبرى مرتان فى الاسبوع مع كرية واحدة فى كل ابناء. حيوانات المقارنة كانت تتغذى على كريات خالية من الفيروس. جمبرى التجريب كلن يتغذى على كريات تحتوى على  $10 \times 10^6$  أجسام تضمينية للفيروس PIB's لكل كرية. هذا التركيز يزيد عن الكمية المطلوبة كى تسبب موت مؤثر فى الحشرة العائل (أكثر من  $10 \times 3$  مرة من تركيز الجرعة القاتلة (Ldao). بعد كل يوم من بداية التغذية يتم ازالة الاكواب الى صوانى بلاستيك ثم يتم تنقيط الغذاء للزائد فى خزان زجاجى كبير ثم لقاء الاكواب الى الخزانات. يتم تخليص البقايا الملوثة بالفيروس من التلوث عن طريق اضافة هيبوكلوريت الصوديوم الى الاناء الزجاجى والعينة البلاستيك وأدوات المطبخ. المخلفات من مربى المقارنة تغسل فى حوض به ماء الحنفية.

## ٥- التقييم الحيوى للغذاء

لقد تم اجراء التقييم الحيوى لكريات الطعام التجارية التى تستخدم لتغذية الجمبرى عن طريق وضع ٢ جرام من غذاء الجمبرى فى بيئة الحشرات نصف المخلفة ثم وضع واحدة من حشرات يرقات نطاط الكرب الحديثة الفقس neonatant (ترايكوبلوزيانى) فى كل كوب تقييم. بالنسبة للمقارنة يتم تقديم غذاء غير ملوث ويقدم الغذاء المحتوى على الجرعة القاتلة النصفية  $Ld_{50}$  من البولى هيدرا فى عينات التجريب المعاملة. كان يتم استخدام ٣٦ يرقة فى كل مكرر من المكررين أى كان يتم تعريض ٧٢ يرقة T.ni لغذاء المقارنة و ٧٢ يرقة أخرى للغذاء المجرع بالبولى هيدرا كذلك كان هناك ٧٢ يرقة P.ni و ٧٢ يرقة دودة قارضة S.exigua كمجموعات ضابطة للمقارنة مع عدم اضافة غذاء المقارنة أو البولى هيدرا الى بيئة الحشرات نصف المخلفة.

## ٦- الاختبارات السيولوجية

لقد تم انتهاء الاختبارات بعد ٣٠ يوم فى التعريض وبعدها تم قتل كل الحيوانات الحية التى دومت المعيشة وتم تجهيزها. العينات المجمدة من الجمبرى المعرض وكذلك المقارنة (كلاهما كان يشمل الجسم كله والاحشاء) تم تجهيزها للاختبارات السيولوجية. لقد تم تجهيز السيرم المضاد Antisera ضد البولى هيدرا AcB الكلية وبروتين بوليهيدرا AcB وبروتين بوليهيدرا الفيروس العضوى لحشرة T.ni تبعاً لطريقة Tompkins (١٩٧٩). تم ترسيب مضاد السيرم باستخدام سلفات الامونيوم وتخزينها على درجة -٥٢٠م. تجرى اختبارات الانتشار المناعى immunodiffusion ضد الثلاثة مضادات السيرم والبولى هيدرا AcB فى الدودة القارضة باستخدام ١% بيو- راد أجروز فى المنظم تريس - باربيتال درجة حموضة ٨.٦. تم تحضير الشرائح لمدة ٧٢ ساعة على درجة حرارة ٥٤م فى حجرة الرطوبة ثم يضاف إليها ٠.١ مليلتر كلوريد صوديوم لمدة ٣ ساعات ثم تغسل بالماء المقطر لمدة ١٠ دقائق ثم تصبغ فى محلول ٢% توماسى برلينيت الأزرق R- 250 ثم تزال الصبغة وتصور. يتم اجراء الفرد للكهربى المناعى فى شرائح زجاجية ١٠x١٠سم تحتوى على وسط من ١٥ مليلتر من ١% بيو - راد أجروز فى المنظم مع درجة حموضة ٨.٦. تخرم الجدران فى الوسط ويضاف الانتيجين المناسب. يجرى الفرد للكهربى فى المنظم تريس - باربيتورات عند ٨,٣ v/cm على ٥٩م لمدة ساعة و ٤٥ دقيقة. بعد الفرد الكهربى يضاف الانتيسيرا

المناسب ثم يتم تحضير الشرائح على ٧٣ ساعة عند ٥٤م في غرفة الرطوبة وتنسل وتصبغ وتزال الصبغة كما وصف قبلا مع شرائح الانتشار المناعى. يتم تعريض كل الروايق supernates لعينات للمعاملة والمقارنة من الجمبرى المهرس والكريات بعد اضافة اومول كربونات صوديوم إلى او مليلتر كلوريد صوديوم الى الفرد الكهربى الخاص بالانتشار المناعى باستخدام مضاد السيرم ضد فيروسات T.ni وبروتين البولى هيدرا و/أو مضاد السيرم الى بروتين AcB.

#### ٧- الهستولوجى Histology

الجمبرى الذى استمر فى المعيشة تقطع فى نهاية الاختبار وتحفظ فى مثبت Davidson. يتم ازالة كل الاحشاء كاملة وتجهز للفحص بالميكروسكوب الضوئى. بعد الغمس فى البارافين يتم عمل قطاعات طولية ٧ ميكرومتر وتصبغ روتينيا بصبغة هيماتوكسيلين لهريس والأبوسين أو بطريقة البروموفينول الأزرق المحورة. يتم فحص القطاعات للكشف عن الاجسام القرينة مع التركيز الخاص على أنوية بنكرياس الكبد وخلايا المعى الاوسط.

#### ٨- الميكروسكوب الالكترونى EM

عينات البنكرياس الكبدى فى حيوانات المقارنة والمعاملة التى تحفظ للفحص الميكروسكوبى الالكترونى يتم تثبيتها وتجهيزها وغمسها فى الايون. قطاعات الفضة تقطع على الميكرونوم الدقيق "النرا" ثم تصبغ باليورانيل أسينات وسترات الرصاص. يتم البحث عن الانوية وسيتوبلازم خلايا بنكرياس الكبد من العينات العشوائية عند ٢٥٠٠x وحتى ٥٠٠٠x فى الميكروسكوب الالكترونى Zeiss EM10. يتم فحص كل القطاعات على كل مصبغة grid والكشف عن وجود أو غياب الاجسام الضمنية inclusion body والفيروس أو التأثير المرض على الخلايا Cytopathic effect.

#### ٩- نتائج التقييم الحيوى للمادة فى العواقل الحشرية الطبيعية

لقد حدث موت أقل من ٥% فى يرقات الحشرات T.ni أو الدودة القارضة S.exigua التى تغتذ على غذاء جمبرى مصنع بدون الفيروس. لقد وصلت نسبة الموت الى ٤٧% فى يرقات T.ni التى تغتذ على غذاء أو عليقة جمبرى تحوى على الجرعة النصفية القتلة LD5٠ من AcB و٥٤,٦% موت بين حشرات الدودة القارضة.

## ١٠- الملاحظات الشاملة للعوائل غير المستهدفة خلال الاختبارات

عينات الجمبرى فى المقارنة والمعاملات التجريبية بعد ادخال الفيروس لم تظهر اختلافات فى سلوك التغذية ولا الاتزان equilibrium أو النشاط. لقد وصلت النسبة خلال الاقلية فى الاوانى الموجودة فيها الى ٣٥-٤٠%. خلال الاختبار وصلت نسبة الموت (خلال ٣٠ يوم) ٣٠% بين حيوانات المقارنة فى مقابل ٢٨% فى حيوانات المعاملات التجريبية.

## ١١- نتائج الاختبارات السيرولوجية

أظهرت نظم الانتشار المناعى Immunodiffusion حزم الجسم المناعى المرسب precipitin مشابهه بين مضاد السيرم ضد بروتين البولى هيدرا للحشرة أوتوجرافا كاليفورنيا ومضاد السيرم antisera ضد البروتين بوليهيدرا T.ni لبروتين بولى هيدرا A.californica. ولو أن بروتين البولى هيدرا أ. كاليفورنيا لم يعطى تفاعل مرئى مع الانتشار المناعى الا أنه يعطى حزم الاجسام المضادة المترسبة مشابهه بواسطة الفرد الكهربى المناعى حيث أن الانتيسيرا ضد بولى هيدرين T.ni وأ. كاليفورنيا بوليهيدرين تعطى معظم الحزم السائدة سواء استخدمت مع باقى اختبارات الانتشار المناعى والفرد الكهربى المناعى. لم يتم الحصول على دليل سيرولوجى عن وجود بروتين البولى هيدرا أو بروتين الفيرون عن طريق الانتشار المناعى أو الفرد الكهربى المناعى باستخدام الانسجة الداخلية للجمبرى المعرض. كذلك كانت اختبارات التثبيت المكمل سالبة.

## ١٢- نتائج اختبارات السمية المرضية Histopathology

الفحص بالميكروسكوب الضوئى لم يكشف عن وجود اختلافات بين أنسجة الجمبرى فى عينات المقارنة التى عرضت للفيروس PIB's. لم يوجد دليل عن حدوث عدوى (اجسام ضمنية) أو أى استجابة مرضية أخرى فى البنكرياس الكبدى أو المعى الاوسط ولم تشاهد أكلة عن حدوث تغيرات فى الانوية أو السيتوبلازم والتى تشير الى حدوث عدوى فيروسية.

## ١٣- نتائج الفحص بالميكروسكوب الالكترونى

لم يظهر الفحص المنائى فى المجالات المطلوبة فى القطاعات المتباية الدقة للبنكرياس الكبدى أية علامات عن العدوى الفيروسية أو النشاط المرضى الخلوى فى الحدوى الفيروسية.

## ب- البكتريا (كمثال باسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع كورسناكي)

### ١- كيفية إحداث الفعل المفترض في العوائل الطبيعية

تتكون تحضيرات الباسيلليس ثورينجينسيز من الجراثيم وأجسام شبيهة الجراثيم (بلورات). يحدث التأثير السام عندما تنوب أجسام أشباه الجراثيم Parasporal bodies وتنشط بواسطة انزيمات تجويف المعدة gutlumen مما يؤدي الى انفرد اندوتوكسين البروتين ويسبب انتفاخ وتحطم الغشاء الطلائي للمعدة. قد يحدث الطور المعدى عندما يتحطم الغشاء الطلائي للمعدة. كان يعتقد أن تسرب الهيموليف في تجويف المعدة والذي يخفض من رقم الحموضة ينشط انبات الجراثيم والتي تحدث فقط مع بعض مجموعات الحشرات ولا تمثل أهمية بالنسبة للمرضية في معظم الاحوال. يتبع ذلك مرور الباسيلليس أو الاطوار الخضرية خلال المعدة المحطمة في الهيموسيل. في داخل الهيموسيل يحمل الباسيلليس خلال الحيوان. يحدث تلف كبير في المعدة والأنسجة الداخلية بواسطة الاندوتوكسين والنمو الخضرى للباسيلليس ثورينجينسيز وكذلك تحت النوع اسراتيلينسيز.

### ٢- حيوانات وظروف الاختبار

تم الاختيار والاتفاق على جمبرى الجزس Palaemonetes pugio لهذا الاختبار. تستخدم طريقتان من التعرض للباسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع كورسناكي: ١- كريات الطعام، ٢- المعاملة المباشرة عن طريق الانبوب الفمى gavaging. بالنسبة للجمبرى المعرض لكريات الطعام فان ظروف الاختبار تشمل نظام التغذية والتنظيف والتخلص من التلوث وهى نفسها كما ذكرت مع المواد الفيروسية. المعاملة الانبوبية الفمية تجرى عن طريق حقن محلول مادة الاختبار في التجويف الفمى. تؤخذ عينات الهستولوجى فى وقت المعاملة الانبوبية وبعد ١٢،٣،٦ ساعة من المعاملة.

### ٣- البكتريا: التجهيز والتغذية

استخدم مستحضر مسحوق جاف من التجهيز التجارى للباسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع كورسناكي (قدرة ٤٠٠٠ وحدة دولية لكل ملليجرام). يتم تجهيز كريات الطعام عن طريق طحن قشور السمك الى مسحوق دقيق واضافة كمية معلومة من المسحوق الخام. يجهز الغذاء فى كريات كل منها يزن جرام تقريبا بقدرة ١٦٠٠٠٠ وحدة دولية تقريبا لكل كرية. يتم خلط معلق مركز من الباسيلليس ثورينجينسيز وماء البحر ويحقن فى التجويف الفمى لكل حيوان جمبرى والذى لم

يتغذى خلال الساعات الاربعة والعشرين السابقة باستخدام حقنة دقيقة ميكروليتر. يتم حقن ما يقرب من ٨ميكروليتر من المعلق بكفاءة ٢٥٦٠ وحدة دولية في التجويف المعى لكل حيوان جمبرى. المعلق يتجاوز الطول الداخلى للقناة الهضمية فى أقل من ٢ ساعة مما يوضح ظهور شرائط براز جديدة.

#### ٤- التقييم الحيوى للطعام

يجرى اختبار لكريات الطعام فى المقارنة ومعاملات التجريب لتحديد الكفاءة والعفوانية فى العوامل الحشرية الطبيعية. يجرى التقييم الحيوى على T.ni والدودة القارضة S.Frugiperda و S.exigua عن طريق التغذية السطحية وكذلك الغرس فى الغذاء. يتم استخدام كرية واحدة لكل ٢٤ وعاء كل منها يحتوى على حشرة واحدة. يتم عمل معلق للكربية فى ٥ مليلتر ماء مقطر ثم تخط وتقط على سطح الوعاء ويسمح لها بالجفاف أو تخط مع الغذاء وتسكب فى الوعاء قبل وضع الحشرة الحديثة الخروج neonate فى الوعاء.

#### ٥- الهستولوجى - التعرض بواسطة كريات

تم قتل كل الجمبرى الذى تعرض للمعاملة وظل على قيد الحياة وكذلك حيوانات المقارنة فى نهاية فترة الاختبار (٣٠ يوم) وحفظت فى مثبت دافيد سون. لقد تم التخلص وإزالة القشور والدروع الخارجية Carapaces وتم غمس الجمبرى الكامل فى شمع البرافين. تم جمع القطاعات الطولية بسمك ٧ ميكرون وكذلك القطاعات العرضية باستخدام الصيغات الروتينية هيماتوكسين والايوسين.

#### ٦- التعرض المباشر بواسطة الامبوب المعى Gavaging

تم قتل كل الجمبرى المعرض وكذلك أفراد المقارنة فى نهاية فترات التجريب صفر، ٢، ٦، ١٦، ساعة. تم تشريح القناة الهضمية للجمبرى وتم حفظها فى مثبت دافيدسون وتم تجهيزها للفحص بالميكروسكوب الضوئى. تم جمع القطاعات الطولية Parasagittal بسمك ٧ ميكرون وكذلك القطاعات العرضية بنفس السمك بالهيماتوكسيلين والايوسين.

#### ٧- الميكروسكوب الالكترونى

تم اختيار الجمبرى من معاملات التعرض عن طريق الغذاء للفحص. تم تجهيز القناة الهضمية فقط من كل من الجمبرى المعرض للاختبار وكذلك أفراد المقارنة. تم أخذ عينات الانسجة من ثلاثة أماكن من كل قناة هضمية وهى المعى الامامى والوسط والخلفى. تم تثبيت العينات وعمل القطاعات والصيغ والفحص

بالميكروسكوب الالكتروني Zeiss EM 10. لقد تم الاهتمام بأية تأثيرات سامة ممكنة على الخلايا الطلائية المبطنة للمعى الاوسط.

#### ٨- نتائج التقييم الحيوى لمركب الاختبار فى العوائل الحشرية

لقد أتضح ان كريات الطعام التجريبية المحتوية على الباسيلليس ثورينجينسيز شديدة الفاعلية ضد ثلاثة أنواع من العوائل الحشرية عند هذه الجرعة بينما كريات المقارنة أحتئت وفيات فى الحدود المقبولة فى هذه البروتوكولات.

#### ٩- الملاحظات الشاملة على العوائل غير المستهدفة خلال الاختبار

لم نلاحظ اختلافات واضحة فى سلوك الجمبرى المعامل وكذلك حيوانات المقارنة قبل وخلال وبعد التغذية. لقد وصلت نسبة الموت المتراكم ١٤% بين المقارنة فى مقابل ١٦% فى المجاميع التجريبية. لقد تأكد أن نسب الوفيات كانت فى الحدود المسموح بها تحت نظام التجريب المتبع وأن الوفيات كانت تحدث لأسباب أخرى بخلاف التعرض للباسيلليس ثورينجينسيز. لم تحدث وفيات بين حيوانات الجمبرى التى عوملت من خلال الاتيوبوب الفمى بالباسيلليس ثورينجينسيز المسحوق والماء والملح.

#### ١٠ - نتائج الهستو پاثولوجى والفحص بالميكروسكوب الالكتروني

أظهر الفحص بالميكروسكوب الضوئى والالكترونى عدم وجود اختلافات بين أنسجة جمبرى المقارنة وتلك التى تعرضت للباسيلليس ثورينجينسيز. لم يثبت أى دليل يشير الى وجود البكتريا ولا أية تأثيرات سامة أو مرضية فى بنكرياس الكبد أو فى القناة الهضمية.

#### ج- الفطريات (كمثال *Lagenidium giganteum* - سلالة كاليفورنيا)

لقد تم عزل هذا الفطر فى الاساس من عائلة الحشرى الطبيعى وهو بعض "كيوليكس تارسالين" وقد تم تسجيله كمبيد حشرى ميكروبى فعال. ولو أن الفطر لاجينيديوم جيجانتثيوم من كائنات المياه العذبة الا أنه كان محط الاهتمام فى الدراسات الأولية للفطريات لأسباب ثلاثة. السبب الاول أنه يقدم نموذج لكائن حى من الطراز الاولى Prototype يصلح لطرق التطور الابتدائية والسبب الثانى أنه عضو من نفس الجنس *L.callinectes* وهو المعروف عنه أنه ممرض لبيض الكراب ويرقات القشريات فى البحار ومصصبات الانهار، السبب الثالث أنه يعطى إمكانية لدراسة التأثيرات الممكنة

على كائنات مصبات الانهار خاصة تلك التي تحدث في ظل الملوحة المنخفضة حيث انه يتحمل هذه الدرجة من الملوحة.

#### ١- طريقة احداث الفعل المفترض في العوامل الطبيعية

الجراثيم أو البوغ الحيواني Zoospore للفطر إل. جيجانتيوم وهو الخلية المتحركة تمثل الطور المعدى الذى يرتبط بالعمر الاول والثانى والثالث وبداية الرابع ليرقات البعوض الكيوليكس والاييسس والاتوفيلس ويتحوصل encysts على الكيونيكل. وبعد ذلك ينفذ ويبدأ فى النمو كهيقات. سوف نشير الى عملية النفاذية هذه. لقد اقترحت احدى النظريات التى وضعها Domnns وآخرون (١٩٧٧) عملية تتضمن انزيم يحلل البروتين protolytic أو يحلل الدهون Lipolytic فى تزامن مع الضغط الميكانيكى. بعد كسر أو خرق breached الكيونيكل تبدأ خيوط الهيقات فى النمو داخل البرقة حتى تملأ الهيموسيل. عندئذ تطور الهيفا غشاء septa وتكون الكيس الجرثومى Sporangia. تنتفخ هذه الاكياس وتصبح بيضوية وتبدأ فى تكوين مخرج exit أو أنابيب للصرف والتى تدفع خلال الكيونيكل وتكون حوصلات خروج الى جسم البرقة. البوغات الحيوانية تنقسم وتتكرر خارجيا داخل الحوصلات وتتفرد وتتحرر فى البيئة المائية التى تحيط ببقايا البرقات عندما تعمل الاهتزازات التى تحدث بواسطة البوغات الناضجة على كسر غشاء الحوصلة التى تبدأ دورة جديدة.

#### ٢- مزرعة الفطر لاجينديوم وانتاج البيوغ

تحت القسم Subtaxon للفطر لاجينديوم جيجانتيوم (سلالة كالفورنيا والتي أعيد عزلها من ولاية شمال كارولينا) على بيئة الاجار تم نقلها الى بيئة سائلة (البيئة القياسية) للنمو والصيانة. للأغراض التجريبية تم عمل مزارع متعددة على نفس المنوال من المزرعة الام. يتم تحفيز البيوغ عن طريق اضافة الماء المقطر الى المزرعة وخط الخليط فى خلط يعمل بالموجات فوق الصوتية بسرعة منخفضة. يبدأ انتاج البيوغ بعد ١-٢ ساعة من هذه الخطوة مع قمة الانتاج بعد ١٤-١٨ ساعة. المزرعة المخففة أو المسائل يضاف الى موضع الاختبار بعد ٢-٦ ساعات من اضافة الماء المقطر. لمنع انفراد وتحرر الفطر للبيئة يتم تحطيم مزارع الفطر.

#### ٣- حيوانات وظروف الاختبار

لقد أجريت دراسات أولية على يرقات الجمبرى (P.pugio) فى ظل ظروف ملوحة ٥,٣ فى الاف. تم استخدام ثلاثة مجموعات كل منها مكون من عشرة يرقات مع كل مستوى ملوحة: مجموعة المقارنة، المجموعة المعرضة لمزرعة الفطر



لاجينديوم المحفزة (البيئة القياسية) والمجموعة المعرضة للمزارع المحفزة من الوسط عند ملوحة الاختبار المناسبة (٣، ٥ في الألف). تم حفظ كل مجموعة على ٢٥°م في أواني فردية كل منها تحتوي على ١٠ مليلتر من ماء البحر على درجة ملوحة مناسبة. تم العدوى بمقدار واحد مليلتر من المزرعة المحفزة كل يوم بعد الظهر لمدة أربعة أيام متتالية. في صباح كل يوم بعد العدوى يتم تنظيف الاواني وتطهير ماء البحر. يتم اجراء ملاحظات عن الوفيات والاجهادات بشكل منتظم وتزال الكائنات المشكوك فيها وتتحصن وتقيم من حيث عدوى الفطر بواسطة الفحص الميكروسكوبى للتحضيرات الطازجة.

تم اجراء دراسات أولية عن حساسية بيض ويافاعات الجمبرى *P.pugio* للفطر *L.giganteum*. تم اختبار ثلاثة انثى حبلى كل منها فى طبق بترى مزرعى يحتوى على ٥٠٠ مليلتر من ٣ فى الألف ملوحة ماء بحر (٢٥°م) الذى اضيف اليه ١٠ مليلتر من الفطر المحفز (بيئة قياسية). يتم تكرار التجريع لمدة أربعة أيام متتالية مع التنظيف والملاحظة بين كل تجريع. تم تجهيز بيض ويافاعات الجمبرى للفحص النسيجي فى نهاية الاختبار. يتم صبغ الشرائح بالهيماتوكسيلين والايوسين وPAS والهيماتوكسيلين بغرض التقييم.

#### ٤- نتائج الاختبارات الفطرية

خلال الاختبار لوحظت بعض حالات الوفيات فى يرقات جمبرى المقارنة والمعاملة. هذا بينما لم يظهر فحص الجمبرى الميت خلال الاختبار وفى نهاية الاختبار أية عدوى بالفطرو علامات تشير الى أى علاقة بين الموت والاصابة بالفطر فى المعاملات. ربما يكون من أسباب الوفيات الاجهاد بسبب الملوحة أو أية أسباب أخرى بخلاف التعرض للفطر. أظهر الفحص الشامل والنسيجي ليافاعات وكتل بيض الجمبرى عدم وجود أية عدوى بالفطر أو ارتباط للبيوغ باليافاعات أو الاجنة النامية.

#### د - البروتوزوا (كمثال نوزيما كنياتيم *Nosema Cuneatum*)

##### ١- كيفية إحداث الفعل المفترض فى العوائل الطبيعية:

الطور المعدى لبروتوزوا الميكروسبوريدية هو الجرثومة. جراثيم النوزيما يتم تناولها فى طعام العائل الحشرى المستهدف. فى المعى الاوسط للعائل تأتى الجراثيم أو تصبح بالقرب من الخلايا الطلائية للمعدة. يحدث الوفيات عندما تحرر الجراثيم أنبوب الصرف الذى يرتبط ببلازمالما الخلايا الطلائية أو أى نوع آخر من الخلايا الأولية.

يترك الاسبوروبلازم sporoplasm الجرثومة من خلال الانبوب مقلوب القطب للدخول الى خلية العائل الاولى المستهدفة. لا يعرف الكثير عن طرق دخول الاطوار المعدية المبكرة للميكروسبورديا في عوائلها. هذا ولو أن الخلايا المتجولة أو الهائمة Wandering cells خاصة الخلايا الميزنشيمية الوسطية غير المتميزة وخلايا الدم hemocytes والخلايا الملتهمة macrophages (اعتمادا على ما اذا كانت العوائل لا فقارية أو فقارية) وسوائل الجسم يحتمل أن تساعد في توزيعها. في الخلايا المناسبة تصبح الاسبوروبلازومات meronts. بالتأكيد فإن الميكروسبورديا تنتشر الى أنواع الخلايا النهائية مثل الخلايا العذبة والعضلات والاعصاب والانسجة الضامة حيث تسبب عدوى شديدة وكثير من تحطم الانسجة وفقد الوظائف الحيوية الهامة (مثل تحلل العضلات muscle lysis). عند مواقع الانسجة هذه يبدأ التجرثم Sporulation وفي العادة بعد التكبير الخضرى الفائق لأطوار Schizont stages. يتم تحرير الجراثيم فى البيئة أو تدخل عائل جديد عندما تتحلل الحشرة المريضة أو تؤكل بواسطة الملتهمات أو الكائنات/المفترسات Scavengers/ Peredators.

## ٢- حيوانات وظروف الاختبار

ظروف الاختبار مطابقة لتلك التى صممت فى دراسات التعرض للفيروسات من حشرة A.californica فيما عدا استخدام الجمبرى P.pugio فقط كحيوان اختبار. كذلك لم تجرى أية محاولات لفصل الجمبرى الاناث الحوامل من غير الحوامل لغراض الاختبار.

## ٣- تجهيز وتغذية البروتوزوا

لقد استخدمت مركزات جراثيم النوزيما N.cuneatum وممرض الميكروسبورديا من نطاط الاوراق الرحال فى شمال أمريكا "ميلانوبلس ساتجوينيبس" فى هذا الاختبار كانت كريات الطعام الملوثة تجهز اسبوعيا. يتم طحن تسعة جرامات من طعام قشور السمك الى مسحوق نقيق ثم رش معق الجراثيم فى الماء فوق مستحضر مسحوق الغذاء باستخدام البشورى الرشاش ثم السماح للماء بالتبخير على درجة حرارة الغرفة ثم ضغط المسحوق الجاف فى كريات الطعام او جرام. هذه الطريقة تحقق جرعة كبيرة من الجراثيم (حوالى ٤٤٠٠٠٠ جرثومة لكل كرية) الى جمبرى التجريب مع كل تغذية. جمبرى المقارنة كان يتغذى على كريات طعام خالية من البروتوزوا على صورة رقائق من طعام السمك فقط. التعرض كان يتم بواسطة

كربات الطعام وكان نظام التغذية والتنظيف والتخلص من التلوث يتم كما ذكر قبل مع المستحضرات الفيروسية.

#### ٤- التقييم الحيوى للغذاء

تم اختيار الحديد من كربات الطعام الملونة والعادية للمقارنة من المقنن الاسبوعى وتم تخزينها على ٤°م بغرض التقييم الحيوى. لقد تم ارسال كل عينات كربات الطعام الى وزارة الزراعة الامريكية لاختبار الفاعلية والمرضية ضد *M.sanguinipes*.

#### ٥- الهستولوجى

تم انتهاء الاختبارات بعد ٣٠ يوم ثم قتل جميع الجمبرى الذى استمر فى المعيشة وتم الحقن بميثيل دافيسون وترك اثناء الليل فى فرن تحت تفريغ (٢٠ ضغط جوى Psi) للتأكد من كمال نفانوية المثبت. بعد ذلك تم تجهيز العينات لفحص المرضية النسيجية بعد المعاملة بالـ decalcifier. تم تجهيز الجمبرى الكامل هستولوجيا للتمكن من الفحص الجيد للقناة الهضمية والبنكرياس الكبدى (غدة هضمية).

#### ٦- نتائج التقييم الحيوى للبروتوزوا

اوضحت النتائج الاولى ان الميكروسبورديا من كربات الغذاء الملوث كانت ممرضة وحية فى داخل العائل *M.sanguinipes*.

#### ٧- الملاحظات الشاملة للعائل غير المستهدف خلال الاختبار

جمبرى المقارنة ومعاملات التجريب بعد المعاملة ببروتوزوا الاختبار لم تظهر أية اختلافات فى سلوك التغذية. لقد وصلت نسبة الوفيات بعد ٣٠ يوم حوالى ٢٠% بين حيوانات المقارنة فى مقابل ١٤% فى حيوانات التجريب. نسب الوفيات هذه كانت فى الحدود المقبولة مع بروتوكول التجريب.

#### ٨- نتائج الهستولوجى

لم تظهر اختلافات بين أنسجة جمبرى المقارنة وتلك المعرض لمستحضر البروتوزوا من جراء الفحص بالميكروسكوب الضوئى. لم تظهر أية علامات عن حدوث حالات مرضية فى أى من أنسجة بنكرياس الكبد أو المعى الاوسط. أظهر الفحص الهستولوجى عدم وجود دليل على وجود جراثيم ثابتة داخل القناة الهضمية للجمبرى المعرض وكذلك اتضح زوال الجراثيم المتناولة.

## REFERENCES

- Aly, C., Mulla, M. S., and Federici, B. A., Sporulation and toxic production by *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* in cadavers of mosquito larvae (Diptera: Culicidae), *J. Invertebr. Pathol.*, 46, 251, 1985. 1985.
- Brusca, J., Summers, M., Couch, J., and Courtney, L., *Autographa californica* nuclear polyhedrosis Virus efficiently enters but does not replicate in poikilothermic vertebrate cells, *Intervirology*, 26, 207, 1986.
- Canning, E. U. and Lom, J. (with a contribution by Dykova, I.), *The Microsporidia of Vertebrates*, Academic Press, Orlando, 1986.
- Couch, J. A., Martin, S. M., Tompkins, G., and Kinney, J., A simple system for the preliminary evaluation of infectivity and pathogenesis of insect virus in a non-target estuarine shrimp, *J. Invertebr. Pathol.*, 43, 351, 1984.
- Domnas, A. J. P., and Hickes, B. F., Sterol requirements for zoospore formation in the mosquito-parasitizing fungus *Lagenidium*, *Mycologia*, 69, 875, 1977.
- Foss, S. S., Courtney, L. A., and Couch, J. A., Evaluation of a Fungal Agent (*Lagenidium giganteum*) Under Development as an MPCA for Nontarget Risks. Report EPA/600/X-86/229. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D. C., 1986.
- Heimpel, A. M., Testing penaeid shrimps for susceptibility to an insect nuclear polyhedrosis virus, *Environ. Entomol.*, 2, 611, 1973.
- Jagues, R. P., Application of viruses to soil and foliage for control of the cabbage looper and imported cabbage worm, *J. Invertebr. Pathol.*, 15, 328, 1970.
- Lacey, L. A., *Bacillus thuringiensis* serotype H-14, in *Biological Control of Mosquitoes*, Bull. No. 6, Chapman, H. C., Ed., American Mosquito Control Association, Fresno, CA, 1985, 132.
- Lightner, D. V., Proctor, R. R., Sparks, A. K., Adams, J. R., and Thomas, E. D., Reichelderfer, C., and Heimpel, A., Accumulation and persistence of a nuclear polyhedrosis virus of the cabbage looper in the field, *J. Invertebr. Pathol.*, 20, 157, 1972.

- McCray, E. M., Jr., Umphlett, C. J., and Fay, R. W.. Laboratory studies on a new fungal pathogen of mosquitoes, Mosq. News. 33(1). 1973.
- Overstreet, R. M., Marine Maladies? Worms, Germs and other Symbionts from the Northern Gulf of Mexico, No. MASGP- 78-021, Mississippi-Alabama Sea Grant Consortium, Ocean Spring, MS, 1978.
- Percy, J. and Fast, P. G., *Bacillus thuringiensis* crystal toxin: Ultrastructural studies of its effect on silkworm midgut cells, J. Invertebr. Pathol., 41, 86, 1983.
- Sapo, T., Nishimura, T., Oguma, K., Momoyama, K., and Takeno, N., Reculoviruses infection of cultured Kuruma shrimp, *Penaeus Japonicus* in Japan, Fish. Pathol., 15, 185, 1981.
- Shaw, B. L. and Battle, H. I., The gross and microscopic anatomy of the digestive tract of the oyster *Crassostrea virginica* (Gmelin), Can. J. Zool., 35, 325, 1957.
- Sindermann, C. J., Principal Diseases of Marine Fish and Shellfish, Academic Press, New York, 1970.
- Tompkins, G. T., characterization of Multiple Embedded Nuclear Polyhedrosis Viruses Isolated from the Cabbage Looper, Ph. D. thesis, University of Maryland Park, 1979.



## **الباب الثالث**

### **أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على الفقاريات**

**الفصل الأول: الأمان على الفقاريات - الإنسان Vertebrates-Human**

**الفصل الثاني: أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على الفقاريات والحيوانات الأليفة**

**والحياة البرية**





## الفصل الأول

### الأمان على الفقاريات — الإنسان Vertebrates-Human

#### أ- تقديم واستعراض علم

من مقالة للباحثان J. A. shaddock و J. P. single حيث قدما بالقول أن تطور واستخدام المبيدات الحشرية الميكروبية سوف يزداد عندما تصبح المبيدات الحشرية الكيميائية أقل شيوعاً بسبب المشاكل المرتبطة بظهور وتطور ومقاومة الأنواع الحشرية المستهدفة وكذلك السمية غير المستهدفة والثبات البيئي. المبيد الحشري الميكروبي الأول الذي سجل في الولايات المتحدة الأمريكية كان باسيليس بوبيليا (١٩٤٨). بحلول عام (١٩٨٥) كان قد تم تسجيل ١٤ ميكروب في مكافحة الآفات فيما يزيد عن ١٠٠ منتج في أمريكا كى تستخدم في الزراعات الحقلية والغابات وفي مكافحة البعوض وفي داخل بيوت السكن. من منطلق المخرجات تتعرض المبيدات الحشرية الميكروبية لنفس الدراسات المتعلقة بالأمان للوقوف على تأثيراتها الكيميائية بما فيها دراسات السرطانية والعدوى. كمثال يتم تخنية أنواع الطيور على امتداد ٦٩٠ يوم وعلى الفئران ٧٣٠ يوم. كذلك تم إجراء الحقن في الأوبون والاستنشاق والتغذية على المدى القصير على الفئران والجرذان وخنازير غينيا والمتطوعين من الأدميين. يتم تناول الأدميين جرثيم ١٠١ لكل يوم ولمدة خمسة أيام وتستشق ١٠ جرثيم بدون أية تأثيرات مرضية. هذا بينما أصبح من المعروف أن حجم الاختبارات المتاحة لتقييم أمان المبيدات الحشرية الكيميائية لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر على الوسائل الميكروبية لأسباب متعددة.

اختبارات أمان الكيميائية تفترض أن التأثير البيولوجي المباح يمكن أن تتحقق إذا تم المعاملة بجرعة عالية بما فيه الكفاية. من الناحية التقليدية يعبر عن الجرعة dose كجرعة نصفية قاتلة LD50. على العكس يكون من المستحيل تحقيق الجرعة النصفية القاتلة باستخدام الوسائل الميكروبية إذا أعطيت لأنواع غير العوائية باستخدام الوسائل التقليدية مثل الأيروسولات والمعاملة الجلدية والفعية. كميات المادة المطلوبة لأحداث الموت تكون كبيرة بحيث تسبب Suffocate حيوان الاختبار أو تحدث انسداد في القناة الجوفعوية. الاختبارات الكيميائية تفترض كذلك أن المركب يمثل و/أو يخرج وإن نواتج التمثيل قد تكون سامة أو أكثر سمية عن المركب الاصلى. الآن لا يوجد

دليل أن المبيدات الحشرية الميكروبية تنشط تمثلياً في الثدييات. هذا ولو أن الدلتا-اندرتوكسين المذبذبة في القلوى من الباسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرايلينسيز قاتلة عندما تحقن في الجرذان وتقوم بتحليل Cytolytic لكرات الدم في الإنسان والفيبروبلاست في الفئران وكذلك في المزارع الأولية للخلايا الليمفاوية في الخزائر خارج الجسم فإن خطوة التنشيط لا تحدث في الثدييات بسبب أن ظروف المعدة غير مناسبة. الوسائل الميكروبية تختلف عن السموم الكيميائية لأنها تملك القدرة على التضاعف ولو أن بعض الوسائل الكيميائية تعزل في دهن جسم العائل وتحدث تأثير مع الوقت مما يستدعي ضرورة إجراء كلا الدراسات الحادة والمزمنة. في النهاية فإن اختبارات الأمان الكيميائي تفترض أن المعلومات الخاصة بالتركيب الكيميائي للمركب والمعلومات عن المركبات المرتبطة يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن الأضرار المؤثرة للمركب على الإنسان بينما يكون هناك تفاوت عريض disparity داخل نفس جنس الكائن الدقيق بالنظر إلى المدى للعوائل والمرضية. على سبيل المثال فإن الباسيلليس ثورينجينسيز قاتلة لحشرية الأجنحة بينما الباسيلليس أنتراسيز عبارة عن ممرض عنيف للمجترات والإنسان.

**خلاصة القول** أنه بينما أن المبيدات الحشرية و الميكروبية تتقاسم الأمان فيما يتعلق بالسمية والالتهابات والحساسية إلا أن الوسائل الميكروبية متميزة في مقدرتها على التضاعف في العائل المناسب. في هذا المقام سوف نلخص الدلائل لإجراء الأمان واختبارات الحكم عليه في الثدييات مع الإشارة إلى الإصدارات الفاتحة المتعلقة بعدوى الثدييات وسمية الممرضات الحشرية مع التركيز على الممرضات الحشرية البكتيرية والفطرية والبروتوزوا.

#### ب- فلسفة تقييم الضرر:

لقد تعاطف الاهتمام في اتجاه وضع بروتوكولات جديدة لاختبارات الأمان تبرز الخصائص المتميزة للممرضات الحشرية. فلسفة الاختبارات تعرف بالتحدي الأقصى maximum challenge الذي يؤيد استخدام أقصى ظروف اختبار قوة (extreme) مثل الحقن في داخل العين intraocular أو داخل المخ intracerebral لكي تحدث تأثيرات بيولوجية واضحة يمكن الكشف عنها. الاقتراب المستخدم يتوازى مع مفهوم الجرعة النصفية القاتلة LD<sub>50</sub> ولكن طريق التعرض مختلفة عما هو الحال مع تقدير الجرعة. في اختبار التحدي الأقصى فإن الجرعة الممكنة الأعلى (تعتمد على الحالة الطبيعية

للمادة) تعطى عن الطريق الذى يعتبر من أكثر الطرق شدة فى تعريض الدفاعات الطبيعية للحيوان إلى الخطر. اختيار الطريق الأكثر تعرضاً للحيوان تبنى على معيارين المعيار الأول يتمثل فى البحث فى الدراسات المرجعية للوقوف على الحالات والظروف التى تم فيها عزل الكائن الحى من الإنسان أو الحيوانات أو حيث كانت أعراض ومناطق الضرر تنتج بواسطة الكائن محل الاعتبار أو الأنواع قريبة الصلة بها. فى هذه الحالة يتم تصميم الاختبارات بما يستهدف النظام المناسب من الأعضاء organ system فى محاولة لإعادة وتكرار العدوى. المعيار الثانى يتمثل فى أن بعض أعضاء جسم الثدييات مثل المخ أو العين تعتبر ذات قابلية عالية للعدوى بسبب محدودية مدى الاستجابة والتأثير المدمر devastating حتى لو كان متوسط على وظائف هذه الأنسجة. هذه الأساسيات موضحة ومعمول بها فى اختبارات الأمان فى الممرضات الحشرية. البكتريا B.sphaericus تشترك فى الحالات القاتلة من الالتهاب السحائى meningitis فى الإنسان ومن ثم فإن اختبارات التحدى الأقصى للأمان تشمل دراسات الحقن فى المخيخ. على نفس المنوال فإن الميكروسبورديا E.cuniculi تسبب ضرر فى مخ الأرانب والرئيسات primates ولذلك تم حقن الميكروسبورديا الممرضة للحشرات "توزيما الجيريا، نوزيما لوكاستيا" فى مخ الأرانب كجزء من مجهودات تقييم ضررها على الثدييات.

الصعوبة الأولية المرتبطة باختبارات التحدى الأقصى تشمل تمثيل interpretation بيانات الموت ومحاولة استقراء آخر هذه النتائج وأمانها على الإنسان. الرفض قبل الأوان premature rejection للمركب ذات أهمية كبرى بسبب أنه حتى الكائنات غير الممرضة تستطيع إحداث الموت عندما تحقن بكميات كبيرة فى الموقع القابل للإصابة مثل المخ ومن ثم نقول أن المقدرة على إحداث الموت لا يجب أن تودى إلى رفض المركب بشكل أوتوماتيكى إلا إذا تم تقييم ما يحدثه المركب من خلال طرق أخرى للتعرض. قيمة هذه الاختبارات تقع فى النتائج السالبة التى تعطى أدلة موثوقة فيها عن أمان الكائن للتثدييات واستقراء ما قد يحدثه على الإنسان بالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات المرتبطة بما يعرف بـ "الحالة الأسوأ Worst case" مثل الحقن فى المخيخ قد تثبت عدم قيمتها فى الحالات حيث تم عزل الممرضات الحشرية من الإنسان.

## ج- دلائل الاختبارات Testing guidelines

بروتوكولات اختبارات الأمان الحالية تسمح باختبارات التحدى الأقصى مع الطرق التقليدية للتعرض. فى عام ١٩٨١ قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بنشر مضبطة تشمل ثلاثة برامج فى ثلاثة بطاريات لاختبارات الأمان على الثدييات للمرضات الحشرية. البطارية الأولى tier تستخدم اختبارات قصيرة المدى (٤ أسابيع أو أقل) لتقييم القدرة على العدوى والسمية وأحداث الالتهابات والحساسية عن طريق التعرض الفردى عن طريق الفم والاستنشاق والحقن الوريدي والجلد والعيون. يجب الا تزيد الجرعات عن ٥ جرام/كجم وأن أننى جرعة بالحقن الوريدي كانت ١٠ كائن لكل فأر فى مقابل ١٠ كائن لكل جرذ. الاجتياز الناجح للبطارية الأولى (Tier I) يؤدى إلى إعلان أن المرض الحشري آمن بلا أية قيود أو حدود ومن ثم فإن هذه البطارية تحيد عن أو ترحل دراسات السرطانية على المدى الطويل والمكلفة جدا عما هو الحال مع المبيدات الحشرية الكيميائية. البطاريات II و III تتضمن تطوير بيانات التعرض وكذلك الدراسات على المدى الطويل مع التعرض الفردى والمتعدد للتقييم الكمي للسمية والمقدرة على إحداث الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك فإن الحقن فى المخيخ موصف فى بروتوكول البطارية الأولى I مع البروتوزوا بسبب قابلية الجهاز العصبى المركزى فى الثدييات للإصابة بالكائن E.cuniculi. مفهوم البطاريات الثلاثة هذه تم وضعه وتطورة بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA US فى عام ١٩٨٢ حيث تعتبر هذه الاختبارات كأساس الدلائل توصف نوع الثدييات التى تختبر وكذلك عدد الحيوانات فى كل مجموعة معاملة وتقرير ما اذا كانت الحيوانات التى فيها مناعة قد تتضمن فى اختبار البطارية الأولى.

تقييم الدور الذى يلعبه نظم المناعة فى العائل فى تصفية المرض الحشري من خلال استخدام الجردان ناقصة المناعة العقلية ahlymic كحيوانات تجارب أو استخدام مخفضات المناعة الكيميائية مثل الهيدروكورتيزون والسيكوفوسفاميد والتى تعتبر امتداد عقلانى لفلسفة التحدى الأقصى. هذا التوجه لم يشار اليه فى كتيب WHO وقد نظر اليه من قبل البعض نظره عكسية بسبب الصعوبة المرتبطة مع الموجودات الموجبة مثل العدوى أو الموت وصحة الانسان. لقد لاحظ بعض الباحثين أن أصناف مخفضات المناعة المتاحة والمتوفرة وكيفية إحداث الفعل المتباينة لها تجعل من المقارنات بين دراسات الأمان من الصعوبة بمكان. لذلك تم التعبير عن الروى بأن الناس ناقصى المناعة قد تعاني من الامراض الطبيعية فى الفقاريات قبل أن تتمكن

المرضات الحشرية من القيلم بدورها ولكن السؤال يظل مطروحا. مظاهر نقص المناعة المكتسبة Acquired Immunodeficiency أو ما يعرف بالمختصر "AIDS" يسود في المناطق التي تمثل مرضات الحشرات مكون هام في برامج مكافحة النواقل Vector control. في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية يعامل مرضى السرطان بالعلاج بمخفضات المناعة وهذا من الأمور الشائعة بما يؤدي إلى الاهتمام بالجزء الخاص بتشريعات وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA حول الضرر المحتمل الذي يحدث لهؤلاء الأفراد بواسطة مرضات الحشرات.

في الوقت الراهن فإن السمية تحدث مع البكتيريا والفطريات ولكنها لم تظهر مع البروتوزوا أو الفيروسات وأحداث العنوى موضوع مرتبط بالمجاميع الأربعة كلها. المركبات التي تجتاز اختبارات البطارية الأولى تعتبر غير ضارة على الثدييات وما يستقر منها على الإنسان ولكن على الفرد أن يحذر ويحاط تجاه الأمان المطلق لأي ممرض للحشرات. لقد خلص الباحث Burges (١٩٨١) إلى "عدم وجود موقف لا خطر no-risk" وبالتأكيد ليس مع المبيدات الكيميائية وحتى مع الوسائل الحيوية وحيث لا يمكن لأي فرد أن يثبت أنها سلبية الخطر بشكل مطلق. تسجيل المركب الكيميائي ما هو الا مخرج ونتاج الاستخدام حيث تكون الاخطار مقبولة. نفس القول قد ينطبق على الوسائل الحيوية.

Currently, toxicity is an issue with bacteria and fungi but it has not been demonstrated with protozoa or viruses: infectivity is a concern with all four groups. Candidates that pass Tier I are considered nonhazardous to mammals and by extension to man. But one must be extension to man, but one must be ware about claiming absolute safety for any entomopathogen. Burges summed this up when he noted that "A"no-risk" situation does not exist, certainly not with chemical pesticides, and even with biological agents one cannot absolutely prove a negative. Registration of a chemical is essentially a statement of usage in which the risks are acceptable. The same must apply to biological agent."

#### \* عدوى مرضات الحشرات للتثبيات Infectivity:

##### أ- العدوى في مقابل التثبيت infection VS persistence

تعرف العدوى على أنها غزو الجسم بواسطة الكائنات الدقيقة الممرضة وما يستتبع ذلك من رد فعل الأنسجة لوجودها. يمكن أن يشار للاصطلاح كذلك على أنه الوجود البسيط للكائنات الدقيقة داخل الأنسجة سواء كان ذلك سيؤدي إلى أو لا يؤدي

لتكاثرات مرضية. في هذا المقام يشير الاصطلاح عدوى infection إلى تضاعف الكائن في الثدييات والتي تقاس بواسطة وجود الأطوار الخضرية في النسيج أو شفاء عدد مترابيد من الكائنات الحية النشطة من الوسط مع تقدم الوقت. الاصطلاح "ثبات Persistence" يشير إلى بقاء معيشة الكائنات الحية النشطة بنون تضاعف. هذا ينصح ببساطة بواسطة الاسترجاع أو الشفاء البسيط للكائن. هذا التمييز الحاسم Crucial يرجع إلى أن المادة وأي مادة تستطيع التضاعف في الثدييات تحدث أضرار كبيرة على الإنسان على عكس تلك التي لا تتضاعف. من الناحية العملية يكون من الصعوبة التمييز بين العدوى والثبات باستخدام طرق المزرعة الميكروبية القياسية مثل الأضرار المشكوك فيها المزالة Swabbing suspect lesions لأن هذه الطريقة يمكن أن توضح فقط أن الكائنات الحية النشطة كانت موجودة ولكنها لا تقدر وجود مرحلة تاريخ الحياة. لسوء الحظ فإن بعض الباحث ينظرون إلى الشفاء الميكروبي كمرادف للعدوى. لقد أدى ذلك إلى ظهور تقارير متضاربة عن ممرضات الحشرات التي تصيب الحيوانات والإنسان. فيما يلي نتناول البيانات الخاصة بعدوى وثبات ممرضات الحشرات البكتيرية والفطرية والبروتوزوا في الحيوانات المنوعة والتي في طريقها للمناعة.

#### ب- ممرضات الحشرات البكتيرية En tomopathogenic bacteria

لقد نشر أن الباسيليلس ثوريجنيسيز سببت قرحة في عيون أحد الفلاحين بعمر ١٨ عاما تعرض للتلوث بالترشيش عرضيا في الوجه بواسطة المعلق التجاري لهذا الكائن الدقيق. التشخيص بنى على أساس استرجاع الباسيليلس من مسحة العين بعد ١٣ يوم من التعرض ولو أن القرحة لم تخصص مباشرة للكشف عن وجود الصور الخارجية للبكتريا. لم يقتنع الباحثين بإمكانية أن الجراثيم قد توجد في العيون وتسترجع ولو أنه ليس بالضرورة أن مسببة ترتبط بالقرحة. لقد أجريت تجارب معملية على نوعين من الباسيليلس الممرضة للحشرات هما الباسيليلس ثوريجنيسيز تحت النوع اسراتيلينيسيز والباسيليلس سفيريكس واتضح أن كلا النوعان يسترجعا من عيون الأرانب بعد ٨ أسابيع من دخولها في الرئج أو الكيس المسدود Cul-de-sac من الملتحمة conjunctival ولو أنه لا يوجد دليل على حدوث التضاعف. الغسيل الغزير Flushing للعيون المعاملة بالماء لمدة ٣٠ ثانية بعد التعرض لا يزيل كل مصدر العدوى. لذلك فإن استرجاع جراثيم الباسيليلس ثوريجنيسيز من المصاب بعد ١٣ يوم من التعرض يمثل حدوث ثبات. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكائن الدقيق يمكن أن

يسترجع من الطحال بعد ٨ أسابيع من الحقن الوريدي ومن المخ بعد ٤ أسابيع من الحقن في المخيخ. لذلك يمكن أن نعتبر أن الجراثيم من العيون بعد ١٣ أسبوع من التعرض ليس بالعلامة أو الظاهرة المميزة Unremarkable.

هناك ادعاء غير مادي أن الباسيليليس ثورينجينسيز التي تغرس في الطعام قد تؤدي إلى حدوث أضرار في الرئتان Pneumonia والتهاب في عضلات القلب myocarditis وفي الكبد في الماشية وحديثاً نشر ما يفيد بأنه لم يثبت حدوث أية أمراض من جراء وضع عديد من المستحضرات التجريبية لهذا الممرض الحشري مع الغذاء. لقد لاحظ Hadely وآخرون (١٩٨٧) في دراساتهم على الأغنام أن جراثيم الباسيليليس ثورينجينسيز لا تظل حية ونشطة فقط في المعدة الأولى rumen للحيوانات المختبرة ولكنها تسترجع كذلك من الدم. بينما تؤدي هذه النتيجة إلى الاقتراح بأن هذا الكائن الدقيق له صفات وخصائص الغزو invasive والاختراق إلا أن الخدوش والجروح في فم الأغنام التي تتسبب من الطعام تعتبر أماكن الدخول إلى تيار الدم في عدد من أصناف البكتريا مثل B.anthraxis والاكثينوماميسيس ليجنيريسيس. بالإضافة إلى ذلك فإن البكتريا مثل كلوستريديوم نويفاي تستطيع الهجرة السالبة خلال جدار الأمعاء المخدوش ثم تدخل إلى تيار الدم. لقد خلص الباحثون إلى أن ما حدث في الغنم حيث وجدت الباسيليليس في الدم لم تكن السبب لأية ظاهرة مرضية ومن ثم اعتبرت غير ممرضة nonpathogenic في هذا العائل.

الجرذان التي تعاني من نقص المناعة الجزئية immunodeficient ليست حساسة للعنوى بالباسيليليس ثورينجينسيز عندما اختبرت في المعمل. الجرذان العادية Athymic (nude) التي تعاني من نقص الخلايا الليمفاوية T ومن ثم نقص المقدرة على حمل هذه الخلايا التي تعتمد على استجابة الجسم المعتاد نجحت في تصفية الكائن الدقيق من الطحال بعد الحقن اليربوني. لقد تم استرجاع Bt بعد ٥ أسابيع من الحقن ولكنها استرجعت كذلك من الفأر الهجين المنيع الطبيعي (BALB/c) في نفس الفترة من الوقت. هذا بينما معدل التصفية يختلف ويتفاوت وقد أدت هذه التجربة إلى الاقتراح أن حالة المناعة قد تؤثر على ديناميكية التصفية. هذه التجربة توضح أن نظام المناعة الكامل طبيعياً غير مطلوب لتحقيق الدفاع الناجح ضد الباسيليليس وقد يمتد ذلك للإنسان. لا يوجد ادعاء بأن الباسيليليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرانييلنسيز معدية للإنسان وقد يكون ذلك راجعاً إلى أنها لم تستخدم على المدى الطويل كما حدث مع حشرات حرشفية الأجنحة وبالتالي يكون هناك تعرض أقل. لقد تعرض تحت النوع هذا

لاختبارات مكثفة عن الامان فى معامل متعددة. المعاملات عن طريق الفم والعيون والحقن اليريتونى والايروسول والحقن فى المخيخ لهذه البكتريا فى الفئران والجرذان والأرانب لم تثبت أى دليل لحدوث العدوى. هذا ولو أن الباسيليس ثورينجينسيز تحت النوع اسرائيلينسيز لم تثبت أكثر من ٨ أسابيع فى طحال الفئران. لم يوجد دليل على حدوث تضاعف كما لم تحدث أى مرضية بعد المعاملة. لقد اخفقت الكائن الدقيق تماما من رنتى الجرذان خلال أسبوع واحد بعد التعرض بالايروسول وحدث نفس الشئ من مخ الجرذان بعد ٣ أسابيع من الحقن فى المخيخ.

الفئران التى تعاني من نقص أو خفض المناعة ليست حساسة للعدوى للبكتريا B١ تحت النوع اسرائيلينسيز. الفئران العادية التى حقنت فى الوريد بتركيز ٢,٦ x ١٠<sup>٦</sup> جراثيم والهجين (BALB/c) مخفض المناعة مع هيدروكورتيزون أسيتات (١٠ مللجم/كجم) وحقنت فى الوريد بتركيز ١٠ x ٣,٤ جراثيم نجحت فى تصفية هذا الكائن الدقيق من الطحال خلال فترة ٧ أسابيع. معدلات التصفية اختلفت بين الفئران العادية وتلك التى عوملت بالكورنيكوسثيريود وكذلك الفئران غير المعاملة BALB/c والفئران المنيعه (سواء كانت عادية أو محقونة بالكورنيكوسثيريود) ومع هذا لم يثبت وجود أى دليل على حدوث العدوى.

لقد تم استرجاع B.sphaericus من الانسان وكان متضمنا فى تسعة حالات من الالتهابات السحائية فى الدماغ وحالة قاتلة من حالات الالتهابات السحائية الضعيفة Leptomeningitis وقد استرجعت من الورم الكاذب من رنة الانسان. هذه العزلات الأدمية غير مرضية للأرانب الصغيرة التى تم حقنها فى الوريد i.v. وفى الغشاء اليريتونى i.p. أو فى الفئران المعدة عن طريق الوريد أو بالحقن اليريتونى وفى المخيخ. العديد من العزلات الحشرية للباسيليس سفيريكس المتحصل عليها من WHO/CCBC (أرقام ١-١٣٢١، ١٤٠٤، ١٥٩٣-٤) تعرضت لاختبار التعرض الخاص بالأمان مع التحدى الأقصى والبروتوكول التقليدي. لم يظهر الجهاز العصبى المركزى للأرانب والفئران أية قابلية للعدوى مع وحدات ١٠ x ٤,٧<sup>٤</sup> مستعمرة (CFU) من هذا النوع. الفئران التى تم حقنها فى المخيخ قامت بتصفية هذه الوحدات فى خلال ٧ يوم. الحقن فى العيون لوحداث ١٠ x ١<sup>١</sup> CFU من B.sphaericus فى الأرانب لم تغطى أى دليل عن حدوث العدوى ولو أن الممرض الحشري لم يسترجع بعد ١٤ يوم من الحقن. العزلة الأدمية من هذا النوع NCTC#1102S التى حقنت تحت الجلد sac. وفى الغشاء اليريتونى i.p. فى الجرذان والفئران لم تسبب عدوى. الفئران العادية التى



تعانى من نقص المناعة استقبلت ١٠x٩,٥ CFU من NCTC#1102S تحت الجلد بدون أن تظهر أية مظاهر عدوى ولم يسترجع أى من هذه العزلات من مهروس النسيج.

التجارب الجارية فى المعامل على المستحضر التجارى من الباسيلليس سفيريكس التى تحصل عليها من الصحة العالمية WHO أوضحت أن الكائن الدقيق يمكن أن يسترجع من طحال الفئران بعد ١٠ أسابيع من الحقن اليربوتونى ip ومن الأكياس المقفولة فى الملتحمة للأرانب بعد ٨ ساعات من المعاملة. لقد أتضح أن الباسيلليس سفيريكس تبدو مقارنة لكلا BT وتحت نوعها اسرائيلينسىز فيما يتعلق بالثبات الطويل. أقصى ثبات لهذه الباسيللاى مدونة فى الجدول (١-٣).

جدول (١-٣): الثبات الأقصى للممرضات الحشرية البكتيرية والفطرية والبروتوزوية فى الثدييات

الكائن الدقيق	طريق الدخول	الثبات (يوم)	النوع
باسيلليس ثورينجينسىز تحت النوع الكورسكاى	الفشاء اليربوتونى	أكثر من ٣٥	فلر
باسيلليس ثورينجينسىز تحت النوع اسرائيلينسىز	الفشاء اليربوتونى	أكثر من ٧٠	فلر
باسيلليس سفيريكس	الفشاء اليربوتونى	أكثر من ٦٧	فلر
ميتر هيزيوم انيوباليا (أ)	الفشاء اليربوتونى	١٨	جرد
لاجينيدوم جيجانتوم (ب)	الفشاء اليربوتونى	٢٨	فلر
نوزيما الجيريا (ج)	تحت الجلد	٢٧	فلر
	الفشاء اليربوتونى	٤٢	ارنب

أ = لوحظت جراثيم بيضية oospores - لم تقدر الحيوية.

ب = أطوار قبل جراثيمية - لوحظ بعد التضاعف

ج = لوحظ وجود جراثيم - لم تقدر الحيوية - ترسب عرضى فى الكلى.

إذا لم يحدث إنبات لجراثيم البكتريا فأنها قد تسلك كجسيمات خاملة وهنا تكون ديناميكية التصفية مشابهة لجسيمات اللثى أو الغرويات. هذا بينما قد يثار جدل حول ان الاسترجاع الطويل للبكتريا او الثبات فى الحقيقة تمثل تضاعف بطئ مع إحلال ثابت للبكتريا التى تحطمت خلال دفاعات العائل. إذا حدث استرجاع للجراثيم فقط بعد الحقن وعدد الكائنات يتناقص مع الوقت فان هذا السيناريو قد يسيطر ويحكم. بالتبادل فان استرجاع الصور الخضرية أدى إلى الاقتراح بأنه على الأقل تكون البكتريا ذات مقدرة على التضاعف.

لقد أجريت تجربة معملية باستخدام الفئران التي حقنت بجراثيم الباسيلليس سفيريكس لتحديد ما اذا كان الإنابت سيحدث حقيقة في طحال الفئران وكذلك لتحديد معدل التصفية. لقد تم تسخين مهروس الطحال من ٤٠ فار في حمام مائي على درجة ٦٥°م لمدة ٣٠ دقيقة لقتل الباسيللاي (الأطوار الخضرية) حيث أن هذه الظروف لم تؤثر على الجراثيم. مقارنة عدد وحدات CFU المسترجع من محاليل الطحال المعامل المسخن والطحال غير المعامل أظهر أن محاليل الباسيلليس سفيريكس المعاملة والمسخنة تحتوي على عدد قليل بوضوح من CFU عن المحاليل غير المعاملة. لقد أدى ذلك إلى الاقتراح بحدوث إنبات للجراثيم. أظهرت تجارب المقارنة أن الجراثيم لم تتأثر بهذه الدرجة أو نظام التسخين الحراري كما أن مهروس الطحال المهروس لا يلصق الجراثيم agglutinate والذي قد يحدث في مستعمرات قليلة. التجربة الموضحة أعلاه أظهرت إمكانية وجود مقدرة على التضاعف في بكتريا الباسيلليس سفيريكس في الثدييات ولو أنه لم تلاحظ الباسيللاي في قطاعات الهستولوجي من أنسجة الطحال. عدد وحدات CFU لهذا النوع المسترجع مع الوقت يتناقص تبعا للمعادلة الوظيفية التالية:

$$Y = \ln 12.761 - 0.111X$$

حيث Y تساوى عدد وحدات CFU لكل جرام طحال — X تمثل عدد الأيام بعد الحقن.

#### ج- الفطريات الممرضة للحشرات: Entomopathogenic fungi

لم ينشر على الإطلاق ما يشير إلى أن الفطر *Metarhizium anisopliae* يحدث عدوى في الإنسان. الفئران والجرذان والأرانب أعطيت هذا الممرض الحشري في المعمل عن طريق الاستنشاق وتحت الجلد حقنا وفي الغشاء البريتوني حقنا وفي المعاملة القمية topical ولم تظهر أية أعراض عدوى أو مرضية. لقد تم استرجاع الكونيديا الحية من طحال الجرذان بعد ١٨ يوم من الحقن في الغشاء البريتوني (جدول ٣-١) كما تم استرجاع هذا الممرض الحشري *M.anisopliae* من المعدة والطحال والريثان في الفئران بعد ١٤ يوم من استنشاق الكونيديا. هذا بينما انخفض استرجاع هذا الفطر واختفى من الريثان بعد ١٤ يوم مما أدى إلى الاقتراح بعدم حدوث تضاعف. الحيوانات لم تختبر حيث أنها متوسطة المناعة في المعامل حيث أشار الباحث في السابق أن الجرذان ناقصي المناعة ليست حساسة للعدوى بالفطر ميتارهيديم أنيسوبليا.

بعد المعاملة عن طريق الجلد، الفم، في القصبه الهوائية، في الغشاء البريتوني وفي العين لم تحدث عدوى بالفطر *L. giganteum* على الجرذان والفئران والأرانب. لقد لوحظت الجراثيم البيضيه Oospores في خرايج abscesses الكبد بعد ٢٨ يوم من الحقن البريتوني. هذا ولو أن حيويته لم تقيم بسبب صعوبات الإنبات على بيئة المزرعة فإن الإنبات والنمو يجب أن تحدث قبل الحقن (لقد لوحظ أن الجراثيم البيضيه تتطلب عادة ٣٠ يوم أو أكثر من الأيام كي تتطور في الماء). لقد لوحظت الميسيليومات في خراجات المساريقا meseatric وهذه الخارج يجب أن تعقم عند الزرع. ولو أن الفطر *L. giganteum* يوجه أو يتميز بالاستجابة الخاصة بالالتهاب inflammatory في الثدييات إلا انه لم يثبت وجود دليل على إحداث العدوى حيث أن درجة الحرارة أعلى من ٣٠م تقلل طور الميسيليوم الخضري. لم يتم معاملة هذا الفطر في الحيوانات متوسطة المناعة. بناء على الحد الأعلى للحرارة ٣٠م للميسيليومات وكذلك عدم المرضية في الاختبارات يبدو أن هذا الفطر يمثل خطورة على الانسان.

#### د- البروتوزوا الممرضة للحشرات Entomopathogenic protozoa

لقد نشر الباحثان Uden and Alger (١٩٨٧) أن الحقن تحت الجلد بالفطر نوزيما الجيريا في وسادة القدم footpads والذيل للفئران أحدثت عدوى. لقد لوحظت الأطوار الخضريه بعد عشرة أيام من الحقن بينما وجدت الأطوار ما قبل الجرثومية بعد ٢٧ يوم من الحقن (جدول ٣-١). الجراثيم التي قتلت بالحرارة داومت ثابتة في الأنسجة حتى ١٢ يوم. لقد ماتت النوزيما الجيريا خلال ٣ أيام من عدوى خلايا كلى الخنازير التي تم صيانتها على درجة ٣٧م ولم توجد خلايا مصابة في الاوانى التي تم تحضينها على درجة ٣٨م. في المعمل فشل الحقن البريتوني وتحت الجلد وفي المخيخ بالنوزيما الجيريا في الفئران والأرانب في إحداث النتائج المذكورة أعلاه حيث لم تحدث مرضية أو عدوى من خلال وجود الصور الخضريه. الفئران الهجن منخفضة المناعة من جراء المعاملة بالهيدروكورتيزون أسيتات (٢٥ملجم لكل فأر) لم تظهر قابلية للعدوى. الفئران العادية لم تختبر بسبب أن مصدر عدوى هذه الميكروسبورديا كانت ملوثة بالبكتريا والفطريات من مهروس البعوض. لم يظهر أن النوزيما الجيريا تسبب تأثيرات ضارة على الانسان بسبب الحد الأعلى للحرارة لهذه البروتوزوا (٣٥م) وكذلك عدم احداثه للضرر أى innocuousness عندما يحقن من خلال بعض طرق

اختبارات التحدى فى التثبيبات ذات المناعة الطبيعية وتلك التى تعانى من خفض المناعة.

لقد استخدمت نوزيما لوكستيا فى مكافحة نشاطات الأوراق على امتداد عشرة سنوات دون أن تحدث أى حالة عدوى فى الإنسان أو الحيوان. هذه الميكروسبورديا تعرضت وشاركت فى اختبار التحدى الأقصى وكذلك الاختبارات التقليدية دون أن تسبب مرضية أو عدوى. لقد تم حقن الأرانب فى العين وفى الغشاء البريتونى دون أية حوادث أو مرضية. لقد أظهر الفحص الميكروسكوبى وجود جراثيم *N. locustae* فى كبِد فأر واحد بعد ٦ أسابيع من الحقن البريتونى. فى هذا الخصوص تم حقن الجراثيم عرضيا فى الكبِد ولم تقتر حيويته (جدول ٣-١)

لقد تم حقن الفئران فى المخيخ دون أن يحدث لها عدوى. لقد أحدثت النوزيما لوكستيا استجابة التهابات فى التثبيبات وفى الغالب وجدت الجراثيم فى الاورام المحببة فى الطحال والكبد *granulomatous foci*. هذا ولو أنه يوجد كمية كبيرة من مادة الحشرة فى مسبب العدوى *inoculum* وهذا الملوث قد يوجه الاستجابة على صورة الالتهابات *inflammatory* حيث أن شرائح نشاط الأوراق بدون النوزيما لوكستيا أظهرت استجابة ورمية محببة كذلك. معاملة واعطاء الجراثيم للجردان عن طريق القم لم تحدث ضرر كما أن هذا المرض الحشري لم يكن مثير للالتهابات الأولية فى الجلد. من المثير للاهتمام تحديد ما اذا كانت ستبقى حية وذات حيوية على نفس فترات جراثيم البكتريا الممرضة للحشرات. أظهرت نتائج الاختبارات أن النوزيما لوكستيا ليست مرضية للتثبيبات المختبرة ومن ثم لا تمثل خطورة على الإنسان.

هـ- العدوى *infectivity*: ممرضات الحشرات تملك أنواع من أطوار الحياة التى تستطيع الاستمرار فى المعيشة والبقاء عندما تصبح الظروف البيئية غير مناسبة للنمو والتطور الطبيعى (جراثيم/كونيديات/جراثيم بيضية). ليس من المستغرب أن هذه الكائنات الدقيقة تبقى حية وذات حيوية فى أنسجة التثبيبات لفترات مختلفة من الزمن. وجود هذه الكائنات فى الأنسجة والاسترجاع المتتابع قد يؤدى إلى توجيهات وأراء كاذبة *Spurious* عن العدوى لذلك وجب مزيد من الاهتمام نحو تقدير طور الحياه الذى يسترجع فى حالة حدوث عدوى حقيقية. يعتقد الكثيرون أن استرجاع الممرضات الحشرية من الإنسان يحدد أوليا بواسطة تكرارية تعرض الإنسان. مع تزايد استخدام المبيدات الحشرية الميكروبية فإن عزل الممرضات الحشرية التى تنتج تجاريا من

الإنسان من الأمور المحتومة التي لا يمكن تجنبها inevitable. توفر البيانات عن الأمان على الثدييات وكذلك تعاطف فهم فترة الثبات القصوى لهذه الوسائل الميكروبية في الثدييات سوف يساعد في تقييم أهمية ومعنوية وفائدة العزلات الادمية من الممرضات الحشرية اذا حدثت. بناء على البيانات المتوفرة عن الثدييات فإن الإنسان الذي يعاني من خفض المناعة لا يبدو أنه يواجه خطر كبير من العدوى من الممرضات الحشرية مقارنة بمجموع البشر العاديين.

#### \* سمية ممرضات الحشرات البكتيرية والفطرية على الثدييات:

أ- البكتريا: في المعامل تعتبر السمية toxicity حالة تستدعي الاهتمام عندما ترتبط بالتعرض لتركيز  $10^6$  أو أقل من البكتريا لكل فار أو  $10^7$  أو أقل من البكتريا لكل جرذ (يوجد حدود للجرعة الفردية الابوية اقترحها Burger ١٩٨١). لقد لوحظ أن بعض الباحثين الآخرين اقترحوا اجراء الاختبارات على جرعة تساوى ١٠ أو ١٠٠ مرة مثل متوسط الجرعة للحقنية لكل اكر مع نسبة تحويل من نسبة وزن الحيوان إلى وزن الانسان. لقد تم الاتفاق على ان الموت في حيوانات التجارب عند التركيزات أعلى من حدود بيرجس تكون مقبولة من حيث الأمان على الانسان ولو أن الجرعة النصفية القاتلة LD50 يجب تقديرها في الناحية العملية. التوكسينات الخارجية Exotoxins موضوع اخر ويجب أن يقيم كما هو الحال مع الكيمياءات باستخدام بروتوكولات أمان الكيمياءات القياسية وهذا ما لم نتناوله في هذا المقام. من الأهمية ملاحظة أنه بينما البكتريا نفسها قد لا تكون سامة عندما تنمو في مزرعة نقية فإن مكونات المزرعة والنواتج الثانوية للتخمير قد تكون كذلك ومن ثم فإن متطلبات التسجيل تشمل كلا المادة الفعالة والمركب أو المستحضر النهائي وضرورة تعرضها للاختبارات.

نتائج الاختبارات الاصلية التي نشرت عن الباسيليس ثورينجينسيس اوضحت أنها سامة على الفئران عند تركيز  $10^3 \times$  وحدة CFU عندما حقنت في الغشاء البريتوني كما كانت سامة على خنازير غينيا مع تركيز غير موصف. عامل السمية للفئران كان الثبات الحرارى حيث أن المزارع المعقمة بالايوتوكلاف سببت موت ٥ من ٥ فئران خلال ١٦ ساعة. لقد تأثرت خنازير غينيا كذلك حيث مات ٧ خنازير من بين عشرة من جراء الحقن البريتوني من مزرعة ماثلة Slant culture بتركيز غير محدد. لقد خلصت هذه الدراسة ان السمية ترجع الى خصائص المادة الحاملة لانها ترتبط بالكائنات الحية. لقد قام الباحثان Lamanna and Jones (١٩٦٣) بتقييم

السمية واحداث العدوى عن طريق الحقن البريتوني لسلالات عديدة من الباسيليس ثورينجينسيز وكذلك B.cereus و B.anthraxis على الفئران ولاحظنا أن الصور الخضرية كانت أكثر سمية من الجراثيم. لقد كانت الجرعة النصفية القاتلة لبكتريا BT على الأطوار الخضرية لكل فأر. لقد كانت السمية في حدود المستويات المقبولة حيث أنها كانت تحدث مع مستويات أعلى من  $10^6$  من الكائنات. كمقارنة كانت LD50 لاحدى سلالات الباسيليس أنثراكس تساوى جرثومتان لكل فأر وهذه تختلف بمقدار ١٠٠ مليون من بين هذه الانواع من الباسيليس بالنظر للسمية على الفئران. لقد لوحظ أن نتائج هذه الدراسات قد تتأكد بواسطة وجود البيتا-اكسوتوكسين B-exotoxin ذات النشاط في التثبيبات كما أن السلالات التي تحتوي على هذا التوكسين الخارجى منعت من الاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ١٩٧٣.

أظهرت تجارب الحقن في المخيخ باستخدام الجرذان في المعمل مع سلالة لا تنتج البيتا-اكسوتوكسين- باسيليس ثورينجينسيز 3a.3b قابلية إصابة الجهاز العصبي للمركزي لتراكيزات  $10^6$  وحدة CFU من الكائن الدقيق. لقد ثبت اعتماد الموت على الجرعة مع عدم حدوثه مع تركيز أقل من  $10^6$  كما كان عامل السمية هو حركة الحرارة. بيئة المزرعة أثرت على السمية حيث كانت BT النامية على بيئة منقوع المخ والقلب (BHI) أكثر سمية عن تلك التي نمت على اجار BHI (جدول ٢-٣). على عكس الدراسات السابقة كان يوجد عامل السمية الخاص بالحرارة heat labile. لذلك تم الإبقاء على السمية في الدلائل الخاصة بالامان خاصة عندما يؤخذ في الاعتبار طريق المعاملة في اختبارات عالية التحدى.

جدول (٢-٣): السمية المرتبطة لمرضات الحشرات البكتيرية والفطرية في المعمل

النوع	الجرعة	عدد الحيوانات المصابة/الميتة	طريق المعاملة أو الدخول	الكائن الدقيق
جرذ	$10^6$	٦/٥	المخيخ	BT كورسناكي
جرذ	$10^6$	٦/٢	المخيخ	BT كورسناكي
جرذ	$10^6$	٦/٥	المخيخ	BT لمرثايلينسيز
جرذ	$10^6$	٦/١	المخيخ	BT لمرثايلينسيز
فأر	$10^6$	٤٢/٢٦	الغشاء البريتوني	BT لمرثايلينسيز
فأر *	$10^6$	٤٢/٣	الغشاء البريتوني	BT لمرثايلينسيز
فأر *	$10^6$	٥/٥	المخيخ	B سفريكس
فأر	$10^6$	٤٩/٤٢	الغشاء البريتوني	B سفريكس
جرذ	١٠	٦/١	القصة الوائلية	لاجينيدوم جيجالتيوم

\* = فأر عارى BALB/c فأر محقون بالهيدروكورتيزون أسيتات

• - لم تحدث وفاة مع تعقيم مصدر العدو

لقد أحدثت BT اسرئيلينسيس موت في الجرذان بعد الحقن في المخيخ وكانت سميتها مشابهة لسلالات حرشقية الاجنحة دون حدوث موت تحت معدل  $10^6$  وحدة CFU لكل جرذ. لقد كان عامل السمية هو الحرارة وكانت السمية تتأثر بمكونات بيئة المزرعة وكذلك حرارة التحضين. بيئة BHI broth على درجة حرارة  $30^{\circ}\text{C}$  أنتجت معظم مصدر العدوى السامة الحقن البريتوني للنوع BT اسرئيلينسيس أحدثت وفيات في أحد التجارب التي صممت لتقدير حساسية الفئران ناقصى المناعة وذات المناعة المتوسطة للعدوى تحت هذا النوع. لقد أعطيت الجرعة  $1.6 \times 10^6$  وحدة CFU لأربعين جرذ عارى وجرعة واحدة  $3.4 \times 10^6$  لأربعين فأر عارى BALB/c محقون بالكورتيكوستيرويد وعدد 42 فأر عارى BALB/c للمقارنة. خلال فترة 10 ساعات حدثت وفيات في 62% من الفئران العارية. كذلك ماتت 7% من الفئران التي عولمت بالكورتيكوستيرويد بينما استمرت كل حيوانات المقارنة في المعيشة وقد لوحظ عدم وجود مواضع ضرر واضحة أو مميزة في الفئران الميتة. لقد كان مصدر العدوى يتكون من معلق مغسول ينتج بواسطة أحد الصناعات بينما كان المعلق التجارى ينتج من خلال قناة أخرى وكان يعطى خلال نفس الطريق من المعاملة ومع هذا لم يسبب أية وفيات. لم يكن متوقع وجود ملوثات بكتيرية حيث كانت المزرعة نقية. لذلك فإن السمية قد تكون حدثت من البكتريا نفسها أو من نواتج التخمر التي تلتصق على الجراثيم البكتريا BT اسرئيلينسيس. تجدر الإشارة إلى أن السمية لم تحدث مع جراثيم أقل من  $10^6$ .

لن نتناول سمية الدلتا- اندوتوكسين المذابة في القلوى (درجة حموضة 12) من BT اسرئيلينسيس على الثدييات لأن السم الاولى Protoxin لا ينقسم الى شرائح نشطة في الثدييات. لقد ذكر حديثاً أن البولى بيتيد KDa 60 مسؤل عن الفعل الهام والمحلل للدم لهذا التوكسين ومن ثم يجب أن يرتبط بمستقبلات الفوسفوليبيدات على غشاء الخلية لكي يزيد من النفاذية الخلوية Permeability.

عزلات ب- سفيريكس 1321-1093، 1044، 1045 النامية على بيئة مرق سفيريكس المخفلة وعندما حقنت في المخيخ كمزارع مرق كاملة broth لم تكن سامة على الجرذان عند تركيز  $10^6 \times$  وحدة CFU لكل جرذ ولكنها عندما حقنت في الفأر في المخيخ بتركيز  $1.2 \times 10^6$  وحدة CFU عانت من نزيف في المخ cerebral hemorrhages وماتت (الجدول 3-2). لم تحدث وفيات في الجرذان بعد الحقن

البريتوني بعديد من تركيزات  $10 \times 2,4$  وحدة CFU بينما الحقن تحت الجلد بتركيز  $10 \times 6,9$  وحدة CFU في الفئران لم تحدث تأثيرات معاكسة.

المعلق التجارى من ب- سفيركس عندما حقن في الغشاء البريتوني أحدث ٨٦% موت في الفئران خلال ٢٤ ساعة (جدول ٣-٢). التجارب اللاحقة أظهرت أن السمية تعتمد على الجرعة ولم يحدث أى وفيات عندما تم حقن جرعة  $10^7$  أو أقل من وحدات CFU. لم يوجد عامل السمية في الراشح أو الرائق المرشح ولذلك فإن السمية ترتبط بجراثيم هذا الكائن الدقيق أو النواتج التى تلتصق بغلاف القصرة وقد ثبت أن عامل السمية ثابت في الحرارة. لم يتضح ما إذا كان التوكسين الإبادى ضد الحشرات يسبب موت الفئران بسبب أن تجهيزات التوكسين للخم لبكتريا ب- سفيركس ١٥٩٣، ٢٣٦٢ ليست سامة على الخلايا Cytotoxic للهامستر الرضيع خاصة خلايا الكلى وليست سامة على خلايا الدم الحمراء في الإنسان حيث ثبت أن حقن التوكسين الخم في الماء المقطر (٧٥ ملجم/مليلتر) فشل في إحداث قتل الفئران. سمية هذا المستحضر التجارى تقع في حدود الامان الموضوعة. قد تظهر اختلافات بين تأثيرات المزارع المعملية والنواتج النهائية للكانات الدقيقة.

ب- الفطريات: لقد تأكد أن الفطر ميتاريزيوم أنيوبالبا غير سام على حيوانات المعمل. طريق الدخول والمعاملة شملت الايروسول والحقن تحت الجلد والأنبوب الفمى gavage (التغذية القهرية خلال مضخة الدفق وأنبوب يمر في المعدة) والمعاملة الفمية والتقطير في العيون Ocular instillation والحقن البريتوني. لقد حدثت أضرار عن موضع الحقن تحت الجلد (ورم جيبى تحت الجلد S.C.granulomas). لقد لوحظ الورم الجيبى بعد الحقن البريتوني ولكن هذا العرض قد ينتج من وجود جسيمات غريبة حيث أن البكتريا المعقمة في الاوتوكلاف تنتج تأثيرات متساوية الشدة. لقد سبب الفطر L.giganteum موت مؤثر في الجرذان (٦٧%) بعد التلقيط في القصبه الهوائية للجراثيم البيضاء بتركيز  $10 \times 1,2$  في ٠,٥ ماء مقطر. لقد ماتت بعض الجرذان خلال أربعة دقائق من تناولها الجرعة بينما الفئران الباقية ماتت من الالتهاب الرئوى الحاد خلال ٢٤ ساعة. لقد حدثت الوفاة بسبب احتقان ممرات الهواء و/أو الالتهابات الكبيرة في العائل بسبب الكميات الكبيرة من المادة الغريبة. خفض كمية العدوى الى  $10 \times 2,9$  جراثيم بيضية في نصف مليلتر ماء مقطر لكل جرذ قللت من معدل الوفيات ولو أن الممرض موجودا في الرئتان بسبب



الالتهابات التي حدثت في العائل من المادة الغريبة. لم تكن هناك وفيات مرتبطة بالتعرض عن طريق الجلد أو الفم أو العين أو في الغشاء البريتوني للبكتريا *L.giganteum* مما أدى إلى القول بأن الكائن الدقيق هذا غير سام على الإنسان.

جـ- السمية Toxicity: سمية البكتريا الممرضة للحشرات التي اختبرت معملياً وقعت في حدود المستويات المقبولة وحدثت وفيات فقط خلال طرق الدخول الموجهة مثل الحقن البريتوني وفي المخيخ. لقد لوحظ أن المنتجات التجارية قد تحتوي على منتجات قد تكون سامة على حيوانات المعمل مع تراكيزات عالية حيث لوحظ تفاوت بين المادة الجارية النامية في المعمل والناتجة التجارية. تفاوت الموت قد يكون بسبب الاختلافات بين السلالات والعزلات ومع كل هذا فإن ب. سفيريكس ثبت أنها نوع معقد والافراد غير مميزة لبعضها البعض من حيث الاساسيات المورفولوجية. هذا ناتى من المعرفة المتوفرة حالياً عن الطرز المورفولوجية والنشاط المتفاوت الابدائى على الحشرات. لقد لوحظ أن ب- سفيريكس سلالة ٢٣٦٢ تحدث موت بعد الحقن البريتوني لتركيز  $10^4$  وحدات CFU (ماتت ٦ فئران من ٦) ولقد خلص الباحثون أنه لا تحدث موت مع الجرعات أقل من  $10^4$  وحدة CFU.

الموت في الحيوانات المعرضة للفطريات كان ميكانيكياً عن طريق سد مسالك الهواء. لقد ثبت أن كلا الفطرين إلى جيجانتيوم، ام. انيسوبيليا ينتجا مواضع ضرر في الرئتان والبريتون في الجرذان والفئران وحيث أن المادة المعقمة في الاوتوكلاف تنتج ضرر ذات شدة مقارنة بخلص الباحثون إلى أن الضرر ينتج من تفاعل العائل للمادة الغريبة الثابتة في الحرارة. في النهاية تم الاستنتاج بأن التجارب الحيوانية أدت إلى الاقتراح بأن الممرضات الحشرية البكتيرية والفطرية لا تملك أية تأثيرات معنوية إلا في حالات الظروف المتناهية غير العادية عندما تحقق كميات كبيرة شاذة. قابلية الإنسان للاصابة بالتوكسينات الخارجية موضوع اخر مستقل يجب أن يقيم تبعاً لبروتوكولات تقييم الامان الموضوعية والمتفق عليها.

#### \* الخلاصة الشاملة

منذ أربعة عقود مضت فقدت مالكة احدى مزارع الدواجن في ميرلاند بأمريكا بعض من الطيور بعد معاملة المقاطعة بالبالميليس بوبيليا. لقد رفعت مالكة المزرعة دعوى قضائية على مسئولى المقاطعة وأخذتهم إلى المحكمة طالبة التعويض عما حدث من وفيات للدواجن. لقد دافع الباحث الدكتور جورج لانجفورد وهو مسئول برنامج

استخدام هذه البكتريا وشرح أمان الياسيليس بوبليا على الفقاريات وفي معرض دفاعه تناول ملحقاً من مسحوق الجراثيم في الماء مما دعا القاضى لتعليق القضية وتمت ملاحظة العالم واستمرت حياته ما يزيد عن ٢٠ عاماً بعد هذه الحادثة. مسئول عن الحشرات في ولاية ميرلاند. لقد تغير الزمن ولم نعد نعتد على المتطوعين الأحميين لتحديد خطورة الكائنات الدقيقة على الإنسان ولذلك أصبح من الأفضل الاعتماد على البيانات من التجارب الحيوانية. لقد خلص الباحثون الى أن ممرضات الحشرات لا تحدث العدوى للإنسان بالرغم من ثباتها لفترات طويلة من الوقت في أنسجة الثدييات. خلصت التجارب المعملية الى أن الناس الذين يعانون من نقص المناعة ليمسوا في خطر كبير من جراء العدوى بهذه المواد عن الناس ذوي المناعة العادية. ممرضات الحشرات ليست سبباً لمرض الإنسان ولا أنها سامة على الفئران والجرذان بعد المعاملة بكميات كبيرة من البكتريا الحية التي تدخل الجسم عن طريق التناول أو الطرق الأخرى. مع الطرق التقليدية للتعرض فإن الممرضات الحشرية المختبرة تكون غير محدثة للعدوى ولا تسبب أمراض. لذلك يمكن استخدامها بأمان في البيئة التي يتعرض فيها الإنسان بشكل طبيعي.

## REFERENCES

- Anon., Mammalian safety of microbial agents for vector control: a WHO memorandum, Bull. W. H. O., 95, 857. 1981.
- Apperly, F. L., Ed., Patterns of Disease on a Basis of Pathology, Lippincott. Philadelphia., PA, 1951.
- Belschner. H. G., Sheep Management and Discaes. Angus and Robertson. London. 1959. 415.
- Davis, B. D., Dutbecco, R., Eisen, H. N., Ginsberg, H. S., and Wood, W. B., Jr., Eds., Microbiology. 2<sup>nd</sup> ed., Harper & Row, New York, 1973.
- Dorland's Illustrated Medical Dictionary. 24<sup>th</sup> ed., W. B. Saunders, Philadelphia, 1965.
- Einstein. L. and Swartz, M. N., Pathogenic properties of invading microorganisms, in Pathologic Physiology – Mechanisms of Disease. 5th ed., Sodeman. W. A., Jr. and Sodeman. W. A., Eds., W. B. Saunders, Philadelphia. 1974, 454.
- Fisher. R. and posner, L., Toxicology of the microbial insecticide Thuricide, Agric. Ood Chém., 7, 686. 1959.
- Gill, S. S., Singh, G. P., and Hornung, J. M., Cell membrane interaction of *Bacillus thurinheinsis* subsp. *Israelensis*. cytolytic toxins, Infect. Immun., 55, 1300, 1987.
- Heimpel. A. M., Safety of insect pathogens for man and vertebrates, in Microbial Control of Insect and Mites, Burges, H. D. and Hussey, N. W., Eds., Academic Press. New York, 1971, 469.
- Ignoffo, C. M., Effects of entomopathogens on vertebrates, Ann. N. Y. Acad. Sci., 217, 141, 1973.
- Jones, T. C. and Hunt, R. D., Eds., Veterinary Pathology, 5<sup>th</sup> ed., Lea & Febiger. Philadelphia. 1983. 581.
- Kissane, J. M., Bacterial diseases, in Pathology, Vol. 1, Anderson, W. A. D., and Kissane, J. M., Eds., C. V. Mosby, St. Louis, 1977, 369.
- Lamanna, C. and Jones, L., Lethality for mice of vegetative and spore forms of *Bacillus cereus* and *Bacillus cereus*- like insect pathogens injected intraperitoneally and subcutaneously. J. Bacteriol., 85. 532. 1963.
- Newsom, I. E., Sheep discases. Williams & Wilkins. Baltimore. 1952. 3.

- Samples, J. R. and Buettner, H., Corneal ulcer caused by a biologic insecticide (*Bacillus thuringiensis*). *Am. J. Ophthalmol.*, 95, 258, 1983.
- Thomas, W. E. and Ellar, D., *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* crystal delta endotoxin: effect on insect and mammalian cells in vitro and in vivo. *Cell Sci.*, 60, 181, 1983.
- Undeen, A. H. And Alger, N. E., *Nosema algerae*: infection of the white mouse by a mosquito Darasite Exp. Parasitoi., 40, 86, 1970.

## الفصل الثاني

# أمان المبيدات الحشرية الميكروبية على الفقاريات والحيوانات الليفة والحياه البرية

### (١) المقدمة Introduction:

أ- تقديم واستعراض عام: الآفات ونقالات الامراض التابعة لمفصليات الارجل تلعب دورا مؤثرا على الانتاج الزراعى وصحة الانسان والحيوان. لقد تركزت مكافحة هذه الناقلات على تطوير واستخدام المبيدات الكيميائية. فى الاصل وفى البداية تحصل على نتائج جيدة من خلال الحملات الواسعة لمكافحة الآفات ومع استمرار الاستعمال على امتداد ٥٠ عاما ظهرت تفلوتات فى مخرجتها مع ظهور مشاكل عديدة. لقد أدت التأثيرات الجانبية على الكائنات غير المستهدفة ومقاومة الحشرات المستهدفة لفعل المبيدات وتلوث البيئة وخلل التوازن فى مجتمعات الحشرات والمقدرة على احداث التشوهات الخلقية teratogenicity والسرطانية carcinogenicity الى تنشيط الاهتمام بوسائل مكافحة الاخرى بخلاف المبيدات.

٢- زيادة الاهتمام باستخدام المبيدات الحشرية الميكروبية بدأ بعد ١٨٨٠ ولكنه كان محدودا ومحددا بسبب متطلبات النمو السريعة لمرضات الحشرات. بحلول الاربعينيات تم اكتشاف وسائل عديدة نافعة ودخلت الى حيز التطبيق. فى البداية لم يكن مطلوبا الا القليل لاثبات أن الكائن فعال وأمن. لقد كان من بين متطلبات التقييم عمل دراسة واستعراض عن الامان على الفقاريات. لقد قام الباحث Dutky بعزل ووصف الكائن المسبب لمرض اللبن Milk disease المتسبب عن الباسيليمس بوبيليا فى اواخر الثلاثينات و أمكن الحصول على حقوق ملكية فى أمريكا U. S. patent لتوزيع هذا الكائن فى الطبيعة بعد اجراء واستكمال بعض الاختبارات بما فيها تغذية الجراثيم بواسطة الزرزور Starlings والفراخ دون أية تأثيرات معاكسة.

لقد أصبح واضحا الحاجة الى اجراء بعض الاختبارات التقليدية التى تجرى على المبيدات للتنبؤ بمخاطرها على الثدييات وما يستتبع ذلك من احتمالات التأثير على الانسان. لقد كانت الولايات المتحدة الامريكية أول البلدان التى سنت قانون يتناول تسجيل المواد التى تستخدم فى معاملة المحاصيل الغذائية. لقد كان ذلك هو القانون الفيدرالى لمبيدات الحشائش والفطريات والقوارض لعام ١٩٤٧. فى

خلال ١٠-١٥ سنة التالية لصنوع هذا القانون وضعت الدول الاخرى تشريعات مشابهة لتلك الموضوعية في أمريكا. لقد وضعت قوانين تنظم وتشرع بواسطة الحكومات في السويد والمانيا الغربية آنذاك وهولندا ونيوزيلندا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا آنذاك وايران وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي وقتئذ وسويسرا.

مع تطور اختبارات الامان لمبيدات الآفات أصبح من الواضح أن المبيدات الحيوية تتطلب اختبارات متميزة ليست مطلوبة بالضرورة مع المبيدات الكيميائية. من الاهتمامات الاولى مقدره هذه الوسائل الحيوية على التضاعف مع احتمالات قوية للاستقرار في البيئة واحداثها للعدوى في الكائنات غير المستهدفة (NTOs). من الاهتمامات والنواحي الأخرى انتاج ونواتج تهليل سامة أو Toxic metabolites وكذلك حدوث طفرات وراثية في كثير من الكائنات الممرضة وتحفيز تفاعلات الحساسية allergic reaction وحدث التهاب بالملامسة irritancy.

ب- تصميم اختبارات الامان safety test design: مع أن المبيدات الكيميائية والحيوية تتقاسم النتيجة النهائية في مكافحة مفصليات الأرجل فإن الميكانيكيات الأساسية للمكافحة من خلالها قد تكون مختلفة. لقد تم تصميم الاختبارات مبكرا لتقييم المبيدات الكيميائية وقد قدمت النتائج اجابات جزئية عن الاسئلة التي كانت ومازالت عن أمان المبيدات الحيوية. لذلك قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) في عام ١٩٨١ باصدار مذكرة بعنوان "اختبارات الامان وتشريعات المبيدات الحيوية على الثدييات". لقد كان الغرض الاساسي من الاختبارات التي صممت بواسطة WHO اجراء تحليل الخطر/الفائدة risk/benefit analysis لكل من الاستخدامات المختلفة من الوسائل الحيوية المختلفة. لقد تم تطوير نظام اختبارات أمان على الثدييات مكون من ثلاثة بطاريات three-tier وكذلك تضمن الاصدار التوصيات الخاصة باجراء حصر منظم ودورى للنواحي السيرولوجية على كل الاميين المعرضين للمرض خلال التطوير والتطبيق علاوة على اقتراحات خاصة ببداية اجراء الاختبارات المحدودة وتقدم التجارب الحقلية الموسعة.

لقد وضعت منظمة WHO قائمة بطرق التعرض الخاصة وأنواع الاختبارات الواجب اجراؤها ونوع وعدد أنواع الثدييات التي تستخدم في كل اختبار. اختبارات البطارية الاولى تتضمن التعرض عن طريق الفم والقضاء البريتوني (ip)

والاستنشاق والعيون والجلد مع اختبارات الحساسية والحساسية الفاققة واصدارات الطفرات. بسبب ميل الوسائل الفطرية لاحداث تفاعلات الحساسية يجب أن تجرى اختبارات لدلائل اضافية مثل Arthus وتفاعلات فرط الحساسية المتأخرة delayed hypersensitivity فى اختبارات أمان الوسائل الفطرية. هناك تشديد مع البروتوزوا والفيروسات خاصة بالكشف عن احدثائها للعدوى بسبب السمية القليلة المرتبطة بهذه الكائنات. يجب أن تتضمن البطارية الاولى اختبارات العدوى فى مزارع أنسجة الثدييات على هذه الوسائل. اختبارات ميكروسبورديا البروتوزوا يجب أن تتضمن تعرض الجمجمة بسبب المرضية المعروفة للجهاز العصبى المركزى. بالاضافة الى ذلك فان البروتوزوا التى لا تتضاعف مع درجة حرارة جسم الثدييات يجب أن تحقن فى النسيج مع درجات حرارة منخفضة مثل الذبول أو أمشاط القدم بدلا من التعرض عن طريق الحقن البريتونى.

لقد قامت مجموعات مختلفة بتصميم بروتوكولات لاختبار الوسائل الحيوية بما يلقى الضوء على السمية للفقاريات. التوكسينات التى تنتج بواسطة هذه الكائنات يجب أن تعزل وتوصف وتعرف من حيث نظم احداث الفعل. بالاضافة الى ذلك فانه يجب تقييم تمثيل التوكسين بواسطة الفقاريات كما يجب اجراء اختبارات السمية الحادة والمزمنة كما هو متبع فى بروتوكولات المبيدات الكيميائية. تقييم التأثيرات على المدى الطويل على العائل يجب اجراؤها خاصة السرطانية والتشوهات الخلقية.

**خلاصة القول** أن تصميم دراسات امان الممرضات الحشرية فى الفقاريات يجب أن تتضمن اختبارات العدوى والسمية والحساسية والالتهابات. عدوى الفقاريات تبنى على تعريف وتوصيف الوسيلة وتحديد المدى العوائلى. الدراسات على النمو المعتمد على الحرارة والمعيشة والبقاء فى مزارع الانسجة والبقاء والتوزيع ومقدرة التضاعف فى الثدييات خلال الطرق المختلفة من التعرض (بما فيها الحيوانات ذات المناعة المنخفضة) يجب أن تجرى. التوكسينات التى تنتج بواسطة كائن دقيق يجب أن تقيم بناء على أساسيات تقييم امان المبيدات الكيميائية. اختبارات الحساسية يجب أن تتضمن الاختبارات فى حيوانات التجارب واجراء ملاحظات على الناس الذين يتناولون الممرضات هذه لمعرفة الحساسية على المنتج الاولى والمستحضر خلال اختبارات الحساسية على الجلد والعيون فى حيوانات التجارب مع ملاحظة الأيمنين الذين يتناولون المركب خلال التطوير.

## (٢) مجاميع الممرضات Pathogen groups:

### ← (أ) البكتريا

لقد استخدمت كلا البكتريا المكونة للجراثيم Sporeforming وغير المكونة للجراثيم كممرضات الحشرات. البكتريا المكونة للجراثيم قد لاقت معظم الاهتمام كمبيدات حشرية ميكروبية. من هذه المجموعة الباسيلليس ثورينجينسيز والباسيلليس سفيريكس والتي درست واختبرت على نطاق واسع.

#### ١- باسيلليس ثورينجينسيز

لقد استخدمت بكتريا BT بكثافة في الزراعة والغابات وبرامج الصحة العامة لمكافحة آفات حشرية الاجنحة وبعض شبكية الاجنحة nematoceros من ثنائية الاجنحة. لقد أنتجت أصناف من BT بشكل تجارى وسجلت في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا الغربية ودول عديدة أخرى تستعمل المبيدات الحيوية. اختبارات الامان واستخدام هذه الكائن الدقيق يرجع الى الخمسينيات مع تطور الثوروسيد. الدراسات الابتدائية شملت اختبارات على متطوعي البشر مع التعرض عن طريق الفم والاستنشاق وكذلك عدوى الفئران بأنواع عديدة من BT في محاولة لتعريف السلالات المرضية للفئران. الاختبارات اللاحقة تضمنت سلسلة من الدخول لجسم الفأر وملاحظة ثبات الممرض في دم الفأر وكذلك الحقن البريتوني في خنازير غينيا والسمية عن طريق الاستنشاق في الفأر واثبات التهابات في خنازير غينيا والسمية عن طريق الفم في الجرذان. لم تظهر أى سمية أو مرضية من هذا الكائن فى أى من هذه الاختبارات. اختبارات الامن التى أجريت بواسطة مجاميع أخرى أظهرت عدم حدوث تأثيرات على الفراخ والدجاج البياض والخنازير الصغيرة والناضجة والطيور الذيل Pheasant والحجل Partridge.

لقد أجرى Hadley وآخرون (١٩٨٧) دراسة لمدة ٥ شهور عن السمية/العدوى عن طريق الفم للباسيلليس ثورينجينسيز فى الاغنام. لقد أجريت هذه الدراسة بسبب ما خلص اليه Morden and Herein من أن المبيدات الحشرية من الباسيلليس BT عندما غذيت فى الاغنام أحدثت التهاب رئوى والتهاب العضلة القلبية وأضرار فى الكبد. لم يتحصل الباحث Hadley وآخرون على أية تأثيرات سامة أو عدوى من BT تحت النوع كورستاكى على الاغنام. بسبب امكانية BT لتكوين طفرة نحو تكوين باسيلليس أنثراكس (التي تسبب مرض الجمرة الخبيثة anthrax فى الحيوانات والانسان) فى القناة الجوفمعية أجريت دراسة أخرى. اضافة لهذه الجزئية تم دراسة عزل الفاج



Phage من بكتريا BT القادرة على عدوى مزارع باسيليس أنثراكس. اعتبارا لامكانية حدوث الطفرة والتضخيم في الثدييات تم اجراء دراسة أخرى مع طريقتين منفصلتين من التعرض. لقد تم تغذية الفئران المعاملة بالمضاد الحيوى على BT وبسيدوموناس أيروجينوزا وبعدها تم استئصال أمعاء الفأر وربطت ثم حقنت بمزرعة البكتريا. فى أى من الحالات لم يظهر ما يدل على حدوث طفرة وبعد ٢٤ ساعة كان مجموع BT ضئيل للغاية بينما *P.aeruginosa* انخفضت بشكل حاد.

استعراض الدراسات المرجعية يوضح ندرة التقارير حول المرضية على الثدييات من جراء التعرض لبكتريا BT. الانتشار المعرض للديليل (مستحضر BT فى معامل أبوت) فى عيون أحد المزارعين أدى الى حدوث قرحة فى القرنية والتي أنتجت BT تحت السلالة كورستاكى فى المزرعة. يوجد تقرير واحد يشير الى التهاب الندى القاتل فى الابقار Mastitis من الباسيليس ثورينجينسي. أشار العديد من الباحثين عدم حدوث عدوى بكتيرية bacteremia من جراء وجود البكتريا فى أنسجة الفقاريات بعد العدوى بجرعات عالية من BT.

فى الخمسينيات ظهرت تقارير عديدة تشير الى ان بعض سلالات BT أنتجت اكسوتوكسين ثابت فى الحرارة. بعد ذلك مباشرة تم الكشف عن أربعة مركبات سامة فى مزارع البكتريا البللورية *Crystalli ferous*. هذه السموم شملت الفا- اكسوتوكسين، بيتا- اكسوتوكسين، دلتا- اندوتوكسين، وجاما- اكسوتوكسين. بسرعة تم افتراض أن الدلتا- اندوتوكسين والبيتا- اكسوتوكسين ذات أهمية فى تطوير لاحق لانواع من BT. أظهرت الدراسات أن المدى العريض للحشرات تأثر بالانواع التى تنتج الاكسوتوكسينات بينما الانواع التى تنتج الاندوتوكسين كانت متخصصة بشكل ملحوظ على الكائنات المستهدفة.

أ- دلتا- اندوتوكسين  $\delta$ -Endotoxin: التأثيرات المرضية فى حشرات حرشفية الاجنحة وثنائية الاجنحة لمختلف الاصناف التجارية من BT ترجع فى جزء كبير منها الى الاندوتوكسينات التى تنتج خلال التجرثم Sporulation. هذه التوكسينات تسود فى الاجسام الباراجراثومية ومن ثم يجب أن يتم تناولها لى تصبح نشطة. هناك العديد من العوامل الداخلية *intrinsic* والخارجية *extrinsic* تحكم حساسية نوع الحشرات لهذه التوكسينات. استراتيجيات ومعدلات التغذية ودرجة الحموضة وبيئة الانزيمات فى المعدة للكائن المستهدف وموقع ارتباط التوكسين من أكثر العوامل الداخلية أهمية والتى تؤثر على حساسية ومستوى الكفاءة على اليرقات.

لقد أجريت اختبارات مكثفة على منتج الاندوتوكسين وهو BT تحت النوع اسرائيلينسيز والمعروف بالباميليس ثورينجينسيز (H-14). لقد أظهرت الاختبارات المبكرة انها آمنة للإنسان وغيره من الفقاريات. في دراسات لاحقة استخدم هذا الكائن الدقيق كنموذج في تطوير اختبارات التحدى الاقصى في برنامج اختبار الامان على الثدييات. هذه الاختبارات تشمل حقن جرعات عالية من الكائن في المخ intracranially وفي العيون intraocularly. لقد استخدمت كذلك الطرق التقليدية للتعرض كما في التعرض عن طريق الفم وعن غير طريق المرى Parenteral (غير معوى) وعن طريق الجهاز التنفسي وكذلك الجلد. هذه الاختبارات، وتفاوت التعرض بالإضافة الى اختبارات الحساسية واستخدام الحيوانات منخفضة المناعة واحداث الطفرات لم تظهر أن BT تحت النوع اسرائيلينسيز تحدث أية أضرار على الثدييات. الدراسات اللاحقة على الجرذان والفئران وخنزير غينيا والارانب أكدت على أن الثدييات ذات تحمل عالي للميكروب كما أنه يطرد بسرعة من الجسم ولا يتضاعف. لقد ثبت كذلك أمان هذا الكائن على البرمائيات amphibians. متطلبات التسجيل ونتائج الامان على الثدييات والاختبارات التي تجرى في اليابان.

على عكس هذه الدراسات ظهرت تأثيرات ضارة injurious في دراسات الامان التي تمت فيها المعاملة المباشرة للاندوتوكسين المذاب في محلول منظم من هذا الكائن. لقد اتضح أن الكائن ذات سمية خلوية Cytotoxic لخمس خطوط خلايا مزروعة لخمس أنواع من الثدييات وتسبب تحلل دموى في كرات دم الثدييات. لقد أشار Armstrong وآخرون (1985) الى قابلية الاندوتوكسين المذاب لتحليل Lyse كرات الدم الحمراء وقد اتضح انه قاتل للفئران عندما يحقن في الغشاء البريتوني. أظهرت دراسة اخرى أن الحقن البريتوني في الفئران. أحدثت تأثيرات مماثلة لتلك التي يحدثها التوكسين العصبى neuromuscular toxin. لقد وجدت نفس مجموعة الباحثين أن حقن توكسين BT تحت النوع كورسناكي المذاب في القلوى في الفئران لم ينتج أية أعراض ضرر عصبية عضلية. لقد قام الباحثان Kalmakoff and Pillai بعزل نوعين من البروتينات (بروتين A، B) من بللورات BT تحت النوع اسرائيلينسيز. لقد وجدوا أن البروتين (A) يقوم بالتحلل المائى لكرات دم الانسان والارانب hemolytic كما أظهر نشاط سمية عصبية neurotoxic activity عندما استخدمت العقلة العصبية البطنية السادسة في الصرصور الأمريكى.

لقد أجرى الباحثان Thomas and Ellar (١٩٨٣) دراسة لتوضيح اختلاف التأثيرات على الثدييات عندما تعطى بلورات الدلتا- اندوتوكسين الأصلية وتلك التي تعطى الاندوتوكسين المذاب للبكتريا BT تحت النوع اسرانيونيسيز. لم يلاحظ الباحثين أية تأثيرات سامة واضحة من جراء المعاملة بالاندوتوكسين الاصلى لكل فرد Per os تحت الجلد أو حقن في الوريد في الفئران ذات المناعة العادية BALB/c. على العكس أحدثت الدلتا- اندوتوكسين المذاب تغيرات خلوية Cytological وخلوية مرضية Cytopathic في الفيروبلات في الفئران وفي الخلايا الليمفاوية في الخنازير وثلاثة أنواع في الاورام السرطانية في خلايا طلائية الفأر. بالإضافة الى ذلك حدث تحلل دموى في الجردان والفئران والاحصنة والانسان ( في كرات الدم الحمراء) كما أن الحقن الوريدي في فئران BALB/c سببت شلل وموت سريع. لم يظهر بلورات الدلتا- اندوتوكسين المذابة أى تأثيرات سامة عندما أعطيت Per os. الاختبارات على BT من النوع كورسناكى في صورة البلورات الاصلية وجدت غير سامة على الفئران كما لم تظهر أى مرضية خارج الجسم ولكنها عندما تم تناولها بواسطة الحشرات الحساسة كانت قاتلة وبسرعة مما يوضح حدوث تنشيط في السم الاولى Protoxin activation في معدة الحشرات القلوية.

ب- بيتا- اكسوتوكسين B-Exotoxin: بعض سلالات BT تنتج كذلك البيتا- اكسوتوكسين ذات الثبات الحرارى وهو أدينين نيوكلوثيد. المدى الواسع للنشاط ضد عدد من اللافقاريات مكن من استخدامه في مكافحة الذباب المنزلى Muscoid Flies وأنواع أخرى من الاقوات الحشرية. بسبب ثبات المركب استخدم في العليقة خلال الطور اليرقى لمكافحة الذباب فى سباح الايقار والدواجن. لسوء الحظ فان التأثيرات السامة للمركب غير متخصصة على الحشرات. من أكثر التأثيرات الضارة للممرضات الحشرية أو نواتج تمثيلها على الفقاريات تأكدت من العديد من الدراسات. اختبارات الامان التي أجريت مبكرا على البيتا- اكسوتوكسين أدت الى حدوث موت في الفئران بعد الحقن الوريدي. لم يتم الكشف عن أية أضرار مرضية نسيجية في المخ والكبد والنظام الليمفاوى ونخاع العظام. أظهرت دراسات أخرى حدوث نكرزة في الكبد وأضرار في الكلى والطحال. أظهرت الجرعات غير القاتلة عدم حدوث تأثيرات تراكمية. توصيف التوكسين بواسطة الباحث Sebesta وآخرون (١٩٩٦) أظهر أنه يسبب تثبيط فى تخليق الحامض النووى RNA فى خارج جسم الفأر. لقد اقترح

أن النشاط الفسيولوجي للبيتا- اڪسوتوكسين يرجع الى التفاضل بين الاكسوتوكسين والالينوزين ترائى فوسفات ATB ومن ثم يحدث نشاط طفرى خفيف.

أظهرت دراسات سمية أخرى أن الاختلافات فى الموت المرتبط بالجنس فى الفئران التى تم حقنها بالاكسوتوكسين ملحوظة وظاهرة. الاختبارات باستخدام ٦٠ فار من كل جنس أظهرت أن الجرعات القاتلة النصفية LD50 تساوى ١٨٤,٨ بينما LDq5 تساوى ٢٩٠,٦ ميكروجرام/جم من وزن الجسم فى الذكور. لقد كانت القيم المقابلة فى الاناث تساوى ١٣٥,٦، ٢٦٦,٩ ميكروجرام/جم وزن الجسم على التوالي.

أظهرت دراسات التغذية بالبيتا- اڪسوتوكسين نتائج متضاربة. مضافات الغذاء المحتوية على بيتا- اڪسوتوكسين بكمية كافية لكى يمر خلال البراز فى كميات كافية كذلك تقتل الذبابة المنزلية وذبابة horn-fly (Haematobin-irritans) وذبابة الوجه Face fly (M.autumnalis) درست. لم تلاحظ أية سمية على الثدييات من اعطاء هذه المادة للدجاج والعصافير اليابانية والفئران والثور المخصى الصغير Steers. على العكس من ذلك أظهرت دراسات حديثة حدوث ضرر فى الدواجن بعد اعطائها البيت- اڪسوتوكسين. لقد شملت الاضرار تآكل فى القانصة gizzard والتهاب ومغص فى الامعاء enteritis والمعدة الحقيقية للطائر Proventriculitis وفقر الدم anemia وكذلك نزيف فى البشرة Pectechial hemorrhages فى المعدة ونكوص المبيض regressed ovaries. بالاضافة الى ذلك لاحظ الباحث Galichet (١٩٦٥) حدوث فقد فى الشهية anorexia ونقص فى وزن الخنازير المعاملة كذلك لاحظ الباحثان Ode and Matthysee (١٩٦٤) حدوث رفض من قبل الابقار للطعام المحتوى على البيت- اڪسوتوكسين.

#### ٢- الباسيلليس سفيريڪس B. Sphaericus

أظهرت العديد من عزلات الباسيلليس سفيريڪس نشاط ابدى ضد يرقات البعوض وكانت الطرز السيرولوجية الاكثر فاعلية 25 و 5a, 5b. ولو أن هذه البكتريا لم تنتج تجاريا بعد الا انها تستخدم تجريبيا فى أماكن عريضة من معيشة البعوض على مستوى العالم. فى عام ١٩٨٠ بدلت دراسة مكثفة عن الامان لاختبار سلالة اوسلاطات من هذا الكائن (4-1593, 9-1404, 11-1 SS). الانواع التى اختبرت شملت الفئران والجردان والارانب. لقد تم حقن هذه الحيوانات تحت الجلد وفى العشاء البريتونى وفى المخ والعيون. لقد كانت نتائج هذه الاختبارات مشجعة.

لقد أنتج الحقن تحت الجلد حالة واحدة من خراج موضعي Local abscess ولكنه لم يكن محتويًا على الباسيليليس سفيريكس. الحقن البريتوني وفي المخ في الارانب وحقن المخ في الجرذان لم ينتج أية أضرار نمجية معنوية. الجرذان التي عوملت بأعداد كبيرة من البكتريا حقنًا في المخ طورت التهاب السحايا بشكل معتدل Mild meningitis مع صدف وعائى كما ينتج البكتريا على المزرعة. حقن عيون الارانب intraocular بالبكتريا أنتجت Ophthalmitis متوسطة وحتى Panophthalmitis وهي تكون أكثر شدة وخطورة في الحيوانات التي تناولت أو عوملت بكائنات حية نشيطة ولو أن المادة المعقمة في الاوتوكلاف أنتجت أضرار كذلك. الدراسات التي صممت لاختبار تضاعف البكتريا في مخ الجرذان أظهرت أن عدد الجراثيم ينخفض بالتدريج حتى ١٤ يوم حيث تنتج الاماخ مزارع سالبة من الباسيليليس سفيريكس. أظهرت دراسات السمية الحادة والمزمنة على الجرذان والفئران وخنزير غينيا مع المعاملات عن طريق الفم والحقن تحت الجلد وفي الغشاء البريتوني وفي المخ عن طريق الاستنشاق ومن خلال التعرض الجلدي عم حدوث أية تأثيرات وكذلك مع الفحص بعد الوفاة Postmortem.

الدراسات الحديثة التي استخدمت فيها الفئران التي عوملت بالجراثيم الحية للطرز الميولوجية 5a, 5b والسلالة 2362 عن طريق الحقن تحت الجلد وفي الغشاء البريتوني وفي الوريد مع تعرض اضافي عن طريق الفم والجلد والاستنشاق لم تظهر أية أضرار مرضية مع الفحص بعد الوفاة. لقد أظهرت دراسات أخرى أمان هذه البكتريا على الاربيان Cray fish (Arthropoda/Decapoda) والسمك أكل اليرقات Larvivorous fish وفرخ الضفدع Tadpoles ولو أن بعض الباحث أشاروا الى سمية هذه البكتريا على ضفدع الرانا مع التركيزات العالية.

توجد تقارير نادرة عن الفعل غير الابدائي على الحشرات للباسيليليس سفيريكس نعدى الانسان. لقد أشار الباحثان Allen and Wilkinson (١٩٦٩) الى حالة واحدة من التهاب السحائي وعمومية تفاعل Schwartzman في انسان عجوز بعمر ٦٤ عاما. لقد تم زراعة الباسيليليس سفيريكس في الدم والمائل الشوكي وسائل الغشاء العنكبوتي البطني في الدماغ Subarachnoid. لقد فشل حقن الارانب في الوريد وفي البريتون بهذه العزلة في انتاج عدوى أو أية أضرار. لقد استعرض Farrar (١٩٦٣) ١٢ عدوى في الانسان بالبكتريا غير الممرضة من الجنس باسيليليس. معظم هذه العدوى أثرت على الجهاز العصبي المركزي مع مملك مباشر بولبي لدخول أغشية الدماغ

Meningea أو نجرثم الدم الثابت Persistent bacteremia الذى يسبق عدوى الالتهاب السحائى فى الدماغ. لقد أشار أحد الباحثين الى عزل الباسيلليس سفيريكس من ورم كاذب فى الرئة Pseudotumor.

### ٣- البكتريا التى لا تكون جراثيم Nonspore forming bacteria

يوجد نوعان من البكتريا التى لا تكون جراثيم تعتبران كمبيدات حشرية ميكروبية. لمساء الحظ فان هذه الوسائل الميكروبية معروف عنها أنها ممرضة للحيوانات والانسان.

أ- بسيدوموناس أريجيتونزا *Pseudomonas a-ruginosa*: هذا الكائن أو الميكروب مرتبط بالعدوى المنقطعة Sporadic للنباتات والحيوانات والانسان وكذلك الحشرات. العدوى فى الحيوانات والانسان ترتبط عادة بالغزو الثانوى بواسطة هذا الكائن بعد ظروف الضعف والوهن debilitating ولو أنه قد يكون كممرض أولى فى بعض الاحيان. توجد تقارير تشير الى عدوى كل الحيوانات الاليفة والمعملية كما حدثت اصابات وبائية شديدة epizootics.

ب- سيراتيا مارسيسنس *Serratia marcescens*: السيراتيا على غرار بسيدوموناس تعتبر من الكائنات المساعدة للنهضة للفرص أو ذات المناسبات Opportunistic. الميكروب شائع فى الزواحف ولو أنه توجد تقارير عديدة تشير الى احدثائه عدوى فى الانسان. (Heimpe, ١٩٧١, Jacobson, ١٩٨٤).

### ← (ب) الفيروسات Viruses

الفيروسات الممرضة للحشرات تقسم فى العادة لفرض المناقضة الى:  
١- الفيروسات المغروسة Occluded فى اجسام البروتين البارابلورية من ٠,٥ الى ٢٠ ميكرومتر فى القطر ٢- الفيروسات غير المغروسة. الاجسام المغروسة تحمى الفيروونات من الظروف المعاكسة البيئية. الفيروسات التى تحتوى على فيروونات مغروسة تتضمن Baculoviridae (ولو أن فرد من هذه المجموعة غير مغروسة) و Poxviridae و Reoviridae. الفيروسات من عائلات Rhabdoviridae, Iridoviridae, Parvovirus, Picomaviradac غير مغروسة.

١- Baculoviridae: تقسم الباكولوفيريدي الى تحت مجاميع ثلاثة: ١- فيروسات البولى هيدروزييس الئووية (NPV) ٢- الفيروسات المحببة granulosis (GV), ٣- مجموعة صغيرة من الفيروسات غير المغروسة بشكل القضيب rod-shaped. هذه

العائلة من الفيروسات تطورت بشكل واسع وأختبرت واستخدمت في مكافحة الحبيوية للآفات وحديثا كفيروسات منمنجة لانتاج هذه المنتجات المتنوعة مثل انترليوكسين-٢ الالامى، بروتين C-myc الالامى وانترليوكسين الفئران.

أ- فيروسات البوليبيروزييس النوية: الفيروسات هذه NPV's من أكثر الفيروسات التي درست باستفاضة من بين جميع الفيروسات الممرضة للحشرات. لقد اتضح انها مناسبة بشكل خاص للمكافحة الحبيوية للآفات بسبب التخصص العائلى لها (بداية وألوييا حرشفية الاجنحة Lepidoptera) وكذلك أنواع الفيروسات المتخصصة داخل هذه المجموعة والدرجة العالية من العفوانية وحقيقة أن الفيروس محمي جيدا أو نسبيا من عناصر البروتين الموجودة فيه Occlusion protein. فى الستينيات تعرض فيروس دودة كيزان الذرة H.zea NPV لاختبارات مكثفة ككذلك المطلوبة مع الكيمبيات بواسطة وكالة حماية البيئة الامريكية EPA فى الولايات المتحدة الامريكية. تضمنت هذه الاختبارات دراسات السرطانية والتشوهات الخلقة على المدى الطويل. لم يكن الفيروس NPV's قادرا على التضاعف أو يحدث تأثيرات مرضية على الكائنات الدقيقة أو على خطوط الخلايا للفقاريات غير الحشرية ولا على خطوط خلايا الفقاريات ولا على الفقاريات أو النباتات أو اللاقاريات من غير مفصليات الارجل. لقد أجريت تجارب على جرعات ١٠-١٠٠ مرة مثل متوسط معدل الحقل لكل أكر (٤٠٥ و هكتار) والتي حولت لنسبة وزن حيوان الاختبار لوزن الانسان ٧٠ كيلو جرام. طرق التعرض اشتملت على الدخول عن طريق الفم والاستنشاق والتعرض الجلدى والحقن فى الجلد وفى العضلات والمخ وفى الوريد وفى الغشاء البريتونى وتحت الجلد. تعرض الفقاريات كان يشمل حيوانات (الى جانب الانسان والاوليات الاخرى) للجرذان والفئران وخنازير غينيا والارانب والعصافير والدواجن وعصفور المنازل (Passer domesticus) والبط والفلان والجرذان ناقصى المناعة وغيرها من أنواع الاسماك.

لقد أشار الباحثان Wells and Heimpe (١٩٧٠) عدوى الفيروس فى البكتريا. لقد أنت نتائج هذه الدراسة الى الاقتراح بأنه تحت ظروف معينة فان الفيروس Baculovirus قد يعدى ويتضاعف فى خلايا الكائنات الاخرى. لقد دعى ذلك الوضع الى الحاجة الى استكشاف لاحق. لقد اظهرت اختبارات الباحث Deller (١٩٧٨-١٩٨٢) انتاج جسم مضاد متخصص ضعيف للفيروس بعد الحقن فى الوريد للفيروسات فى الفئران. اليرقات التى تغذت على الاحشاء من هذه الحيوانات المعدية

لم تظهر أى نشاط فيروسي. التغذية عن طريق الفم للفيروس NPV للأوز لم تظهر أى دليل عن تضاعف الفيروس بشكل غير واضح. الاختبارات على خطوط خلايا الفقاريات التي أجريت بواسطة الباحثان McIntosh and Shamy (١٩٨٠) أظهرت فى تجربتان من خمسة حدوث تضاعف بعد عدوى خلايا الهامستر الصينى (CHO) ولو أن CHO نمت روتينيا على درجة  $35^{\circ}\text{C}$  (ولو أن خطوط خلايا الحشرة نمت على درجات حرارة منخفضة  $28^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ ). عندما تم تحصين مزارع CHO على درجة حرارة منخفضة  $28^{\circ}\text{C}$  لم يحدث تضاعف فى الخلايا. لم يتمكن الباحث Tjia وآخرون (١٩٨٢) من الحصول على جعل NPV يتضاعف فى مختلف خطوط الخلايا فى الثدييات.

لقد أظهرت الدراسات الحديثة فى الثمانيات التى أجريت بواسطة العديد من الباحثين عدم حدوث تضاعف فى الدواجن وسلمون قوس قزح والجمبرى كما لم تزداد معدلات تبادل الكروماتيدات الاخوية أو تشوه فى كروموسومات الهامستر الصينى أو الفئران التى تعرضت عن طريق الفم أو الحقن فى الغشاء البريتونى. سيروولوجية الانسان والاحصنة والبقر والخنازير والاغنام التى أجريت بواسطة مجموعات مختلفة أظهرت استجابة الجسم المضاد لبروتينات الباكولو فيروسات. لم يتأكد ما اذا كان ذلك يرجع الى التعرض لانتيجين الفيروس أو الانتيجين المتفاعل عبوريا والذي يتوزع بشكل عريض فى البيئة. لقد أجرى Carbonell وآخرون (١٩٨٥) اختبار متميز للوقوف على نواحي الامان التى صممت باكلوفيروس مندمج مع اختبار مقدرتها على الدخول والتعبير عن الحمض النووى "رنا" RNA الفيروسي فى خلايا الثدييات التى تعتبر انعكاس لتضاعف الفيروس. أظهرت النتائج أن DNA الفيروس غير قادرة على الدخول بكفاءة فى أنوية خلايا الثدييات. لقد أمكن استنتاج يؤيد الاعتقاد بأن هذه الفيروسات فيها مستوى أصلى وأصيل من الامان على انواع الثدييات.

ب - الفيروسات المحببة Granulosis Viruses: الفيروسات المحببة عالمية التوزيع وتميل الى تخصصية الجنس genus specific. على عكس NPV فإن جسم اختبارات الامان تكون اصغر فى الفيروسات المحببة GV. لقد قام الباحث Bailey وآخرون (١٩٨٢) باجراء اختبارات تضمنت فحص للثدييات الصغيرة الممرضة لرش GV. لقد وجدت مستويات محسوسة من الجسم المضاد فى هذه الحيوانات. لقد قام بعض الباحثين بجمع عينات البراز يوميا على امتداد ٣ أسابيع بعد تعرض



الفران للفيروس. لقد تم الكشف عن الفيروسات النشطة حيويًا على امتداد انتاج الجسم المضاد ومع هذا فانه بعد ٨٠ يوم من التغذية لم يتم الكشف عن أجسام مضادة متخصصة للفيروس بواسطة التحليل الإشعاعي للمناعة. الاختبارات على النفل الرأسى لفيروس تتضمن العدوى عن طريق الفم فى الفران قبل وبعد الاخصاب. لقد وجدت السيرم من الصغار خالية من الاجسام المصادة للفيروس. لقد استنتج الباحثين من الاختبارات ان النفل الفيروسي لا يحدث فى الحيوانات المختبرة بعد التعرض لجرعات فردية من GV وأن انتاج مستويات الجسم المضاد تحدث فقط بعد التعرض لجرعات عالية من الفيروس.

دراسات أخرى عن الامان على GV أظهرت مرة أخرى نقص فى العدوى. الفران وخنازير غينيا التى تعرضت فرادى من خلال الاستنشاق والحقن وملامسة الجلد والعيون لم تظهر أية تأثيرات معاكسة. عندما حقن GV فى *Estigmene acrea* لم يحدث ضرر على صحة الفران وخنازير غينيا. أظهرت تجارب لاحقة عن المناعة مع مختلف طرق التعرض باستخدام الكبسولات او الفيروونات المعزولة فى الفران وخنازير غينيا والارانب عدم حدوث تأثيرات مرضية. لم تظهر أية تأثيرات خلوية مرضية أو اضرار على النمو من جراء المعاملة بالفيروسات GV على أجنة الطيور. لقد تحصل على نتائج مشابهة لتلك التى تحصل عليها مع NPV فيما يتعلق بتبادل الكروماتيدات الاخوية والتشوهات الكروموسومية. بالإضافة الى ذلك فان سيروولوجية الانسان والاحصنة والابقار والاعنام والنعام أظهرت تفاعلات موجبة لبروتينات الفيروسات GV كما حدثت مع بروتينات NPV.

**خلاصة القول** أنه لم يتم الكشف عن الباكولوفيروسات فى الثدييات والطيور والاسماك ولو أنه تم الكشف عن الفيروس النشط بيولوجيا لفترات قصيرة مع أخذ عينات البراز من العديد من الانواع. لقد أوضح ذلك أن الطيور قد تكون قادرة على نشر الفيروس فى الطبيعة وعلى المحاصيل. الدراسات التى صممت للكشف عن تشوهات الكروموسومات وتبادل الكروماتيدات الاخوية أعطت نتائج سلبية. الاجسام المضادة للباكولوفيروس تم الكشف عنها فى الانسان وسيرم الحيوان وظهرت تفاعلات موجبة تعتمد أساسا على التركيز النسبى لجلوبولينات المناعة فقط. بناء على هذه النتائج خلص بعض الباحثين الى صعوبة اتخاذ قرار ما اذا كان هناك خطورة واقعية من هذه الفيروسات.

٢- بوكس فيريدي Poxviridae: هذه العائلة تشمل مدى عريض من الاجناس بما فيها تلك التي تؤثر على الثدييات وهي Avipoxvirus , Leporipoxvirus . Parapoxvirus , Orthopoxvirus , Capripoxvirus . Suipoxvirus وتلك التي تؤثر على الحشرات مثل Entomopoxvirus (EPV) مع تحت الجنس (Coleoptera) A EPV وتحت الجنس B (EPV لحرشفية ومتساوية الاجنحة) وتحت الجنس (EPV لثنائية الاجنحة). لم يوجد أنشطة سيروولوجية عبورية مع تحت الاجناس A ، B مع فيروسات اللقاحات Vaccinia (مثل فاكسين فيروس لقاح الجدري في الانسان Smallpox) كما ان النشاط غير الوراثي لم يثبت. الفيروس EPV لحشرات غمدية الاجنحة تعرضت لاختبارات على المستوى الصغير خارج المباني في فرنسا وحقت نجاحات محدودة. بعض أنواع حرشفيات الاجنحة حساسة لفيروس الحشرات من تحت الجنس B. لقد أجريت تجارب حقلية في كندا في بداية السبعينات مع نجاحات متوسطة. لقد أجريت دراسات محدودة على فيروسات ثنائية الاجنحة ولكن لم يشار الى اجراء تجارب حقلية.

اختبارات الامان على الفيروسات الحشرية Entomopoxviruses شملت الحقن في المخ والغشاء البريتوني في الفئران الرضيعة والتعرض عن طريق الفم في الفئران والحقن البريتوني وفي التعرض في الانف للفئران بعمر ١٠ أسابيع وتعرض الفئران المعملة والثدييات البرية في الاقفاص لتركيزات عالية من الفيروسات التي تستخدم حقليا. نتائج هذه الاختبارات لم تظهر أية تأثيرات مرضية أو أضرار مرضية في هذه الحيوانات. الاختبارات خارج الجسم شملت أجنة الطيور وخطوط خلايا الفقاريات أظهرت نقص في تضاعف الفيروس أو التأثيرات الخلوية المرضية.

٣- اريدوفيريدي Iridoviridae: اريدوفيروسات تعرف بالفيروسات متقزحة اللون iridescent والتي تعدى ٥٠ نوع من الحشرات وتسبب امراض متنوعة في الفقاريات مثل حمى النعام الاقريقية ومرض الخلايا الليمفاوية Lymphocystis في السمك وفيروس الجيكو gecko virus وفيروس الضفدع. أظهرت اختبارات الامان على الفقاريات بعض المشاكل مع الفيروسات متقزحة الالوان. الحقن البريتوني للجرعات الكبيرة من فيروسات متقزحة الالوان في نوعين من مفصليات الارجل أظهر سمية قاتلة على الضفدع الشرقي "رنا ليمفوشا- ريس" بدون تضاعف الفيروس. أدت الاختبارات اللاحقة التي استخدمت فيها الفئران الى موت فوري بعد

الحقن البريتوني للفيروسات غير المعاملة. لم يظهر الحقن بالفيروس غير المنشط بالحرارة أية تأثيرات معاكسة. أشار بعض الباحث إلى أن السيرم من عمال المعامل تفاعلت مع الفيروس منقزح اللون من الأنواع ١-٤. محاولات تنمية فيروسات منقزحة الألوان في مزارع أنسجة الفقاريات أعطت نتائج سلبية. هذه الفيروسات ليست محل تطوير في الوقت الراهن في مكافحة الآفات الزراعية وإفات الغابات.

٤- فيروسات الباروفيريدي Parvoviridae: هذه العائلة تحوى على ثلاث اجناس. تشمل هذه العائلة باروفيروس، دينوفيروس (تعرف دينوكليوزيس) ومجموعة الفيروسات المرتبطة بالادينو Adeno. ما يقرب من ٢٠ فيروس من Parvoviridae وأجناس الفيروس المرتبطة بالادينو تعدى الثدييات بينما أربعة فيروسات دينوكليوزيس ذات اهتمام خاص بسبب تشابهها مع الباروفيريدي والتي تعدى الفقاريات. الباروفيروسات الخاصة بالثدييات تعدى مجموعة منها تشمل الانسان وتنتج امراض متنوعة مثل بلعمة كريات الدم القلينية Feline Panleukopenia، التهاب المعوى Mink enteritis، والتهاب الامعاء Canine Parvovirus enteritis، فيروس كليهام فى الجرذان Kilham، والتهاب المعدة المعدى فى الانسان infectious gastroenteritis. اختبارات الامان على فيروس دينو نيوكليوزيس فى بعض الالبيدس ايجيبتى لم تظهر أية تأثيرات مرضية على الجرذان والفئران ولا أجنة الفراخ. فيروس دينوكليوزيس لدودة الشمع جالاريا ميلونيللا يتحول وينتج انتيجينات فيروسية فى خلايا الفقاريات. لقد أجرى الباحث Giran (١٩٦٦) اختبارات امان على هذا الفيروس على الفئران البالغة وحديثى الولادة والارانب باستخدام الحقن الوريدي وتحت الجلد والحقن فى المخ ولم يستطيع اثبات حدوث العدوى او أية اضرار مرضية. لقد قام الباحثان Tinsley and Harrap (١٩٧٥) بجمع عينات السيرم من عمال المعامل ووجدوا ٨ من بين ٢٣ عامل تفاعلت مع واحد أو أكثر من انتيجينات فيروس دينوكليوزيس. عفوانية هذه الفيروسات أثارت الاهتمام بإمكانية استخدامها فى مكافحة الآفات الحشرية ولكن احتمالات حدوث مشاكل تتعلق بعدوى الفقاريات تستدعى الحذر والحيطه والاهتمام أيضا.

٥- ريوفيريدي Reoviridae: الريوفيريدي تشمل الاجناس التالية: الريوفيروس والروتافيروس التى تعدى الفقاريات وأنواع لوبيفيروس التى تعدى كلا مفصليات الأرجل والفقاريات وكذلك فيروسات بوليهيدروزيس السيئوبلازمية التى تعدى

مفصليات الأرجل فقط. في الفقاريات يسبب الريوفيروسات عدوى في الجهاز التنفسي في الإنسان والتهابات في شعب القصبه الهوائية Tracheobronchitis في الكلاب والالتهابات الكبدية الدماغية hepatoencephalitis في القران ومرض التهاب المفاصل arthritis في النواجن. الروتافيروسات تسبب التهاب الامعاء enteritis في الإنسان والحيوانات بينما الاوربيفيروسات Oribiviruses تسبب مرض الحصان الأفريقي.

من بين الجنسين الذين يصيبا الحشرات فان فيروسات البولي هيدروزيس السيتوبلازمية استحوذت على اهتمام الباحثين بسبب تخصصها على مفصليات الأرجل وتأثيراتها المسببة للوهن والضعف debilitative والقتل على عوائلها. الاوربيفيروسات تتضاعف في مفصليات الأرجل بدون أية تأثيرات ضارة. لقد قام الباحث Ignoffo (١٩٧٣) بتعرض فيروسات البولي هيدروزيس السيتوبلازمية لعديد من أنواع الفقاريات من خلال طرق عديدة للمعاملة ولم يتحصل على أية تأثيرات مرضية. لم يحدث أى تضاعف أو تأثيرات خلوية مرضية من هذا الفيروس في الثدييات أو الاسماك أو في الخطوط الخلوية للطيور. لقد أشار Aizawa (١٩٧٦) الى أن تعرض القران والارانب والهامستر للأجسام الضمنية Occlusion bodies سواء عن طريق الفم أو بالحقن لم يسفر عن أية تأثيرات معاكسة أو تضاعف للفيروس. لقد اقترح Arata وآخرون (١٩٧٨) ضرورة اجراء اختبارات مكثفة عن أمان هذه المجموعة من الفيروسات بسبب أن تكرارية الدمج الوراثي في الروفييريدي المعدى للفقاريات أوضح أن هذه المجموعة من الفيروسات قد لا تكون ثابتة من الناحية الوراثية.

٦- الرابدوفييريدي Rhabdoviridae: أجناس هذه العائلة تشمل Vesiculovirus , Lyssavirus , sigmavirus ومجموعة رابدوفيروسات النباتية تسبب أمراض في كلا الفقاريات والحشرات. من أمثلة الأمراض التي تصيب الثدييات التهاب المعدة الوعائي (Vesicular stomatitis) في الأحصنة والخنازير والأبقار وحمى سريعة الزوال ephemerl Fever في الأبقار والنزف الفيروسي لتعفن الدم Viral hemorrhagic Septicemia في السلمون. الجنس Lyssavirus تعدى كذلك كلا الفقاريات والحشرات. في الثدييات تسبب داء القلب rabies وفيروس موكولا Mokola Virus وفيروس لاجوس في الخفافيش Lagos bat virus وفيروس النجاسة

النيجيرية Shrew virus وفيروس كاتونكان Katonkan. فيروس ستما Stigma هو فيروس متحول متجاس في الدوروسوفيللا. فيروسات الرابدوفيروسات تتضاعف في أنواع عديدة من الحشرات والنباتات. لم تختبر هذه الفيروسات من منظور الامان واعتبرت مؤذية بشكل غير كافي على الحشرات للدرجة التي يمكن أن تعتبر ضمن وسائل مكافحة الميكروبية.

٧- بيكورنافيريدي Picornaviridae: البيكورنافيريدي تشمل أجناس Aphovirus Enterovirus . Rhinovirus. الجنس انتيروفيروسات يسبب الشلل Polio في الانسان والنعام والفئران والالتهاب الدماغى encephalomyelitis في الطيور وفيروس كوكساكي Cocksackie في الانسان وشلل النحل Paralysis وفيروس نودا مورا في الحشرات. الاجناس رينوفيروس والاقنوفيروس تشمل امراض الكبد في الثدييات (التهاب الكبد الوبائي A) ومرض القدم والفم والايقار والخنزير) وكذلك فيروسات البرد في الانسان. فيروس النودامورا يتضاعف في البعوض دون أن يسبب أعراض مرضية أو يقتل النحل والديدان والفئران. في المملكة المتحدة تم الكشف عن أجسام مضادة Ig M في الثدييات مع فيروس الشلل جينوميًا genometa paralysis. بسبب المرضية على الفقاريات فإن احدا من هذه الفيروسات ليست محل تطور في الوقت الراهن.

#### ← (ج) الفطريات Fungi

من المعروف الآن أن ما يقرب من ٥٠٠ نوع من الفطريات تحدث العدوى في الحشرات. بعض هذه الانواع تكون معدية لمدى عريض من الكائنات غير المستهدفة NTO's بينما البعض الاخر أكثر تخصصية عائلية. العديد يمكن زراعته على بيئة صناعية وقد تم فحص البيئة مع البعض للوقوف على سميتها على الحشرات كما تم معرفة المركب الفعال الاساسي. الفطريات التي تنتمي الى جنس أو أجناس Beauvaria ، Metarhizium و Culicinomyces ، Entomophthora ، Nomurea ، Coelomomyces ، Leptolegnia ، Tolypocladium ، Paecilomyces ، Aspergillus Lagenidium وغيرها وقد استخدمت أو محل اعتبار كي تستخدم كمبيدات حشرية ميكروبية. في هذا المقام سوف نناقش بعض الاجناس التي تعرضت لبعض اختبارات الامان وهي:

١- البوفاريا *Beauveria*: هذه الفطريات عزلت في الغالب من الحشرات المريضة واستخدمت كثيراً في اختبارات المكافحة الميكروبية. هذه الفطريات تنتج مركبات سامة والتي تؤذي عوائلها بعد الغزو. لقد أجريت تجارب الامان دوماً على البوفاريا باسيانا. الحقن تحت الجلد وفي الوريد في الجرذان لم ينتج أية أضرار كما أن أنسجة الرئة في الفئران التي عرضت لجراثيم الفطر *B.bassiana* لمدة ٩٠ يوم كانت سالبة عندما حقنت في البيئة المغذية للآجار. على العكس من ذلك فإن التعرض عن طريق الاستنشاق في الفئران والجرذان وخنازير غيبيا للجراثيم سببت ظهور أعراض مرضية *Symptomology*. في سلاسل أخرى من الدراسات فإن تعرض الجرذان لجرعات عالية عن طريق الفم لمدة ٢١ يوم للجراثيم والميسيليوم أدت الى حدوث ثلاثة حالات من الوفيات في عشرة حيوانات. لقد أحست بعض المجاميع بوجود تفاعلات معاكسة واعتقدوا أنها قد ترجع الى الطبيعة الخاصة للمستحضرات أو لأسباب أخرى لا ترتبط بالبوفاريا باسيانا. من الاختبارات الأخرى عن أمان هذا الفطر تشمل التجريب الفمي للضفادع بالجراثيم. لم تنتج أية أضرار مرضية أو عدوى في الاحشاء بواسطة البوفاريا باسيانا. أظهرت تقارير أخرى أن البوفاريا غير قادرة على النمو على درجة حرارة جسم الثدييات ٣٧°م.

توجد تقارير تشير الى التأثيرات المرضية على الحيوانات والانسان بواسطة البوفاريا. لقد أشار Muller- Kogler (١٩٨٧) الى تفاعلات متوسطة وحتى الشديدة خاصة بالحساسية أو الانتهاكات لتحفيزات الجراثيم كما ظهر في العديد من الدراسات على البوفاريا. لقد أشار باحثين آخرين الى عدم حدوث تأثيرات ضارة معاكسة على الانسان من جراء التداول المتكرر للبوفاريا باسيانا. بسبب أن التقارير العديدة أشارت الى حدوث التهاب في القرنية *Keratitis* قلم Ishibashi وآخرون (١٩٨٧) بأجراء سلاسل من الاختبارات لمقارنة مرضية وأضرار القرنية من جراء التعرض للبوفاريا باسيانا وفطر *كانيديا البيككنس*. لقد أظهرت الفحوص الهستوباثولوجية حدوث مرضية ضعيفة بواسطة البوفاريا باسيانا على القرنية بينما لم يحدث غزو للحجرة الداخلية. بالإضافة الى ذلك أشار Ignoffo (١٩٧٣) الى وجود دليل غير مباشر عن امكانية حدوث سمية ومرضية وحساسية في الانسان كما أمكن عزل أنواع من البوفاريا من أنسجة الفقاريات. لقد اتضح ان البوفاريا باسيانا تسبب الفطار الرئوي *Pulmonary mycosis* في السلحفاة الأرضية العملاقة. لقد أمكن عزل *B.shioteae* من خراج في القناة الصفراوية في الانسان.

٢- الفطر *Metarhizium*: التأثيرات المرضية لهذا الكائن الدقيق تشمل أحداث خلل فى الميتوكوندريا وخشونة فى الشبكة الاندوبلازمية. لقد تضمنت اختبارات الامن تجريب الضفادع عن طريق الفم للفطر *M.anisopliae* وكذلك تعريض الجرذان لمدة ٩٠ يوم عن طريق الفم وتحت الجلد والاستنشاق وفى الوريد دون أن تحدث أية تأثيرات معاكسة. الاستنشاق والحقن الوريدي وتحت الجلد والتنقيط فى العيون للفئران والجرذان والارانب أنتجت ورم حبيبي *granulomas* فى مواضع الحقن وحدث استرجاع للفطر من الطحال بعد ١٨ يوم من الحقن ولكن بدون انتاج مواضع ضرر. التعرض للجراثيم الجافة (غبار) أدت الى استرجاع جراثيم الفطر بعد اسبوعان من التعرض دون مظاهر ضرر. لم تنتج تأثيرات معاكسة من التعرض عن طريق الفم أو التنقيط فى العيون كما لم يثبت حدوث تضاعف فى أنسجة الثدييات. أشار العديد من الباحثين الى عدم حدوث تأثيرات ضارة على متداولي مزارع الفطر *M.anisopliae*.

٣- الفطريات *Culicinomyces*: المدى العوائلى للجنس *Culicinomyces* ربما يكون محدودا على البعوض وغيرها من يرقات ثنائية الاجنحة المائية. بسبب أن هذا الكائن له مدى عوائلى واسع على البعوض فله مباشر من ناحية امكانية انتاج مادة أو وسيلة مكافحة ميكروبية. اختبارات الامن تضمنت التجريب الفمى *Oral dosing* للفئران والجرذان وخنازير غينيا والاغنام والابقار دون حدوث أية تأثيرات معاكسة. كذلك عوملت مجموعة أخرى عن طريق الفم شملت الجرذان والفئران وخنازير غينيا والابقار والاغنام ونوعان من البط البرى بمعلقات الفطر. لقد كانت هذه المعلقات مرضية ليرقات البعوض ولكنها لم تظهر أية تأثيرات صحية على حيوانات الاختبار. لقد تم استكشاف قيم معايير الدم *Hematological* والنوالحى البيوكيميائية ولم تظهر أية تغيرات عن الحالات العادية. لم يظهر تشريح الجثة *Necropsy* أية علامات عن التجثر *sporulation* أو غزو الانسجة. لقد أجريت اختبارات السيرولوجية على المختبرات والأغنام وتسعة أميين (اثان يعملان فى المعامل على هذا الفطر) وثلاثين من الاغنام من جنوب ويلز. لقد أنتجت المجترات والاغنام عيارات من كونيديا *Culicinomyces* من ٢٠ الى ٨٠. لقد وجدت عيارات أقل من عشرة فى البط والانسان. العيارات فى الحيوانات المعاملة لم تكن أعلى من المقارنة. لقد أدت هذه النتائج الى اقتراح أن الكائن أو أى واحد يرتبط به انتيجينا قد يكون

شائع في البيئة. فشل ارتفاع مستويات الحد الحرج للجسم المضاد بعد التجريب  
توضح نقص في العدوى.

لقد طور الباحث Mulley وآخرون اختبارات أمان إضافية على هذا الفطر. لقد  
كان مفهوم هذه المجموعة من الباحثين أن الفطر يغزو جروح الجلد ويحفز  
استجابات الحساسية في الحيوانات التي تتعرض بشكل مزمن. الحقن السطحي للجلد  
والحقن تحت الجلد للفطر أجرى على الفئران والاحصنة العادية وتلك التي تعاني من  
نقص المناعة. لقد تم التجريب الفمي والحقن تحت الجلد لنوعان من السلاحف  
الاسترالية المتوطنة Lizard وسلحفاة المياه العذبة (نوع واحد) ونوع واحد من  
الضفادع. النتائج في الثدييات اشتملت على تفاعلات التهابات موضعية انتقالية في  
مواضع الحقن مع عدم قدرة على زراعة الكائنات الدقيقة هذه. لقد نتجت أورام  
حبيبية في السلاحف الأرضية وسلاحف المياه والضفادع عند مواضع الحقن وتم  
عزل الفطر. لم يوجد أي دليل على حدوث الانتشار الجهازى. لقد خلص الباحث إلى  
أن إلى أن Culicinomyces ليست مرضية على الثدييات ويعضد هذا القول عدم  
مقدرتها على النمو فوق ٣٠°م وعدم ثبوت حدوث عدوى في الحيوانات البرية  
والأليفة.

٤- الفطر Lagenidium giganteum: لقد اكتملت اختبارات الامان على الثدييات وغير  
الثدييات على هذا الكائن. تعرض الاسماك والبط والعصافير البيضاء (كولينس  
فيرجيناتس) لم يؤدي إلى تأثيرات مرضية. لقد تم تعريض ثدييات مختلفة عن  
طريق القصبات الهوائية والتناول الفمي والحقن البريتوني والمعاملة الجلدية وعن  
طريق التنقيط في الاعين ولم تحدث أية تأثيرات معاكسة. لقد خلص الباحثين إلى أن  
هذا الكائن امن بسبب محدودية تحمله للحرارة حيث لاينمو ولا يتكاثر فوق ٣٢°م. لا  
يوجد أي دليل على انتاج توكسينات بواسطة هذا الفطر.

٥- فطريات أخرى Other Fungi: للفطريات Entomophthora تحدث عدوى في  
حشرات حرشية وثائية الاجنحة. أجريت اختبارات امان قليلة حيث تم تجريب  
الضفادع عن طريق الفم E.virulenta بينما أعطيت العصافير اليابانية معلق  
E.ignobilis. لقد تم تطعيم كائن من هذا الجنس هو كونيديوبولس كوروناتس، حيث  
أشارت تقارير عديدة إلى نقص الامان على الانسان والاحصنة. أجريت اختبارات  
أمان على Paecilomyces في الضفادع والفئران ولم تظهر أية أعراض مرضية أو  
عدوى في الاحشاء من هذا الكائن. قام الباحث Aizawa بحقن الارانب في الوريد



بالفطر *CC P.farinosus* مرة خلال ٦ شهور ولم يتحصل على أية تأثيرات معاكسة. الفطر *Nomurea rileyi* لم يحدث أية تأثيرات معاكسة على الضفادع. الاسبرجيليس فيه أنواع ممرضة للحشرات وفيه أيضا بعض الانواع ممرضة للفقاريات. *A.Flavus* و *A.ochraceus* تعتبر من ضمن الممرضات على الحشرات. لقد سجلت حالات عديدة من العدوى من الاسبرجيلس في الطيور وغيرها من الحيوانات والانسان. الكائن غني في الغزو ولكنه ثاقب بعد ظروف الضعف أو الوهن ومع طول العلاج بالمضادات الحيوية ولكنه قد يكون ممرض أولى في بعض الظروف. الاسبرجيلس يعتبر ثاني أشيع داء فطري *Mycosis* في الانسان مع اورام حميدة *Malignant*. الجنس *Coelomomyces* ذات مقدرة في مكافحة البعوض ضمن مكافحة الميكروبية.

#### ← (د) البروتوزوا Protozoa

من أكثر البروتوزوا في الحشرات الميكروسيورا والتي تم تقييمها كوسيلة في مكافحة الحيوية ضد البعوض والجراد وحشرات حرشفة الاجنحة. من سوء الطالع أنه يوجد ميكروسيورا أخرى تعدى الأسماك وغيرها من الحيوانات والانسان ولو أن معظم الانواع التي وجدت في الفقاريات كانت متميزة تقسيما. النوزيما التي لاقت الاهتمام كوسيلة لمكافحة حيوية لم تجد الاهتمام خاصة في اتجاه احدثها العدوى في الفقاريات. هذه الكائن يرتبط مع *Encephalitozoon Caniculi* التي تسبب الامراض في الارانب والعديد من الثدييات. من أنواع الميكروسيورا الشائعة *N.algerae* و *N.locustae* والتي تلقى الاهتمام في اختبارات الامان. اختبارات الامان لم تثبت حدوث أية تأثيرات مرضية أو مواضع ضرر.

#### ← (هـ) الديدان Nematodes

توجد ١٩ عائلة من الديدان تحتوى على أفراد تعمل كطفيليات اختيلية *Facultative* أو اجبارية *Obligate* على الحشرات. من أهمها عائلة *Mermithidae* كوسيلة مكافحة حيوية وهي لنوع واحد أو أنواع قليلة من الحشرات وأضرارها على الثدييات لا تذكر. اختبارات الامان لم تظهر أية أضرار أو مرضية سريرية.

#### → الاستنتاجات Conclusions

الاختبارات على الممرضات الحشرية لتقدير ولتحديد الامان على الحيوانات والانسان تعتبر من الامور الهامة في هذا الميبل. ليس من المهم أن تبشر بكونها تصلح

كوسيلة مكافحة ميكروبية أم لا حيث أنها لو كانت تحدث عدوى أو تسبب سمية عندما تتعرض الفقاريات لها فإنها تعتبر أكثر ضررا وخطورة عن الكائنات النافعة.

الدلائل التي اقترحها الباحث Ignoffo (١٩٧٣) لتخطيط وتمثيل دراسات الامان الخاصة بالمرضات الحشرية على الفقاريات ما زالت قابلة للتطبيق حتى الآن وهي:

١- الفرضية المسبقة عن الامان أو نقص الامان على الفقاريات والكائنات الأخرى التي تبنى على دراسات أجريت على أنواع قريبة قد تكون كدليل للدراسات الابتدائية ولكنها يجب ان تتأكد عن طريق تجارب مباشرة تصمم خصيصا لتقييم ممرض حشري معين.

٢- امان الممرضات الحشرية على الفقاريات نسبي. كذلك فان تمثيل النتائج يجب ان يأخذ في الاعتبار الجرعة المعطاة وكيفية اعطائها لكائن أو حيوان الاختبار وكذلك على كيفية تقييم الامان أو نقص الامان.

٣- لا يمكن ضمان ما يعرف بالامان المطلق في كل النظم الحية في كل الاوقات. السمية أو المرضية يمكن تحديدها اذا لم تكن هناك قيود أو حدود للجرعة أو نظام ونوع الفقاريات المستهدفة.

٤- تقارير السمية المرضية أو المرضية السمية Toxicity pathogenicity للممرض حشري متخصص أو معين يجب أن تقيم بعناية وتذكر Prudently في مقابل التقارير التي يغيب عنها المرضية السمية.

## REFERENCES

- Aizawa, K., Ed., Recent development in the production of insecticides in Japan. Proc. 1 st Int. Coll. Invertebr. Pathol., Queens University, Kingston Ontario, 1976, 59-63.
- Barker, R. J. and Anderson, W. F., Evaluation of Beta exotoxin of *Bacillus thuringiensis* Berliner for control of flies in chicken manure. J. Med. Entomol., 12, 103, 1975.
- Cantwell, G. E., Heimpel, A. M., and Thompson, M. J., The production of an exotoxin by various crystal-forming bacteria related to *Bacillus thuringiensis* var. *thuringiensis* Berliner, J., Insect Pathol., 6, 466, 1964.
- Doller, G., The safety of insect viruses as biological control agents, in Viral insecticides for Biological Control, Maramorosch, K. and Sherman, K. E., Eds., Academic Press, New York, 1985, 399.
- Egerton, J. R., Hartley, W. J., Mulley, R. C., and Sweney, A. W., Susceptibility of laboratory and farm animals and two species of duck to the mosquito fungus *Culicinomyces* sp., Mosq. News, 38, 260, 1978.
- Fisher, R. and Rosner, L., Toxicology of the microbial insecticide, J. Agric. Food Chem., 7, 686, 1959.
- Gingrich, R. E., *Bacillus thuringiensis* as a feed additive to control dipterous pests of cattle. J. Econ Entomol., 58, 363, 1965.
- Heimpel, A. M., Investigations of the mode of action of strains of *Bacillus cereus* Frankland and Frankland pathogenic for the larch sawfly, *Pristiphora erichsonii* (Htg.), Can. J. Zool., 33, 311, 1955.
- Ignoffo, C. M., Effects of entomopathogens on vertebrate. Anp. N. Y. Acad. Set., 217, 141, 1973.
- Jacobson, E. R., Biology and diseases of reptiles, in fox, J. G., Cohen, B. J., and Loew, F. M., Eds., Laboratory Animal Medicine. Academic Press, New York, 1984, 449.
- Jones, T. C. and Hunt, R. D., Diseases by higher bacteria and fungi, in Veterinary Pathology, 5 th ed., Lea & Febiger, Philadelphia, 1983, 638.
- Kuhn, C., III and Askin, F. B., Lung and mediastinum, in Anderson's Pathology, 8 th ed., Kissane, J. M., Ed., C. V. Mosby, St. Louis, 1985, 833.

- Mulley, R. C., Egerton, J. R., Sweeney, A. W., and Hartley, W. J., Further tests in mammals, reptiles, and an amphibian to delineate the host ranger of the mosquito fungus *Culicinomyces* sp., Mosq. News, 41, 528, 1981.
- Ohba, M. and Aizawa, K., Mammalian toxicity of an insect iridovirus, Acta Virol., 26, 165, 1982.
- Roberts, D. W., toxins of entomopathogenic fungi, in Microbial Control of Pests and Plants Diseases 1970-1980, Burges, H. D., Ed., Academic Press, New York, 1981, 441.
- Siegel, J. P., Shaddock, J. A., and Szabo, J., Safety of the entomopathogen *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* for mammals, J. Econ. Entomol., 80, 717, 1987.
- Thomas, W. E. and Ellar, D. J., *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* crystal delta-endotoxin: effects on insect and mammalian in vitro and in vivo, J. Cell Sci., 60, 181, 1983.
- Undeen, A. H., Growth of *Nosema algerae* in pig kidney cell cultures, J. Protozool., 22, 107, 1975.
- Vandekar, M., The safety of entomopathogens for mammals: Present evaluation methods and approaches and suggestions for the future, Progress Report to WHO, mimeographed document, TDR/BCV/SWG.79/WP.04, World Health organization, 1979.
- WHO. Mammalian safety of microbial agents for vector control: a WHO Memorandum, Bull. W.H.O., 59, 857, 1981.

## **الباب الرابع**

### **أمان المبيدات الحشرية الميكروبية**

#### **على اللافقاريات غير المستهدفة**

الفصل الأول: الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة من الفيروسات العنوية.

الفصل الثاني: الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة في سلالات حشرية

الاجنحة للباسيليس ثورينجينسيز والبيتا- اكسوتوكسينات.

الفصل الثالث: أمان باسيليس ثورينجينسيز اسراييلينسيز والباسيليس سفيريكس

على الكائنات غير المستهدفة في البيئات المائية



## الفصل الأول

### الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة من الفيروسات العنوية

#### ١- مقدمة Introduction

مكافحة الآفات في المحاصيل الحقلية والغابات للحفاظ على أو خفض مجموع الافة لآقل من الحد الاقتصادي للضرر Economic threshold تعتبر من المطالب المسبقة لإنتاج الطعام والسلع الزراعية الضرورية لحياة الإنسان والحيوانات الأليفة. مع تزايد المعلومات عن التلوث أو الاتساخ البيئي من جراء الاسراف في استخدام المبيدات الكيميائية تم تكثيف الجهود واجراء مزيد من البحوث لايجاد بدائل وطرق فعالة لحماية المزروعات في السنوات الحديثة. استخدام المبيدات الحشرية الحيوية biological insecticides سواء منفردة في الزراعات المصابة بافة واحدة (رئيسية) أو مخلوطة مع وسائل أخرى واستخدامات بطرق مع منظومة الادارة المتكاملة للآفات IPM في الزراعات التي تعاني من آفات عديدة درست أساسا بالنظر للفاعلية على الافة المستهدفة. البحوث التي تناولت التأثيرات الضارة deleterious على النظام البيئي نادرة الاجراء فيما عدا التأثيرات التوكسيكولوجية و/أو المرضية على الفقاريات. في هذا المقام سوف نتناول أمان الفيروسات العنوية baculoviruses على اللافقاريات invertebrates بسبب أن بعد ثبوت مقدرة هذه الفيروسات وكفاعتها في الوبائية المرضية epizootics الطبيعية في مجاميع الآفات الحشرية فقد تقرر وتكونت فناعة بأن الفيروسات العنوية تعتبر المكون الأكبر في نظم الادارة المتكاملة للآفات.

العائلة باكولوفيريدي تتكون من جنس واحد فقط هو Baculovirus وهو يتميز بفيرونيات ذات حمض نووي "DNA" دائري مزدوج الشرائط مع حوالى ١٠٠ أكبر من ١٥٠ أزواج كيلوباز. حول المركز الفارغ فان معقد دنا- بروتين يكون حلزون علائق يحاط بطبقة بروتين. وهو ما يطلق عليه الغشاء الاساسى intimate membrane. الجنس باكولوفيروس يقسم الى ثلاثة تحت مجاميع تبعا للصفات المورفولوجية. أفراد تحت المجموعة (A) وهي فيروسات البولى هيدروزيس النووية (NPV's) ذات فيرونيات عديدة تحتوى على واحد أو عديد من نيوكلوكبسيدات nucleocapsids فى كل فيريون فى كل جسم ضمين occlusion body و البولى هيدرون Polyhedron. هذه الاجسام الضمنية تتكون فى أنوية خلايا المعدية بالفيروس

NPV. فى تحت المجموعة (B) وهى الفيروسات المحببة (GV) يتكامل نيوكلوكلسيد واحد فقط فى كل فيروس حيث يغرس للفيروس فى الجسم الضمين (كبسولات). تضاعف الفيروس وتكوين الجسم الضمين للفيروس المحبب يحدث فى سيتوبلازم الخلايا المعدية بعد أن يتفكخ الغلاف النووى مما أدى الى الاقتراح بوجود خليط من المادة النووية والسيتوبلازمية. تحت المجموعة (C) الفيروسات غير الضمنية nonoccluded تتكون من نيوكلوكلسيديات مفردة الغلاف وهى غير ضمنية.

الفيروسات العسوية وجدت فقط فى اللافقاريات ولا يعرف أى فرد من هذه العائلة يصيب الفقاريات أو النباتات الراقية. لقد سجل وجود الفيروسات العسوية فى رتب الحشرات: غمدية، ثنائية، غشائية، حشرية، شبكية الاجنحة والترأى كوبرا. الفيروسات العسوية (أو الجسيمات شبيهة الباكولوجيوس) تم عزلها فى مختلف القشريات والاكاروسات والفطريات الممرضة للحشرات. أى فيروس عسوى يسبب وبائيات epizootic فى الحيوانات سواء كان يحدث طبيعيا أو تحفيز صناعيا بعد استخدام الفيروس ومن ثم يحدث تأثيرات ضارة فى البيئة. قبل التطبيق العملى للفيروسات العسوية كمبيدات حشرية يجب الاخذ فى الاعتبار تأثيرها على الافات المستهدفة والكائنات غير المستهدفة (NTO's) والحشرات النافعة. بسبب أن المدى العوائى للفيروسات العسوية تحدد بشكل مكثف بداية لتحديد العوائى الجديدة القابلة للمكافحة بالفيروسات فاننا سوف نركز فى هذا المقام على التداخل بين الفيروسات العسوية والحشرات النافعة.

٢- تخصص الفيروسات العسوية على الافات الحشرية (كعوائى بديلة وأنواع غير مختلفة) أظهرت دراسات العدوى العيورية Cross-infectivity باستخدام العدوى عن طريق الفم وجرعات عالية من لقاح الفيروس inoculum أن القليل من الفيروسات العسوية متخصصة النوع. فى الواقع فإن معظم هذه الفيروسات ذات مدى عوائى ضيق ولكنها لا تزيد اطلاقا عن الرتبة order وفى العادة لا تزيد عن عائلة العائل الذى تم عزل الفيروس منه فى الاصل. من الشائع أن المدى العوائى يكون محدودا على جنس العائل المختص competent host. بوجه عام فإن المدى العوائى لفيروس NPV من حشرية الاجنحة أوسع من ذلك الخاص بالفيروسات المحببة GV أو NPV من ذبابة النشارة والتي ظهر بعضها ذات تخصص فى النوع. الفيروس العسوى غير الضمين من حشرة oryctes chinoceros (غمدية الاجنحة scarabeidae) يعدى بعض



خنافس dynastine الأخرى بينما ذلك من أكاروس باتونيتس سترای (أكارى-تترانيكىدى) يكون معدى (الدرجة معينة) للأكاروس تترانيكس يورنيكا فقط. الفيروس العصى من الجمبرى penaeus dyorarums تم عزله من العديد من أنواع أخرى من الجمبرى.

هذه ولو أن تمثيل نتائج العدوى العبورية من الصعوبة بمكان ان لم يكن مستحيلا فى حالة حشرات الاختيار التى تم عداوها فعلا (ولو أنها غير واضحة) بالفيروس. من المعروف أن الفيروسات غير المعدية noninfectious لعائل معين قد لا تمثل أى إجراءات فى تنشيط الفيروس الضحية occult virus. لذلك فان مصدر الفيروس الموصف ذات الصفات البيوكيميائية المعروفة يعمل كلقاح فيروسى كما يعرف كفيروس مميت حتى يمكن الحصول على نتائج عقلانية كمثال الفيروس plaque المنقى الضرورى فى دراسة العدوى العبورية. العديد من نتائج دراسات العدوى العبورية محل تساؤلات بسبب حقيقة أن الفيروس النسل progeny virus لم تعرف وقورت بلقاح الفيروس.

لقد عرف أنه توجد اختلافات محددة فى الحساسية بصرف النظر عن الحالة التقسيمية للعائل البديل بالمقارنة بالعائل المختص. الحساسية المنخفضة فى حشرة Heliiothis subflexa لفيروس H.zea- NPV بالمقارنة بحشرة H.virescens ترجع الى تداخل الفيرونيات والخلايا الطلائية للمعى الاوسط ويبدو أنها يسيطر عليها عن طريق جين فردى. ميكانيكية المدى العوائلى يجب أن تحدد ولو أن بعض متطلبات نجاح العدوى معروفة:

- ١- يجب أن يتم تناول الفيروس حتى تحدث العدوى طبيعيا.
- ٢- الأجسام الضمنية لفيروسات NPV وGV يجب أن تذاب فى معدة العائل الخاص المقتر لتحرير الفيرونيات.
- ٣- قبل فقد التنشيط بواسطة عصير المعدة يجب أن تمر الفيرونيات الحرة خلال الغشاء الغذائى Peritrophic.
- ٤- الفيرونيات يجب أن تدمج على الخلايا الطلائية للمعى الاوسط عند مستقبلات خاصة على الخمائل الدقيقة microvilli.

٥- امتصاص الفيروس وانتقال النيوكليكسيد لأنوية الخلايا وعدم تغليف الحامض دنا الفيروسى وتضاعف الدنا وترجمته وتجميعه assembly الى جسيمات فيروس ناضجة يجب أن تحدث.

٦- في حالة حشرات حرشفية الاجنحة يجب أن تتفرد وتحرر الفيروسات خلال غشاء البلازما التصاعدي لخلايا المعى الاوسط كى تسبب عدوى عامة والتي تؤدي في النهاية لقتل اليرقات.

تقييد المدى العوائلى للفيروسات العسوية على العائلة أو حتى الجنس فى العائل الاصيل الذى تم عزل الفيروس منه يجعل من المستحيل تخطى حدود رتبة العائل الاصيل وهذا قد يعتمد على حقيقة انه فى كل الكائنات الاخرى فان واحد على الاقل من هذه المتطلبات المذكورة أعلاه لا يستكمل.

### ٣- أمان الفيروسات العسوية على الحشرات النافعة

بسبب دور الفيروسات العسوية كمبيدات حشرية ميكروبية فانها يجب أن تسجل كأي مبيد قبل التسويق كما أن بروتوكولات اختبار التأثيرات الجانبية للباكولوفيروسات على الحشرات النافعة يشابه تلك التى تتبع المبيدات الكيميائية التقليدية (سأضعها باللغة الانجليزية حتى يتأكد المتشككون ولذين يصرون على أن المبيدات الميكروبية فيروسية كانت أو بكتيرية وغيرها ذات أمان مطلق ومن ثم لا تستوجب اجراء أية اختبارات للتأكد من الامان والتأثيرات الجانبية).

Because in their role as microbial insecticides baculoviruses have to be registered as any other pesticide prior to marketing, the protocols for testing the side effect of baculoviruses on beneficial insect have been similar to those for conventional chemical pesticides.

كمثال فان معظم الاهتمامات والتطبيقات تركزت على تأثير الفيروسات العسوية على نحل العسل وغيرها من الحشرات النافعة مثل دودة الحرير (جدول ٤-١). بالإضافة الى ذلك فانه يستخدم بروتوكولات قياسية لاختبار التأثيرات الجانبية للمبيدات الكيميائية على بعض المفترسات والطفيليات لتقييم تأثير استخدام الفيروسات العسوية على هذه الحشرات النافعة.

فى العادة فان الاختبارات التى تجرى على الحشرات النافعة تنفذ فى المعمل ومن النادر أن تجرى فى الحقول. اتباع البروتوكولات القياسية يحتم أن المبيدات التى تظهر تأثيرات ضارة فى الاختبارات المعملية يجب أن تخبر كذلك تحت الظروف الحقلية.

نحل العسل وديدان الحرير: مع قبول تقييد عدوى بعض أنواع الفيروسات العنوية على العائلة أو على الأقل للرتبة في العائل الأصلي فإن نقص الضرر على الملقحات وديدان الحرير من جراء الفيروسات العنوية لا تثير الدهشة أو الغرابة. لم تظهر أيًا من محاولات تحدى النحل بالمرضات الحشرية أية تأثيرات ضارة. معاملة كل المستعمرات لم يؤدي إلى حدوث أية شذوذ في إنتاج البيض أو تربية الحضنة أو موت الشغالات والملكة وكذلك في السلوك العام للمستعمرة (جدول ٤-١). ثم دراسة حساسية ديدان الحرير للفيروسات العنوية من عوائل أخرى. باستثناء *Caifornica NPV* و *Autographa* وهو من الفيروسات العنوية المعرض مدى عوائل معروفة وكذلك *Bombyx mori-NPV* لم تظهر أية فيروسات عنوية أخرى أية تأثيرات ضارة على ديدان الحرير الأخرى (جدول ٤-٢).

جدول (٤-١): دراسات سمية الفيروسات العنوية في نحل العسل

الفيروس Virus	معزول من Isolated from	التعرض Exposure	التأثير Effect
NPV	<i>Autographa Californica</i>	Per os to adult bees either individually or to whole colony	-
NPV	<i>Choristoneura fumiferana</i>	After aerial application monitoring the impact on colonies	-
NPV	<i>Heliothis zea</i>	Per os to adult bees either individually or to whole colony	-
NPV	<i>Lymantria dispar</i>	Per os to bees in a colony	-
NPV	<i>Mamestra brassicae</i>	Contact. Per os to adult bees	-
NPV	<i>Orygia pseudotsugata</i>	Per os to bees in a colony	-
NPV	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Per os to bees in a colony	-
NPV	<i>Thymelicus lineola</i>	Per os to bees in a colony	-
NPV	<i>Trichoplusia ni</i>	After aerial application monitoring the impact on colonies	-
NPV	<i>Neodiprion lecontei</i>	Per os to bees in a colony	-
NPV	<i>Neodiprion sertifer</i>	Contact. Per os to adult bees either individually or to whole colony	-
GV	<i>Cydia pomonella</i>	Per os to bees in a colony	-
GV	<i>Estigmene acrea</i>	Per os to bees in a colony	-
a	No deleterious		

جدول (٤-٢): حساسية ديدان الحرير للفيروسات العنوية

الفيروس Virus	معزولة من Isolated from	دودة الحرير Silkworm	النتائج Result
NPV	Authographa Californica	Anisota senatoria <sup>b</sup>	+
NPV	Bomplex mori	Samia cynthia <sup>b</sup>	+
NPV	Euproctis similis	Bomplex mori <sup>c</sup>	-
		Samia cynthia <sup>b</sup>	-
NPV	Heliothis zea	B. mori <sup>c</sup>	- <sup>d</sup>
NPV	Hyphantria cunea	B. mori <sup>c</sup>	-
NPV	Momestra brassicae	Antheraea pernyi	-
		B. mori <sup>c</sup>	-
NPV	Pseudaletia separata	A. mylitta <sup>b</sup>	-
		Samia ricini <sup>b</sup>	-
		B. mori <sup>c</sup>	-
NPV	Spodoptera litura	B. mori <sup>c</sup>	-
GV	Artona funeralis	B. mori <sup>c</sup>	-
GV	Cydia pomonella	A. pernyi <sup>b</sup>	-
GV	Hyphantria cunea	B. mori <sup>c</sup>	-
GV	Pieris rapae	Bombyx spp. <sup>c</sup>	-

a + lethal infection; - no deleterious effect.

B (Lep.: Saturniidae).

C (Lep.: Bombycidae).

d Virus preparation with a high contamination by bacteria were harmful to silkworms.

١- المفترسات Predators: لقد أكدت الدراسات العملية على مفترسات متعددة من يرقات حرشفية الاجنحة (البنتاوميز، القمل المجنح، أبي العيد، الخنافس الكاسية) أن الفيروسات العنوية لا تحدث أية تأثيرات معاكسة عندما تغذى على يرقات معدية بغيروس NPV ولا حتى عند تتابع ما يحدث لها من جراء تغذيتها على الاجسام الضمنية للفيروسات العنوية المعلقة في بيئات مغذية نصف مخلقة ولا مع الملامسة مع تجهيزات NPV أو GV. بالإضافة الى ذلك فإن المفترسات تعتبر من وسائل انتشار الفيروسات العنوية النشطة. هذا يرجع الى حقيقة أنها تتغذى في الغالب على اليرقات المعدية بالفيروس وكذلك على اليرقات التي ماتت من تأثيرات الفيروسات العنوية ومن ثم تنتج اجسام ضمنية معدية. الدراسات الخاصة بنشر الفيروسات العنوية بواسطة المفترسات مدونة في الجدول (٤-٣). النتائج من الاختبارات الحقلية أدت الى الاقتراح بأن معقد المفترس يحفز النشاط الوبائي للفيروسات العنوية بواسطة تلوين المجموع الخضرى للاجسام الضمنية سواء

مباشرة بعد أن تتظلف الافراد أجزاء منها أو خلال البراز. بسبب أن الاجسام الضمنية تمسك في معدة حوريات غير متجانسة الاجنحة التي تقترب على العوائل المصابة بالفيروس حتى ما بعد الانسلاخ الاخير حيث تكون الحشرات البالغة (قوية الطيران Fliers) قادرة على تقديم اللقاح الفيروسي لمجاميع الاقات الصحية.

جدول (٤-٣): انتشار ونشر الباكولوفيروسات بواسطة المفترسات

المفترس Predator	الفيروس Virus	الضحية Prey	موقع الاختبار Test site	النتيجة Result
Orthoptera (Acridiidae) Acrotylus Patruelis	NPV	Spodoptera exantpa	Field/ lab	Virus activity in feces and gut content
(Oecanthidae) Oecanthus sp.	NPV	Anticarsia gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)
(Tettigoniidae)	NPV	A. Gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)
Dermaptera	NPV	A. Gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)
Heteroptera (Lygaeidae) Geocoris spp.	NPV	A. Gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)
(Miridae) Span(a)gonicus sp.	NPV	A. Gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)
(Nabidae) Nabis Tasmanicus	NPV	Heliothis punctigera	Field	Virus activity in Feces
Nabis spp.	NPV	A. Gemmatalis	Field	Virus activity in feces (predator homogenates)

ب- أشباه الطفيليات Parasitoids: هناك امكانية لاجداث تأثيرات من جراء استخدام تحضير الفيروس على أشباه للمتطفلات البالغة وكذلك التتابعات الأكثر أهمية لبرقات الافاق المتطفل عليها التي تصبح معدية وأن العائل المعدي يصبح متطفل عليه Parasitized. توجد القليل من نتائج دراسات على تأثير الفيروس على

الطفيليات البالغة. هذا يوضح أن الدراسات على المدى العائلي لم تظهر أية تأثيرات ضارة. عندما تعرضت تراكوجراما كوكوبا الى أو عندما تناولت جرعت مختلفة من البولي هيدرا لحشرة مامسترا براسيكا المعدية بالفيروس NPV دون أى تغيير فى معدلات التطفل. لقد تم نشر نتائج للكونتسيا ميلانوسكيلس حيث تغذت الاناث المتزاوجة مع ليمانتريا ديسبار - NPV دون أية تأثيرات على دوام حياة الدبابير ومعدل تطفلها. ولا على النسبة الجنسية للدبابير المنبثقة من الجيل التالى.

أجريت الاختبارات بواسطة عدوى يرقات العائل المتطفل عليها مسبقا بفيروس الباكولوفيروس أو بواسطة تطفل العائل المعدى مسبقا. تحدث التأثيرات الضارة على يرقات شبيهة الطفيل اذا تم قتل العوائل أو تغيرت فسيولوجيا بواسطة الفيروس قبل تعذر الطفيل. عامل أو عوامل السمية Toxic factor(s) فى هيموليف اليرقات التى أضيفت على التوالى بالسلالة المنشطة Synergistic strain بفيروس حشرة Mythimna unoquincta-GV أو السلالة فاتقة التغذية بفيروس NPV نفس الحشرة كانت من أكثر التغيرات التى تعتمد على الفيروس فى العوائل المصابة. مع السلالات التقليدية للفيروسات GV و NPV ومع أن عامل أو عوامل السمية لم تحفز فانه لم تسجل تأثيرات ضارة على حشرة *Glyptapanteles militaris*.

**خلاصة القول** أن الفيروسات العسوية ذات مدى عوائلى ضيق ولا يوجد دليل على حدوث تأثيرات ضارة مباشرة. كل التأثيرات الممينة ونحت الطبيعية Sublethal غير مباشرة وتتسبب عن عدم ملائمة العائل بسبب عدوى الفيروس. الاستثناء يتمثل فى سلالة GV (منشطة Synergistic) و NPV (فرط التغذية hypertrophic) للحشرة *M.unipuncta* والتى تحفز عوائل السمية فى اليرقات. كل التأثيرات القاتلة ترتبط لاشباه الطفيليات المنيعه فى العوائل المصابة بالفيروس (جدول ٤-٤) والتى زادت مع زيادة الفترات بين تبويض أشباه الطفيليات وعدوى الفيروس.

المقدرة على تمييز العوائل المعدية بالفيروس من العوائل الصحية تحقق ميزة اختبارية للطفيليات. تمييز العائل سجل مع شبيه الطفيل *cotesia melanoscelus* التى تتطفل على حشرة ليمانتريا ديسبار. التلامس بين الطفيل والعائل يختلف بشكل معنوى بين يرقات ليمانتريا ديسبار المعدية وغير المعدية ولكن محاولات التبويض فى اليرقات غير المعدية كانت ٦٨,٧% وهى أكبر كثيرا عما هو الحال مع اليرقات المعدية بالفيروس (٣٢,١%).

جدول (٤-٤): تطور الطفيليات في العوائل المعدنية بالباكتولوفيروس

الطفيل Parasite	العائل Host	الفيرس Virus	النتيجة Result
<b>Hymenoptera (Braconidae)</b>			
<i>Cotesia glomerata</i>	<i>Pieris rapae</i>	GV	Parasites survive only if larvae were infected 4 days Parasitization: survival rate of the parasite is negative correlated to virus dosage
<i>C. marginiventris</i>	<i>Spodoptera mauritius</i>	NPV	Death of the host causes death of the (immature) parasite: parasites pupate in living infected hosts
<i>C. marginiventris</i> <i>C. marginiventris</i>	<i>Mythimna unipuncta</i> <i>Spodoptera exigua</i>	GV-s GV-s	No mortality Significantly higher mortality rate: death short after emergence from host before completion of cocoon spinning
<i>C. marginiventris</i>	<i>M. unipuncta</i>	NPV-h	Normal development of the parasite
<i>Glyptoxantes militaris</i>	<i>M. unipuncta</i>	NPV	Normal development of the parasite
<i>G. militaris</i>	<i>M. unipuncta</i>	NPV-h	Mortality of parasites- caused by a toxic factor in the hemolymph of infect larvae
<i>G. militaris</i> <i>Chelonus insularis</i>	<i>M. unipuncta</i> <i>M. unipuncta</i>	GV-s GV-s	Mortality of parasites Death of the host causes death of the (immature) parasite
<i>C. insularis</i>	<i>S. exigua</i>	GV-s	No mortality, but significant longer time for development
<i>C. insularis</i>	<i>M. unipuncta</i>	NPV-h	Death of the host causes death of the (immature) parasite- parasites were alive in morebund hosts
<b>(Encyrtidae)</b>			
<i>Copidosoma truncatellum</i>	<i>Trichoplusia ni</i>	NPV	Death of the host causes death of the (immature) parasite
<b>(Ichneumonidae)</b>			
<i>Complexis sonorensis</i>	<i>Heliothis virescens</i>	NPV	Death of the host causes death of the (immature) parasite (if infection prior to parasitization): parasites survive, if host is infected 48 h or more after parasitization
<i>C. sonorensis</i>	<i>M. unipuncta</i>	GV-s	No mortality, but significant longer time for development
<i>C. sonorensis</i>	<i>M. unipuncta</i>	NPV-h	No mortality and alteration of development
<i>Hyposoter exiguae</i>	<i>T. ni</i>	NPV	Death of the host causes death of the (immature) parasite (if infection prior to parasitization): parasites survive

			ive if host is infected after parasitization; time for development of para sites in infected hosts significantly reduced
H. exiguae	M. unipuncta	GV-s	No mortality, but significant longer time for development
H. exiguae	S. exiguae	GV-s	No mortality, but significant longer time for development
H. exiguae	M. unipuncta	NPV-h	No mortality and alteration
(Pteromalidae) Pteromalus puparum	P. rapae	GV	Death of the host causes death of the (immature) parasit. surviving parasites smaller and shorter living
(Calliphoridae) Sarcodexia innota	Urbanus proteus	NPV	Development of the parasite in diseased larvae; however, Failure to emerge from puparia
S. innota	Epargyreus clarus	NPV	Emerging from diseased larvae
(Tachinidae) Blepharipa pratensis	Lymantria dispar	NPV	Death to the host causes death of the (immature) parasite; survival rate of the parasite is negative
Compsilura concinnata	M. unipuncta	GV-s	correlated to virus dosage No effect development. But fewer parasites emerged from infected hosts
C. concinnata	M. unipuncta	NPV-h	No effect development. But fewer parasites emerged from infected hosts
Parasachopaga misera	Spodoptera litura	NPV	No mortality and alteration of development
Voria ruralis	T. ni	NPV	Death of the host causes death of the (immature) parasite

a Synergistic strain of the Mythinna unipuncta GV.<sup>10</sup>

b Hypertrophic strain of the Mythinna unipuncta NPV.<sup>11</sup>

التاكنيد *Chrysotachina alcedo* تنبثق فقط في يرقات أورباتس بروتئوس غير المعدية خلافاً للماركوفاجيد *Sarcodexia innota* كما اتضح من الدراسات الحقلية. معظم *S. innota* التي تنبثق كيرقات من يرقات *U. proteus* المريضة وتتعدى خارج يرقات العائل تقش في تحقيق انسلاخ ناجح في اتجاه الحشرة الكاملة. العديد من عذارى *S. innota* كانت شاذة من حيث صغر الحجم مما يوضح أن يرقات *U. proteus* المعدية بالفيروس كانت عوائل غير مناسبة. لقد حدث نفس الشيء مع الماركوفاجيد التي تنبثق من يرقات *E. clarus* المعدية بالفيروس.



اناث *Hyposoter exiguae* لا تميز بين العوائل المعدية وغير المعدية بالفيروس. يرقات شبيه الطفيل داخل العوائل والتي تتعرض للفيروس قبل التطفل تموت عوائلها من جراء العدوى بالفيروس ولكن اليرقات في العوائل التي تعرضت للفيروس بعد التطفل أكملت تطورها قبل أن تموت عوائلها. تمضى الطفيليات وقتاً أقل كثيراً في عوائلها اذا تعرضت للفيروس بعد التطفل مباشرة. بالإضافة الى ذلك فان حساسية يرقات *Trichoplusia* للفيروس NPV تكون أقل كثيراً عما هو الحال في يرقات *L. dispar* يوجد تأثير تنشيطي لعامل الموت للفيروس NPV والتاكنيد بليف-يبابرانتسيز. دمج الفيروس NPV وشبيه الطفيل تزيد الموت ولكن على حساب شبيه الطفيل.

انتقال وانتشار عدوى الباكولوفيروس بواسطة الطفيليات من المجموع المصاب من الافات الحشرية الى الحشرات السليمة الصحية يمكن أن يحدث ميكانيكياً. هذا يحدث من خلال الطفيليات الملوثة بالفيروس والتي لامست حديثاً اليرقات. التي ماتت بالفيروس أو تلك التي أصبحت ملوثة بواسطة مادة العقى *meronium* التي تحتوى على الفيروس من خلال انتقال الممرض الحشرى للمجموع الخضرى الذى استهلك بواسطة يرقات العائل أو الى العائل الطارح بواسطة الة وضع البيض الملوثة بالفيروس.

ج- الكائنات المائية غير المستهدفة (NTO's): التأثيرات الجانبية على اللاقاريات غير المستهدفة الناتجة من تطبيق الفيروسات العسوية كانت مجالاً لعدد من الدراسات التي استخدم فيها الانواع من الرتب المختلفة المدونة فى جدول (٤-٥). على نسق الدراسات الأخرى عن التأثير على بيئة لهذه الممرضات الحشرية لم تثبت حدوث تأثيرات معاكسة

جدول (٤-٥): تأثير الفيروسات العسوية على اللاقاريات المائية

الفيروس Virus	معزول من Isolated from	الانواع المعرضة Exposed species	النتائج Result
NPV	<i>Autographa californica</i>	Penaeid shrimps	-
NPV	<i>Heliothis zea</i>	Cryfish, brown shrimp, grass shrimp, Daphnia, oyster	-
NPV	<i>Lymantria dispar</i>	Daphnia, Chironomus, notonecta, waterboatmen	-
NPV GV	<i>Neodiprion lecontei</i> <i>Pieris rapae</i>	Daphnia Shrimps	-
Baculovirus from penaeid shrimps		Shrimps	

a - no advers effect; + lethal infection

#### ٤ - تأثير تطبيقات الفيروسات العسوية فى الحقول:

أوضحت نتائج التجارب العملية عدم حدوث تأثيرات ضارة من جراء تطبيق تحضيرات الفيروسات العسوية وكذلك على الحشرات النافعة مثل الترابكو جراما. تلوث بيض العائل بالفيروس لم يحدث تأثير طارد على الطفيل والفيروس لم يؤثر عكسيا على تطور الطفيل فى البيض. فى التجارب الحقلية على المدى الطويل فى المانيا أخذت الاعتبارات حول تأثير الفيروس المحبب للفراشة العجرية (GPGV) على الاحياء على أشجار التفاح. عند اعتبار مجموع العائل فإن المعاملة بفيروس GPGV ذات تأثير واضح على مجموع طفيليات الفراشة العجرية على عكس معقد طفيل أنواع لافات الاوراق. لمبب أن لافات الاوراق لا تغذى بواسطة GPGV فإن مستوى المجموع يظل دون تغيير وهذا ما يحدث مع طفيلياتها وكذلك الافات الاخرى مثل العنكبوت الاحمر والمن فى القطع التجريبية المعاملة بالفيروس. بسبب المدى العوائى الضيق للباكولوفيروس (بواسطة خذف المبيدات الحشرية الكيميائية) فإن مجموع الاكاروس الاوربي الاحمر ومن التفاح الصوفى تبقى تحت الحد الاقتصادى فى القطع التجريبية المعاملة بالفيروس.

**الخلاصة والاستنتاجات:** حيث أن الفيروسات العسوية تحدث طبيعيا فإن الحشرات النافعة تلامس دوما مع هذه الوسائط الطبيعية. التأثيرات الضارة للفيروسات العسوية على الملقحات والمفترسات وأشياء الطفيليات البالغة لم توجد فى الطبيعة. عدم التطور التقليدى العادى ليرقات الحشرات الملتزمة entomophagous فى العائل المصاب بالفيروس أثبتت حدوثها داخليا بسبب عدم ملائمة العائل لشبيه الطفيل محل التساؤل. تمييز العائل على أساس عدوى الفيروس سجل وثائقيا مما يشير الى ان بعض أنواع أشباه الطفيليات لا تضع البيض "Waste" على العائل الذى سيموت على الفور. اشباه الطفيليات التى تتطور اجباريا فى البيض أو العذارى ن تتأثر بواسطة أو بعد تطبيق الفيروس لان هذه الاطوار غير حساسة تقريبا لعدوى الفيروس. نقص أعداد الحشرات النافعة بعد مكافحة الافات بالفيروسات العسوية ترجع الى نقص أعداد العوائل. فى المحاصيل التى يوجد فيها معقد من الافات فإن استخدام الباكولوفيروس الاختيارى سوف يسمح ببقاء كل الحشرات والاكاروسات الاخرى فيما عدا الافة المستهدفة. لذلك فإن العوائل البديلة للمفترسات وأشياء الطفيليات ستظل متوفرة ومناحة.

## REFERENCES

- Abbas. M. S. T. and Boucias. D. G., Interaction between nuclear polyhedrosis virus- infected *Anticarsa gemmatilis* (Lepidoptera: Noctuidae) larvae and predator *Podisus maculiventris* (Say) (Hemiptera Pentatomidae). *Environ. Entomol.*, 13, 599, 1984.
- Beaver, J. B. and Reed, D. K., Susceptibility of seven teranychids to the nonoccluded virus of the citrus red mite and the correlation of the carmine spider mite as a vector, *J. Invertebr. Pathol.*, 20, 279, 1972.
- Groner, A., Specificity and safety of baculoviruses. in *The Biology of Baculoviruses*, Vol. 1, Grandos. R. R. and Federici. B. A., Eds., CRC Press, Boca Raton, FL, 1986, 177.
- Hassan. S. A., Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzlinge. *Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienstes* (Braunschweig). 36, 6, 1981.
- Ignoffo, C. M., Specificity of insect viruses, *Bull. Entomol. Soc. Am.*, 14, 265, 1968.
- Kaya. H. K., Toxic factor produced by a granulosis virus in armyworm larva: Effect on *Apanteles militaris*. *Science*, 168, 251, 1970.
- Lewis, F. B. and Podgwalte, J. D., Safety evaluations, in *The Gypsy Moth Research towards Integrated Pest Management*, Donae, C. C. and McManus, M. L., Eds., U. S. Dept of Agriculture, 1981, 475.
- Morton, H. I., Moffett, J. O., and Stewart, F. D., Effect of alfalfa looper nuclear polyhedrosis virus on honey bees, *J. Invertebr. Pathol.*, 26, 139, 1975.
- Smith. R. P. and Kurezewski. F. E., The gypsy moth, *Lymantria dispar* (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae). Its parasitoid (Hymenoptera, Braconidae) and the nuclear polyhedrosis virus: an ultrastructural study, *Pol. Pismo Entomol.*, 50, 189, 1980.
- Tinsley. T. W. and Kelly, D. C., Taxonomy and nomenclature of insect pathogenic viruses. in *Viral Insecticides for Biological Control*, Maramorosch, K. and Sherman. K. E., Eds., Academic Press, New York, 1985, 3.
- Vail, P. V., Cabbage looper nuclear polyhedrosis virus-parasitoid interaction *Environ. Entomol.*, 10, 517, 1981.
- Wu. J. F., Tai, G. G., Shi, M. B., Huang, Z. H., and Xian, B. C., [A preliminary study on granulosis of the zygaenid, *Artoma funeralis* Butler], *J. Bamboo Res.*, 2, 102, 1983 (Chinese);



## الفصل الثاني

### الأمان على اللافقاريات غير المستهدفة في سلاسل حرشفية الاجنحة للباسيلليس ثورينجينسيز والبيتا- اكسوتوكسينات

(١) مقدمة: منذ الاستخدام المبكر للمستحضرات التجارية للباسيلليس ثورينجينسيز قبل ٢٥ سنة مضت كان الأمان واحدة من أكثر المميزات التي تعضدها من بين تطبيقات المبيدات الحشرية الميكروبية. هذه المنتجات الميكروبية على عكس المبيدات الكيميائية أظهرت تخصص عالي في فعلها الابادى على الحشرات. لقد أظهرت قليل أو عدم السمية على الكائنات غير المستهدفة (NTO's) في كلا الاختبارات المعملية والاستخدامات الحقلية. حديثا وكنتيجة لزيادة الاهتمام بالبيئة والفهم الأفضل للتوكسينات المرتبطة بالباسيلليس ثورينجينسيز فقد تركز الاهتمام على تأثيرات هذه التوكسينات على NTO's خاصة اللافقاريات.

المنتجات التجارية الاولى التى تبني على هذا الكائن الدقيق قدمت فى الولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٨٥ للاستخدام ضد يرقات حرشفية الاجنحة. النوع الذى استخدم فى اولى هذه المنتجات كانت باسيلليس ثورينجينسيز تحت النوع ثورينجينسيز والمعروف عنها انها تنتج كلا الدلتا- اندوتوكسين والبيتا- اكسوتوكسين. فى عام ١٩٧٣ أوقفت ومنعت المنتجات التجارية التى تحتوى عنى البيت- توكسين فى أمريكا بسبب اعتبارات امان ناتج التمثيل metabolite هذا ومنذ ذلك الوقت كانت واصبحت كل منتجات الباسيلليس ثورينجينسيز خالية تماما من البيت- اكسوتوكسين.

الجدول (٤-٦) يضم ٢٣ نوع والتي أظهرت نشاط وفاعلية ضد حرشفية الاجنحة فى الاختبارات المعملية و/أو انحقلية. معظم البيانات عن الامان على الكائنات غير المستهدفة NTO's نحصل عليها بعد الحصول على المنتجات التجارية أو من خلال المعلومات التعصيدية للحصول على التسجيل والمركب فى وكالة حماية البيئة الامريكية EPA. بسبب هذا الوضع فان معظم المعلومات وثيقة الصلة تأتى فى ثلاثة تحت أنواع: ثورينجينسيز، كورسناكى، جاليرى والقليل من المعلومات تحصل عليها من التحت أنواع التسعة عشر الباقية. فى هذا المقام نذكر العديد من المستحضرات التجارية التى تختلف فى الفاعلية والاستخدامات المختلفة تحت النوع باسيلليس ثورينجينسيز (جدول ٤-٧).

جدول (٤-٦): تحت أنواع الباسيليلوس ثوريينجينسيز ذات النشاط ضد حشرية الاجنحة

تحت النوع Subspecies	المسريولوجي H- serotype	دلتا- اندوتوكسين &- endotoxin	بيتا- اكسوتوكسين B-exotoxin
Thuringiensis	1	+	+ (or 0)
Finitimus	2	0	0
Alesti	3a	+	0
Kurstaki	3a, 3b	+	+ (or 0)
Dendrolimus	4a, 4b	+	0
Sotto	4a, 4b	+	0
Kenyae	4a, 4c	+	+ (or 0)
Galleriae	5a, 5b	+	0
Entomo	6	+	0
Aizawai	7	+	0
Morrisoni	8a, 8b	+	+ (or 0)
Ostrinae	8a, 8c	+	0
Tolworthi	9	+	+ (or 0)
Darmstadiensis	10	+	+ (or 0)
Toumanoffi	11a, 11b	+	0
Kyushuensis	11a, 11c	+	0
Pakistani	13	+	0
Israelensis	14	+	0
dakoto	15	+	?
wuhanensis	-	+	+
kumamoensis	18	+	+ (or 0)
japonensis	23	+	0

جدول (٤-٧): المستحضرات التجارية للباسيليس ثورينجينسيز في مكافحة يرقات حشرية الاجنحة (سوف تذكر مصادرها في متن الموضوع)

الشركة Company	الكفاءة Potency	النوع Type	نمت النوع بباسيليس ثورينجينسيز <i>B. thuringiensis</i> sub-species	المنتج Product
Solvay	1.0 IU/mg	Powder	Thuringiensis	Bactospeine
	8,800 IU/mg	liquid	Kurstaki	Biotrol XK
Nute-lite (Produced in U. S. S. R)	6,500 IU/mg	powder	Thuringiensis	Bitoxibacillin
	4X10 <sup>10</sup> sp/cry. g (0.6-0.8% active)	Powder		
Sandoz		Liquid	Galleriae	Certan
Abbott	16,000 IU/mg	Powder	Kurstaki	Dipel WP
	8,800 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Dipel 4L
	13,200 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Dipel 6L
	17,600 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Dipel 8L
(Produced in U. S. S. R)	1X10 <sup>10</sup> sp/g	Powder	Galleriae	Enterobacterin
Sandoz		Liquid	Thuringiensis	Thuricide 30B
		Liquid	Thuringiensis	Thuricide 50B
	16,000 IU/mg	Powder	Kurstaki	Thuricide 11P
	3,430 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Thuricide 16B
	4,000 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Thuricide HPC
	8,000 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Thuricide 32B/LV
	12,000 IU/mg	Liquid	Kurstaki	Thuricide 48L.V

Potency information derived from product labels and literature cited in this review.

## (٢) السلالات الفعالة ضد حشرية الاجنحة:

### أ- التأثيرات على كائنات المياه العذبة Freshwater Orgnisms:

لقد اتضح أن جراثيم بباسيليس ثورينجينسيز تحت النوع كورستاكى ذات ثبات لبعض الوقت في نظم المياه العذبة. لقد وجد Menon and De Mestral (١٩٨٥) أن ٥٠% من الجراثيم تبقى حية ونشطة بعد ٥٠ يوم. من المرجح ان استخدام هذا النوع بالقرب من مواطن المياه العذبة سوف يؤدي الى وجود كميات صغيرة من الجراثيم والذئنا- اندوتوكسين في الماء. في دراستان حقيقتان استخدمت مستحضرات BT كورستاكى في البرك بالمعدلات الموصى بها على المحاصيل الزراعية. لقد قام Anderson بتقييم تأثيرات الداييل ٤ الى على البلانكتون الحيوانية خاصة نوع الدافنيا في البرك الصغيرة على امتداد ٣ شهور. لقد تم استكشاف البلانكتون الحيوانية zooplankton خاصة rotifers, copepods, cladocerans, هاموش الفانتوم (chaoborus sp) خلال الدراسة دون ان تظهر أية دلائل عن التأثيرات المعنوية

بالمقارنة بما كان موجودا قبل المعاملة مع أى من الاتواع المدروسة. لقد أجرى Laszlo (١٩٧٩) دراسة مشابهة فى البرك حيث استخدم دابيل فى صورة مسحوق قابل للبلل بعمدلات الحقل ولم تظهر أية تأثيرات سامة على القشريات الدقيقة microcrustaceans (ostracoda ، copepods) والكاروسات (Hydracarina) والحشرات (ثلاثية وغير متجانسة وغمدية الاجنحة Ephemeroptera ، odanta).

لقد أجريت تجارب معملية على الحشرات المجموعة من أماكن تدفق ونيارات الماء لتحديد التأثيرات على الكائنات غير المستهدفة NTO's المرتبطة بالرش الواسع فى الغابات. لقد قام Edit (١٩٨٥) بجمع يرقات أنواع ترايكوبترا، بليوكوبترا، ايفيميريترا وثلاثية الاجنحة وعرضها لتركيزات الفيروسيد 321٧ تماثل الوضع الاسوأ فى الحقل وزيادة ١٠ وحتى ١٠٠ مرة عن هذه الكمية. من بين الحشرات التى أختبرت وجد أن سمليوم فيتقوم حساسة للمنتج. فى دراسة مماثلة وجد Lacey وآخرون (١٩٧٧، ١٩٧٨) أن هذا النوع أكثر حساسية للبكتريا BT كما كانت أكثر حساسية من أنواع سيمبوليدى الأخرى. أنواع ترايكوبترا التى تعيش فى مجرى الماء فى نطاق حواجز الرش الجوى بالبكتريا BT فى الغابات وجدت أمعاتها الوسطى تحتوى على تركيزات عالية من الجراثيم والبورات بعد التطبيق ولم تلاحظ أية تأثيرات سامة.

ب- التأثيرات على الكائنات البحرية Marine organisms: جراثيم BT كورستاكي لا يتعايش فى ماء البحر كما فى المياه العذبة ويوجه علم فان ماء البحر يعتبر مبيد بكتيرى bactericidal على البكتريا غير البحرية. لقد وجد الباحثان مينون وديمسترال أن ٩٠% من جراثيم تحت النوع هذا تموت بعد ٣٠ يوم من التعرض لماء البحر. حتى BT لا تدوم المعيشة لمدى طويل فى البحر ولكن من الممكن للكائنات التى تعيش فى هذه البيئة أن تقوم بتناول الجراثيم و/أو البلورات اذا اجريت المعاملات بالقرب من منطقة الشاطئ. عندما تم حقن خلايا BT والجراثيم فى الاستوكزا البالغة Oysters تمت تصفية الكائنات الدقيقة من النظم الموجودة فيها. لقد بلغت نسبة الاتهام للخلايا الخضرية ١٠٠% بعد ٢٤ ساعة من الحقن. بعد عشرة أيام من المعاملة لم يمكن التمييز بين الحيوانات المعاملة وغير المعاملة. لقد تم التهام ما يقرب من ١٠٠% من الخلايا الخضرية بعد ٢٤ ساعة من الحقن. يرقات الاستوكزا (C.gigas) فى المربى الذى يحتوى على مدى عريض من تركيزات دابيل 8L تطورت بشكل عادى.



لقد اختبرت أنواع عديدة من الكائنات البحرية في المعمل بواسطة Alzieu وآخرون (١٩٧٥) وهى بلح البحر من الرخويات Mussels والاستكوزا والحلازين البحرية Periwinkle والجمبرى حيث تم تعريضها فى المربى لتركيزات الداييل من ١٠-٤٠٠ مللجم/لتر لمدة ٩٦ ساعة. فى التجارب الحقلية فإن ٢٠ مللجم/لتر تمثل تركيز ١٠٠٠ مرة مثل المستويات المتوقعة من BT فى مرقد الاستكوزا بعد الرش الجوى بالمعدلات الموصى بها. لقد وجد أن الجمبرى A.salina فقط حساس للبكتريا BT فى هذه الدراسة وكان التركيز النصفى القاتل LC50 من ٦٥ مللجم/لتر. المكونات الخاملة من المستحضر قد تساهم فى معدلات الوفاة حيث أن نسب الموت نقصت بعد ازالة هذه المكونات الخاملة من معلق الاختبار.

ج- تأثيرات كائنات التربة Soil organisms: جراثيم BT كورسناكى تكون ثابتة فى الاراضى حتى سنة أو ما يزيد. اذا كانت الظروف ملائمة قد يحدث نمو خضرى وقد يزداد عدد الخلايا فى التربة بشكل كبير. مستويات الجراثيم تنقص بسرعة فى الشهور القليلة الاولى بعد استخدام بكتريا BT وتظل ثابتة لعدة شهور بعد ذلك. الدلتا- اندوتوكسين البلورية يعتقد أنها تنهار بواسطة الكائنات الدقيقة فى التربة فى خلال ١-٣ شهور. فى دراسات مبكرة تم تعريض دودة الأرض Lumbricus terrestris تربة تحتوى على ١-١٠% (وزن/ وزن) ثوروسيد 30B أو 50B لمدة شهرين ووصلت نسبة الموت الى ١٠٠%. الموت قد يرجع الى معدلات الاستخدام العالية وتعفن الدم Septicemia أو الى البيتا- اكسوتوكسين الممكن تواجده فى المستحضرات. لقد استخدم الباحثان Benz and Altwegg (١٩٧٥) مستحضر داييل مسحوق قابل للبلل على الارض بمعدلات ١، ١٠، ١٠٠ مرة مثل المعدلات الموصى بها (٦٠، ٦٠٠، ٦٠٠٠ مللجم/م<sup>٢</sup>) والباكتوسبين بمعدل ٣٠ جم/م<sup>٢</sup> فى قطع تجريبية حقلية صغيرة. خلال شهرين اختبار لم نلاحظ أية تأثيرات معاكسة على مجموع دودة الأرض فى الارض المعاملة كما لم تسجل ديدان حية أو مريضة فى المناطق المعاملة. لقد تم تقييم Enterobacterin فى الأصص المملوءة بالتربة فى المعمل بمعدلات ٠,٢ وحتى ٢%. لم يسجل خفض فى فترة معيشة ديدان الارض بعد ١١٠ يوم ولو أن نشاط الديدان انخفض فى الأصص المعاملة. مستويات مفصليات الأرجل الدقيقة (الكاروس والكلومبولا) انخفضت بمقدار مرتان الى عشر مرات بعد المعاملة.

د- التأثير على الكائنات الأرضية Terrestrial organisms: على المجموع الخضرى تكون جراثيم وبلاورات BT ثابتة لفترات قصيرة نسبيا. لقد وجد سلامة وآخرون (١٩٨٣) أن الجراثيم لها نصف فترة حياة بين ٧٥-٢٥٦ ساعة على أوراق القطن وليس هذا بسبب الحرارة المرتفعة ولكن ترجع الى تأثير الاشعة فوق البنفسجية. الدلتا- إندوتوكسين البللورية ليكتريا BT كورسكاى يفقد الفاعلية ضد حشرات حرشفية الاجنحة بعد ٤٠ ساعة من التعرض لضوء الشمس. هذا على خلاف الثبات الطويل فى بيئات الماء العذب.

١- حشرات متساوية الاجنحة Orthoptera: من الاهتمام الوقوف على أن المفترسات الحشرية الناقعة قد تصبح مسممة intoxicated أو معدية عندما تتغذى على افات حشرية تناولت جراثيم BT و/أو البلاورات. لقد قام Yousten (١٩٧٣) بتغذية كميات قاتلة من BT كورسكاى ليرقات نطاط الكرب (ترايكوبلوزيا- نى) وقبل الموت مباشرة قام بتقديم هذه اليرقات للرعاش الصينى (تينوديرا أريديفوليا تحت النوع سينسيز). التقدير الكمي للجرعة التي تم تناولها بواسطة الرعاشات لم يكن ممكنا ومن ثم خلص الباحث أن الرعاشات لم تكن حساسة لمخاليط الجراثيم/البلاورات من عائل الحشرة.

٢- حشرات جلدية الاجنحة Dermaptera: لقد أجرى الباحث Workman (١٩٧٧) اختبارات معملية على مفترس الحشرات أبو مقص المخطط earwig "لابيديورا ريبيريا" على يرقات حرشفية الاجنحة. لقد قام بتعريض أبو مقص الى الدابييل القابل للبلل الذى استخدم فى التربة بمعدلات تكافئ عشرة مرات المعدل الحقلى العادى ولم يحدث أى وفيات فى المجموعة المعاملة.

٣- حشرات غير متجانسة الاجنحة Heteroptera: فى دراسة معملية وجد Hamed (١٩٧٨-١٩٧٩) أن المفترس "بيكروميروس بيديس" لم يتأثر عكسيا أو بضرار بعد التغذية على يرقات الضحية "ييونوميوتا ليفونيميليس" والتي تغذت على أوراق عوملت بالدبييل قابل للبلل أو الثوروسيد HP. أظهرت العديد من الدراسات الحقلية مع مستحضرات BT التجارية الامان على المفترسات من نصفية الاجنحة. البرع Spined stiltbugs "جياس سينوس" من المفترسات الهامة على بيض حرشفية الاجنحة خاصة دودة براعم الدخان "H.virescens". فى التطبيقات الحقلية للدابييل القابل للبلل WP على الدخان أشار Elsey (١٩٧٣) الى تحقيق مكافحة فعالة لافات حرشفية الاجنحة دون لية تأثيرات ضارة على الحوريات أو الحشرات الكاملة

*J. spinosus* خلال شهرى الدراسة. فى دراسة مشابهه فى حقول فول الصويا قد استخدم الداييل القابل للبال ضد دودة البرسيم الخضراء و دودة القطيفة فى الفول ولم تظهر أية تأثيرات معاكسة لبكتريا BT كورسناكى على مفترسات عائلات Nabidae (damselfly و Nabis) أو *bigeyed bug* Lygaeidae. لقد أجرى Harding وأخرون (١٩٧٢) دراسة لمدة سنتان على القطن لتقييم تأثيرات نفس تحت أنواع البكتريا على الاعاء الطبعية لدودة النوز *H. zea* على القطن. بعد تطبيق المستحضر الميكروبي ضد هذه الافة بمعدلات ٦-٢٤ رطل/أكر لم يسجل تأثيرات ضارة على المفترسات من عائلة *minute pirate bugs* (*Geocoris* ssp *orior* sp) و عائلات Anthocaridae Nabidae أو Reduviidae (assassinbugs) بعد رش الغلات بالتوروسيد والداييل WP ضد دودة أوراق البلوط "هيتير و كامبا مانتيو".

٤- حشرات غمدية الاجنحة Coleoptera: لقد قام سلامة وزكى (١٩٨٢) بتربية يرقات دودة ورق القطن على غذاء يحتوى على BT تحت النوع entomocidus ثم تم تغذية هذه اليرقات بواسطة خنافس ستافيليند البالغة "الحشرة الرواعة". لم تتأثر طول فترة حياة المفترس ولم تسجل أية اختلافات فى قبول الضحية بين اليرقات غير المعاملة وتلك التى تعرضت للوسيلة الميكروبية. فى دراسة أخرى قام سلامة وأخرون (١٩٨٢) بمعاملة المن بمحلول bt انتروموسيدي ثم قدم هذه الحشرات المعاملة ليرقات أبى العيد حديثة الفقس بالتغذية على المفترس المعامل. هذا ولو أنه بينما ازدادت فترة دوام يرقات المفترس فى مجموعة المعاملة بالبكتريا BT انتوموسيدس إلا أنه لم يحدث خفض واضح فى استهلاك الضحية. من هذه البيانات اتضح أن الخنافس قادرة على التمييز بين سطح الضحية المعامل بالوسيلة الميكروبية وأن هذه الضحية قد تنتج مادة طاردة للتغذية أو طاردة فى خنافسها المفترسة. خلافا لهذا الوضع فان مفترسات أبى العيد غير قادرة على تمييز الضحية التى تناولت BT انتوموسيدس.

فى دراسة معملية وحقلية صغيرة مع واحد من مفترسات كارابيدى وهو *Bembidion lampros* وجد الباحث أن الداييل مسحوق قابل للبال أحدث تأثير ضعيف جدا على الخنفساء. لقد تم تقييم الفاعلية بالملامسة للتوروسيد HPC على المفترس "هيو داميا كونفيرجنس" ولم تتضح أية حساسية بعد خمسة أيام عندما عوملت بمستويات تكافى المعدلات الحقلية. فى الحقل تم استكشاف مجاميع الخنفساء للوقوف على حساسيتها لرش BT على المحاصيل المختلفة. كمثال قام جونسون

(١٩٧٤) بتقييم العديد من المستحضرات التجارية على صورة رش أو طعوم على الدخان. مجاميع نوعى *H. convergens* وغيرها فى أبى العيد كوليوميجيلا ماکولاتا\* ووجد عدم تأثرها بالمعاملة الميكروبية خلال سنتى الدراسة. لقد وجد Asquith (١٩٧٥) أن خفشاء أبى العيد الاسود *S. punctum* لا تتأثر بمخلوط الدايبييل قابل للبلل والجوثيون على أشجار التفاح لم يحدث خفض فى مستويات مجاميع خنافس أبى العيد فى القطع التجريبية التى عوملت بالدايبييل وغيرها فى الدراسات الحقلية. لقد أشار بعض الباحث الى أن المستحضر التجارى Bitoxibacillin قد يسبب موت لأبى العيد *C. septempunctata* إلا أن هذا التأثير القاتل يرجع الى وجود BT بيتا- اكسوتوكسين فى هذه المستحضرات وليس البكتريا أو الدلتا- اندوتوكسين البتلورى.

٥- حشرات شبكية الاجنحة Neuroptera: يرقات Lacewing المسماه "كريزوبا كارنيا" من المفترسات الهامة على الحشرات وقد قام العديد من الباحثين باختبار خساسة هذا النوع لمنتجات BT. لقد وجد Wiltinson وآخرون (١٩٧٥) أن الثوروسيد HPC بمعدلات الحقل الموصى بها لم يؤثر على الحشرات الكاملة أو يرقات هذا النوع عندما استخدمت كرش ملامس. لقد خلص Hassan (١٩٨٣) أن الدايبييل غير ضار للحشرات البالغة من المفترس *C. carnea* عندما عرضت لإقلام جافة عند التركيزات الموصى بها. لقد قام Salama وآخرون (١٩٨٢) بتقييم تأثير BT انوموسيدس على يرقات *C. carnea* بوضعها مع قش مرشوش و يرقات دودة ورق القطن المعاملة. عندما تغذت على دودة ورق القطن المعاملة طالت فترة تطور اليرقة بشكل كبير كما حدث خفض كبير فى استهلاك الضحية. لقد حدث نفس الاتجاه مع يرقات المن المرشوشة مما يوضح تأثير مانع للتغذية أو تأثير طارد.

٦- حشرات ثنائية الاجنحة Diptera: لقد وجد حامد (١٩٧٨- ١٩٧٩) أن نوعى التاكينيد Tachinid ( *Bessa fugax* و *Zenillia dolosa* ) لم يتأثر بعد التغذية على معلقات الدايبييل التى تحتوى على  $10 \times 10^5$  جرثيم لكل مليلتر. لقد لاحظ Horn (١٩٨٣) خفض فى أعداد يرقات السيرفيد على الكرنب Collards المرشوش بالدايبييل قابل للبلل وقد يكون ذلك راجعا الى التأثير الطارد على الحشرات الكاملة. الملاحظات الحقلية عن تأثيرات تطبيقات BT على مختلف حشرات ثنائية الاجنحة لم تظهر أى تأثير معاكس على النسبة المئوية للتطفل. فى تقييم الرش الجوى للثورويدي HPC فى مكافحة الفراشة الغجرية ودودة الاوراق لم يسجل أى تأثير

معاكس لنوعى التاكينيد. لقد أشار الباحث Fusco (١٩٨٠) إلى زيادة التطفل بواسطة التاكينيدى.

٧- حشرات غشائية الاجنحة - نحل العسل Hymenoptera: الدراسات الاولى التى اسخدم فيها شغالات عديدة فضلت فى اثبات أى نشاط لبكتريا BT ضد الاطوار غير البالغة والكاملة من نحل العسل.

لقد قام Martouret and Euvert (١٩٦٤) بتغذية شغالات النحل لبكتريا BT تحت النوع ثورينجينسيز الموجودة فى مخاليط السكر والعسل والصلصال. لقد حدث موت كامل خلال سبعة أيام مع تحضير الجراثيم- بللورات الاكسوتوكسين وبعد ١٢ يوم لمعقد الجراثيم - بلورات فقط. لقد أشار بحث اخرين أنه بالرغم من أن الخلايا الخضرية لبكتريا BT لم تحدث ضرر على النحل الا أن مستحضراتها تحتوى على بيتا- اكسوتوكسين. لقد قام Cantwell وآخرون (١٩٦٦) بتغذية النحل على محاليل سكرية تحتوى على جراثيم BT تحت النوع ثورينجينسيز (٦٧ و  $1.672 \times 10^1$  لكل نحلة) والرائق  $2.5$  مللجم لكل نحلة) وبلورات  $0.5$  وحتى  $1.6 \times 10^1$  لكل نحلة) وكذلك بلورات تحت النوع اليسى وسوتو (كلاهما  $0.5 \times 10^1$  لكل نحلة). لقد فضلت الاتواع الثلاثة من البللورات فى احداث ضرر على النحل ولكن البيتتا- اكسوتوكسين (الرائق) أعطى  $100\%$  موت تقريبا بعد ٧ أسابيع. لقد سجل موت عالى فى المعاملة بالجراثيم بعد ٨ أيام. هذا قد يرجع الى تتابع فى تعفن الدم Septicemia. لقد كانت الجرعات عالية بمرات عديدة عما يتعرض له النحل فى برامج مكافحة حرشية الاجنحة.

لقد تم تغذية المزارع الكلية غير المتجرئة من BT تحت النوع ثورينجينسيز وتحت النوع كورستاكى بواسطة حشرات نحل العسل البالغة. لقد وجدت حالات وفاة فى النحل بسبب البيتتا- اكسوتوكسين فى مزرعة BT ثورينجينسيز بينما لم يحدث موت فى المزارع التى فيها توكسين الحرارى thermolabile والذي قد يكون جاما- اكسوتوكسين. حيث أن هذا التوكسين يفقد نشاطه خلال التجزئ فانه لا يكون ذت اهتمام فى المنتجات التجارية المتجرئة. عندما تمت التغذية على مزارع كاملة التجزئ من تحت النوع BT كورستاكى لحشرات نحل العسل البالغ بركيزات جراثيم  $1 \times 10^1$  + البللورات لكل نحلة على امتداد ٧ أيام لم تسجل أية تأثيرات مرضية مع كلا المستحضرين.

بكتريا BT تحت النوع جاليري فعال ونشط ضد حرشيات الاجنحة وأخر أثبت نجاح على المستوى التجارى فى مكافحة نودة الشمع (*Galleria spp*) المرتبطة بخلايا النحل. يمكن رش هذه البكتريا على سطح أقراص العسل أو غرسها فى الشمع. مع هذه الطرق توجد فرصة بسيطة للكائنات غير المستهدفة بخلاف نحل العسل كى تصبح فى تلامس مع هذه البكتريا. لقد قام Cantwell and Shieh (١٩٨١) بتغذية تخفيف ٢٠:١ من BT جاليريا فى محلول سكرور ٤٠% للنحل البالغ حديث الفقس. بعد ١٤ يوم لم تسجل اختلافات فى الوفيات بين المجاميع المعاملة وغير المعاملة. لم تظهر أية تأثيرات معاكسة على الشغالات البالغة أو حياة الخلية المعاملة عندما قدرت من خلال وضع البيض وانتاج الحضنة وتغطية عيون الحضنة وانتاج العسل. لقد أشار الباحث Burges (١٩٧٦) الى أن جراثيم تحت النوع هذا قد تظل حية فى العسل لفترة غير محدودة. بسبب تحملها لبكتريا فان نحل العسل لا يبدو أنه يتأثر بواسطة هذا النبات. لقد أشار Buckner وآخرون (١٩٧٤) فى كندا عدم حدوث تأثيرات معاكسة على نحل العسل بعد الرش الجوى بالدابيليل مسحوق قابل للبلل والثوروسيد 16B.

٨- حشرات غشقية الاجنحة- أشباه الطفيليات Hymenoptera- parasitoids: أشباه الطفيليات الحشرية تعتبر منظمات هامة جدا لمجاميع الآفات الحشرية وقد اختبرت بشكل كثيف لمعرفة حساسيتها للباسيلليس ثورينجينسير. فى دراسات التغذية على معلقات هذا الكائن الدقيق تم تسجيل وفيات فى بعض الانواع. لقد قام Krieg وآخرون (١٩٨٠) بتغذية الجراثيم المغسولة وبلورات BT تحت أنواع ثورينجينسير وكورسناكى (١٠x٥ جراثيم + بلورات لكل مليلتر) الى الترايكوجراما كالوسيا البالغة ولم يلاحظ أى موت أو نقص فى المقدرة على التطفل بعد ٧ أيام من التغذية. عندما قام Hassan and Krieg (١٩٧٥) بتغذية معلقات الباكثوسبين أو الدابيليل أو الثوروسيد لحشرات الترايكوجراما عند نفس المستويات لم تشاهد أية تأثيرات ضارة فيما مع معاملة الباكثوسبين والتي أحدثت نقص فى القدرة على التطفل. هذا قد يرجع الى البيتا- اكسوتوكسين فى الباكثوسبين. لقد لاحظ بعض الباحث فترة بقاء ومعيشة أقل فى حشرات *Hyposotca exiguae* البالغة والتي تغذت على معلقات دابيليل (٢ مللجم/مليلتر). لقد خلص الباحث الى أن الموت قد يرجع الى معقد بلورات الجراثيم. لقد أجرى Muck وآخرون (١٩٨٢) اختبارات مشابهة مع الدابيليل مسحوق قابل للبلل على الحشرات البالغة كوينسيا جلوميراتا، بيمبلا تريونيلا ولم تسجل أية

وفيات في ك. جلوميراتا بمعدلات  $10^{-1}$  -  $10^{-2}$  جرثيم لكل مليلتر ولكن لوحظ قليل من التأثير عند أى معدل على اليمبلا. لقد أشار الباحثين الى تحطم الغشاء الطلائى للمعى الاوسط فى اليمبلا مع التركيز الاعلى بسبب الدلتا- اندوتوكسين. لقد قام Dunbar and Johnson (1975) بجمع الحشرات للكلملة كارديوشيلس نيمبرسيس فى الحقل وتم تغذيتها على معلقات الداييبل القابل للبلل والبيوترول (XK and WP). لقد لاحظ الباحثان قصر فترة الحياه فى المجموعة التى تغذت على BT ولكن لم يكن هناك تأكيد على أن التغذية التى قد حدثت فعلا. تجنب الطعام والتجوع قد تكون أسباب الوفاة.

أشباه الطفيليات قد تتجنب أو تطرد بعد التغذية بواسطة هذه المستحضرات. بينما لاحظ Hassan (1983) أن الترايكوجراما كاكوسيا لم تتأثر من جراء التعرض لافلام السطوح الجافة من BT ثورينجينسيز والكورستاكي فإن الحشرات الكاملة تم طردها بواسطة مستحضرات الباكثوسيين والداييبل فى اختبارات الاختيار Choice tests. وجد باحث آخر عدم حدوث نقص فى النسبة المئوية لتطفل المن بواسطة دياريتيلا رابيا على الكرنب المعامل بالداييبل مسحوق قابل للبلل. تسم يرقات العائل بواسطة المستحضرات الميكروبية هذه قد تجعلها أقل جذبا للحشرات الكاملة من أشباه الطفيليات. لقد لاحظ سلامة وزكى (1983) أن زبلى كلوروفثالاما خفضت من مستويات تطفل يرقات دودة ورق القطن المسممة بالبكتريا ووجد ان هذه اليرقات أصبحت أقل قبولا لدبور "براكون بريفيكورنس" لقد وجد أن اناث C. melanoscelus لم ترغب فى يرقات العائل المسمم بعد 3 أيام من المعاملة ولكنها كانت قابلة لفعل ذلك بعد 10 أيام.

على العكس من هذه النتائج كان Dunbar وآخرون (1972) أول من أشار الى زيادة فى النسبة المئوية لتطفل الفراشة الغجرية ويرقات دودة الدردار فى الغابات التى عوملت بالثوروسيد HPC. لاحظ بعض الباحث عدم حدوث أية تأثيرات معاكسة على أشباه الطفيليات بعد المعاملة مع الداييبل WP والثوروسيد فى مكافحة فراش نوتودونتيدي H. manteeo. لقد أشار Fusco (1980) الى زيادة فى النسبة المئوية للتطفل ليرقات الفراشة الغجرية بواسطة C. melanoscelus و P. uncineta بعد الرش الجوى بالداييبل 4L. لقد خلص الباحث أن هذا يرجع الى زيادة كثافة يرقات العائل بالحجم المناسب مما أدى الى اقتراح حدوث تنشيط بين BT و C. melanoscelus. لقد أكد باحثون آخرون التنشيط فى اختبارات المعمل مع يرقات

الفراشة العجربة التي تغذت على الـ *الدايبيل* 4L وتعرضت للطفيل سى ميلانوسيلليس. لقد ازدادت النسبة المئوية للتطفل في اليرقات المسممة بالبكتريا حتى أنها نمت ببطء وكانت بالحجم المناسب للتطفل على مدى فترة طويلة من الوقت. لقد تحصل على نفس النتائج في المعمل مع روجاس ليمنتريا وعوائل الفراشة العجربة التي تغذت على BT كورسناكى. فى حالة الروجاس بينما كانت النسبة الجنسية لأشباه الطفيليات تميل ناحية انتاج ذكور أكثر فى اليرقات المعاملة حيث أن الاناث تضع بيض مخصب أكثر فى يرقات العائل الاكبر. تطبيق هذه النتائج فى الحقل وجد Weseloh وآخرون (١٩٨٣) زيادة من ٦ الى ١٢ مرة فى النسبة المئوية لتطفل يرقات الفراشة العجربة بواسطة *C. melanoscelus* فى اللقح التجريبية فى الغابات المعاملة ببكتريا BT. لقد وجد Hamel (١٩٧٧) أن أشباه الطفيليات التى نهجم الاطوار المبكرة من يرقات دودة البراعم ازدادت فى العدد بعد الرش الجوى للـ *الدايبيل* WP أما أشباه الطفيليات فى يرقات دودة البراعم الكبيرة فى العمر نقصت فى العدد. لم يؤدى الرش الموسع لبكتريا BT كورسناكى الى حدوث اية تأثيرات معاكسة فى مجاميع أشباه الطفيليات.

يرقات شبيه الطفيل التى تطورت داخل يرقات العائل المسمم ببكتريا BT كانت ذات فترة تطور طويلة فى بعض الحالات. لقد أثنى سلامة وزكى (١٩٨٣) الى فترات تطور زيادة فى الطول مع شبيه الطفيل *Zele Chlorophthalme* فى دودة ورق القطن المعاملة بالكتن النقيق. لقد سجلت فترات تطور برقى طويلة نسبيا مع سى ميلانوسيلليس التى تطور فى يرقات الفراشة العجربة المعاملة بالـ *الدايبيل*. هذه النتائج فى توافق مع ما وجده Tamerak (١٩٨٠) من أن يرقات العائل المسممة ببكتريا BT ليست مناسبة غذائيا لأشباه الطفيليات سواء كانت يرقات أو حشرات كاملة حيث أن الحشرة الكاملة لدبور البراكون بريفيكورنس التى تغذت على سوائل الجسم قصرت فترة تطورها. لقد أشار حامد الى تأثيرات سامة فى أربعة أنواع من أشباه الطفيليات التى تغذت على سوائل جسم العائل المعدى ببكتريا BT وهى ديدجما أرميلاتا، بمبلا تريونيلا، اجينيا سيبس، تتراستيكس ائيمونيميللا. على العكس من ذلك وجد Hassan (١٩٨٣) أن تطور التريكوجراما اكوسيا لم تتأثر عندما تم غمس بيض العائل فى معلقات BT بعد التطفل. فى يرقات العائل التى تناولت جرعات كبيرة من BT كانت تتابع تطور شبيه الطفيل هو الموت بسبب موت العائل قبل الاول أو قبل التضج فى العائل غير الناضج *H. exiguae*.



٩- الأكاروسات Acarina: لقد قام Krieg بتعريض العنكبوت الاحمر ذات النقطتان "تترانيكس يورتيكا" على المجموع الخضرى المعامل بمستحضر الثوروسيد "من الانتاج المبكر ١٩٦٦" وقد سجل حدوث وفيات كبيرة بسبب احتواء المستحضر على بيتا- اكسوتوكسين. تحت الظروف الحقلية لم يضر الاكاروس من جراء الرش بمستحضرات BT كورسناكي. لقد اشار Weires and Smith (١٩٧٧) الى ان رش التفاح بالدايبيل خلال ٤ شهور الموسم لم تؤثر على الاكاروسات *T. urticae* و *P. Ulmi* او على نوعى المفترسات مثل *A. fallacis* ، *Z. mali*.

### (٣) البيتا- اكسوتوكسين فى الهاسيلليس ثورينجينسي B- Exotoxin

الثورينجينسين Thuringiensin أو البيتا- اكسوتوكسين عبارة عن ناتج تمثّل metabolite يذوب فى الماء وثابت فى الحرارة حيث يوجد فى بعض سلالات بكتريا BT. الاكسوتوكسين عبارة عن نيوكلو تيد 701- KDa يحتوى الالدينين والجلوكوز وحامض الالاريك allaric. ولو أن انتاج الاكسوتوكسين من الناحية التاريخية كان مرتبطا ببيض تحت أنواع BT خاصة تحت النوع ثورينجينسي، جليريا، دارمستالينسي الا أن انتاجه فى هذه السلالات وغيرها يعتمد على بيئة النمو. فى الولايات المتحدة الامريكية يجب أن تكون المنتجات التجارية لهذا الكائن الدقيق خالصة من الاكسوتوكسين كما يتأكد من خلال التقييم الحيوى على الذباب المنزلى. التوكسين Thuringiensin نفسه ما زال تحت التطوير كمبيد حشرى تجارى.

أ- كيفية احداث الفعل Mode of action: كيفية احداث فعل الثورينجينسين فى النظم الحيوية تتمثل فى تثبيط انزيمات RNA بوليميريز التى تعمل بالتنافس مع الالنيوزين تراهى فوسفات ATP. فى الثدييات أظهر الثورينجينسين فعل تفضيلى فى منع تخليق RNA الريبوسومى. فى نطاط للكرنب "تراكوبلوزيا- نى" أدى الحقن بالثورينجينسين الى تثبيط غرس المركب المعلم اشعاعا فى بروتين الرنا والدنا. حيث أن تخليق الرنا يعتبر من العمليات الحيوية طوال فترة الحياة فان الاكسوتوكسين يحدث السمية فى كل صور الحياة المختبرة. فى الثدييات فان الموقع الاولى للفعل يحتمل أن يكون الكبد. فى الغالب يتأخر الموت حتى بعد الحقن المباشر لجرعات مكثفة. الجرعات المنخفضة القاتلة تظهر فترات تأخير طويلة.

فى الحشرات اتضح أن الاكسوتوكسين يحدث الموت ويخفض من دوام المعيشة ويثبط التكاثر ويعمل كمادة محدثة للتشوهات الخلقية Teratogen ومانع للتغذية

Feeding deterrent. التأثير السام للثوريينجيسين يكون واضحا فعلا في اليرقات كاملة الانسلاخ (حشرات كاملة التطور) holometabolous في وقت التعذر. المادة سامة كذلك حتى مع الحشرات ناقصة التطور أو hemimetabolous خاصة عند وقت الانسلاخ. في العادة يتأخر وقت الوفاة وهو قد يكون راجع الى دور ووظيفة طول فترة الحياة. يحدث الموت في الحشرات البالغة عند المستويات العالية من الجرعة فقط. أظهرت ديدان اللوز والديدان القارضة خفض في الخصوبة وطول فترة الحياه ولو أن دوام معيشة الديدان القارضة نقصت فقط مع الجرعات العالية. لقد كان للاكسونوكسين تأثير البيض وحدث تثبيط في تطور اليرقة التي فقست وحدثت موت مع الانسلاخ الاول بسبب النفاذية المباشرة داخل البيض (سوف أضع هذه الجملة بالانجليزية ردا على من يؤكدون أن مستحضر BT المصرى المسمى أجرين يقتل بيض دودة ورق القطن ففي ذلك دليل على احتوائه على البيتا- اكسونوكسين المحظور).

Exotoxin also has an effect on the egg, inhibiting larval development of hatching and producing mortality at first molt apparently by direct penetration into the egg.

التأثير الخاص بالتشوه الخلقي غير القاتل Sublethal teratogenic للمركب ثوريينجيسين لوحظ في رتب عديدة من الحشرات كاملة التطور مثل ثنائية وغمدية وحرشفية الاجنحة.

ب- العوامل التي تؤثر على الممية: بوجه عام أظهر ثوريينجيسين سمية أقل كثيرا عن طريق المعاملة الفمية orally بالمقارنة بالطرق المباشرة للدخول في كلا الثدييات والحشرات. هذه الظاهرة ربما ترجع الى وجود كميات كبيرة من الفوسفاتازيس المحللة في خلايا أمعاء الثدييات والحشرات. الاختلاف في السمية بين المعاملة المباشرة وتلك عن طريق الفم كانت في رتبة ٦٠-١٠٠% في الثدييات وقد تكون أعلى حتى ٢٥٠ في الحشرات. الاختلافات في معدل الإزالة elimination قد تساهم كذلك حيث أن الانواع الأقل حساسية مثل الفئران تقوم بتصفية وهم الثوريينجيسين بسرعة أكثر عن فراشة الشمع الحساسة "جاليريا ميلونيلا" الاختلافات فيما بين الانواع في حساسية تحضيرات بوليميريز RNA للثوريينجيسين تأكدت بين الجرذان وذبابة اللحم "ساركوفاجا بولاتا". على نفس المنوال فإن الاختلافات في حساسية الانزيم اقترحت كمسبب للاختلاف بين حساسية الحشرة الكاملة واليرقات

كما ذكر أعلاه. لقد خلص البحث الى ان الثوريينجينسين سام بوجه خاص على الحشرات كاملة التطور خلال الاتسلاخ عندما يكون نشاط RNA بوليميريز المنشط مع هورمون الاتسلاخ الحساس للثوريينجينسين عاليا.

ج- السمية على اللافقريات غير المستهدفة: لقد أجرى القليل من الدراسات عن سمية الثوريينجينسين لللافقريات غير المستهدفة NTO's. معظم البيانات المتوفرة تتضمن السمية على انواع الحشرات النافعة المرتبطة بالافات المستهدفة خلال تجارب التطوير التجارى. حساسية مفصليات الارجل للثوريينجينسين درست باستفاضة وكانت تتعرض معظم الافات الحشرية. من هذه الدراسات المرجعية خلص البحث الى ان الثوريينجينسين ليس له درجة عالية من الاختيارية Selectivity بين الحشرات حيث كانت معظم الانواع التى اختبرت فى المعمل حساسة للمنتج. التقييم الكمي للحساسية من الصعوبة بمكان حيث أن معظم التجارب استخدمت بيانات تحتوى على الثوريينجينسين بدون التقدير الكمي لجرعة البيتا- اكسوتوكسين. بسبب أن البيئة تؤثر على مقدرة سلالة BT على انتاج البيتا- اكسوتوكسين وكذلك الكمية الناتجة من هذا التوكسين فان المقارنات المباشرة للحساسية من الصعوبة بمكان. علاوة على ذلك فان المسحضرات التى وصفت قبلا على أنها نقية Pure قد تحتوى على ١٠-٢٠% اكسوتوكسين عندما قدرت بواسطة طرق التحليل الاكثر حداثة وتقدما كما أن التجهيزات التى قد تحتوى على أكثر من توكسين واحد واردة. يوجد دليل على أن أكثر من توكسين ثابت فى الحرارة ينتج بواسطة ثلاثة تحت أنواع مختلفة من بكتريا BT بناء على السمية المختلفة تبعا للحساسية للحرارة كما أمكن عزل العديد من المكونات السامة المتميزة بواسطة جهاز HPCL.

#### ١- البلاتكتون الحيوانية فى المياه العذبة Freshwater Zooplankton:

لقد أختبر مستحضر الثوريينجينسين على الدافنيا ماجنا وكانت التركيزات النصفية LC50 خلال ٢٤-٤٨ ساعة أكبر من ١٥،٦،٣ مللجم/لتر على التوالي. لم تسجل تأثيرات شاذة فى الدافنيا بعد ٢٤ ساعة مما يعكس الفعل المتأخر للثوريينجينسين. حيث أن الثوريينجينسين ثابت ضد التلخل المائى فان سمية أكبر قد تحدث فى نهاية الفترة. هذه القيم للتركيزات النصفية القاتلة LC50 توضح أن الثوريينجينسين بعد ٢٤ ساعة ليس على السمية على الدافنيا ماجنا. حيث أن المعدلات المستخدمة فى الحقل فى المكافحة منخفضة بوجه عام (٤٠-٦٠ جم/لكر) وأن الثوريينجينسين ليس عنده مقدرة

على الحركة في البيئة بسبب الارتباط القوي على سطح التربة فإنه لا يتوقع حدوث أية تأثيرات على مجموع الدافنيا من جراء الاستخدام الحقلى والميدانى للتورينجينسين.

## ٢- كائنات الأعماق المائية Benthic Aquatic Organisms

لقد لاحظ بعض الباحثين أن التورينجينسين غير سام لأنواع Tubifex spp فى تجارب أولية غير واضح فيها طريقة المعاملة. لسوء الحظ لا توجد بيانات أخرى متوفرة عن الارتباط العالى للتورينجينسين فى التربة وبسبب المعدلات المنخفضة للاستخدامات التجارية للمركب فإنه لا يحتمل حدوث تأثيرات ضارة على هذه الكائنات بين فئات الصخور والتربة.

## ٣- الكائنات الأرضية Terrestrial Organisms :

أ- حشرات ذات الفنب القافز: Thysanoptera: فى دراسة معملية لم تلاحظ أية تأثيرات ضارة على مفترس العنكبوت الأحمر Scolothrips sexmaculatus بعد ٢٨ يوم من المعاملة بمعدل ٢٠ جم/أكر. لقد حدث خفض كبير فى المجموع بعد ١٤ يوم مع معدل ١٠ جم/أكر من التورينجينسين (واحد من المستحضرين) وحدث استرجاع للمجموع بعد ٢١ يوم.

ب- حشرات غير متجانسة الاجنحة Heteroptera: لم تلاحظ أية تأثيرات على أنواع Geocaris spp فى حقول القطن المعاملة بمعدل ٤٥ جم/أكر. كذلك لم تلاحظ أية تأثيرات على Nabis spp فى التجارب الحقلية عند معدلات أعلى من ١٥٠ جم/هكتار. بوجه عام لم تعتبر حشرات نصفية الاجنحة حساسة للتورينجينسين حيث ثبت أن هذه المستويات ذات سمية عالية لأنواع اللبجر. لقد أشار Sanford (١٩٨٥) أن استخدام التورينجينسين على القفاح لم يؤثر على فقس مفترس mirid "اتراكوس مالى" بعد ٣٠ يوم من المعاملة بمعدل ١٦ جم/١٠٠ لتر. التجارب الحقلية على البق المفترس "أوريس تريستكلر" أظهرت عدم تأثيره باستخدام التورينجينسين حتى ٨٠ سم/أكر. أجريت دراسات عن إمكانية تأثير التورينجينسين على البق الواخز ذات البقعان "بيريليس بيوكيولاسى" حيث أنه يتغذى على يرقات خنفساء كلورانو البطاطس المعاملة. لم يحدث أى تأثير على يرقات العمر الثالث التى تغذى على جنث خنفساء الكلورانو المسممة بالتورينجينسين سواء على دوال المعيشة أو نضج الحشرة غير متجانسة الاجنحة. كذلك لم تحدث أية تأثيرات على يرقات العمر الرابع التى تغذى على خنافس كلورانو البطاطس المريضة أو يرقات العمر الثالث التى تعرضت لكلا يرقات الخنافس والمجموع الحضرى المحتوى على محلفات الاكسوتوكسين.

ج- غمدية الاجنحة Coleoptera: لم تتأثر مجاميع Hippodamia spp بمعدل ٤٠ جم/ أكر ثورينجينسين عندما استخدمت على البرسيم وهو المعدل الذي يحقق مكافحة اقتصادية للآفات الحشرية. في نفس الدراسة نتضح أن خنافس "مبلجيسيز نيجريسنس" كانت حساسة للمعاملة عند معدلات أقل من ١٠ جم/أكر.

د- غشائية الاجنحة Hymenoptera: غالبية الدراسات عن سمية الثورينجينسين على الكائنات غير المستهدفة NTO's اشتملت اختبارات على نحل العسل "بيس ميليفيرا". أظهرت هذه الدراسات تأثيرات قاتلة على نحل العسل عندما وجد الثورينجينسين في مصدر الطعام حيث تأخر موت اليرقات والحشرات الكاملة كما لوحظ معدل موت عالى بعد ٥,٣ أيام على التوالي عند الجرعات التى تعطى ٩٠-١٠٠ موت. لقد كان الاكسوتوكسين قاتلا كذلك ليرقات نحل العسل ولكنه لم يؤثر على خروج الحشرات الكاملة حيث أن جميع اليرقات التى داومت المعيشة استكملت الحياه بشكل عادى. لم تسجل أية تشوهات خلقية Teratogenic على نحل العسل. مستعمرة من ١٠٠ ألف نحلة تم معاملتها بمعدل ٢٠٠ مللجم رائق BT عانت من الوفاة بشكل كامل. لقد أثرت المادة على اليرقات والعدارى والحشرات الكاملة. لقد وجد Vandenberg and Shimanuki (١٩٨٦) أن جرعة ٠,٠٠٢ مللجم لكل نحلة كانت فعالة فى خفض دوام معيشة النحل البالغ الذى تغذى على مستحضرات جراثيم BT الخالية من الثورينجينسين تخفيفات مستحضرات الاكسوتوكسين كانت سامة فى الغذاء أو بالملامسة عندما وضعت فى أو مع نحل العسل فى الاقفاص. لقد لوحظ النشاط الملامس فقط مع أكثر التخفيضات تركيزا (١٠٠ مرة أكثر تركيزا عن المستويات الخاصة بالسمية عن طريق الفم طوال فترة الحياة ولكنها مشابهة لمستويات التى تؤثر على نصف فترة الحياة LT50 بواسطة جرعة فردية عن طريق الفم). لقد وجد Atkins (١٩٨٥) أن مستويات ٠,٠٥٤ جم لكل نحلة لم تحدث القتل فى النحل البالغ فى الاقفاص بعد ٧٢ ساعة عندما أجرى الرش عليها على صورة مسحوق تغير كلولين. لقد اشار الباحث Mayer (١٩٨٥-١) أن النحل البالغ فى الاقفاص لم يتأثر عندما سمح له الوجود مع المجموع الخضرى للبرسيم لمدة ٢٤ ساعة ثم جمع بعد ٢-٨ ساعات من المعاملة بمعدل ٤٠ جم/أكر ثورينجينسين. هذه التجربة يجب أن تكرر لفترات طويلة للوقوف على التأثير المتأخر.

أظهرت الدراسات الحقلية أن التخفيف البينى وعدادات التغذية فى نحل العسل تقدم حماية من استخدام الثورينجينسين التجارية فى احدى التجارب على البرسيم

المزهر لم تحدث المعاملة بمعدل ٤٠ جم/أكر ثوريينجيسين أية وفيات عن المقارنة من خلال عد النحل الميت في المصائد خلال ثلاثة أيام من المعاملة. نشاط وطيران النحل البالغ ثم تقييمه كذلك من خلال الملاحظة وتؤكد عدم تأثره خلال يومان من المعاملة. لم يؤثر الثوريينجيسين على دوام معيشة الحضنة في الخلايا ولو على تطورها خلال ٦ ساعات بعد المعاملة مع أن عدد العذارى كان قليلا. في دراسة على الذرة السكرية من حيث تساقط حبوب اللقاح وجدت زيادة كبيرة في أعداد النحل الميت في المصائد في اليوم الاول بعد المعاملة بالثوريينجيسين بمعدل ٤٠ جم/أكر بينما كانت الاعداد عادية في اليوم الثاني والثالث. ما حدث في اليوم الاول كان وما زال محل تساؤل. في هذه التجربة لم تسجل أية تأثيرات على النحل السراح و العدد الذي يعود للخلايا حاملا حبوب اللقاح بعد يومان من المعاملة. في دراسة على النحل القاطع للارواق *Megachile roundata* حيث سمح للنحل البالغ في الاقفاص بالسرحان على البرسيم المعامل بالثوريينجيسين بمعدل ٤٠ جم/أكر ولم تسجل وفيات بعد ٢٤ ساعة. هذه الفترة غير كافية بسبب عدم امكانية الحكم على حدوث وفيات.

كذلك أظهرت الدراسات على أشباه الطفيليات بوجه عام أن الثوريينجيسين لا يحدث أية أضرار على هذه الحشرات النافعة. الطفيل الشبيهة *Edovum puttleri* الذي يتطفل على خنفساء كلورادو البطاطس لم يتأثر من التغذية على ٧,٥ مللجم/مليلتر تخفيف من الثوريينجيسين في محلول العسل في الماء مع الحشرات البالغة في الاقفاص لمدة ١٤ يوم كذلك لوحظ أن مجموع هذا الطفيل لم يتأثر من جراء المعاملة بالثوريينجيسين بمعدل ٣٠ جم/أكر في الحقل.

تم دراسة حساسية شبيه الطفيل *Trixys Pallidus* من Aphidid (braconid) والوارد من فرنسا الى كاليفورنيا للمساعدة في مكافحة من اللوز كروم أبيض جاجلانديكولا للثوريينجيسين. لقد وجد أن الثوريينجيسين بمعدل ٢٢ جزء في المليون لم يسبب أية وفيات في شبيه الطفيل البالغ بالملامسة أو عن طريق خفض التطفل عندما تم التعريض خلال التناول. المعاملة القيمة بمعدل ٢٢ جزء في المليون ثوريينجيسين على عذارى العمر الثالث المتأخر لم تسبب أية تأثيرات على الخروج.

هـ- الاكاروسات *Acarina*: لقد تم دراسة سمية الثوريينجيسين على نوعين من الاكاروسات بواسطة Patterson وآخرون (١٩٨٦). لقد تمت معاملة الاناث البالغة وحوريات خليطة الجنس والبيض للاكاروس المفترس *N. fallacis* و *T. occidentalis* بواسطة النقع في محاليل الثوريينجيسين بمعدلات ١٠-١٠٠٠ جزء

فى المليون. لقد تم تقييم الموت بعد ٢٤ ساعة من المعاملة ووصلت قيم الجرعات النصفية القاتلة LD50's الى ٣٥،١٥٠ جزء فى المليون لأكاروسات *N. fallacis* البالغة والحوريات على التوالي فى مقابل ٣٥-٣٠٠ جزء فى المليون فى أكاروس *T. occidentalis* البالغ والحوريات. لقد كان هذا النوع أكثر حساسية للثوريينجيسين بينما كان أقل حساسية عن ضحية العنكبوت. الملاحظات التى تشير الى أكبر نسبة من الموت خلال عملية الاتسلاخ وحساسية الحوريات تتمشى مع ما هو معروف عن كيفية احداث فعل الثوريينجيسين.

س- العناكب *Araneida*: فى التجارب الحقلية على البرسيم تم خفض تعداد العناكب عد ٧ أيام من المعاملة بالثوريينجيسين بمعدل من ٢٠ وحتى ٨٠ جم/أكر.

**الخلاصة والاستنتاجات :** من البيانات المتاحة اتضح أن الانواع النشطة والفعالة التابعة لحرشية الاجنحة للباسيليس ثوريينجيسيز احدثت تأثيرات سامة على بعض اللافقاريات. هذه التأثيرات قد ترجع الى: ١- مكونات المستحضر، ٢- معقد الجراثيم- بلورات، ٣- البيتا-اكسوتوكسين.

أ- المستحضرات Formulation: المواد الفعالة فى منتج BT التجارى فى الطبيعة ليس محل نقاش فى هذا المقام. مع ذلك فانه يمكن القول أن هذه المواد تظهر سمية على الكائنات غير المستهدفة بناء على نتائج التجارب المعملية والحقلية التى أجريت فى العشرين سنة الاخيرة ولو أنها غاية فى القلة. بناء على ضمان أمان هذه المواد أقرت وكالة حماية البيئة الامريكية EPA. US بتسجيلها. يوجد بيانات محدودة عن تقييم تأثيرات المستحضر على الكائنات غير المستهدفة NTO's. أظهرت احدى الدراسات التى أجريت بواسطة الباحث Haverty (١٩٨٢) على الكريزوبا والهيبوداميا مع الدايبل 4L حدوث موت على عند مستويات ثمانية مرات أعلى من معدلات الحقل. موت *Artemia* لوحظ مع تركيزات تزيد ٣٠٠٠ مرة عن التركيزات الحقلية القياسية. لم يثبت وجود أية علاقة بين للتأثيرات على الكائنات غير المستهدفة والمستحضرات. مكونات المستحضر قد يكون لها تأثيرات على بعض المفترسات الحشرية وأشباه الطفيليات فى جعل الضحية أو العوائل المعاملة مع BT أقل جذباً عن غير المعاملة. بينما أن هذه تحسن من المكافحة عن طريق تحويل أو توجيه المفترسات وأشباه الطفيليات فى البحث عن الضحية التى تسببت فى

الرش الحقلى كما انها قد تؤدي الى حركة هذه للكائنات النافعة خارج نطاق المساحات المعاملة.

ب- معقد الجراثيم- البلورات Spore-crystal complex: التأثيرات الخاصة بمنع التغذية أو تجنب الضحية سجلت مع معقد الجراثيم- البلورات غير المجهزة في المفترسات وأشباه الطفيليات. في حالة بعض أشباه الطفيليات فإن تجنب العوائل المعاملة بيكتريا BT قد تكون مرتبطة أكثر بالقابلية للكشف عن حالة ضرر أو تلف فسيولوجى عما هو الحال مع الوسيلة الميكروبية نفسها. بعض أنواع المفترسات من رتب شبيكية وغمدية الاجنحة أظهرت تطوريقي طويل بعد تناول الفريسة المعاملة بيكتريا الباسيلليس. كذلك فإن أشباه الطفيليات البالغة من رتبة غشائية الاجنحة أظهرت قصر في فترة حياتها بعد التغذية على سوائل جسم يرقات العائل المسممة بيكتريا BT. بالإضافة الى ذلك فإن الأخيرة أظهرت خفض في خروج أشباه الطفيليات البالغة مع خفض في مقدرة التكاثر. أظهر أحد التقارير حدوث تلف في المعدة في غشائية الاجنحة بسبب الدلتا- اندوتوكسين. هذا بينما في الامكان أن الأخير يكون ذات سمية ضعيفة لليرقات وهذا غير شائع الحدوث بسبب أن تنشيط التوكسين يعتمد على ظروف حموضة PH خاصة ومواقع ارتباط خاصة في الغشاء. مع التركيزات العالية من الجراثيم يحدث تغفن بكثيرة في الدم. التفسير الأكثر احتمالاً يتمثل في أن هذه التأثيرات قد ترجع الى أن العوائل المسممة بيكتريا BT أقل ملائمة من الناحية الغذائية عما هو الحال مع العوائل السليمة الصحية. لقد أجريت محاولات قليلة للوقوف على سبب الموت في العديد من الدراسات. مطلوب دراسات ميكروسكوبية وميكروبيولوجية لتحديد ما اذا كان تغفن الدم Septicemia أو التسمم intoxication أو التغذية Nutrition أو أى عامل آخر مسؤول عن الموت. لقد حدث سبب مباشر لموت للكائنات غير المستهدفة NTO's في الحالات التى تناولت فيها يرقات حرشغية الاجنحة جرعات قاتلة من بكتريا BT ويرقات أشباه الطفيليات كانت غير قادرة على استكمال نموها قبل موت العائل. التتابعات لغشائية الاجنحة كانت قاتلة كذلك كما هو الحال عندما تؤكل يرقات العائل بواسطة المفترسات.

بعض أنواع ذبابة Tachinid وأشباه طفيليات غشائية الاجنحة أظهرت معدلات عالية من التطفل بعد التطبيقات الحقلية لبكتريا BT بسبب الاعداد الكبيرة لليرقات الصغيرة المتاحة كعوائل. بعض أنواع أشباه الطفيليات أظهرت تحول في النسب الجنسية بعد المعاملات الحقلية كنتيجة ليرقات عائلها التى تبقى في الأطوار الأخيرة



لفترات ممتدة من الوقت. بوجه عام وبشمول أكبر نقول أن تأثيرات معقد الجراثيم- البلورات لميكتريا BT كانت أقل ما يمكن على الكائنات غير المستهدفة NTO's عندما استخدمت بالمعدلات الموصى بها. معظم هذه التأثيرات كانت ثانوية في الطبيعة ناتجة من تقليل صحة العائل أو يرقات الضحية.

ج- بيتا- اكموتوكسين (ثورينجينسين) (B- Exotoxin (thuringiensin): حيث أن الثورينجينسين ذات طريقة احداث فعل سامة على كل الحيوانات فان الجرعات العالية تميل لاحداث تأثيرات معاكسة على كل الاحياء المعرضة. الثورينجينسين له تأثير ملامس بسيط في الحشرات. تعرض المفترسات والطفيليات للثورينجينسين المعامل في الحقل تكون من خلال العائل أو بواسطة الملامسة بتناول الجرعات السامة خلال الافتراس والتطفل تكون من الصعوبة بمكان بسبب التخفيف في العائل والهدم السريع للثورينجينسين داخله. الثورينجينسين الذائب في الماء عنده ميل قليل للتراكم في البيئة. بالإضافة الى ذلك فان فقد الفسفرة في dephosphorylation في العائل تؤدي الى فقد الفاعلية. بوجه عام فان سمية الثورينجينسين خلال الافتراس والتطفل لم تلاحظ في المعمل ولا في الحقل. الانواع من قسم Arachnidae حساسة بوجه خاص لفعل الثورينجينسين. التطبيقات الحقلية للثورينجينسين قد تحدث ضرر أكثر على الاكروسات والطلاكب النافعة عما هو الحال مع الكائنات الحشرية غير المستهدفة. معظم هذه الانواع من الحشرات لم تتأثر بالمعاملة بالثورينجينسين بالمعدلات التجارية الاختيارية من بين الانواع التي تحقق امان مناسب لبعض الانواع بما يتوافق مع المكافحة الفعالة للأفات المستهدفة.

لو أن الثورينجينسين سام على نحل العسل باللامسة أو التناول فان مجاميع نحل العسل لم تتأثر في الحقل بسبب قلة المعدل المستخدم والتخفيف وعادات تغذية الحشرات. التجارب الحقلية في المستقبل يجب أن تتضمن ملاحظات على فترات طويلة للوقوف على التأثير المتأخر للثورينجينسين في هذه الانواع من الجرعات المنخفضة.

## REFERENCES

- Alzied, C. deBarjac, H., and Maggl, P., Tolorance of plarine fauna to *Bacillus thuringiensis* S\_znce et Peche.. Bull. Inst. Peches Marit. Maroc. 250, 11, 1975.
- Asquith, D., Response of the predaceous black lady beetle *Stethorus punctum* (LeConte), to apple orchard insecticide treatments, Abbott labotatories Exp. No. D986-t(x)7, 1975.
- Atkins, L., A toxicity test with thuringiensin against honey bee worker adults, unpublished study for Abbott Laboratories. 1985.
- Benz, G. and Altwegg, A., Safety of *Bacillus thuringiensis* for earthworms, J. Inventbr. Pathol. 26, 125, 1975.
- Burges, H. D., Leaching of *Bacillus thuringiensis* spores from foundation beeswax into honey and their subsequent survival, J. Invertebr. Pathol., 28, 393, 1976.
- Cantwell, G. E. and Shieh, T. R., Certan-A new bacterial insecticide against the greater wax moth, Am. Bee J., 121, 424, 1981.
- Dunbar, J. Pi and Johnson, A. W., *Bacillus thuringiensis*: effect on the survival of a tobacco badworm parasitoid and predator in the laboratory, Environ. Entomol., 4, 352, 1975.
- Fusco, R. A., Field evaluation of a commercial preparation of *Bacillus thuringiensis*, DIPEL, 4L, progress report, Gypsy Moth Pest Management Methods Development Project, Pennsylvania Bureau of Forestry, 1980.
- Hamed, A. R., Effects of *Bacillus thuringiensis* on Partasites and predators of yponomeuta evonyellus (Lep., Yponomeutidae), Z. Angew. Entomol., 87, 294, 1978-79.
- Haverty, M. I., Sensitivity of selevted non-target insects to the carrier of Dipel 4L in the laboratory, Environ. Entomol., 11, 337, 1982.
- Ignoffo, C. M. and Gregory, B., Effects of *Bacillus thuringiensis* beta-exotoxin on larval maturation, adult longevity and egg vibility in several species of Lepidoptera, Environ. Entomol., 1, 269, 1972.

- Johnson, A., *Bacillus thuringiensis* and tobacco budworm control on flue-cured tobacco, J. Econ. Entomol., 67, 755, 1974.
- Krieg, A., Hassan, S., and Pinsdorf, W., Comparison of the effect of the variety israelensis with other varieties of *B. thuringiensis* on non-target organisms of the order Hymenoptera: *Trichogramma cacoeciae* and *Apis mellifera*, Anz. Schaedlingsk. Pflanz. Umweltschutz, 53, 81, 1980.
- Lacey, J. A., Mulla, M. S., and Dulmage, H. T., Some factors affecting the pathogenicity of *Bacillus thuringiensis* Berliner against blackflies. Environ. Entomol., 7, 583, 1978.
- Mayer, D., The effect of thuringiensin on adult honey bees (*Apis mellifera*) and leafcutter bees (*Megachile rotundata*) in a laboratory mortality bioassay, unpublished study for Abbott Laboratories, 1985a
- Patterson, C., Potts, M., and Rodriguez, J. G., Laboratory evaluation of *Bacillus thuringiensis*. Unpublished study for Abbott Laboratories, 1968.
- Salama, H., Foda, M., Zaki, F., and Khalafallah, A., Persistence of *Bacillus thuringiensis* Berliner spores in cotton cultivations, Z. Angew. Entomol., 95, 321, 1983.
- Vandenberg, J. and Shimanuki, H., Two commercial preparations of the beta-exotoxin of *Bacillus thuringiensis* influence the mortality of caged adult honey bees, *Apis mellifera* (Hymenoptera: Apidae), Environ. Entomol., 15, 166, 1986.
- Weires, R. W., and Smith, G. L., Apple mite control, N. Y. St. Agric. Exp. Sta. Rep., Hudson Valley, NY, 1977.
- Yousten, A. A., Effect of the *Bacillus thuringiensis* 8-endotoxin on an insect predator which has consumed intoxicated cabbage looper larvae. J. Invertebr. Pathol., 21, 312, 1973.



### الفصل الثالث

## أمان باسيلليس ثورينجينسيس اسرئيلينسيس والباسيلليس سفيريكس على الكائنات غير المستهدفة فى البيئات المائية

مقدمة: البعوض والذباب الاسود تنقل الوسائل المسببة لبعض الامراض التى تسبب الوهن والضعف للانسان بما فيها الملاريا وداء المذنبت الملحية onchocerciasis والامراض الفيروسية arboviruses والفلاريا الليمفاوية Failariasis وغيرها من الامراض الطفيلية المتنوعة فى الانسان وغيره من الفقاريات. مكافحة الاختيارية للناقلات الحشرية للامراض تمكن من خفض المرضية او نسبة انتشار المرض Morbidity والموت Mortality الذى يسبب عن هذه الامراض مع اقل تأثير ضار على البيئة. قبل اكتشاف الممرضات البكتيرية عالية الكفاءة والاختيارية على الناقلات الحشرية للامراض تم استعراض التأثير على البيئة المائية وأمان المستحضرات المتوفرة للمكافحة الميكروبية للحشرات. بواسطة الباحث Singer (١٩٥٧) وغيره من الدارسين خلال مشاركتهم فى ورشة العمل التى نظمتها وأشرفت عليها (EPA) بالاضافة الى التوصيات الخاصة بدراسة ثبات وأمن الوسائل الميكروبية للمكافحة فان المشاركون أوصوا باستمرار البحث عن وتطوير الكائنات الدقيقة التى تساهم فى ادارة السيطرة على الافات فى البيئات المائية. خلال ١٥ عاما من البحث والتطوير تم عزل بكتريا فعالة ذات كفاءة فى مكافحة والقضاء على اليرقات مقارنة أو قريبة فى الكفاءة والفاعلية للعديد من المبيدات الحشرية الكيميائية التقليدية. أظهرت التجارب الحقلية المكثفة أن بعض عزلات بكتريا باسيلليس سفيريكس (فى الغالب الطرز السيروولوجية 5a, 5b) والباسيلليس ثورينجينسيس تحت النوع اسرئيلينسيس (الطرز السيروولوجي H-14) تحقق مكافحة اختيارية ليرقات البعوض والذباب الاسود مع قليل من التأثير على الكائنات غير المستهدفة.

لقد حدث تطور سريع من الناحية التجارية لبكتريا BT اسرئيلينسيس بعد اكتشافها مباشرة بواسطة الباحثان Goldberg and margalit (١٩٧٧). لقد تم توثيق فاعليتها ضد انواع عديدة من الافات والبعوض الناقل للملاريا وغيرها والذباب الاسود فى اماكن كثيرة من العالم. السرعة التى تم فيها تسجيل هذه المنتجات تجاريا فى امريكا كانت ترجع الى الدرجة العالية من الاختيارية Selectivity لتوكسين هذا الكائن الدقيق

تحت ظروف معينة وقد لوحظ الأثر والفعل الباقي الطويل وتدوير recycling البكتريا وكذلك السجلات الخاصة بتسجيل وأمان هذه المركبات في الزراعة وسلاسل BT ذات الفعل الاختياري ضد وتجاه حشرات حشرية الاجنحة.

بالرغم من أن B. sphaericus ذات مدى عوائل ضيق فاتها لها كفاءة عالية كمبيد يرقات ضد البعوض. العديد من العزلات أثبتت فعل ابادى في اليرقات ضد عدد من أنواع البعوض وتحت ظروف معينة لوحظ الفعل الباقي الطويل وتدوير البكتريا. العزل الحديث والاختبارات الحقلية الملائمة للسلاسل ذات الكفاءة العالية جدد الاهتمام في النواحي التجارية لبكتريا BT سفيريكس.

القبول العريض من قبل العامة والوكالات التشريعية لهذه الوسائل الميكروبية في المكافحة كان مسبوقا باختبارات مكثفة عن الامان تحت مختلف الظروف البيئية. بالرغم من أن BT تحت المسئلة اسرائيلينسيز مسجلة للاستخدام في العديد من البلدان ومع أن الكثير من الدراسات أوضحت قليل من التأثيرات المعاكسة على غالبية الكائنات غير المستهدفة NTO's فإن استخداماتها في المياه الجارية Lotic تؤدي الى كثير من الخلافات والآراء المتعارضة. الاهتمام الاكبر محل الخلاف ينصب على الامان على الانسان والكائنات غير المستهدفة النافعة والتأثير الشامل في أو على الشبكة الغذائية خاصة ما يتعلق بصناعة صيد السمك القباسيليس سفيريكس لم تسجل حتى الان للاستخدام الميداني. في هذا المقام سوف نقوم باستعراض البيانات المتاحة عن التأثيرات في المدى القصير والطويل للوسائل الميكروبية على الكائنات غير المستهدفة NTO's في البيئات المائية.

#### ١- تأثير BT اسرائيلينسيز على اللافقاريات غير المستهدفة في المياه الجارية:

من بين نوعي الوسائل الميكروبية محل التداول في هذا المقام اتضح أن BT اسرائيلينسيز فقط ذات فعل ونشاط قاتل لليرقات من الذباب الاسود ومن ثم فهو النوع الوحيد الذي استخدم بكثافة في البيئات وأماكن المعيشة في المياه الجارية. ولو أن بكتريا BT سفيريكس فعالة ضد أنواع البعوض التي توجد على حواف التيار الجارى (مثل أنوفيليس مينيميس وغيرها) لم تجرى دراسات مستفيضة عن تأثيرات هذه البكتريا على الكائنات غير المستهدفة في بيئات المياه الجارية.

هناك اتفاق ضمنى على العوامل الحيوية التي تحكم اختيارية BT اسرائيلينسيز على يرقات الذباب الاسود. مجموع عوامل السلوك الاختياري لتغذية يرقات الهموش

المستهدفة، درجة الحموضة العالية نسبياً للمعدة، الاكتمال الملائم للانزيمات المحللة للبروتين *Proteolytic enzymes* تعمل وتمكن من اصطلاك وتفرق وتنشط الاجسام الضمنية للجراثيم الاولى التي تحتوى على التوكسين. غياب اى من هذه العوامل يقلل لحد كبير ويبطل *nullifies* حساسية النوع المعنى تجاه التأثيرات المعاكسة والخطيرة لبكتيريا *BT* اسرائيلينيز. كمثال فان الحشرات ذات الاختيارية الغذائية *Filter feeding* من رتب *Ephemeroptera* و *Trichoptera* وغيرها قد تقوم بالتناول الفعلى للتوكسين دون اى نتائج تنشيطية حتى تظل غير ضارة على هذه الكائنات. من جهة اخرى فان بعض حشرات المياه الجارية من شبكية الاجنحة قد تكون حساسة فى الاصل لتوكسين البكتريا ولكن قد لا يحدث تناول لكميات كافية من التوكسين بسبب كيفية احداث الفعل (مثال ذلك المفترسات وجامعى الفتات *Scraper* والجامعات *gatherer* ... الخ).

#### (ا) طرق قياس التأثير على الكائنات غير المستهدفة فى المياه الجارية:

١- الدراسات المعملية: لقد تم وضع وتطوير مجموعة من طرق وخطوات التقييم الحيوى *bioassay* للوقوف على النشاط الابدائى على اليرقات للمبيدات الحشرية المستخدمة فى مكافحة الذباب الاسود بما فيها *BT* اسرائيلينيز. لقد تم عمل استعراض مرجعى لهذه الدراسات بواسطة *Lacey* وآخرون (١٩٨٢) و *Walsh* (١٩٨٥). من سوء الطالع أن استخداماتها لتحديد وتقدير التأثير الحاد لنفس مبيدات اليرقات على *NTO's* محدودة للغاية. التقييم المعملى لتأثير هذا الكائن الدقيق على الاحياء غير المستهدفة فى النظم البيئية فى المياه الجارية تكون مفيدة كذلك اذا كان التقييم الحيوى يجعل من معدلات وسلوك التغذية مقارن لتلك التى تلاحظ فى البيئة الطبيعية. مثال ذلك فان البيانات التى تحصل عليها فى التقييم الحيوى لبكتيريا *BT* اسرائيلينيز ضد الاحياء المائية والتى أجريت فى المياه الساكنة *Still water* تحت درجات منخفضة بشكل شاذ ذات قيمة محدودة. حتى نظام التقييم الحيوى البسيط نسبياً والذي يسمح بالتغذية المرتبطة والعادية يمكن أن يعطى معلومات ذات قيمة عن الحساسية لبعض المجاميع الفعالة. مثال ذلك أن نظم التقييم الحيوى الذى يتحقق فيها الجريان أو التيارات المائية عن طريق قنائع الهواء أو القلابات المغناطيسية أو العيوات المغزلية قد تكون ملائمة للأنواع التى ترتبط مع السطوح الناعمة نسبياً وتتغذى داخل طبقة الحاجز. هذا ولو أن هذه النظم قد لا ترد أو تحقق تنوع الظروف الموجودة فى التيارات الطبيعية التى تمكن من اجراء التقييم الحيوى

للبيكتريا BT تحت النوع اسرانيلىنسىز ضد مدى عريض من الكائنات غير المستهدفة NTO's. النظم الاكثر تطورا عن التدوير وتهوية الماء الذى استخدم بواسطة Gawgler وآخرون (١٩٨٠) مع ادخال الوسائط الطبيعية تقدم محاكاة أفضل للظروف الحقلية المتنوعة.

٢- الدراسات الحقلية: نظم الاتسياب وصورة الاتجاه unidirectional flow أو المزاريب أو البواليع الدقيقة minig-utters عند جانب التدفق للتيار باستخدام تيار ماء متدفق بالضغط أو الجاذبية تقدم نظام محاكاة واقعى عن مكان المعيشة مع تحقيق ملائمة الحجم الصغير والانشاء السريع والتكرارية. نظم الاحواض أو المجارى الصغيرة تحتوى على الوسائط الطبيعية مثبتة أو ترتكز فى التيار أو فى النهر الذى يعمل بما يحقق مميزات نظام البواليع الدقيقة فيما عدا عامل التكرارية repeatability تحت ظروف أكثر طبيعية. وضع الشباك نهاية اتجاه مجرى الاحواض والمجارى بما يسمح بالقياس الدقيق للانجراف والموت.

من أكثر الطرق الدقيقة لتقييم تأثير المبيدات الحشرية على الكائنات غير المستهدفة NTO's خاصة تأثيرات تكرار التطبيق تلك التى أجريت فى المواقع الاصلية in situ. لقد استخدمت طرق عديدة لأخذ العينات لاحصاء Sensusing مجاميع اللافقاريات قبل وبعد المعاملة بالمبيدات الحشرية. هذه الطرق تشمل أخذ عينات الانجراف واستخدام الوسائط الصناعية للمستعمرات واستخدام جهاز أخذ العينات Surber وغيره من الوسائل والحصر والعد من الوسائط الطبيعية والتربية المعملية فى مقابل الكائنات المعرضة فى الحقل. العديد من التجارب الحقلية المبكرة على BT اسرانيلىنسىز ضد يرقات الذباب الاسود اشتملت كذلك على تقييم أولى لامكانية التأثير السالب على الاحياء غير المستهدفة. الدراسات التى أجريت فى مختلف أنواع التيارات المائية فى الظروف المناخية الاستوائية والمعتلة اظهرت قليل أو عدم التأثير على العديد من الاحياء من حشرات الماء الجارى.

(ب) التأثير على الكائنات غير المستهدفة فى المياه الجارية على المدى القصير:

الجدول (٤-٨) يتضمن نتائج العديد من تجارب التقييم قصيرة المدى للوقوف على تأثير BT اسرانيلىنسىز على الكائنات غير المستهدفة فى المياه الجارية Lotic. فى معظم الحالات ظهر القليل من التأثيرات المعاكسة الواضحة فى غالبية الاحياء غير المستهدفة فى دراسات الاستكشاف. فى بعض الحالات حدثت زيادة فى NTO's بعد



المعاملة ببكتريا BT اسرانيلىنسىز. الزيادة الواضحة هذه قد ترجع الى خفض المنافسة على المكان خلال التخلص من أنواع السيمبوليد المستهدفة بما يمكن من التوسع فى استخدام الوسيط الذى لم يكن متاحا من قبل. واحد من التقييم الذى أجرى بتفصيل أكثر للتأثير قصير المدى فى الوقت الراهن لم تظهر أى زيادة فى انجراف ٢٧ من العائلات غير المستهدفة ولا أى نقص معنوى فى كثافات مجموع ٧٥ من الاجناس غير المستهدفة بعد معاملة الرتبة الثلاثية وسلحفاة نيلر الماء البارد مع جرعات تشغيلية للفيكوباك- AS.

بعض يرقات شبكية الاجنحة فى المياه الجارية قد تأثرت عكسيا بواسطة التعرض لبكتريا BT اسرانيلىنسىز. من أكثر العائلات السوبر التي تأثرت هي Culicoidae التي تشمل Culicidae، Chironomidae، simuliidae، Belapharoceridae وغيرها من العائلات الاخرى التي وجدت فى أماكن المعيشة فى المياه الجارية Lotic والسكنة Lenitic. الزيادة فى الانجراف و/أو النقص فى كثافة المجموع لبعض أعداد الكائنات غير المستهدفة فى هذه العائلة السوبر حدثت من جراء المعاملة بالجرعات المحددة من بكتريا BT اسرانيلىنسىز. عائلة الكرونوميدي من أكثر العائلات شيوعا التي تأثرت من بين الكائنات غير المستهدفة NTO's. بالإضافة الى التأثيرات على بعض الكرونوميدي أشار Back وأخرون (١٩٨٥) الى زيادة موت وانجراف يرقات blepharocerid التي تعرضت لتركيزات عالية من مركب النكنار Teknar. لم تلاحظ أية تأثيرات معاكسة من مستحضر Vectabac-AS على الكرونوميدي ولو على بليفاروكيريد عندما استخدمت بمعدلات منخفضة (جدول ٤-٨).

جدول (٤-٨): التأثيرات على المدى القصير لبكتريا BT اسرانيلىنسىز على الكائنات

غير المستهدفة فى المياه الجارية تحت الظروف الطبيعية

الموقع	التأثير على	طريقة أخذ العينات	المستحضر/ التركيز	غالبية الاحياء غير المستهدفة
Location	NTO's Impact on NTO's	Sampling method	Formulation/ concentration	Major taxa of predominant NTO's
Ivory Coast	No adverse effect	Drift samples in stream trough	Primary powder (0.2 mg/ l/10 min)	Ephemeroptera, Trichoptera, Lepidoptera, Odonata, Mollusca, Hirudinea
Newfoundland Canada	No adverse effect	Counts from natural substrates	Aqueous suspension (10 <sup>4</sup> spores per ml/1 min)	Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata.

Chironomidae. Ephemeroptera. Trichoptera.	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min)	Drift samples, in stream through	Increased drift, some reduction of chironomids	Ivory Coast
Chironomidae. Trichoptera. Ephemeroptera. Plecoptera. Elmidae	Primary powder (0.5 mg/ 1/15 min)	Suber sampler, counts from natural substrates	No adverse effect	New York
Chironomidae. Ephemeroptera. Trichoptera.	Teknar® W1 - (1.5 mg/1/10 min)	Artificial substrates	No adverse effect	Ivory Coast
Chironomidae. Ephemeroptera. Trichoptera.	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min)	Drift samples, in stream through	Increased drift, some reduction of chironomids	Ivory Coast
Ephemeroptera. Trichoptera. Plecoptera. Coleoptera. Chironomidae, Dixidae.	Teknar® WDC (2 mg/1/15 min) or Primary powder (0.2 mg/ 1/15 min)	Suber samples	No adverse effect	New Zealand
Chironomidae	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min) or Primary powder (3.0 mg/ 1/10 min)	Counts from natural substrates	No adverse effect	South Africa
Chironomidae. Ephemeroptera. Plecoptera. Trichoptera. Gastropoda. Platyhelminthes.	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min) or (2.3 mg/ 1/7 min)	Drift samples, counts from natural substrates	Mortality in Ephemeroptera, some reduction of Chironomidae. (Tanytarsini), reduction in Burmipia (Gastropoda)	South Africa
Ephemeroptera. Trichoptera. Plecoptera. Chironomidae.	Teknar® WDC (10 mg/1/10 min)	Drift samples, "kick" samples	some reduction of Chironomidae larvae. Increase in drifting by Ephemeroptera (2 spp.), Trichoptera (2 spp.)	New Hampshire
Chironomidae	0.7- 2.0 mg/l operational dosage (application time not given)	Counts on natural and artificial substrates	Some education of chironomids at 17x operational dosage	Federal Republic of Germany
Chironomidae. Blepharoceridae. Trichoptera. Plecoptera. Ephemeroptera	Teknar® WDC (5.86 mg/1/15 min)	Artificial substrates and drift nets	Increased drift in Blepharoceridae, reduction in to genera of Chironomids, other taxa not adversely affect	Quebec

Chironomidae and other Nematocera. Ephemeroptera. Lepidoptera (Pyratidae). Trichoptera	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min) or Primary powder (0.2 mg/ 1/10 min)	Drift samples. in stream troughs and Surber samples	Increased drift, some reduction of Hydropsychidae	Ivory Coast
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera Chironomidae, and other nematocera, Coleoptera	Vectobac®- AS (10 mg/1/1-5 min)	Artificial substrates and drift nets	No significant advers effects	Maine
Chironomidae, Ephemeroptera. Trichoptera	Teknar® WDC (1.6 mg/1/10 min)	Drift samples, counts on natural substrates	Slight increase in drift, some reduction of chironomids (Tanytarsini)	South Africa
Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera	Vectobac®- AS (1 mg/1/10-30 min)	Drift nets, counts from natural substrates, "portable invertebrate sampling box"	No adverse effect	New York

لقد لوحظ زيادة في انجراف أحياء أخرى الى جانب شبكية الاجنحة. كذلك أشار الباحث Gibon وآخرون (١٩٨٥) الى حدوث زيادة كبيرة في انجراف حشرات Ephemeroptera و Trichoptera بعد فترة قصيرة من استخدام BT اسرائيلينسيز. اذا أخذ في الاعتبار نقص البيانات عن حساسية هذه الاحياء لهذه البكتريا فانه من الممكن أن تكون الزيادة في معدلات الانجراف راجعة الى الزيادة المؤقتة في الجسيمات أو الرقائق Particulates خلال فترات المعاملة خاصة التيار القوي لنقاط المعاملة. المواد الاضافية Adjuvants قد تساهم كذلك في الهياج وما يستتبعه من انجراف للكائنات غير المستهدفة في الاعماق benthic. لقد عزي الباحث Dejoux التأثيرات المعاكسة لمركب Teknar على ذباب الكاديس في المجارى المائية للمعاملة في ساحل العاج الى مكون الزيلين في مستحضر المركب البكتيرى. كذلك فان زيادة الانجراف لا تعتبر دائما كدليل عن التأثير القاتل المباشر لتوكسين البكتيرى ومع ذلك فان الزيادة augmentation غير الطبيعية في سلوك الانجراف سوف تضع الكائن المنجراف في خطر كبير بسبب الافتراض. لقد أشار أحد الباحثين الى أن الزيادة في الانجراف بعد استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية كان كبيرا بشكل واضح عن ذلك الذى حفز بواسطة مستحضرات BT اسرائيلينسيز.

الموت في الكائنات غير المستهدفة NTO's من غير شبكية الاجنحة بعد المعاملة بمستحضرات BT اسرائيلينسيز أقل تكرارية في الحدوث عما هو الحال مع

الانتشار المتزايد. المستوى العالى للموت فى حشرات Ephemeroptera ترجع على الأقل فى جزئية الى التداول الاجهادى. لقد أشار بعض الباحث الى حدوث نقص غير ممكن تفسيره فى كثافة مجموع القواقع Burnupia بعد المعاملة بالنكثار. فى دراسات أخرى لم تسجل أية تأثيرات معاكسة لبكتريا BT اسرئيلينسيز على قواقع الاعماق الاخرى وقواقع غير الانهار.

من أهم اهتمامات الوكالات التشريعية والعامه بوجه عام ما يعنى التأثيرات التى يمكن أن تحدثها مستحضرات بكتريا BT اسرئيلينسيز على الاسماك. حديثا تأكد أن تركيزات المستحضرات الخاصة بهذا الكائن الدقيق والمستخدمة فى مكافحة الذبابة السوداء لم تحدث أية أضرار على الاسماك وغيرها من الفقاريات. لقد وجد أن التركيزات العالية بشكل غير عادى من مستحضر نكتار احدثت تأثيرات ضارة على السلمون مع أن الباحث Fortlin وآخرون (١٩٨٦) خلاصا الى أن هذه التأثيرات الضارة لم تسبب عن الانتوتوكسين ولكنها حدثت بسبب الزيلين وهو أحد مكونات مستحضر Teknar عن النوع WDC أو المركز القابل للانتشار فى الماء. لقد درس الباحث Gibbs وآخرون (١٩٨٦) تأثيرات الجرعات الموصى بها (١٠ مللج/لتر لمدة ١-٥ دقائق) من الفيكتوبك-AS على سلوك تغذية S.fontinalis، slimy sculpins، cottus cngnatus. بالرغم من أنه كانت هناك زيادة طفيفة فى تناول يرقات الذباب الاسود فى عينات ما بعد المعاملة (بما فيها تيارات الكاء المقارنة) لم يكن ممكنا ارجاع اى تغيير الى معاملات فيكتوباك.

### (ج) التأثيرات على النظم البيئية فى المياه الجارية على المدى الطويل:

استكشاف التأثير طويل المدى لبكتريا BT اسرئيلينسيز على النظم البيئية فى المياه الجارية سوف تمكن من تقدير التأثيرات المزمعة لتوكسين الميكروب على الكائنات غير المستهدفة الحساسة وكذلك تأثيرها على تركيب الشبكة الغذائية. أى تدخل intervention يحدث خلال أو اعادة هيكلة المجتمعات المائية قد تؤدى الى حدوث تأثيرات ضارة معاكسة فى المستويات الغذائية الراقية. كلما تنوعت الشبكة الغذائية (من حيث عدد الكائنات والانواع عند كل مستوى غذائى) كلما قل التأثير الفاجعى الغذائى catastrophic بسبب الازالة الكاملة أو الجزئية لنوع معين أو مجموعة من الانواع (مثل السيمبوليدات أو بعض انواع الكيرونوميدي). لقد أشار Molloy الى عدم تسجيل أية تأثيرات ضارة لمجتمع الحشرات غير المستهدفة على المدى الطويل فى التيار

ثلاثى الرتبة الثالثة فى جبال Adirondack (نيويورك) بعد سنتان من تطبيق برنامج مكافحة الذباب الاسود باستخدام بكتريا BT اسرائيلينيز.

## ٢- تأثير BT اسرائيلينيز والباسيليس سفيريكس على الكائنات غير المستهدفة فى المياه الساكنة Lenitic habitats:


عدد الدراسات التى أجريت عن تأثيرات عذبن النوعين من البكتريا فى أماكن المعيشة فى المياه الساكنة قالت كثيرا تلك التى أجريت فى المياه الجارية. فى تجارب التقييم الاولى على بكتريا BT اسرائيلينيز ضد الانواع غير المستهدفة أصبح موثوقا أنه بعيدا عن بعض التأثيرات على الكيرونوميدي وبعض الانواع الاخرى للكيوليسودي فان سيادة الكائنات غير المستهدفة تظل بدون أن تتأثر. فى هذا المقام سوف نركز على تأثيرات BT اسرائيلينيز و B سفيريكس على المجميع المختارة من الكائنات غير المستهدفة فى المياه الساكنة مع التمثيل بالمستويات الغذائية المختلفة فى السلسلة الغذائية.

(أ) الرعاشات Odonata: حشرات الرعاشات غير الناضجة أو الرعاش الكبير dragonfly (Anisoptera) وحوريات حشرة ذبابة damsefly (zygoptera) مائية بطبيعتها وتوجد بشكل دائم فى أماكن معيشة يرقات البعوض. الحوريات حشرات مفترسة ليرقات البعوض وغيرها من اللاقليات الكبيرة macroinvertebrates. كمثال فان حوريات الرعاش Tranetrum corruptum تستهلك حوالى ٣٦ ورقة بعوض عمر رابع لكل حورية خلال أربعة أيام فى الاختبارات المعملية. تحدث معدلات استهلاك مشابهة فى حوريات الدامس فلاى Enallagma civile حيث قدر انها تستهلك ٢٨ ورقة بعوض خلال أربعة أيام.

يرقات البعوض المسممة intoxicated بجرعات متناهية العلو من بكتريا BT و B سفيريكس قدمت للرعاشات T.corruptum و E.civile. لقد تم تعريض اليرقات الضحية الى واحد جرام من المستحضرات البكتيرية لكل لتر (١٠٠٠ مرة عن أقصى معدل لمبيد اليرقات) ثم قدمت للحوريات بمجرد ظهور علامات التسمم بشكل واضح. تجهيزات المرضى التى استخدمت فى هذه الاختبارات كانت المعلق المائى (AS) لبكتريا BT اسرائيلينيز (Abbott 6145, 600 ITU/mg: ABG- laboratories, North chieago, IL) وكذلك المعلق المائى للباسيليس سفيريكس (BSP- 1.2x10<sup>7</sup> spores/ ml., Solvay and co. Brussels). فى هذه التجارب تناولت الحوريات كميات معتبرة من كل توكسين حيث يذاب جزئيا وينشط فى أمعاء الضحية. لقد تناولت الحوريات كذلك أعداد كبيرة من الجراثيم الساكنة والمنبئة من تلك الموجودة فى أمعاء يرقات البعوض. لم تسجل اختلاقات معنوية فى

معدل استهلاك يرقات البعوض غير المعاملة وتلك المعاملة ببكتريا BT اسرائيلينسيز و B سفيريكس. دوام تطور حوريات الداجون فلاي والدامس فلاي من وقت التعرض وحتى الخروج كانت وبالضرورة متساوية في أفراد المقارنة وأفراد المعاملة. لاحظ العديد من الباحث عدم حدوث أية تأثيرات معكسة على الرعاشات Odonata بواسطة BT اسرائيلينسيز.

ب- حشرات Ephemeroptera: اليفيميروترا من بين أكثر الغازيات سيادة في أماكن فيضان الماء الحديث والحيوى biotopes ليرقات البعوض. هذه الغازيات عبارة عن اكلات العشب herbivores تتغذى على الطحالب وغيرها من المواد النباتية كما تلعب دورا هاما في ايكولوجية المناطق دائمة أو مؤقتة الفيضان. حيث أنها تلعب دورا مؤثرا ومحددا في الانتاج الأولى فانه من المهم وألا تضار هذه الكائنات بواسطة أية تدخلات تستخدم في برلمج مكافحة نقلات الامراض. في برامج التجارب الحقلية على بكتريا BT اسرائيلينسيز و B سفيريكس في كاليفورنيا ضد يرقات البعوض تم عمل ملاحظات كمية مكثفة عن تأثيراتها على حوريات ذبابة مايو وفي الغالب Callibaetis pacificus. في دراسة أخرى عن تأثيرات BT اسرائيلينسيز (Vectobac معمل أبوت) و B سفيريكس ٢٣٦٢ (مسحوق اولى- معمل أبوت) باستخدام معدلات ضد اليرقات ٠,٥٦ ، ٠,٢٢ كجم/هكتار على التوالي لم تسجل أية تأثيرات معكسة ملحوظة على حوريات ذباب مايو. اتجاهات المجموع التي تتلعبت مع فيضان البرك الجافة كانت مشابهة البرك المعاملة وغير المعاملة (شكل ٤-١).



شكل (٤-١): اتجاهات مجموع حوريات ذباب مايو في برك معيشة يرقات البعوض التجريبية غير المعاملة وتلك المعاملة ببكتريا BT اسرائيلينسيز و B سفيريكس بالمعدلات القاتلة لليرقات موضحة بكثافة يرقات البعوض. الاسهم تشير الى تطبيق المعاملات.

للدiazinon ، الكاربaryl ، البروبوكسر بينما لم يتوصل إلى ارتباط مع التعرض للملاثيون أو الكلوربيريفوس بينما لم يتوصل إلى ارتباط مع التعرض للملاثيون أو الكلوربيريفوس كما في الجدول (٣-٨) . في الغالب كانت معظم الارتباطات ضعيفة بسبب قلة أعداد أفراد الحالات.

جدول (٣-٨) : دراسات وبائية مختارة وسرطان الرئة والتعرض للمبيدات الحشرية :

Reference	Study Population	Exposed Cases	Estimated Relative Risk (95%CI)
<b>Specific Insecticides</b>			
<i>Cohort Study</i>			
Pesatori et al., 1994	Pest-control workers in Florida		
	Living controls <sup>a</sup>		
	Diazinon	17	1.3 (0.6-3.1)
	Malathion	11	1.0 (0.4-2.6)
	Chlorpyrifos	3	0.6 (0.1-2.4)
	Carbaryl	3	4.2 (0.6-27.2)
	Propoxur	5	1.4 (0.4-5.5)
	Deceased controls <sup>a</sup>		
	Diazinon	17	2.0 (0.7-5.5)
	Malathion	11	1.6 (0.5-4.6)
	Chlorpyrifos	3	1.3 (0.2-7.1)
	Carbaryl	3	NA
	Propoxur	5	12.4 (1.5-100.3)
<b>Classes of Insecticide</b>			
<i>Cohort Study</i>			
Pesatori et al., 1994	Pest-control workers in Florida		
	Living controls <sup>a</sup>		
	Organophosphorous agents	23	2.0 (0.8-5.0)
	Carbamates	7	1.8 (0.5-6.4)
	Deceased controls <sup>a</sup>		
	Organophosphorous agents	23	2.2 (0.8-5.8)
	Carbamates	7	16.3 (2.2-122.5)
<i>Case-Control Study</i>			
McDuffie et al., 1990	Male cases from Saskatchewan Cancer Foundation Registry		
	Carbamates	9	0.46 <sup>a</sup>
<b>Insecticides</b>			
<i>Cohort Study</i>			
Rapiti et al., 1997	Male workers at Italian chemical production Plant	4	0.80 (0.27-1.82) <sup>b</sup>
<i>Case-Control Study</i>			
McDuffie et al., 1990	Male workers at Italian chemical production Foundation Registry		
	Other insecticides <sup>c</sup>	19	0.95 <sup>a</sup>

<sup>a</sup>Results are adjusted for smoking.

<sup>b</sup>90% CI.

<sup>c</sup>Insecticides other than chlorinated hydrocarbons, arsenic, or phosphodithioate.

باستخدام سجلات مؤسسة Saskatchewan السرطان قام الباحث McDuffie ومعاونوه (١٩٩٠) بتعريف حالة سرطان أولية تم تشخيصها في سنوات ١٩٨٢ - ١٩٨٦. لقد تم تعريف أفراد المقارنة من المجموع (العدد=١٨٧) من سجلات خدمات مستشفى ساسكاتشوان. لقد تم سؤال كل المشاركين لتحديد التعرض المهني وتاريخية العلاج الطبي وحالة التدخين. نسبة الشذوذ مع سرطان الرئة والتعرض للكاربامات كانت أقل من (١) مما أدى إلى الاقتراح بعدم وجود خطر سرطان الرئة من جراء التعرض للمبيدات.

لقد قام Resatori ومعاونوه (١٩٩٤) بتقييم التعرض لمجاميع المبيدات الحشرية عن طريق القسم في دراسة على عمال مكافحة الآفات كما ذكر قبلاً. خطر سرطان الرئة زادت مع المبيدات الفوسفورية العضوية (OR=٠,٢) والكاربامات (OR=١,٨) كما نقرر بواسطة المشيرة التالية ومعظم النتائج كانت تحمل في طياتها عدم اليقين.

### سرطان العظام Bone Cancer :

من بين الصور العديدة لسرطان العظام والمفاصل ورم العظام الخبيث الذي يظهر التمسج في الضام Osteosarcoma وهو من أكثر أنواع سرطان العظام شيوعاً حيث يصل إلى حوالي ٣٥% في كل الحالات. يحدث هذا السرطان بشكل متكرر في الذكور ويوجد سرطان العظام الخبيث في الغالب في نوي العمر ١٠-٣٠ ومن النادر حدوثه في منتصف العمر. حوالي ١٠% من الحالات تطورت في الناس بعمر ٦٠ سنة والأكثر عمراً. من أنواع سرطان العظام الأولية الأخرى سرطان الخلايا الغضروفية chondrosarcoma وورم ليونج Ewingi tumor (سرطان تجويف العظم) وسرطان قاعدة الجمجمة وعظام الحبل الشوكي chordoma وسرطان الأنسجة الضامة مثل الورم الليفي الحميد histiocytoma والورم الليفي الخبيث fibrosarcoma. لقد كان معدل البقاء خلال الخمس سنوات أعلى حتى ٨٠% ولكن التكهّن بالناس ذوي سرطان العظام متفاوت كثيراً اعتماداً على نوع السرطان والمرحلة التي تم فيها التشخيص (Acs, ٢٠٠٠ - e).

عوامل الخطر مع سرطان العظام تتمثل في التعرض للإشعاع المتأين خاصة في المرحلة المبكرة أو مع الجراحات العالية وتاريخية الخلل الوظيفي في العظام مثل مرض باجيت pagets disease ووجود الحرف المتعدد (نامية عظمية فوق العظم) exostoses وهي تمثل نمو زائد لأنسجة العظم، أورام حميدة في العظام تتكون بواسطة العظم والغضاريف osteochondromas وأورام الغضاريف الحميدة المتعددة enchondromas وبعض العوامل الوراثية (مثل طفرات جين الورم P53 - الخافض suppressor) (ACS - ٢٠٠٠ - e, NCI, ٢٠٠٢ - i).

لدراسات الوبائية عن التعرض للمبيدات الحشرية: لقد تناولت العديد من الدراسات فحص خطر سرطان العظام بين الفلاحين وعمال الزراعة (مثل Blair وآخرون ١٩٩٣, Brownson



معدلات التطور ووضع البيض وحيوية البيض متساوية في المجاميع المعاملة وغير المعاملة. لقد أظهرت الدراسات الى أجريت بواسطة Olejniczek and marystova أن يرقات البعوض التي سمعت بواسطة بكتريا BT اسرائيلينسيز لم تسبب أى موت ملحوظ في المفترس نوتونكتا جلوكا التي تغذت عليها. في تجارب معملية استخدم فيها نوتونكتيد المجموعة من الحقل حدث ١٠% موت في المقارنة في مقابل ١١% في الحوريات التي استهلكت يرقات مسممة. لقد وجد الباحث Schnetter وآخرون (١٩٨٠) الذي تعرض لمدة ٤٨ ساعة لتركيز ١٨٠ جزء في المليون من BT اسرائيلينسيز بدون تقديم ضحايا مسممة. لقد تم تقييم كفاءة سلالتان من B سفيريكس (1593m و 2362) على المجاميع الحقلية من Anisops bouvieri في المعمل واتضح ان التركيزات القاتلة النصفية LCSO تزيد بمقدار ٥٠٠ مرة عن المعدلات القاتلة لليرقات من هاتين السلالتين.

٣- عائلة نوتونكتيدي (في الحقل): لم نلاحظ أية تأثيرات معاكسة لبكتريا BT اسرائيلينسيز أو B سفيريكس على مفترسات نوتونكتيد في العديد من الدراسات التي أجريت بواسطة Mulla وآخرون من عام ١٩٨٢-١٩٨٧. في التجارب الحقلية التي أجريت على امتداد ثلاثة مواسم التي استخدم فيها هذه السلالات من الباسيليلا لوحظ انخفاض المجموع الطبيعي لمفترسات نوتونكتا يونيفاسكياتا، نوتونكتا أنديوالاتا وكذلك أنواع Buenaia خلال المعاملات. في نفس الفترة لوحظ نمو في مجاميع هذه المفترسات بسرعة بنفس اتجاه النمو في البرك غير المعاملة وأماكن المقارنة. في احدى الدراسات التي أجريت في فلورينا لاحظ الباحث Purcell (١٩٨١) حدوث خفض في مجموع N. Buenaia elegans و indica بعد المعاملة ببكتريا BT اسرائيلينسيز وقد أرجع ذلك الى نشاط الطيران لجشرات البق هذه. في هذه الدراسات كانت أعداد الحصر بعد يوم من المعاملة مقارنة لأعداد ما قبل المعاملة دون أن تصاحب احصائيات المجاميع غير المعاملة. لقد سادت أنواع نوتونكتا منطقة ويتلاند مارس في كاليفورنيا ولكن بأعداد قليلة. لم تتأثر مجاميع هذا النوع عكسيا من جراء استخدام مستحضر BT اسرائيلينسيز بمعدل ٠,٨ كجم/هكتار وفي الحقيقة زادت المجاميع بعد المعاملة. في أماكن معيشة تحاكي ما هو موجود في الحقول لاحظ Sebmstien and Brust (١٩٨٠) خفض حوالي ٥٠% في أنواع نوتونكتا التي عرضت التركيز ١٢ جزء في المليون من مستحضر BT اسرائيلينسيز من انتاج شركة أبوت بينما لم يلاحظ خفض بعد المعاملة بمستحضر من

انتاج شركة Biochem مع ملاحظة أن كفاءة الاخير تساوى من ٥-١٠مرات مثل مستحضر أبوت. فى عدم وجود مجموع تجريبى للمقارنة وبسبب تنوع واختلاف المستحضرات فان القول بأن مستحضر ما هو الذى سبب قتل مفترسات نوتونكتا لا يجد من يعضده. لقد خالص الباحثون الى أن المفترسات البالغة من النوتونكتيد متحركة وتميل الى الهجرة عند نقص كثافة الضحية أو عندما يصبح مكان المعيشة غير مناسب. د- حشرات غمدية الاجنحة Coleoptera:

أفراد عائلات Dytiscidae (خنافس الغوص) وHydrophilidae (خنافس الماء الكاسحة Scavenger) من المفترسات الهامة والتي تعتبر مفتاح السيطرة على وتنظيم مجاميع يرقات البعوض. هذه المفترسات تغزو وتحتل أماكن المعيشة المائية فى غضون ١-٢ أسبوع بعد الفيضان. اليرقات الصغيرة والناضجة التى تصل الى قمة المجموع خلال ٢-٣ أسابيع بعد الفيضان تتغذى على يرقات البعوض وغيرها من الاحياء المائية. خلال الدراسات التى تناولت تقييم بكتريا BT اسرائيلينسيز و B سفيريكس لم تلاحظ أية تأثيرات عكسية على يرقات هذه الخنافس. أظهرت دراسات لاحقة على امتداد ثلاثة مواسم أن المعاملة بهذه البكتريا بالمعدلات القاتلة ليرقات البعوض لم تؤثر سلبا على يرقات خنافس هذه العائلات. لقد وجدت أعداد كبيرة من يرقات الخنافس خلال وقت المعاملة الثانية فى مكافحة البعوض. لقد كانت اتجاهات المجموع فى الاماكن المعاملة وغير المعاملة متشابهة. أظهرت دراسة أخرى فى كاليفورنيا عدم وجود تأثيرات معاكسة على يرقات الخنافس بواسطة BT اسرائيلينسيز بعد المعاملة بمعدل ٨,٠٠٠كجم/هكتار فى أماكن المعيشة. التعرض فى المعمل لأنواع عديدة من الخنافس المائية التى جمعت فى الحقل لتركيز ١٨٠ جزء فى المليون BT اسرائيلينسيز سببت قليل أو لم تسبب وفيات فى الخنافس البالغة. بناء على البيانات المتوفرة خالص الباحث الى أن كلا الممرضات الحشرية ليس لها أية تأثيرات معاكسة على يرقات خنافس Dytiscid أو Hydrophilid بمعدلات قاتلة ضد اليرقات.

هـ- ثنائية الاجنحة/الهاموش Diptera/chironomidae: هاموش الكايرونوميد يرتبط بشدة بالبعوض وهو يعتبر من أكثر حشرات ثنائية الاجنحة السائدة والمؤثرة التى تعيش فى المياه حيث امكن تولدها فى المياه الجارية والسائكة على حد سواء. توجد يرقاتها فى حيوانات القاع benthos والطحالب والنباتات الجذرية والطاقية وغيرها

من الوسائط. يرقات بعض الأنواع مغذيات للمرشحات Filter feeders. بينما البعض الآخر يعمل كراعيات للعشب browsers أو كمفترسات predators. الهاموش يحتل بصفة مؤقتة أو دائمة المصادر للمائية حيث أن معظم أماكن معيشة يرقات البعوض تعضد السجميع الوفيرة لها. عند تخرج حشرات الهاموش في أعداد كبيرة من أماكن المعيشة بالقرب من تواجد الانسان فإنها تسبب مشكلة وتحدث ضيق بين الناس ولكنها وبأى مفهوم نافعة بسبب الدور الهام الذى تلعبه فى الشبكة الغذائية. لذلك فإنه فى برامج مكافحة الناقلات حيث أن الهاموش لا يمثل مشكلة كافة يتم معاملة مبيدات اليرقات التى لا تضر بيرقات الهاموش. الدراسات الخاصة بتأثيرات الباسيلليس على يرقات الهاموش قليلة ومحدودة. حيث أن سلوك التغذية يختلف من مجموعة لأخرى أو من نوع لآخر فإنه يتوقع أن المجاميع المختلفة ستكون ذات حساسية مختلفة لهذه الميكروبات المرضية.

#### ١- دراسات معملية (باسيلليس ثورينجينيميز تحت النوع اسرائيلينسيز):

أظهرت البحوث حتى الآن أن بعض يرقات هاموش الكيرونوميد ذات حساسية منخفضة لبكتريا BT اسرائيلينسيز بينما أظهرت بحوث أخرى أنها تتأثر بواسطة B سفيريكس. لقد أجرى Ali وآخرون ١٩٨٠-١٩٨١ دراسات على يرقات أربعة أنواع من الكيرونومين فى المعمل فى فلوريدا. لقد تم اختبار أربعة تجهيزات من BT اسرائيلينسيز ضد هذه اليرقات مع اعتبار أو دون اعتبار لغذاء اليرقات. حساسية الأنواع المختلفة للتجهيزات العديدة من هذه البكتريا مدونة فى الجدول (٤-٩) مع قيم LC<sub>50</sub> مللجم/لتر (جزء فى المليون) للأبيديس إيجيبى. من هذا الجدول يتضح أن يرقات الهاموش أقل حساسية لبكتريا BT اسرائيلينسيز حيث كانت ذات تحمل ١٣-٧٥ مرة أكثر من يرقات البعوض للتجهيزات المختلفة. توفير الغذاء لليرقات يزيد من تحملها وهو ما يحاكى الظروف الحقلية. الهاموش كانت أقل حساسية لبكتريا BT اسرائيلينسيز حيث كان تحملها ١٣-٧٥ مرة عن يرقات البعوض لمختلف المستحضرات. تقديم وتوفر الغذاء لليرقات زاد من تحملها وهى الظروف التى تحاكى ما يوجد فى الحقل عن قرب. لقد لوحظ أن يرقات العمر الاول فى G. paopipes كانت أكثر حساسية بمقدار ١٠-١٤ ملل عن يرقات العمر الثالث. لقد أظهرت هذه النتائج المستوى المنخفض من حساسية يرقات الهاموش (خاصة العمر الثالث) لبكتريا BT اسرائيلينسيز. لقد وجد بعض البحوث حدوث موت كامل بعد التعرض لتركيز ١,٨ جزء

في المليون من BT اسرائيلينسيز لمدة ٤٨ ساعة بدون غذاء. لقد كانت الجرعة القاتلة حوالي ٥-١٠ مرات التركيز القاتل ليرقات البعوض في هذه المنطقة.

جدول (٤-٩): حساسية يرقات الكيرونوميد ويرقات البعوض لمستحضرات باسيليس ثوريينجيسيز تحت النوع اسرائيلينسيز

النوع والمستحضر الميكروبي Species and microbial preparation	الطور Instar	بدون غذاء No feed	مع الغذاء With feed
<b>Glyptotendipes (midge)</b>			
IPS- 78 (LY)	3 <sup>rd</sup>	13.1	29.7
R- 153- 78 (WP)	1 <sup>st</sup>	-	1.3
	3 <sup>rd</sup>	9.8	13.3
ABG-6108 (WP)	1 <sup>st</sup>	-	2.8
	3 <sup>rd</sup>	32.4	38.6
SAN-402 (WDC)	1 <sup>st</sup>	-	3.7
	3 <sup>rd</sup>	23.6	37.7
<b>Chironomus crassicaudatus (midge)</b>			
IPS- 78 (LY)	3 <sup>rd</sup>	10.5	15.9
R- 153- 78 (WP)	3 <sup>rd</sup>	4.9	6.8
ABG-6108 (WP)	3 <sup>rd</sup>	47.0	-
SAN-402 (WDC)	3 <sup>rd</sup>	28.3	36.5
<b>C. decorus (midge)</b>			
IPS- 78 (LY)	3 <sup>rd</sup>	8.6	10.8
R- 153- 78 (WP)	3 <sup>rd</sup>	4.6	8.2
ABG-6108 (WP)	3 <sup>rd</sup>	30.8	34.7
SAN-402 (WDC)	3 <sup>rd</sup>	27.0	-
<b>Aedes aegypti (mosquito)*</b>			
IPS- 78 (LY)	3 <sup>rd</sup>	0.19	0.51
R- 153- 78 (WP)	3 <sup>rd</sup>	0.13	0.32
ABG-6108 (WP)	3 <sup>rd</sup>	0.88	2.01
SAN-402 (WDC)	3 <sup>rd</sup>	0.99	2.39

\* 24-h lethal concentration.

From Ali, A., Baggs, R. A., and Stewart, J. P., J. Econ. Entomol., 74, 672, 1981. With permission.

في دراسة أولية أجريت في كاليفورنيا بواسطة Garcia وآخرون (١٩٨٠) تم تحفيز مستويات منخفضة وحتى العالية من الموت في بعض حشرات ثنائية الاجنحة الشبكية nematoceros بما فيها أنواع Dixia (Dixidae) و Palpomyia sp (Ceratopogonidae) والعديد من عائلات Chironomidae مع جرعات من BT اسرائيلينسيز في مستحضرات من ٥٠- عدة مئات أكبر من التركيزات المستخدمة في مكافحة البعوض. لم تقام خطوط العلاقة بين الجرعة والاستجابة كما لم تسجل حالات

خاص وليس على القسم الكبير من المركبات الكلورينية العضوية. جنول (٨-٦) يوضح النقاط الهامة في الدراسات المحددة.

تناولت بعض الدراسات دراسة العلاقة بين التعرض المنزلي والمهني لمبيدات الآفات وسرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي بخلاف سرطان الصدر ولم تركز أي من الدراسات على التعرض للمبيدات الحشرية. الدراسات التي تناولت فحص خطر سرطانات عنق الرحم والمبايض والرحم فينقصها معلومات عن التعرض للمبيدات الحشرية وفي الغالب تتضمن أعداداً متناهية في الصغر (مثل دراسات Fleming وآخرون (١٩٩٩ - أ.ب)، Wessling وآخرون (١٩٩٩).

نتائج ثلاثة دراسات حالة - مقارنة عن تركيزات سيرم الدم مع المبيدات الكلورينية العضوية بما فيها اللندين ومشابهاته والتي جمعت قبل تشخيص حدوث سرطان الصدر وخطر سرطان الصدر كانت ماثلة. لقد قام Ward ومعاونوه (٢٠٠) بأجراء دراسة حالة - مقارنة في النرويج عن خطر سرطان الصدر والمبيدات الكلورينية في السيرم في جماعة من منحي الدم في بنك الدم من السيدات بعدد ٢٥٤٣١ في الفترة من ١٩٧٣-١٩٩١. لقد تم تقدير ٧١ مركب كلوريني عضوي بما فيها HCH وما يعرف باللندين. لم تجد الدراسة أي دليل عن التركيزات العالية في السيرم لأي من هذه المركبات في الحالات أو أي اتجاه لزيادة الخطر مرتبطة بالتعرض لكميات عالية من اللندين ( $OR = ٠.٧$ ).

دراسة حالة - مقارنة أخرى تناولت تقييم الارتباط بين تركيزات المركبات الكلورينية العضوية بما فيها اللندين وبنيا HCH في السيرم وخطر سرطان الصدر باستخدام عينات بنك الدم في مركز سرطان الصدر في ميسوري بكولومبيا حيث تم تشخيص ٧٢٢٤ من السيدات المصابات بسرطان الصدر في الفترة ١٩٧٧-١٩٨٧ (Dorgan وآخرون ١٩٩٩). لم تتوصل الدراسة إلى زيادة الخطر من سرطان الصدر في السيدات اللاتي يحتوي سيرم الدم فيهن على تركيزات عالية من المبيدات الكلورينية ( $OR = ٠.٦$ ).

في دراسة ثالثة حالة - مقارنة قام الباحث Hoyer ومعاونوه (١٩٩٨) بمقارنة تركيزات السيرم من ١٨ مبيد كلوريني عضوي في عينات الدم الأساسية من ٢٤٠ حالة مصابة بسرطان الصدر مع ٤٧٧ من المقارنة تم اختيارهم من المشاركين في دراسة عن القطن في مدينة كوبنهاجن. لقد وجد الباحث عدم ارتباط مع اللندين أو أي مبيدات كلورينية أخرى مثل السدنت، ددي PCB بينما زاد خطر سرطان الصدر مع المستويات العالية من B-HCH ( $OR = ١.٢٦$ ).

لقد قام Zheng ومعاونوه (١٩٩٩) بمقارنة مباشرة على البنزين مع كسلا كلوريد (BHC) في الأنسجة الدهنية في الصدر من ٣٠٤ حالة مرضى بسرطان الصدر مع ١٨٦٩ حالة مرضى بورم الصدر الحميد benign كمقارنة. لقد وجد الباحثون عدم وجود ارتباط بين مشاهيات BHC (بما فيها اللندين) وخطر سرطان الصدر. لقد وجد ارتباط عكسي مع خطر سرطان الصدر في الأفراد

الذين شملتهم الدراسة (OR لمشابهة B-BHC تسوي ٠,٦) وكذلك بين النساء قبل وبعد سن اليأس menopausal عندما تمت مقارنة أعلى كمية BHC في النسيج الدهني مع أقل كمية.

جدول (٨-٦) : دراسات وبائية مختارة : سرطان الصدر والتعرض للمبيدات الحشرية

Reference	Study Population	Exposed Cases	Estimated Relative Risk (95%CI)
<b>Lindane and Related Isomers - Cohort Studies</b>			
Ward et al., 2000	Female serum bank donors in Norway		
	y-HCH	7	0.7 (0.1-4.0) <sup>a</sup>
	β-HCH, highest quartile of lipid-adjusted data	144	0.7
Dorgan et al., 1999	Female serum bank donors in Columbia, Missouri		
	Highest quartile of serum β-HCH	27	0.6 (0.3-1.3)
Hoyer et al., 1998	Female serum samples from Copenhagen City Heart Study		
	Highest quartile of serum β-HCH	63	1.36 (0.79-2.33) <sup>b</sup>
<b>Case-Control Studies</b>			
Zheng et al., 1999	Breast adipose tissue from women in Connecticut		
	Highest quartile of serum β-HCH	77	0.6 (0.3-1.1)
Mussaio-Rauhamaa et al., 1990	Breast tissue from women in Helsinki		
	B-HCH	24	10.51 (2.00-55.26) <sup>c</sup>

<sup>a</sup>OR calculated from discordant pairs.

<sup>b</sup>Adjusted analysis.

<sup>c</sup>Controlled for age and parity.

### : السرطانات البولية Urologic Cancers

سرطانات القناة التناسلية أو البولية تشمل أورام البروستاتا والخصيتات والمثانة البولية والكلى والقناة البولية. السرطانات البولية تصل إلى ٤١% من كل السرطانات في الرجال في مقابل ٤% في السيدات (ACS, ٢٠٠٢-٥). سرطان البروستاتا يمثل حوالي ٣٠% من كل السرطانات في الرجال مما يجعله أكثر السرطانات شيوعاً باستثناء سرطانات الجلد في الرجال الأمريكيين. من أكبر عوامل الخطر العمر حيث أن معظم الحالات في الرجال تحدث فوق سن ٦٥ سنة. العوامل الأخرى تشمل التاريخ الأسري من حيث سرطان البروستاتا والسلالة (سرطان البروستاتا يحدث بنسبة ٧٠% في الرجال السود أكثر منه في الرجال البيض) ومع الغذاء العالي للدهون (٢٠٠٢-٩).

## ٣- دراسات معملية على B سفيريكس (B. spharicus):

باستخدام يرقات C. crassicaudatus و C. paripes المجموعة من الحقل وجد الباحثان Ali and Nayar (١٩٨٦) أن هذه الأنواع غير حساسة بشكل كامل للمساحيق التجريبية الإبلية من B سفيريكس ٢٣٦٢، ١٥٩٣. لقد تم حساب قيمة LC50 بأكثر من ٥٠ جزء في المليون وهو تركيز متناهي في العلو حيث تسوى ١٠٠٠٠ مرة أكثر من الجرعة السامة لبعوض الكيوليكس كوينكيو فستياكس. على نفس المنوال وجد يحاث آخرون أن يرقات الهاموش المجموعة من الحقل غير حساسة بشكل كامل لهذه الوسيلة الميكروبية. لقد كانت قيم LS50 تساوى ٢٨٠ جزء في المليون للسائلتان (15a3M و 2362) وهى تساوى ٥٠٠٠٠ ، ٢٥٠٠٠٠ مرة مثل التركيزات القاتلة ليرقات البعوض. لذلك فانه من الثابت أن يرقات الهاموش تقاوم هذا المرض ضد الحشرات.

٤- دراسات حقلية على بكتريا B سفيريكس: مع المعاملات القاتلة ليرقات البعوض لم يؤثر هذا المرض عكسيا على مجاميع يرقات الهاموش في المياه الجارية على امتداد ٤٨ يوم حيث أجرى خلالها معاملتان. لقد تأكد في دراسات أخرى في منطقة كاليفورنيا أن استخدام B سفيريكس سلالة ٢٣٦٢، AS ومسحوق ABG-6184 عند معدلات ٢٢، ١١كجم/ هكتار على التوالي أظهرت قليل أو عدم خفض في مجاميع الهاموش. هذه المعدلات تساوى ٥٠-١٠٠ مرة مثل المعدلات القاتلة ليرقات البعوض. لذلك يمكن القول أن B سفيريكس لا يغير يرقات الهاموش بوجه عام.

و- ثنائية الأجنحة / كيوليسيدى / توكسورينيكيتيس SSP: يرقات البعوض لجنس توكسورينيكيتيس تعتبر مفترسة حيث تتغذى إجباريا على يرقات الأنواع الأخرى من يرقات البعوض التى تنربى فى الاوانى. الحشرات الكاملة من بعوض توكسورينيكيتيس تقدم للفائدة الأخرى من عدم أخذ وجبات الدم. لذلك أجريت محاولات مستفيضة لاستخدامها فى المكافحة البيولوجية لبعوض الاوانى مثل الابيديس ايجيبتى. فى مجهودات المكافحة المكاملة فان دمج مبيدات اليرقات مع مبيدات الحشرات البالغة مع المفترسات والمنورة البينية تقدم مكافحة فعلة ومتوافقة compatible ومتكاملة complementary على العيوض الافة والناقل. قبل دمج وتكامل هذه الوسائل مثل BT اسرائيلينسيز، B سفيريكس وغيرها من التوكسورينيكيتيس يكون من الضروري تقييم تأثيراتها الضارة على التوكسورينيكيتيس. أظهرت الاختبارات المعملية عدم حدوث تأثير من BT اسرائيلينسيز على يرقات

أنواع التوكسورينكتيس في غياب الضحايا والتحمل النسبي الجرعات المستخدمة البكتريا في وجود الضحايا. لقد أظهر العديد من الدراسات عدم حساسية التوكسورينكتيس لبكتريا B سفيريكس حتى تركيزات متناهية في العلو في وجود الضحايا بالرغم من حساسية للتوكسورينكتيس روتيليس لعزلات الطرز السيرولوجية 5a و 5b من B سفيريكس إلا أنها لم تتأثر بالتركيزات العالية من عزلة 2297 (طرز سيرولوجي ٢٥) في وجود الضحية. قلة الكفاءة أو الكفاءة المنخفضة لبكتريا BT اسرانيلىنيسيز و B سفيريكس على توكسورينكتيتنى تمكن من استخدام مخلوط من هاتين الوسلتين.

س- القشريات Crustacea: مجموعة الكائنات تحتوى على عدد كبير من أنواع المياه العذبة والعديد منها يعيش مع البعوض. توجد القليل من الأبحاث التي تناولت القشريات وما يحدث لها مع معاملات سلالات البكتريا BT اسرانيلىنيسيز أو B سفيريكس. في دراسة عملية وجد أن الكائن البحرى ايلاسموس بامبو تتحمل بكتريا BT اسرانيلىنيسيز "باكتموس" مع قيمة LC<sub>50</sub> في مدى ٢٨ مللجم/لتر وهذا التركيز يزيد بمقدار ١٠٠-٢٠٠ مرة عن جرعة المستحضر القاتل ليرقات البعوض. في احدى الدراسات التي أجريت في الهند على سلالتين من B سفيريكس (1593M، 2362) تم اختبارهما على القشريات المجموعة من الحقل وقد اُوجد أن الدافنيا والجمبرى لم تتأثر بالجرعات العالية جدا من هاتين السلالتين. السلالة 1593M أثرت على S. dicodtmus مع جرعة أكبر من ٢٥٠٠ ضعف التركيز القاتل ليرقات بعوض كيوليكنس بينما كان للسلالة 2362 بعض التأثيرات مع تركيز يزيد ١٥٠٠٠ مرة عن التركيز القاتل ليرقات البعوض. على نفس المنوال وجد أن D. Similis لم تتأثر فيما عدا مع التركيزات العالية جدا حوالى ٤٠٠٠-٢٧٠٠٠ مرة التركيز القاتل ليرقات البعوض من هاتين السلالتين.

ص- الكائنات غير المستهدفة المتنوعة NTO's: أظهرت الدراسات الأولية على تأثيرات BT اسرانيلىنيسيز على مدى عريض من الكائنات غير المستهدفة تأثيرات ضارة قليلة جدا لهذه البكتريا. لقد وجد أن Tubifex tubifex غير حساس حيث كانت LC<sub>50</sub> في مدى ٥-٢٠ ألف مثل عن المعدلات القاتلة ليرقات البعوض. أدى التعرض الطويل لجرعات تحت قاتلة من B سفيريكس الى خفض التغذية وتأخير النضج وغيرها من التأثيرات الضارة في Laccotrephes griseus.



خلاصة القول أنه بناء على نتائج الدراسات الكثيرة التي أجريت على مدى واسع من أماكن المعيشة أن المساحيق والمستحضرات الأولية ليكتريا BT اسراييلينسيز و B سفيريكس ذات اختبارية عالية في مكافحة الناقلات والافات من Nematocera مع أقل تأثير معاكس على البيئة.

## REFERENCES

- Ali, A.. Nuisance chironomids and their control: a review, Bull. Entomol. Soc. Am., 26, 3, 1980.
- Back, C., Boisevert, J., Lacoursiere, J. O., and Charoentier, G., High-dosage treatment of a Quebec stream with *Bacillus thuringiensis* serovar. israelensis efficacy against black fly larvae (Diptera: Simuliidae) and impact on non-target insects, Can. Entomol., 117, 1523, 1985.
- Davidson, E. W., *Bacillus sphaericus* as a microbial control agent for mosquito larvae, in Integrated Mosquito Control Methodologies, Laird, M. and Miles, J., Eds., Vol. 2, Academic Press, New York, 1985, 213.
- Garcia, R., Des Rochers, B., and Tozer, W., Studies on the toxicity of *Bacillus thuringiensis* var. israelensis against organisms found in association with mosquito larvae, Proc. Calif. Mosq. Vect. Cont. Assoc., 84, 33, 1980.
- Lacey, L. A., Larvicidal activity of *Bacillus* pathogens against *Toxorhynchites* mosquitoes (Diptera: Culicidae), J. Med. Entomol., 20, 620, 1983.
- Mulla, M. S., Efficacy of the microbial agent *Bacillus sphaericus* Neide against mosquitoes (Diptera: Culicidae) in southern California, Bull. Soc. Vector Ecol., 11, 247, 1986.
- Mulla, M. S., Drawazeh, H. A., Davidson, E. W., Dulmage, H. T., and Singer, S., Larvicidal activity and field efficacy of *Bacillus sphaericus* strains against mosquito larvae and their safety to nontraget organisms, Mosq. Mews, 44, 336, 1984.

- Mulla, M. S., Federici, B. A. and Darwazeh, H. A., Larvicidal efficacy of *Bacillus thuringiensis* serotype H-14 against stagnant-water mosquitoes and its effects on non-target organisms, *Environ. Entomol.*, 11, 788, 1982.
- Mulla M. S., Norland, R. L., Fanara, D. M., Darwazeh, H. A., and McKean, D. W., Control of chironomid midges in recreational lakes, *J. Econ. Entomol.*, 64, 300, 1971.
- Reish, D. J., LeMay, J. A., and Asato, S. L., The effect of BTI (H-14) and methoprene on two species of marine invertebrates from southern California estuaries, *Bull. Soc. Vector Ecol.*, 10, 20, 1985.
- Schnetter, W., Engler, S., Morawcsik, J., and Becker, N., Wirksamkeit von *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* gegen Stechmückenlarven und Nontarget-Organisms, *Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol.*, 2, 195, 1981.
- Sebastien, R. J. and Brust, R. A., An evaluation of two formulations of *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* for larval mosquito control in sod-lined simulated pools, *Mosq. News*, 41, 508, 1981.
- Singer, S., Use of bacteria for control of aquatic insect pests, in *Impact of the Use of Microorganisms in the Aquatic Environment*. Ecological Research Series, Bourquin, A. W., Ahearn, D. G., and Meyers, S. P., Eds., Environmental Protection Agency Publication EPA-660/3-75-001, 1975, 5.
- Walsh, J. F., The feeding behaviour of *Simulium* larvae, and the development, testing and monitoring of the use of larvicides, with special reference to the control of *Simulium damnosum theobald* s.l. (Diptera: Simuliidae): a review, *Bull. Entomol. Res.*, 75, 549, 1985.
- WHO. Data sheet on the biological control agent *Bacillus thuringiensis* serotype H-14 (de Barjac, 1978), mimeographed document, WHO/VBC/79.750, Rev. 1, VBC/BCDS/79.01, World Health Organization, 1979.

## **الباب الخامس**

### **اعتبارات الامان لأنواع بكتريا باسيليس والوسائل الحيوية الفطرية والنيماتودية ومتطلبات التسجيل**

الفصل الأول: اعتبارات أمان استخدام باسيليس بوبيلا المرض المسبب للمرض

اللبنى فى رتبة الجمال *scarabidae*

الفصل الثانى: أمان وسائل المكافحة الحيوية الفطرية والنيماتودية على اللافقاريات

غير المستهدفة الهامة اقتصاديا كآفات



## الفصل الأول

### اعتبارات أمان استخدام باسيليليس بوبيليا

#### المرض المسبب للمرض اللبنى فى رتبة الجعال *scarabidae*

##### ١- مقدمة:

الدراسات المرجعية عن مجموعة ممرضات باسيليليس بوبيليا والمرض اللبنى ليرقات خنافس الجعال "سكرابيد" والتي تسمى بوجه عام الجعارين البيضاء تشمل ما يزيد عن ٣٠٠ بحث بما فيها الاستعراضات المرجعية الرئيسية التى تغطى نواحي التقسيم البكتيرى والتخصص للعوائل والمرضية والتحكم الفسيولوجى فى النمو والتجريم والمشاكل المرتبطة بالمزارع البكتيرية فى خارج أجسام العوائل والوبائية الحيوانية *epizootiology* امتدادا للدراسات المرجعية على بيولوجية العائل وتطبيقات استخدام *B. popilliae* كمبيد حشرى. العديد من مثل هذه الدراسات المرجعية ناقشت باختصار ما يتعلق بالامان والنواحي البيئية المرتبطة بهذه المجموعة من الممرضات الاجبارية افتراضا. هذه الاصدارات وجهت ونشرت فى مراجع عامة تحت مضمون امان المبيدات الحشرية الميكروبية كأحد الاقسام الرئيسية فى هذا الخصوص. معظم اختبارات الامان التى عضدت تسجيل الباسيليليس بوبيليا كمبيدات حشرية ميكروبية فى أمريكا لم تنتشر بما فيه الكفاية. تقريبا معظم هذه الاختبارات أجريت على الجراثيم التى تنتج فى الخارج *in vitro* أو على مستحضرات الجراثيم. هذه الدراسات المرجعية تناولت تفصيلات الامان مع فحص صلتها الوثيقة بالمستحضر الجديد لجراثيم البوبيليا الناتجة فى الخارج *in vitro* وللتى سجلت حديثا بواسطة وكالة حماية البيئة الامريكية (EPA)

##### ٢- الاستعراض التاريخى *Historical Review*

###### أ- حالة المرض اللبنى *Milky disease*:

الاسم "المرض اللبنى" يصف اللون الابيض مثل اللبن للهيموليف المأخوذ فى يرقات الجعال "سكرابيد" فى حالة شدة العدوى بالاطوار الجرثومية لمجموعة ممرض باسيليليس بوبيليا. ولو أن العديد من الاتواع تم تعريفها فى السابق على أساس الاختلافات فى التراكيب المورفولوجية أو التفضيل للعوائل فإن معظم المراجع

التقسيمية الحديثة تميز أنواع فردية مع عدد من تحت الأنواع. الأطوار الخضرية لهذه الصور تتميز بأنها هوائية، قضبان مكونة للجراثيم تنمو في الخارج فقط على بيئة معقدة. النوات الخضرية سالبة للكتاليز، لا هوائية اختيارية، مقيدة مع درجات حرارة بين ١٧-٣٤°م. الجراثيم البيضية تحمل عدد من الحواف الطويلة وتتطور مركزياً داخل الكيس الجرثومي بشكل ملحوظ والتي لا تستطيل خلال التشكل المورفولوجي للجراثيم *morohogensis*. الاجسام الباراجرثومية العنيدة أو المقاومة *refractory* ذات الأرقام من صفر الى ٢ كخاصية أو مواصفة لتحت النوع قد تتطور أيضاً داخل الكيس الجرثومي خلال التشكل المورفولوجي الباراجرثومية (في حالة وجود الأخيرة) تتراكم في الهيموليف للجعارين المصابة لتركيزات أعلى من ٢-٣.٣١٠ ككيس جرثومي لكل مليلتر. هذه الاكياس الجرثومية لا تتحلل ذاتياً بما يحرر الجراثيم الحرة أو بلورات الباراجراثيم في الهيموليف. سبب الموت في الجعال المصاب قد يكون التجويع الفسيولوجي حيث أنه لم يثبت وجود أو اشتراك مركبات سامة في العملية. كل هذه الخصائص الأخيرة تميز كعلاقات نشوء مركزية بين الممرضات الحشرية قريبة الارتباط في مجموعة باسيلليس بوبيليا وكذلك عوائلها الحساسة من الجعال سكرابيد. هذه الخصائص ذات أهمية مساوية للفاعلية والامان البيئي للمبيدات الحشرية الميكروبية من *B* بوبيليا.

#### ب- الاكتشاف والتطبيق *Discovery and application*:

بالرغم من أن الخنافس اليابانية *popillia japonica* دخلت عرضياً في الولايات المتحدة الأمريكية (بالقرب من ريفرتون بنيجيرسى) في عام ١٩١٢ إلا أن دورها المؤثر في الضرر الاقتصادي وانتشارها السريع جعل منها هدفاً لبرامج مكثفة على المستوى الفيدرالي بحلول عام ١٩١٧. ما بين ١٩٢٢ و ١٩٢٣ وجد أن يرقات الخنافس من مواقع حقلية مفضولة وعريضة مصابة بعدد من البكتيريا غير المعرفة *unidentified* والفطريات كذلك لدرجة أن ٥٠% من الجعال المجموع في الخريف لأغراض التجريب خلال الشتاء فقدت بسبب المرض. لقد تم تمييز ثلاثة مظاهر من الاعراض من المظهر العام للجعال الميت. في المجموعة الاولى كانت الجعارين *grubs* مغطاة بهيفات الفطر. كانت حشرات المجموعة الثانية غامقة اللون (احمر- اخضر - بني- اسود) وكانت تبدو مصابة بالعديد من الكائنات الدقيقة أما جعارين

المجموعة الثالثة كانت بيضاء وملوطة بالكائن الناتج للجراثيم في صورة مزرعة نقية تقريباً.

في فترة خمس سنوات بدأت في عام ١٩٣٤ تم دراسة البكتريا المسببة للمرض اللبني والمسئولة عن اللون الأبيض بشكل مكثف بواسطة الباحث Dutky ومعاونوه (١٩٤٠، ٧٥، ٦٣). الكائنات المزعومة التي تسبب المرض وصفت على أنها نوعان من البكتريا باسيليس بوبيليا والتي تكون بلورة فردية من الباراجرثومية خلال التجزئ وكذلك *B. lentimorbus* (الآن تعتبر نوع من *B* بوبيليا) والتي لا تكون بلورات الباراجرثوميات. لقد تأكد دورها كمسببات للمرض اللبني من خلال سلسلة من معقات الجراثيم التي تم تسخينها لدرجة ٨٠°م لمدة ١٠ دقائق. لم يتم الوثوق أو تحقيق كل متطلبات ومبادئ كوخ *Koch's postulates* في ذلك الوقت حيث أن تحت النوعين قيل أنهما ينموان بقلّة أو لا ينموان إطلاقاً على معظم البيئات كما أن جميع المزارع التي تنتج في الداخل *in vivo* أظهرت بقاء في صورة حية لسنوات عديدة في التربة. الملاحظات المبكرة عن العدوى والانتاجية (زيادة ١٠٠٠ مرة عن الجراثيم التي استخدمت في العدوى) من الجعال المحقون والمجموع من الحقل وضعت الأساس لطريقة التربية المكثفة والانتاج الغزير. مساحيق الجراثيم المجهزة من عجينة جافة من كربونات الكالسيوم والجعال المصاب المهرّوس خففت بواسطة بوردرة التلك للتركيز النهائي ١٠ x ١٠ جراثيم لكل جرام وتم تعريضها لاختبارات حقلية أولية للوقوف على الفاعلية وكذلك اختبارات أولية عن الأمان على الطيور.

عندما استخدم مستحضر البكتريا في صورة مسحوق على المسطحات الخضراء والمصابة بخنافس الجعال اليابانية (في معاملات موضعية *Spots* بمعدل ١، ٦٧ جم لكل بقعة على مسافات ١، ٢٢ متر) بدأت ظهور وبائي موضعي *localized apizootics* للمرض اللبني. بناء على هذه البيانات مع الدلائل الأخرى من عدم وجود ما يشير إلى الالتهابات أو النمو أو التأثيرات السامة للباسيليس بوبيليا التي غذيت لطائر الزرزور والدواجن وكذلك ملاحظات عدم حدوث حساسية أو التهابات بين العمال الذين يتناولون الجعال المصاب. أو المساحيق الجرثومية المنتجة ثم تقديم طلبات عديدة للعديد من الوكالات الحكومية (مكتب الحجر الصحي والنباتي، مكتب الصناعات الحيوانية، مكتب الصناعات النباتية، قسم النحل، وزارة الزراعة الأمريكية *USDA*) ومكتب خدمات الصحة العامة الأمريكي) للحصول على موافقة الحكومة على استخدام مستحضرات الجراثيم من خلال البرنامج الفيدرالي التعاوني. لقد تم الحصول على

موافقة الحكومة وخلال ١٤ عاما ما بين ١٩٣٩-١٩٥٢ تم استخدام واستهلاك ما يقرب من ٨٣٦٠٠ كجم من المسحوق (الناتج من ٤-٥ مليون حشرة جعل محقونة ومجموعة من الحقول) في ١٩٤٠ موقع مختلف في ١٤ ولاية شرقية (أمريكا) وفي مقاطعة كولومبيا وفي مساحة إجمالية تقارب ٤٢٠٠ هكتار. لقد بدأ الانتاج التجارى لمسحوق الجراثيم تحت الترخيص الحكومى غير الاجبارى تبعا لطريقة التحكم ديستوكى ١٩٤١ و ١٩٤٢ فى ظل الحماية فى منتصف الاربعينيات وما زالت مستمرة فى ظل البروتوكولات الأساسية.

#### ج- المدى العوائلى وتخصص الممرض/العفوانية:

لم تنتج محاولات احداث العدوى فى *B* بوبيليا فى مختلف الحشرات غير الجعالية "سكرابيد". لقد خُص *Dutky* ١٩٦٣، ١٩٧٥ الى أن الجراثيم المحقونة فى يرقات الذباب المنزلى عزلت بالتدريج بواسطة أنسجة الجسم الدهنى قبل التعذر ولكنها عاودت الظهور عندما تم تحليل أنسجة اليرقات خلال التشكل *metamorphosis*. لقد أشار كذلك أن الجراثيم والقضبان الخضرية ليست لها تأثيرات على تطور يرقات دودة الشمع جاليريا ميلونيلا. لقد فشل *Aizawa* (١٩٦٧) فى احداث عدوى فى دودة الحرير بواسطة الباسيليلس بوبيليا تحت النوع بوبيليا أو تحت النوع لنتموريس فى المعمل. العدوى الطبيعية بالمرض اللبني كما تشخص عن طريق تراكم الباسيللاى المتجرثة مع الاكياس الجرثومية غير المتحللة والمنتخبة سجلت فقط فى خنافس عائلة سكرابيدى. لقد أجريت دراسات عديدة فى المعمل عن عدوى *B* بوبيليا تحت الانواع المختلفة عن طريق الحقن والتغذية على الصور الجرثومية و/أو الخضرية. تلك الطرق التى تستخدم عن طريق تناول الفمى *Per os* تعتبر وثيقة الصلة بما يحدث فى الحقل ومع هذا فان البيانات الفعلية من الحقل نادرة جدا. من الدراسات على *B* بوبيليا تحت النوع روبيبيا اقترح الباحث *Milner* (١٩٧٤-١٩٨٤) أن المدى العوائلى للفعال لنحت النوع يحتمل أن يقتصر على قليل من الانواع من جنس مفرد. الدراسات المعملية والحقلية التى أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية على سلالات *B* بوبيليا المرتبطة باقات الجعال المتوطنة والوافدة تعضد هذه العموميات جزئيا. لقد وجد *Tashiro* أن السلالة التجارية من *B* بوبيليا التى استخدمت فى مكافحة الخنفساء اليابانية كانت تحدث عدوى مساوية فى جعارين الخنافس الأوروبية "ريزوتروجس مجاليس" على الأقل فى المعمل. على العكس فان الجرعات القياسية لسلالة *DeByrne* للجعال *B* بوبيليا تحت



النوع بوبيليا وسلالة أمفيالون للجعل B بوبيليا تحت النوع لينتيموريس وكلاهما عزلا من مواقع حقليّة ذات اصابات وبائية بين الجعارين الاوربية أحدثت عدوى من ١-١٠% فقط على الخنفساء اليابانية على نفس النمق الذي حدث مع الخنافس الاوربية في الاختبارات المعملية. الدراسات على السلالات المرتبطة بجعل ميلولونشا ايتانس والسيكلوسيفالا أظهرت مدى عوائل محدود ومقيّد مما يعضد فرضية ميلز.

سلالات باسيليس بوبيليا المتطورة للخنفساء اليابانية والجعارين الاوربية عزلت بعد ٢٤، ١٢ سنة على التوالي بعد دخول هذه الاقالت الى الولايات المتحدة الامريكية ومع الجعارين الاوربية حدث ذلك الوضع بعد ٦ سنوات فقط بعد معاملة المواقع الحقليّة بالسلالة التجارية من الخنفساء اليابانية. عند تلخيص نتائج الدراسات التي أجريت في الفترة بين ١٩٧٤-١٩٨٤ لاحظ الباحثان Chang and Wan (١٩٨٦) أنه بعد ادخال مسحوق الجراثيم التجارى من أمريكا تم عزل أكثر من ٣٩ سلالة من B بوبيليا من ١٤ نوع صيني من جعارين سكريدي في سبعة أجناس. بالرغم من أن التخصص العوائى يعتبر من وظائف ميكانيكيات الدفاع وتغذية العائل فان خصائص سلالات الممرض يجب أن تفهم وتستوعب جيدا قبل توضيح الوضع التقسيمى. الدراسات السيولوجية ونظم جيل البلازميد أو دراسة نظم تبادل البلازميد وتقدير المعايير البيو كيميائية المعقدة تنوق أو تشوش بالصعوبات المرتبطة بنمو B بوبيليا في الخارج *in vitro* والتجرب. التطويرات الحديثة التى ستناقش لاحقا سوف تنشط هذه الدراسات فى المستقبل عن طريق تعضيد أو تحسين تطوير المنتج وزيادة تقديرنا للاختلافات فى التخصص العوائى والعنقوانية بين مختلف العزلات وكذلك التتابعات البينية المؤثرة من جراء استعمالها كمبيدات افلت.

#### د- النمو والتجرب فى الخارج *In vitro growth and sporulation*

يوجد على الاقل ٩٠ دراسة منشورة على النواحي المختلفة لنمو وتجرب هذه البكتريا فى الخارج والتي تعتبر واحدة من أخطر الممرضات الحشرية. محور ومركز هذه الدراسات كان المعامل البحثية الاقليمية الشمالية التابعة لوزارة الزراعة الامريكية *Peoria USDA (NRRL)*. IL. بداية من أوائل الستينيات أدى استثمار مجهودات ما يقرب من ٥٠-٦٠ باحث على امتداد سنوات طويلة الى تطوير تكتيك النمو الخضرى المكثف لعدد قليل من عزلات باسيليس بوبيليا على بيئة صلبة أو سائلة معقدة. لقد تحقق انتاج محدود لأكياس جرثومية ناضجة *sporangia* تحتوى جراثيم وأجسام

باراجرثومية ولكن حدث ذلك فى قليل من السلالات المشتقة. أطوار النمو الخضرى فى الخارج كانت تحدث عدوى كاملة لجعارين الخنفساء اليابانية عن طريق الحقن ولكن الجراثيم كانت أقل مقدرة فى أحداث العدوى بواسطة الحقن كما أظهرت فعالية أقل عن طريق الفم. فى نهاية الأربعة عشر سنة تم تحويل الميزانيات الحكومية لأولويات أخرى وحدث انحسار للدراسات فى الخارج *in vitro*.

لقد تعرضت مستحضرات الأطوار الخضرية من *B* بوبيليا فى شكل كبسولات لعدد محدود من اختبارات الفاعلية والأمان. نقص مقدرة أحداث العدوى لهذه التجهيزات على جعارين الخنفساء اليابانية قد ترجع الى غياب الاجسام الباراجرثومية ولكن جعارين ميلولونثا لم تظهر أية استجابات مامة عندما غذيت أو حقنت بالاجسام الباراجرثومية لسلالاتها المنطوية. ولو أن الاجسام الباراجرثومية المذابة تحدث موت عندما تحقن فى الخنافسر اليابانية فان هذا ليس الطريق العادى للتعرض كما أن دور الاجسام الباراجرثومية فى عملية العدوى لبكتريا *B* بوبيليا لم يحدد بشكل قاطع بعد.

الخطوة الأولى فى عمل المزارع الخارجية للباسيليس بوبيليا أو ممرض حشرى آخر تتمثل فى عزل الكائن من العائل المريض. حديثاً شدد الباحث *Krieg* (١٩٨١) على نواحى محددة عندما حذر من أن تطبيق *identity* ممرض البكتريا باسيليس المفترض أن يتأكد على أساس مفاهيم وقواعد كوخ حيث أن مكونات أو منتجات الجراثيم الرمية *Saprophytic* قد تحدث غزو ثانوى للعائل المريض وتزييف *feign* الكائن الممرض الحقيقى. فى دراسة حديثة تعتبر أساس الجدل حول ملكية التركيب تم الاتفاق على أن عملية تجربته *B* بوبيليا فى الخارج *in vitro* تختلف عن العملية فى الداخل *in vivo*. فى البيئة السائلة فان تجربته السلالات المعملية المستقرة أو العزلات الحقلية الجديدة تتضمن التحلل الذاتى *autolysis* للاكليس الجرثومية الناضجة مع تحرير وانطلاق الجراثيم الحرة. هذه الجراثيم المتحررة كانت قادرة على أحداث العدوى فى التقييم الحيوى عن طريق الفم مما يشير الى الاكياس الجرثومية التقليدية التى تحمل الجراثيم فى عائلها من الخنفساء اليابانية. نفس هذه الجراثيم الحرة ولو أنها معدية عن طريق الفم إلا أنها كانت غير معدية عن طريق الحقن. من الواضح الآن أن الدراسات المبكرة لم تستطع تمييز عزلات *B* بوبيليا الحقيقية عندما تجربت هذه العزلات مع التحلل الذاتى للاكياس الجرثومية وعندما فشل التقييم الحيوى بالحقن (أسهل عن طريق التغذية) للجراثيم الحرة- الاكياس الجرثومية لانتاج المرض اللبنى. والعزل المستقبلى لسلالات *B* بوبيليا

المفيدة من العينات المريضة سوف تسهل من خلال تطوير الطرق السيولوجية وغيرها من طرق ووسائل التعريف والتي سوف تحل محل طرق التقييم الحيوى عن طريق تناول الفمى فى التفرة بين كفاءة منتجات الجرثيم الرمية.

### ٣- بيانات الامان Safety data:

#### أ- متطلبات التسجيل للاستخدام على تجيل المراعى Pasture grass

عندما ووفق على القانون الفيدرالى الأمريكى للمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات القوارض عام ١٩٤٧ استمر تسجيل مسحوق جرثيم بكترياب B بوبيليا تحت الفقرة أو الوثيقة "الجـ grandfather" ولم يكن مطلوباً أية بيانات اضافية عن الامان. فى عام ١٩٦٨ قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA المنشأة حديثاً فى ذلك الوقت بسحب تسجيل استخدام هذه المنتجات على المراعى مع تعليق تقديم البيانات الخاصة بأمان مخلفات B بوبيليا على تجيل المراعى الخضراء. لتحقيق المتطلبات الجديدة تم اجراء سلاسل من الدراسات للحصول على البيانات المطلوبة بواسطة فريق بحثى من وزارة الزراعة الأمريكية USDA برئاسة د. A.M.Heimpel وتم تقديم البيانات من خلال المشروع البحثى الاقليمى رقم ٤ (جامعة روتجرز) الى الوكالة EPA كوثيقة عن المبيدات رقم E1692، عام ١٩٧٧. لقد طلبت الوكالة بيانات متابعة عن النواحي المختلفة للاختبارات التى قدمت نتائجها وكذلك ضرورة اجراء اختبارات المرضية فى الفئران مع المعاملة تحت الجلد Subcutaneous على المنتجات التجارية الممثلة. بعد تقديم بيانات هذه الاختبارات تم تعديل البند (٤٠) من الدستور التشريعى الفيدرالى مع اضافة القسم 180.1076 والذي ينص على الاعفاء exemption من متطلبات السماح بوجود المخلفات residue tolerance للجرثيم الحية أو القابلة للحياة Viable للكائن الدقيق باسيليس بوبيليا عندما استخدم كمبيد حشرى على المراعى الخضراء.

#### ب- البيانات الخاصة بتحلل المركب ومخلفاته

الجدول (٥ - ١) يلخص قاعدة البيانات الموجودة التى تضد تسجيل المبيدات الحشرية الميكروبية التى تعتمد على الباسيليس بوبيليا فى المنتجات النهائية للاستخدام فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تم اختبارها بما فيها من تلك المنتجات التى تم تصنيعها بواسطة معاملة Fairfax Laboratories, Clinton Corners, New York (Japidemic® and Doom®), and by the Ringer Corporation, formerly Reuter

( "Laboratories, Manassas, Virginia (Milky Spore and Grub Attack" )  
الأخرى كانت تلك التي تصنع بواسطة الحكومة.

لقد قام Thompson and Heimpel (١٩٧٤) بإجراء سلاسل من الاختبارات الميكروبيولوجية عن عينات الإنتاج للكشف عن الطرز الحيوية الخارجية بما فيها البكتريا Coliform والبكتريا اللاهوائية أو الهوائية (بخلاف B بوبيليا) أو أنواع معقد الشيجيلا سالمونيلا. لم توجد بكتريا لا هوائية أو هوائية ولكن شحنة واحدة وجدت محتوية على بكتريا غير ممرضة صنفت على أنها منتجات جراثيم هوائية من نوع الايروباكتز (في الغالب B سبيتيليس، B سيريس، B ميجاتيريوم) بمتوسط  $10 \times 10^4$  /جم وكذلك بكتريا غير مكونة للجراثيم هوائية بمتوسط  $10 \times 10^2$  /جم. لم يتم الكشف عن أية أعداد من معقد الشيجيلا- سالمونيلا. لقد خلص الباحثان الى أن المنتجات التجارية التي تصنع تبعا لبروتوكولات Dintky في الداخل *in vivo* لا تحتوي على أية بكتريا خارجية ضارة على الانسان وأن أعداد البكتريا الملونة كانت تتماشى بالمقارنة مع الاعداد المسموح بها في أمريكا في منتجات مسحوق اللبن فائقة الجودة "Extra grade". حقن المنتجات التجارية تحت الجلد أو الجراثيم الناتجة في الخارج والمتحررة من الأكياس الجرثومية بمعدل جرعات أعلى ٣-٤ مرات عن تلك المطلوبة لم تسبب أية وفيات في فئران التجارب ولم تظهر أية أعراض مرضية عند التشريح *necropsy*. أظهرت هذه الدراسات أن بروتوكولات اختبارات الجودة الموضوعية تحقق الحصول على مستحضرات نهائية لا تحدث أية أضرار على الانسان أو الحيوانات. تحليل المخلفات أظهر وجود مستويات من جراثيم B بوبيليا بعد ٢٥ سنة من تكوين المستعمرات. بالرغم من نقص البيانات الاحصائية لدقيقة الا انه لم تتوفر دلائل عن أية تأثيرات ضارة على الانسان والحيوانات والبيئة. في الحقيقة فإن ارتفاع وانخفاض مستويات الجراثيم يبدو أنها ترتبط مباشرة بكتافة الإصابة بالجعل وهذا من أحد أهم ملامح الاهتمام البيئي ببكتريا باسيليس بوبيليا.

جدول (٥-١): ملخص بيانات الامان لبكتريا بامبليس بوبيليا ومستحضراتها

U.S EPA Testing Requirements (EPA Guideline.) متطلبات الاختبارات من قبل وكالة حماية البيئة الامريكية	Test animal (number) حيوان الاختبار (العدد)	Formulation المستحضر	Dose الجرعة	Test result نتائج الاختبار	Date التاريخ
<i>Product analysis testing</i>					
<i>Formation of unintentional ingredients (151-22)</i>	<i>Microbia screen</i>	<i>End product</i>	-	No human or animal Pathogens	1974
<i>Product hatch analysis-subcuta-neos injection (40 CFR 180.1076(3))</i>	<i>Mouse (3x5)</i> <i>Mouse (5)</i> <i>Mouse (5)</i>	<i>End product</i> <i>ATCC-53256</i> <i>Pri. Powder</i> <i>ATCC-53256</i> <i>Pri. powder</i>	$1 \times 10^6$ $3.2 \times 10^6$ $4.5 \times 10^6$	No effects No effects No effects	1981 1988 1988
<i>Residue analysis (153-4)</i>	<i>Soil bioassay</i>	<i>End product</i>	$2 \times 10^6 \text{ g}^{-1}$	Present after 25 years	1967
<i>Tier I toxicological data</i> <i>Acute oral (152-30)</i>	<i>Rat (20)</i> <i>Rat (20)</i> <i>Monkey (4)</i> <i>Monkey (4)</i>	<i>End product</i> <i>Spore</i> <i>End product</i> <i>Spore</i>	$5 \times 10^7 / \text{d}(x21)$ $5 \times 10^7 / \text{d}(21)$ $2.5 \times 10^8 / \text{d}(x21)$ $2.5 \times 10^8 / \text{d}(x21)$	No effects No effects No effects No effects	1973 1973 1973 1973
<i>Acute dermal (152-31)</i>	<i>Guinea pig (10)</i>	<i>Spore</i>	$1 \times 10^8$	No mortality, no irritation, no serum antibodies	1977
<i>IV, IC, IP (152-33)</i> <i>Primary dermal irritation (152-34)</i>	<i>Mouse (5x7)</i>	<i>NRRL-B2309 rods</i>	$2.74 \times 10^8$ $4.26 \times 10^9$	$\text{IPLD}_{50} = 3.1 \times 10^9 \text{ cell}$	1971
<i>Primary eye irritation (152-35)</i>	<i>Guinea pig (6)</i>	<i>End product</i>	$5 \times 10^7$	Very slight irritation: complete reversal in 7 d	1983
<i>Hypersensitivity incidents (152-37)</i>	<i>Rabbit (10)</i> <i>Human (8)</i>	<i>Spore</i> <i>Spore and end product</i>	$1 \times 10^6$ Production exposure	No irritation No occupational sensitization	1977 1973
<i>Immune response (152-38)</i>	<i>Human (8)</i>	<i>Spore and end product</i>	Production exposure	No serum	1973

				antibodies detected	
<i>Tier 1 nonrarget data</i> <i>Avian oral (154- 16)</i>	<i>Starling (-)</i>	<i>Spore</i>	$3 \times 10^{10} d (x1)$	No effects, passed viable spores	1938
	<i>Chicken (-)</i>	<i>Spore</i>	$3 \times 10^{10} d (x33)$	No effects, passed viable spores	1938
<i>Avian injection</i> <i>(154- 17)</i>	<i>Chicken (-)</i>	<i>Spore</i>	$1.1 \times 10^9$	No effects	1938
<i>Non- target plant</i> <i>(154- 22)</i>	<i>Pastures</i>	<i>End product</i>	$2.06 \times 10^9 fr$	No negative effects on turf	1975
<i>Non- target insect</i> <i>(154- 23)</i>	<i>Tiphia</i> <i>Neodiprion</i> <i>Ahtsca</i> <i>Gulleria</i> <i>Bomhyx</i>	<i>Milky host</i> <i>Spore</i> <i>Spore</i> <i>Spore and</i> <i>rods</i> <i>Spore</i>	—	No infection on injection	1967

### ج- البيانات التوكمسيكولوجية من المرتبة أو البطارية الأولى Tier 1

الجدول (٥- ١) موجود في صورة تمثل البيانات الرئيسية المحورة التي ترتبط ببيانات الاختبارات الموجودة مع ما هو متوافق مع متطلبات التسجيل في وكالة حماية البيئة الامريكية. الاختبارات التي أجريت قبل عام ١٩٨١ ربما لا تتبع البروتوكولات الموضحة في دليل الوكالة EPA من حيث الاعداد ولكن في العديد من الحالات فإن هذه الاختبارات المطلوبة تتبع بروتوكولات أكثر صرامة عن تلك الجارية. كمثال فان البيانات عن السمية عن طريق الفم تتأتى من دراسات الانبوب المعدى لمدة ٢١ يوم على الجرذان والقروود باستخدام المنتج النهائى التجارى وتجهيزات الجراثيم فى الداخل من شرائح الهيموليف. حيوانات التجارب تتكون من أعداد متساوية من كلا الجنسين مع ملاحظة الموت والتغيرات فى السلوك المرتبطة بالمعاملة والتأثيرات على المعايير الطبيعية والسريرية والمسرولوجية خلال فترة الاختبار والشفاء *recovery periods*. لقد تم قتل نصف الحيوانات المختبرة بعد ٢١ يوم من بداية الاختبار وتم قتل باقى الحيوانات بعد ٧ أيام من القتل الاول وبعد الموت تم فحص الانسجة الكبرى فى الجهاز الدورى والتنفسى والهضمى وأجهزة الاعضاء الغدية للوقوف على أية تغييرات نسجية مرضية. فى كلا الجرذان والقروود لم تسجل أية اختلافات فى السلوك أو فى مظهر حيوانات الاختبار والمقارنة خلال أو بعد ٢١ يوم من المعاملة. لم تسجل كذلك أية وفيات أو علامات العدوى ونفس الشيء مع المعايير الطبيعية والسريرية

والسيرولوجية. عينات السيرم التي أختبرت في معمل اخر لم تظهر أية علامات عن انتاج أجسام مضادة لمواد الاختبار. لم تكن هناك أية تغييرات شاملة فى أى من أعضاء الجسم عند التشريح ولم يمكن الربط بين أية تأثيرات مؤكدة مع الزيادة النسبية فى وزن طحال نكور القروود التى عوملت بالمنتج النهائى أو الزيادة المطلقة فى وزن الحوصلة المنوية والزيادة النسبية فى وزن الغدد فى الاثاث من القروود المعاملة بالجراثيم. على نفس المنوال لم تسجل أنه قد حدثت تأثيرات كبيرة من جراء خفض بمقدار ٢٩% فى الوزن المطلق للغدة الدرقية عند قتل الذكور بعد ٣ أسابيع من المعاملة بالمركب النهائى أو خفض مقداره ٢٤% بعد أربعة أسابيع من المعاملة فى الحيوانات التى تم قتلها للفحص. لم تلاحظ أية تغيرات نسيجية مرضية فى الانسجة للتسعة التى أخذت من كل الحيوانات مما دعى الباحث للقول والاستنتاج بعدم ملاحظة أية اختلافات مؤثرة بين مجاميع الحيوانات المعاملة وتلك الخاصة بالمقارنة خلال فترة الدراسة.

البروتوكولات الخاصة بالدراسات التى أجريت لتقدير السمية الحادة عن طريق الجلد والالتهابات الأولية على الجلد والعيون (بدون غسيل) تتبع بشكل كبير دلائل وكالة حماية البيئة الامريكية EPA، معلق الجراثيم فى الخارج فى الماء المقطر لم تسبب أية وفيات ولا التهابات جلدية ولم تحفز تكوين أجسام مضادة فى السيرم عند معدل ١٠.٠١ جراثيم على موقعين بدون إزرع الشعر على ظهور عشرة حيوانات خنازير غينيا، استخدم ٠.٥ جم من المنتج النهائى (يحتوى على ١٠.٠٥ جراثيم B بوبيليا) المرطبة بمقدار ٠.٥ مليلتر ٠.٩% محول ملهى عوملت كذلك على كل حيوان وعلى كل من الموقعين منزوعى الشعر واخرين غير منزوعى الشعر على ظهور ستة خنازير غينيا وتم تغطيتها لمدة ٢٤ ساعة ثم مسحت للتخلص من مادة الاختبار. لقد ظهرت على الحيوانات علامات الحمامى erythema واضحة مع أودما قليلة جدا edema بعد ٢٤ ساعة مع قليل جدا من الالتهابات بعد ٧٢ ساعة. لقد وصل دليل الالتهابات الاولى ١,٦ على مقياس Draize scale وكانت جميع الحيوانات خالية من الالتهابات خلال ٤-٦ أيام بعد استخدام مادة الاختبار. لم تسجل أية أعراض خاصة بالتهابات العيون بين الارانب بعد ٢٤، ٤٨، ٧٢ ساعة أو بعد ٧، ١٤ يوم بعد المعاملة بتركيزات ١٠.٠١ جراثيم من شرائح الهيموليف فى ٠.١ مليلتر ماء مقطر. لذلك لم تعتبر B بوبيليا محدثة لأية التهابات فى الاعين.

لقد أجرى الباحثان Heimpel and Hurbant (١٩٧٣) للفحص السريرى والطبى والسيرولوجى لثمانية مستخدمين فى معامل فير فاكنس الحيوية العاملين طول

الوقت أو جزء من الوقت بمجموع ٧٥ سنة في عملية التصنيع في الداخل لمنهج *B* بوبيليا. كل الأفراد (خمس نساء وثلاثة رجال) تم حصولهم على فحص طبيعى روتينى وتعرضهم لأشعة *X* على الصدر وكذلك اختبارات الدم السريرية وتحليل البول وقد أجريت هذه الفحوصات والتحليل فى ثلاثة مناسبات خلال موسم انتاج الربيع (من مايو وحتى يوليو). كذلك أخذت ثلاثة عينات من السيرم من المتطوعين وأُخبرت للكشف عن انتاج الجسم المضاد بواسطة اختبارات التجمع *agglutination* والترسيب *Precipitating* وكذلك انتشار الاجار ضد (١) الانتيجينات المجهزة من الاطوار الخضرية لبكتريا *B* بوبيليا من السلالات المعملية *NRRL B-2309S*, *NRRL B-2309L* و *Nrrl B-332uf* و (٢) الانتيجينات المجهزة من هيموليف الخنفساء اليابانية التى جمعت من الحقل و (٣) الانتيجينات من هيموليف جملارين الخنفساء اليابانية التى حققت وحضدت *bled* فى المعمل بينما تم سحب عينات السيرم. لقد اتضح أن سيرم الانسان الذى تم فحصه لم يكن محتوى على اجسام مضادة *antibodies* لآى من تجهيزات الانتيجين الثلاثة ولم تكن أى من الفحوصات الطبية الطبيعية أو السريرية غير عادية مع عوامل العمر والجنس لكل متطوع. لقد خلص الباحث الى عدم وجود دليل عن مرضية مرتبطة بالتعرض المهني لبكتريا *B* بوبيليا كما ان التعرض المستمر لم يحفز انتاج الجسم المضاد فى الانسان.

لقد أجريت دراسة معملية عن المقدرة المرضية للاطوار الخضرية لبكتريا *B* بوبيليا على الثدييات مع ١٤ ساعة المرحلة اللوغاريتمية للسلالة *NRRL B-2309* وكذلك السلالة المعملية غير المرضية لباسيلليس سببتيس بواسطة *Walsh and McMahon* (١٩٧١). لقد تم حصاد العصيان بواسطة الطرد المركزى ثم غسلت فى محلول ٠,١ تريبتون لازالة المخلفات خارجية الخلايا ثم يعاد تطبيقها فى التريبتون ثم خففت فى سائل للحقن. ثم تم التحليل لعد الخلايا الحية بواسطة طريقة الاطباق. ثم حقن تخفيفات العصيان فى الغشاء البريتونى (٠,٥ ملليلتر) ثم حقنت تحت الجلد (٠,٢٥ ملليلتر) فى مجاميع من سبعة فئران. لقد حدثت وفيات فى الارانب التى عوملت بالعصيان الحية بجرعات  $1 \times 10^{10}$  وأعلى ( $LD_{50} = 1 \times 10^8$ ). لقد ماتت الفئران خلال ٢٤-٤٨ ساعة من الحقن من كلا السلالات التجريبية. الحقن البريتونى بجرعة  $1 \times 10^{10}$  عصيان قتلت بالحرارة لم تحدث لية وفيات كما أن الفئران التى حقنت تحت الجلد بتركيز  $1 \times 10^{10}$  باسيلليس بوبيليا لم تموت ولكنها أظهرت نكززة موضعية فى النسيج. النقد فى هذا العمل من أن *B* بوبيليا كانت معزولة من هذه المواضع المنكرزة



بعد ٥-٧ أيام من الحقن لا يمكن أن تفسر بل هي الملاحظة الوحيدة التى سجلت. الجرعات العالية عن طريق العدوى لا تحدث فى الطبيعة ولم يشار الى أية خطورة منها على الانسان والحيوانات.

#### د- البيانات الخاصة بالكائنات غير المستهدفة فى اختبارات البطارية ١

جعارين الخنفساء اليابانية مع أو بدون العدوى ببكتريا باسيلليس بوبيليا يشيع أكلها بواسطة الطيور مثل الزرزور والراخ ومن ثم يكون من المناسب اجراء أول اختبارات لآمان هذه المستحضرات على هذه الأنواع من الطيور. لقد أجريت اختبارات على الزرزور للوقوف على التأثيرات السامة عن طريق الفم مع جرعة فردية من الجراثيم  $10^{10}$  وهى تعادل استهلاك ١٠-١٥ جعران مريض بالمرض اللبني من العمر الثالث. لا توجد أدلة تشير الى أن جراثيم B بوبيليا تنبت فى القناة الهضمية للزرزور أو تظل ثابتة فى براز هذه الطيور. لقد تم تغذية الفراخ بنفس العدد من الجراثيم مع كل يوم من الايام الثلاثة والثلاثين المتوالية أو الحقن بجرعات من الجراثيم  $10^{10}$  لكل كجم من وزن الجسم ولم تظهر أى دلائل على حدوث انبات لهذه الجراثيم كما لم تحدث أية تأثيرات سلبية على الفراخ.

لقد تحصل الباحث Ladd (١٩٧٥) على بيانات محددة عن الآمان على النباتات من نجيل المراعى المعامل بمنتج B بوبيليا التجارى بمعدل ٢٠٠٠ رطل/أكر (٢٠٠ مرة مثل المعدل الموصى به) حيث أشار الباحث الى عدم ملاحظة أية تأثيرات سلبية على نمو نجيل المراعى فى الاماكن المعاملة التى عوملت بجراثيم تركيز  $10^{10}$  لكل قدم مربع. لم تكن هذه الملاحظات مثيرة للاستغراب حيث أن جعران واحد معدل ببكتريا المرض اللبني قد تحوى على عدوى من الاكياس الجرثومية الناضجة عند موت هذه الحشرة. أظهرت كثير من الدراسات الأخرى على الاحياء غير المستهدفة نقص المعلوماتية الخاصة ببكتريا B بوبيليا من بين العديد من أنواع الافات الحشرية غير الجمل والأنواع النافعة (جدول ٥-١).

#### هـ- البيانات المطلوبة فى برنامج التسجيل فى وكالة حماية البيئة الامريكية

لقد بدأ برنامج التسجيل فى وكالة حماية البيئة الامريكية EPA عام ١٩٩٠ حيث تم مراجعة موقف تسجيل المبيدات للوقوف على مدى دقة البيانات التى تعضد التسجيل وتعريف نقاط الضعف data gaps وطالب كل من حصلوا على تسجيلات للمبيدات أن يستكملوا ويقدموا البيانات غير المستوفاة أو غير الدقيقة. لقد حدث نفس

التوجه مع بكتريا باسيليس بوبيليا من قبل وكالة EPA حيث طلبت بيانات اضافية عن الكائنات غير المستهدفة بما فيها أسماك المياه العذبة (الدليل 19-154) ولا ففاريات المياه العذبة (20-154) والنباتات غير المستهدفة (22-154) ودراسات على الحشرات غير المستهدفة (23-154) واختبارات على نحل العسل (24-154)

**خلاصة القول** أنه مع المنتجات في المستقبل المبنية على باسيليس بوبيليا النامية في الخارج قد تحتوي على سلالات أكثر عنفا تستطيع أن تقتل الجعارين المستهدفة أسرع ولكنها تنتج عدد أقل من الجرثام في العوائل المصابة. مع افتراض عدم وجود اختلافات في بيانات الامان وثيقة الصلة فان هناك حاجة لتقدير هذه البيانات سنة بعد أخرى لصيانة استمرارية مكافحة الفعالة للجعارين. الاختبار بين نوع المنتج أو المركبات التجارية السائدة تحتوي السلالات الأقل عنفوانية والاقل انتاجية للجرثام وهذه سوف تبني على التكلفة والجدوى الاقتصادية.

## REFERENCES

- Aizawa, K., Mushi, 39, 97, 1967. (as cited in Reference 17)
- Change, S. and Wan, Y., Studies on milky disease bacteria in China. Sinozoologia. 10, 219, 1986.
- Dutky, S. R., The milky diseases. in Insect Pathoogy: Art advanced Treatise, Vol. 2, Steinhaus, E. A., Ed., Academic Press, New York. 1963. 75.
- Heimpel, A. M. and Hrubant, G. G., Medical examinaion of humans exposed to *Bacillus popilliae* and *popilliae japonica* during production of commercial milky disease spore dust, Environ. Enomol., 2, 793, 1973.
- Krieg, A., The genus *Bacillus*: insect pathogens, in The Prokaryotes: A Handbook on Habitats, Isolation and Identifiation of Bacteria, Vol. 2, Sterr, M. P., et al., Eds., Springer- Verlag, New York, 1981. chap. 136.
- Ladd, T. L., Jr. and McCabe, P. J., Prestistence of spores of *Bacillus popilliae*, the causal organism of type A milky disease of Japanese beetle larvae, J. Econ. Entomol., 60, 493, 1967.
- Ladd, T. L., Jr., U. S. Environmental Protection Agency Pesticide Petition No. 6E1692, personal communiaions, 1975.

- Milner, R. J., A new variety of milky disease, *Bacillus popilliae* Var. *rhopaea*, from *Rhopaea verreauxi*, Aust. J. Biol. Sci., 27, 235, 1974.
- Milner, R. J., Identification of the *Bacillus popilliae* group of insect pathogens, in Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970-1980, Burges, H. D., Ed., Academic Press, London, 1981, 45.
- Obenchain, F. D., unpublished information, 1988.
- Reagan, E. L., Acute subcutaneous injection study of *Bacillus popilliae* spore preparation, RLI-88F1-FIP in CD-1 mice, Food and Drug Research Laboratories, Waverlym NY, 1988.
- Reno, F. E., Acute eye irritation potential study in rabbits, supplement to U. S. Environmental Protection Agency Pesticide Petition No. 6E1692, Hazelton Laboratory of America Inc., Vienna, VA, 1977.
- Rone, F. E., Acute dermal toxicity in guinea pigs; *Bacillus popilliae*, in spore form, final report, supplement to U. S. Environmental Protection Agency Pesticide Petition No. 6E1692, Hazelton Laboratory of America Inc., Vienna, VA, 1977.
- Thompson, J. V. and Heimpel, A. M., Microbiological examination of the *Bacillus popilliae* product callosa, Environ. Entomol., 3, 182, 1974.
- Vos, B. J., Safety evaluation by repeated oral administration of *Bacillus popilliae* to rats and monkeys, U. S. Environmental Protection Agency, Pesticide Petition No. 6E1692, Woodward Research Corp., Herndon, VA, 1973.
- Welsh, R. D. and McMahon, K. J., Pathogenicity of vegetative cells of *Bacillus popilliae* for mice, Trans. Kans. Acad. Sci., 72, 509, 1971.
- White, R. T., Effect of milky disease on *Tiphia* Parasites of Japanese beetle larvae, J. N. Y. Entomol. Soc., 51, 213, 1943.
- Wolfe, G. W. and Mense, M. A., Pathogenicity test in mice; *Bacillus popilliae*, final report, Hazelton Laboratory of America Inc., Vienna, VA, 1981.



## الفصل الثاني

### أمان وسائل مكافحة الحيوية الفطرية والنيماطودية على اللافقاريات غير

#### المستهدفة الهامة اقتصاديا كافات

نولا: أمان وسائل مكافحة الحيوية الفطرية:

الحشرات والاكاروسات والنيماطودا وغيرها من اللافقاريات وكذلك النباتات حساسة للأمراض الفطرية. الكثير من البحوث السبقة تناولت وركزت على حماية الكائنات النافعة مثل النباتات الزراعية والحشرات من الفطريات المرضية. حديثا تحول الاهتمام في اتجاه استخدام هذه الفطريات كوسائل مكافحة للحشائش والحشرات الضارة وغيرها من اللافقاريات. في الوقت الراهن تستخدم بعض الفطريات في مكافحة الحشائش والنيماطودا والاكاروسات والحشرات في أجزاء مختلفة من العالم. الكثير من هذه الفطريات ما زالت تحت التطور والبعض الآخر على وشك الحصول على التسجيل الرسمي من قبل الحكومات المعنية حتى يمكن استخدامه في التطبيق الحقلی.

يوجد ما يزيد عن ٧٠٠ نوع من الفطريات الممرضة للحشرات تم وصفها وتقسيمها في حوالي ١٠٠ جنس. غالبية الدراسات المرجعية عن مرضية هذه الفطريات نشرت بواسطة Madelin (١٩٦٣، ١٩٦٦)، Muller-Kogler (١٩٦٥)، Roberts and Humber (١٩٨١)، Steinhaus (١٩٤٩). الدراسات المرجعية عن استخدام هذه الفطريات في مكافحة الحشرات والاكاروسات نشرت بواسطة Ferron (١٩٧٨)، (١٩٨٥)، Hall and papierok (١٩٨٢)، Robert (١٩٧٣) وغيرهم كثيرون.

في هذا المقام سوف نتناول الامان النسبي لللافقاريات للوسائل الفطرية المسجلة في الوقت الراهن لمكافحة الحشرات والاكاروسات ولن نتناول الفطريات المتخصصة على مفصليات الأرجل النافعة وغير المستهدفة وكذلك التوكسينات الفطرية والفطريات المهندسة وراثيا. المرجع الوحيد الذي تناول بشكل خاص أمان الفطريات على اللافقاريات هو القسم الخاص في كتاب Muller-Kogler الذي نشر منذ ما يزيد عن ٣٠ عاما مضت (١٩٦٥). هناك دراسات مرجعية علمية عن وسائل مكافحة الميكروبية على اللافقاريات نذكر منها Flexner وآخرون (١٩٨٦)، Bailey (١٩٧١)، (١٩٦٧) Camaron، Chapman وآخرون (١٩٧٩)، Englar and Arats (١٩٧٧)،

Pimentel (١٩٨٠، ١٩٨٤) وغيرهم وقد تناولت هذه الدراسات خطورة ومخاطر الممرضات الحشرية على البيئة. لقد نشر الباحث Hall وآخرون (١٩٨٢) دلائل عن تسجيل الفطريات الممرضة للحشرات.

وضع الفطريات الممرضة للحشرات المسجلة: فى الوقت الراهن توجد أربعة أنواع من الفطريات مسجلة للاستخدام كوسائل حيوية لمكافحة الحشرات (جدول ٥- ٢) ولكن اثنان فقط يستخدم على نطاق واسع. بالإضافة الى ذلك فانه ولو أن *Puccinia blattellae* تستخدم فعليا وهى مسجلة واقعا فى مكافحة النيماتودا فانها تعتبر ذات دور فعال فى مكافحة الحشرات فى حقول الارز. فى جمهورية الصين الشعبية عومل ما يقرب من ١٠x٧ هكتار بفطر *Beauveria bassiana* عام ١٩٧٩ لمكافحة ديدان أشجار الصنوبر (أنواع دينزولميس) وحوالى ١٠x١ هكتار من قصب السكر عام ١٩٧٦ لمكافحة ثاقبات الذرة (أو سترينيا فيرناكاليس). فى البرازيل تعامل مساحة ١٠x١ هكتار تقريبا من قصب السكر بالفطر *Metarhizium anisopliae* لمكافحة بق الباصوق Spittle bugs.

هذه المنتجات أمنه بوجه عام ولقد تمت الاشارة الى أمانها على اللاقناريات غير المستهدفة بالتفصيل فى مواضع كثيرة. لقد قلم Flexner وآخرون (١٩٨٦) باستعراض بعض الاختبارات على *B. bassiana* فى المستحضر المعروف Boverin ضد الحشرات غير المستهدفة. لقد كانت الوفيات متوسطة أو عالية فقط فى حالة تناول الحشرات النافعة للفطريات وليس عندما تلامسها. مع المدى العوائلى العريض المعروف للفطريات مثل بوفاريا باسيلانا و *M. anisopliae* فان هناك احتمال كبير لاجداث العدوى أو التأثيرات السامة Toxicosis على اللاقناريات غير المستهدفة. ينصح باجراء استكشاف مستمر بعد التطبيقات الحقلية الكبيرة لهذه المنتجات الحيوية.

## جدول (٥-٢) الفطريات الممرضة للحشرات المسجلة

Pathogen الممرض	Trade name الاسم التجارى	Target species الانواع المستهدفة	Country البلد	Ref. المرجع
Beauveria bassiana	Boverin	Leptinotarsa deceimlineata. Cydia pomenella	U.S.S.R	58
	None	Dendrolimus punctatus. D. tabulaeformis. Ostrinia lurnacalis. Neophotettix spp.	China	94
Hirsutella thompsonii	Mycar <sup>*</sup>	Phyllocoptuta	U.S	138
Metarhizium anisopliae	Biocontrol <sup>*</sup> . Biomax <sup>*</sup> . Combio <sup>®</sup> . Metabiol <sup>®</sup> . Metapol <sup>®</sup> . Metaquino <sup>®</sup> .	oleivora Spittle bugs	Brazil	178.202
Paecilomyces lilacinus	Biocon <sup>®</sup>	Nematodes	Philippines	102
Verticillium lecanii	Vertalac <sup>®</sup> . Mycotal <sup>®</sup> . Thriptal <sup>®</sup>	Aphids Whiteflies Thrips	U.K.	80

المدى العوائلى والتخصىصية: الفطريات الامنه "Safe" fungus على اللافقاريات هى بالضرورة ذات مدى عوائلى محدود وهذه الخاصية تجعل لها اقل تأثير على الكائنات غير المستهدفة (NTO's) هذا قد لا يكون الوضع المناسب فى حال النظر لاستخدام هذه الفطريات كوسيلة مكافحة حيوية. الكائنات غير المستهدفة قد ينظر اليها كعوائل ثانوية حيث تصان فيها العدوى وتتطور وتتضاعف ومن ثم تشجع وتنشط العدوى الاخيرة فى مجاميع العائل المستهدف.

الفطريات من أكثر الكائنات ذات المدى العوائلى العريض من بين ممرضات الحشرات. على سبيل المثال فان قائمة عوائل البوفاريا باسيفانا تشمل ما يزيد عن ٧٠٠ نوع. القوائم الخاصة باللافقاريات غير المستهدفة وتلك التى وجدت غير حساسة لبعض الممرضات الحشرية من الفطريات الشائعة موجودة فى جدول (٥-٣) وسوف أضعها بالانجليزية لأنها واضحة جدا ومجرد أسماء (ترددت كثيرا هل أضع كل القوائم أم أختار منها كنماذج وفى النهاية فضلت أن أضعها جميعا مجزأة حتى يستفيد القارئ والباحث من هذه القوائم وعلى الله قصد السبيل). أية استنتاجات عن المدى العوائلى والتخصص العوائلى لعزلات الفطريات الممرضة للحشرات بناء على قوائم العوائل

الموجودة في الجدول يجب أن تؤخذ بحذر. العديد من التسجيلات في هذه القوائم مبنية على عينة فردية.

جدول (٥ - ٣) المدى والتخصص العوائل لبعض ممرضات الطرية على اللاقاريات

Fungus/ target hosts الفطر/ العوائل المستهدفة	Nontarget hosts العوائل غير المستهدفة	Challenged and not infected العوائل التي لا تصاب وتقاوم العدوى
<b>Chytridiomycetes</b> Coelomomyces spp./ Diptera: Culicidae(h)	Ostracoda  Copepoda(h) Diptera: Culicidae (Toxorhynchites rutilus ssp. Septentrionalis(r)	Oligochaeta: Naididae Branchiopoda (Daphnia carinata) Ostracoda Malacostraca: Amphipoda (Orchestia aff. Tennis). Isopoda (Notidotea lacustris) <sup>2</sup> Diptera: Chironomidae (Chironomus zealandicus)
<b>Oomycetes</b> Lagenidium giganteum	Branchiopoda: Cladocera (Daphnia sp (u))  Copepoda(u) Diptera: Chaoboridae (Chaoborus astictopus(m) <sup>1</sup>	Polychaeta <sup>1</sup>  Gastropoda Branchiopoda: Cladocera <sup>1</sup> (Daphnia pulex) Ostracoda: Podocopa Copepoda: Cyclopoida (Cyclops sp.) Malacostraca: Amphipoda (Gammarus Lacustris). Decapoda (Cambarus sp/ Procambarus clarkii, Palaemonetes pugio) Odonata: Aeshnidae (Aeshna sp.). Calopterygidae (Ischnura sp.). Libellulidae (Libellula sp.) Ephemeroptera: Baetidae (Callibaetis sp., C. montanus) Heteroptera: Belostomatidae (Belostoma fluminae). Corixidae (Corixella sp.). Coenagrionidae (Ischnura cervula <sup>1</sup> ). Notonectidae (Notonecta unifasciata) Diptera: Chaoboridae (Chaoborus flavicans). Chironomidae Ephydriidae. <sup>66</sup> Syrphidae Coleoptera: Hydrophilidae (Enochrus cuspidatus Hydrophilus triangularis. <sup>10</sup> Tropisternus lateralis). Dytiscidae <sup>1</sup> (Hydrotus sp., <sup>10</sup> H. medialis. Laccophilus decipiens. Theronectus basilarus). Coccinellidae (Hippodamia convergens) Hymenoptera: Apidae (Apis mellifera <sup>1</sup> )



تابع جدول (٥-٣) المدى والتخصص العنقلى لبعض الممرضات الطرية على اللاقاريات

<b>Leptolegnia chapmani</b>	None reported	Branchiopoda: Cladocera (Daphnia sp.) Odonata: Aeshnidae, Libellidae, Gomphidae Plecoptera: Nemouridae. Peltoperlidae (Peltoperla sp.). Perlidae, Perlodidae Diptera: Simuliidae (Simulium spp.) Chironomidae, Tipulidae (Diceranota sp., Tipula sp.) Coleoptera: Dytiscidae, Halipidae. Noteridae Trichoptera: Hydropsychiidae. Limnephilidae, Rhyacophilidae <sup>1</sup>
<b>Zygomycetes</b> Conidiobolus coronatus and C. thromboides Symphyla(h) <sup>23</sup> Acari(r) <sup>191</sup> Isoptera(r) <sup>105</sup>	Hymenoptera: Formicidae (Mesoponera sp. <sup>155</sup> )	Diptera: Syrphidae Coleoptera: Coccinellidae Hemiptera: Anthocoridae Neuroptera: Chrysopidae (Chrysopa spp.) Hymenoptera
Homoptera: Aphididae(h) <sup>79</sup> Entomophaga maimaiigal Lepidoptera(r-h) <sup>201</sup>	None reported	Orthoptera: Acrididae (Camnula Pellucida) Chrysomelidae (Diabrotica undecimpunctata) Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae (Calpe canadensis, Heliothis virescens, Spodoptera eridania), Lasiocampidae Malacosoma disstria), Saturniidae (Hemileuca maia), Lymantriidae (Dasychira vagans), Pyralidae (Polidae interpunctella), Pieridae (Pieris rapae) Hymenoptera: Apidae (Apis mellifera <sup>22</sup> )
<b>Entomophthora muscae</b> Heteroptera(r) Diptera (l-h)	Diptera: Empididae (Empis tessellata, Rhamphomyia stigmosa(r), Muscidae (Coenosia muscae(r), Sarcophagidae (Acridophaga aculeata(u), Kellymyia Kelly(h), Pseudosarcophaga affinis(m), Syrphidae(l) (Eupodes sp.(r), Melanostoma scalare.	Diptera: Calliphoridae (Phormia regina, Calliphora vicina), Syrphidae (Allograpta obliqua, Eristalis arbustorum, E. tenax, Toxomerus, Sphaerophoria scita, Syrphus sp.), Tephriidae (Rhagoletis pomonella) <sup>211</sup>

تابع جدول (٥-٣) المدى والتخصص العوائل لبعض الممرضات الطرية على اللافقاريات

<p><b>Erynia delphacis</b> Homoptera(h)</p> <p>Heteroptera:Miridae(u)</p> <p><b>Erynia pierisi</b> Lepidoptera(l-h) Homoptera(m) Diptera(l)</p>	<p>Platyichirus spp.(r). Scopeuma stercorarium(r). Syrphus Spp.(r). Tachinidae (Dexilla vacua(r) Tachina sp. Coleoptera:Cantharis (Cantharis livida(r)) Hymenoptera:Torymidae (Torymus druparum(r))</p> <p>Hemiptera:Miridae (Cyrtorrhinus lividipennis(u)</p> <p>None reported</p>	<p>None reported</p> <p>Homoptera:Aphididae (Aphis fabae Brevicoryne brassicae)<sup>1</sup> Coleoptera:Chrysomelidae (Lepinotarsa deceemlineata). Coccinellidae (Epilachna varivestis). Tenebrionidae (Tribolium confusum) Lepidoptera:Lymantriidae (Lymantria dispar). Pyralidae (Galleria mellonella. Ostrinia nubilalis. Plodia, interpunctella)</p>
<p><b>Erynia delphacis</b> Homoptera(h)</p> <p>Heteroptera:Miridae(u)</p> <p><b>Erynia pierisi</b> Lepidoptera(l-h) Homoptera(m) Diptera(l)</p>	<p>Platyichirus spp.(r). Scopeuma stercorarium(r). Syrphus Spp.(r). Tachinidae (Dexilla vacua(r) Tachina sp. Coleoptera:Cantharis (Cantharis livida(r)) Hymenoptera:Torymidae (Torymus druparum(r))</p> <p>Hemiptera:Miridae (Cyrtorrhinus lividipennis(u)</p> <p>None reported</p>	<p>None reported</p> <p>Homoptera:Aphididae (Aphis fabae Brevicoryne brassicae)<sup>1</sup> Coleoptera:Chrysomelidae (Lepinotarsa deceemlineata). Coccinellidae (Epilachna varivestis). Tenebrionidae (Tribolium confusum) Lepidoptera:Lymantriidae (Lymantria dispar). Pyralidae (Galleria mellonella. Ostrinia nubilalis. Plodia, interpunctella)</p>

تابع جدول (٥-٣) المدى والتخصص العوالم لبعض الممرضات الحشرية على النباتات

<p><b>Erynia radicans</b> Homoptera(r-h) Heteroptera(r) Diptera(r) Coleoptera(u) Hymenoptera(h) Lepidoptera(h)</p>	<p>Diptera: Syrphidae(r) Coleoptera: Lampyridae Hymenoptera: Aphididae(u), Braconidae(u), Chalcididae(u), Ichneumonidae(u), (Bathypsectis tristis(u), Cratichneumon lanosin Lissonota sp. (r) Pteromalidae (Pteromalus sp.(r)</p>	<p>Homoptera: Aphididae (Acynthosiphon pisum, Aphis craccivora), Cicadellidae (Macrostelus fascifrons) Coleoptera: Coccinellidae (Colomegilla maculata Eriopis connexa) Hymenoptera: Aphididae (Trioxys complanatus) Ichneumonidae (Angia sp.) Lepidoptera: Lymantriidae (Lymantria dispar), Pyralidae (Galleria mellonella), Noctuidae (Trichoplusia), Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis)</p>
<p><b>Neozygites acaridial</b> Acari(u)</p>	<p>Acari: Macrochelidae (Macrocheilus peregrinus(h)) Gamasidae (Pergamasus crassipes(r))</p>	<p>None report</p>
<p><b>Hyphomycetes</b> Beauveria bassiana Gastropoda(u) Acari(h) Orthoptera(h) Dermaptera(r) Isoptera(u) Blattaria(h) Thysanoptera(r)</p>	<p>Acari: Phytoseiidae (Metaseiulus occidentalis (1)<sup>14</sup>), Araneae(r) Diptera: Polydesmida (Polydesmus sp.(r)) Embioptera: Teratobryidae (Micratus dorsalis(u)) Dermaptera: Forficulidae (Forficula auricularia(r)) Mantodea: Mantidae (Mantis religiosa(r), Tenodera capitata)</p>	<p>Diptera: Phoridae (Megaselia rufipes<sup>147</sup>), Syrphidae, Tachinidae (Compilura concinnata, Metagonistylum parathesius) Hymenoptera: Braconidae (Apanteles congregatus), Formicidae (Pheidole megacephala<sup>10</sup>), Trichogrammatidae (Trichogramma cacoeciae, T. embryophagum, T. evanescens, T. Pallidum) Neuroptera: Chrysopidae (Chrysoperla carnea)</p>
<p>Homoptera(h) Heteroptera(r) Diptera(h) Coleoptera(h) Hymenoptera(u) Siphonaptera(h) Lepidoptera(h)</p>	<p>Heteroptera: Nabidae (Nabis spp. (r)), Pentatomidae (Perillus bioculatus (1), Veliidae (Mesovelia mulsanti(r)) Diptera: Bibionidae (Bibio marci(r)), Bombyliidae (Villa brunnea(u)), Cecidomyiidae (Aphidoletes thompsoni(u)), Chamaemyiidae (Gremastus nigrocellulatus(u), Leucopis spp. (u)), Dolichopodidae (Modesta sp. (u)), Syrphidae (Eristalis latifrons(r)), Tachinidae (Exorista scutellata(r), Lixophaga diatraene(h), Tipulidae(r) Coleoptera: Carabidae (Bronchocrepus (1), Carabus (u), Harpalus pubescens (1), Lebia bisulcata(r), Pterostichus cupreus (1)), Chrysomelidae (Chrysomela hyperici(r)), Chrysomelidae (Eucleus sphagnum(u)), Coccinellidae (Adalia bipunctata (1), Adonis notata (1), Anisus ocellata, Clavina quatuordecimguttata(r), Chilocorus bipustulatus(u), Coccinella spp., Colomegilla maculata(h), Cryptocercus montroszneri(u), Epilachna spp.(r), Eriopis connexa(h), Exochorus quadripustulatus(u), Harmonia punctata (1), Hippodamia spp. (u), Rodalia</p>	<p> </p>

تابع جدول (٥ - ٣) المدى والتخصص العوائل لبعض الممرضات الطرية على اللافقاريات

	<p>cardinalis(r). Scymnus spp. (n). Semiadalia undecimnotata(1)). Colydiidae (Dastancus longipes(r)). Derodontidae (Laricobius erichsoni(u)). Hydrophilidae (Tropisternus sp.(r)). Nitidulidae (Gischlochilus quadrangulatus(r)). Rhizophagidae (Rhizophagus grandis(h)). Salpingidae (Pitho americanus(u)). Solpidae sp. (r)). Staphilinidae (Lathrobium brunipes(r)). Tenebrionidae (Ceticeus sp. (u)). Hymenoptera Aphelinidae (Encarsia formosa(1)). Apanteles(r). Apidae (Apis mellifera(u)). Bombus pratorum(r). B. terrestris(h)). Braconidae (Helconus annulipes(r)). Coeloides rufocinctus(u). Cotesia glomeratus(1). Cotesia glomeratus(1). Macrobracon sp.(1)). Formicidae</p>	
<p>Culicinomyces calvisporus(1) Diptera: Culicidae(h). Ceratopogonidae(h). Simuliidae(1-h)</p>	<p>(Formica spp.(r). Lasius spp.(r)). Ichneumonidae Coelichneumon rudis. Erigorgus femorator(r). Vespa (Vespa spp. (r). Vesperus sp.(r). Vespa spp.(r). Neuroptera: Chrysopidae (Chrysoperla spp.(u)). (1-m) Lepidoptera: Aretidae (Hypocrita jacobaeae(r)). Bombycidae (Bombyx mori(h)). Pyralidae (Cactoblastus cactorum(r)).</p>	<p>Gastropoda: Basommatophora (Physa sp.) Malacostraca: Decapoda, Atyidae Odonata: Anisoptera, Zygoptera<sup>21</sup> Heteroptera: Belostomatidae (Diplomachus rusticus), Corvidae, 35 Nepidae<sup>11</sup> Notonectidae<sup>11</sup> (Anisops sp.) Diptera: Psychodidae (Psychoda sp.<sup>11</sup> Telmatoctopus albipunctatus<sup>21</sup>). Psychoptera: (Bitacomomorph clavipes<sup>11</sup>). Simuliidae (Simulium vittatum). Tipulidae.<sup>21</sup> Stratiomyidae (Stratiomyia sp.<sup>11</sup>). Tabanidae (Chrysops sp., Tabanus sp.). Syrphidae<sup>21</sup> Coleoptera: Dytiscidae<sup>11</sup> (Necterosoma sp.). Hydrophilidae, Halpidae<sup>11</sup> Trichoptera Hymenoptera: apidae (Apis mellifera<sup>11</sup>)</p>
<p>Hirsutiella thompsonii Acari(h) Coleoptera(m)</p>	<p>Acari: Phytoseiidae (Typhlodromalus peregrinus(u))</p>	<p>Diptera: Culicidae (Aedes aegypti. Anopheles stephensi, Culex pipiens Coleoptera: Coccinellidae (Coccidophilus citricola, Lindorus lotharicus)</p>

تابع جدول (٥ - ٣) المدى والتخصص العوائل لبعض الممرضات الطرية على اللافقاريات

<p><b>Metarhizium anisopliae</b> Symphyla(h) Orthoptera(h) Dermaptera(r) Isoptera(h) Homoptera(h) Heteroptera(u) Diptera(h) Coleoptera(h) Siphonaptera(h) Lepidoptera(h)</p>	<p>Malacostraca Amphipoda Acari Asgastrotidae (Heterogaster anopstn), Mesostigmatidae (Macrocheles sp.(u)) Lemphicostoptera(u) Dermaptera Forficulidae(r) (Forficula auricularis), T Labidura<sup>2</sup>) Heteroptera Achidae(l) Diptera Asilidae (Pteronema sp.(r)), Chironomidae (Chironomus) sp.(u)), Culicidae (Toxothrichites ambouensis<sup>1</sup>), Tachinidae (Devantristia) (r), Tipulidae (Tipulidae sp.) Coleoptera Carabidae(r) (Amara obscu), Colpodes japonicus Onas sp.(r), Coccinellidae (Eptachina sp.(r)), Gyrinidae(h), Lampyridae (Lampyrophorus sp.(r)) Hymenoptera Apidae (Apis mellifera) (l-h), Formicidae(r)<sup>1</sup> Ichneumonidae (Amblyteles sp.(r)), Scelionidae (Camponotus quadricincta), C. Radula, C. Tannamensis(u)), Sphocidae (Sceliphron spirifex(r)), Tipulidae (Tipula inornata(u)), Vespadidae(r) (Vespa sylvestris(r)) Lepidoptera Bombycidae (Bombyx mori(h))</p>	<p>Hymenoptera:Apidae (Apis mellifera) Lepidoptera:Lymantriidae (Lymantria dispar<sup>2</sup>) Gastropoda Branchipoda:Anostraca, Caldocera (Daphnia sp.<sup>10</sup>) Copepoda:Cyclopoida (Cyclops sp.) Odonata:anisoptera Diptera:Culicidae (Aedes aegypti), Tachinidae (Metagonistylum minense, Paratheresia claripalpis) Coleoptera:Tenebrionidae (Tenebrio molitor) Hymenoptera:Braconidae (Apanteles flavipes)</p>
<p><b>Nomuraea rileyi</b> Heteroptera(u) Diptera(r) Lepidoptera(h) Coleoptera(h)</p>	<p>Araneae (r) Lepidoptera:Bombycidae (Bombyx mori(h))</p>	<p>Heteroptera:Pentatomidae (Podisus maculiventris.<sup>1</sup>) Diptera Culicidae (Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Culex pipiens<sup>17</sup>), Muscidae (Glossina morsitans), Tachinidae (Voria ruralis) Coleoptera:Coccinellidae (Hippodamia convergens<sup>18</sup>), Chrysomelidae (Leontia aurata<sup>19</sup>) Curculionidae (Chalcodermus nensu.<sup>2</sup> Hypera postica), Scarabaeidae (Melolontha melolontha).</p>
<p><b>Paecilomyces farinosus</b> Homoptera(h) Heteroptera(r) Phasmida(r)</p>	<p>Araneae(r)<sup>1</sup> Collembola:Entomobryidae (Entomobrya unistrigata(u)) Diptera: Cecidomyiidae (Aphidoletes thomsoni(u)).</p>	<p>Oryctes rhinoceros) Tenebrionidae (Tenebrio molitor, Tribolium confusum)<sup>2</sup> Hymenoptera:Braconidae (Apanteles marginiventris.<sup>18</sup> Microplitis conceps), Ichneumonidae (Camponotus soronensis), Scelionidae (Telenomus prodior) Neuroptera Chrysopidae (Chrysoperla carnea) Lepidoptera Noctuidae (Heliothis virescens), Pieridae (Pieris rapae), Sphingidae (Manduca quinquemaculata, M. sexta)<sup>1</sup> Araneae:Cinifloroerov Lepidoptera:Lymantriidae (Lymantria dispar<sup>10-22</sup>)</p>

تابع جدول (٥-٣) المدى والتخصص العوائل لبعض الممرضات الطرية على اللاتفرات

Diptera (1)	Tachinidae (1)	
Coleoptera (h)	Coleoptera: Carabidae (Broscus cephalotes (m)), Harpalus pubescens (1), Pterostichus cupreus (1), Derodontidae (Lancobius crichonius (u))	
Menoptera (r)	Hymenoptera: Apidae (1) (Apis mellifera (m)), Bombyx terrestris	
Loidoptera (h)	Psithyrus bohemicus (u), I. ornicae (1), Asopolepis longipes, Ichneumonidae (23), Pteromalidae (Dibachys affinis (h)), Vespidae (Vespa sylvestris (r))	
	Lepidoptera: Tortricidae (Hyponota jacobaeae (r)), Bombycidae (Bombyx mori (h))	
Paecilomyces lilacinus	Lepidoptera: Bombycidae (Bombyx mori (r))	Diptera: Culicidae (Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Culex pipiens (1))
Nematoda (h)		Coleoptera: Tenebrionidae (Tenebrio molitor, Tribolium confusum)
Homoptera (h)		Lepidoptera: Pyralidae (Plodia interpunctella)
Heteroptera (r)		
Coleoptera (r)		
Toxopneustium cylindrusporum		
Diptera esp.	Branchiopoda: Cladocera (Daphnia carinata (m))	Blattaria: Blattellidae (Blattella germanica)
Culicidae (h)	Copepoda: Harpacticidae (Tigropus sp. (h))	Heteroptera: Lygaeidae (Oncomelanus fasciatus)
Ceratopogonidae (h)	Ephemeroptera: Lepophlepiidae (Deleatidium sp. (m))	Notonectidae (Anisops sp.)
Lepidoptera (1-h)	Diptera: Chaoboridae (Chaoborus crystallinus (1), C. trivittatus (h)), Drosidae (Parasixia sp. (h)), Psychodidae	
Verticillium lecanii		
Acari (r)	Acari: Oribatidae (r)	Acari: Phytoseiidae (Phytoseiulus persimilis)
Nematoda (r)	Araneae (r)	Branchiopoda: Cladocera (Daphnia sp.)
Orthoptera (h)	Collembola: Isotomidae (Podura longicornis)	Oligochaeta: Lumbricidae
Thysanoptera (m)	Folsomia cavicola	Diptera: Culicidae (Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Culex pipiens)
Homoptera (h)	Heteroptera: Nabidae (Nabis alternatus (h))	Coleoptera: Coccinellidae (Hippodamia quinquesignata)
Diptera (r)	Hymenoptera: Aphelinidae (Encarsia formosa (1), Apidae (Apis mellifera (1)) Bombyx terrestris (h), Psithyrus bohemicus (r)), Braconidae (Aphidius matricariae (u)), Lysiphlebis sp. (u)), Eulophidae (Diglyphus intermedius (1)), Tetrastichus eriophyes (u)), Ichneumonidae (1), Torymidae (Torymus cyanus (r))	Lepidoptera: Pyralidae (Ostrinia unibilais)

Note: Susceptibility: (h) = high (75 to 100%), (m) = moderate (50 to 75%), (1) = low (<50%), (u) = unknown, (r) = rare, usually known only from single records.

<sup>a</sup> Not susceptible to certain strains.

وفي بعض الاحيان يكون تعريف كلا من الممرض والعائل محل شكوك كما أن المدى العوائلي نادرا ما يتأكد منه تجريبيا. بالإضافة الى ذلك فإن هذه القوائم تعتمد على نوع الفطر بينما أظهرت الدراسات المعملية أن العزلات المختلفة للنوع ذات المدى العوائلي الواسع تكون أكثر عفوانية للعائل الذي عزلت منه أولا. هذا الاختلاف في العفوانية تبعاً لنوع العائل عادة لا يوجد عندما يعدى الفطر خلال الحقن في هيُموسيل العائل. لقد أدى ذلك الاقتراح بأنه في هذه الحالات فإن المقاومة تكون على مستوى الكيونيكل.

الفطريات تكون أكثر تخصصية تحت الظروف الحقلية خاصة خلال الاصابات الوبائية Epizootics. توجد تقارير عديدة تشير الى أن الفطريات تهاجم عائل واحد فقط حتى وجود أنواع حساسة قريبة منه. هذه المقاومة يعتقد أنها تحدث نتيجة للتداخلات الحيوية وغير الحيوية abiotic التي تحدث في الحقل. الأنواع العديدة من الفطريات التي يعتقد أنها ذات تخصص على مستوى الرتبة أو العائلة الحشرية نادرا ما اختبرت لمعرفة عدم قدرتها على إحداث العدوى أو المرضية للأنواع من الرتب أو العائلات المختلفة. بعض الحشرات يسهل عدواها في المعمل بواسطة الفطريات غير المعروف أنها تهاجمها في الطبيعة. من جهة أخرى فإن بعض أنواع الفطريات ذات تخصص على. كمثال فإن العائل الوحيد المعروف لحشرة *Entomophaga maimarga* هي الفراشة الغجرية "ليمتاريا نيسبار" في اليابان. في واحدة من التجارب الخاصة بالمدى العوائلي القليل Entomophthorales نجحت العزلة *E. maimaigu* في عدوى قليل من حشرقيات الاجنحة فقط والتي اختبرت والتي لا تمثل رتب حشرية أخرى. عندما تمت عدوى بديان الفراشة الغجرية عن طريق حقن البروتوبلاست وصلت نسب الموت الى 87-100%. على العكس أدى حقن *E. ulicue* و *E. grylli* من مختلف مصادر الحشرات الى عدم إحداث موت. هذا يوضح أن مقاومة العائل في بعض الفطريات ذات التخصص العائلي ليس من الضروري أن تكون على مستوى الكيونيكل.

التخصص العوائلي يحتاج لمزيد من البحوث والدراسات من منظور مدى إحداث العدوى في مفصليات الأرجل وكذلك من منظور للعوامل أو التداخلات الحيوية واللاحوية المسبولة عن التقييد restriction أو التمديد extension. من منطلق تعضيدات الوضع الحقلية يجب اتخاذ الحيطة والحذر الشديدين عند محاولة استقراء النتائج من التجارب المعملية لما قد يحدث في الحقل.

### التأثيرات على اللافقاريات غير المستهدفة:

أ- النحل وغيره من الملقحات *Pollinators*: نحل العسل يستخدم في الانتاج التجارى للعسل وهو أكثر الملقحات أهمية في المحاصيل الزراعية. من الطبيعي أن الموافقة على استخدام مبيد في الزراعة يجب أن يصاحبه تقييم لتأثير هذا المبيد على نحل العسل. اختبارات الامان هذه مطلوبة لغرض تسجيل المبيد في معظم بلدان العالم بل هي احدى متطلبات التسجيل. لم تسجل أية حالات لأمراض أو اصابات وبائية من جراء استخدام وسيلة مكافحة فطرية على نحل العسل أو غيره من الملقحات الهامة مثل حشرات السيرفيدي *Syrphids*. لقد نشر أن الفطريات سواء المتوطنة طبيعيا أو ذات المقدرة على احداث العدوى في الظروف المعملية ولوان بعض الانواع الاخرى غير قادرة على احداث العدوى في هذه الحشرات الناقعة (جدول ٥- ٣).

العديد من الفطريات وجدت في أنواع *Bombus spp* سواء في المستعمرات الحقلية الطبيعية وكذلك في مستعمرات الصوب تحت الاختبار. على وجه الخصوص تم عزل *B. terrestris* ، *P. fainos* ، *V. Lecani* (سيفادوسبوريم) من ملكات النحل للعديد من أنواع برمس وكذلك *P. bohemicus*. لقد تم عزل بوفاريا برونجباراتي (= تينيللا) من عذارى شغالات نحل العسل. الملاحظات القردية عن بوفاريا باسيانا من الحشرات الكاملة للنحل سجلت بواسطة الباحث *Alves* (١٩٨٧) في البرازيل و *Rombach* (١٩٨٧) في كوريا. لقد عزل *Metarhizium anisopliae* من نحل العسل البالغ كذلك.

لقد أجريت دراسات عديدة في محاولة لعدوى نحل العسل بوسائل المكافحة الفطرية. لقد وجد أن بوفاريا باسيانا ذات مقدرة في احداث عدوى في النحل البالغ حيث أشار الباحث *Vincens* (١٩٢٣) الى انتشار العدوى في النحل المصاب. على العكس أشار الباحث *Toumanoff* (١٩٣١) الى أن الموت الذي لاحظته يرجع الى التوكسينات حيث أنه لم يجد على الاطلاق بوفاريا باسيانا وبوفاريا فارينوسس تستعمر تجويف الجسم. لقد استخدم *Vandenberg* (١٩٨٧) مستحضر تجارى من بوفاريا باسيانا وتحصل على معدلات عدوى عالية بين النحل البالغ في الاقفاص مع جرعت حوالى  $10 \times 10^4$  جراثيم لكل نحلة. في اختبار التحدى في المعمل مع *M. anisopliae* أصبح أقل من ١٠% من النحل المعدى مصابا. لقد سجل أن الفيرتيسيليوم ليكاتى قادرة على احداث العدوى في النحل. هذا ولو أن دراسات أخرى على مستحضرات *V. Lecans*



أظهرت أن الموت يرجع إلى العد "الميكانيكي للفحات التنفسية الصدرية وليس للعدوى".

لقد وجد أن النحل البالغ غير حساس للعدوى بالعديد من الفطريات الأخرى في مختلف الاختبارات. الفطريات التي اختبرت شملت *E.muimiga* ، *C.calvisporus* ، *L.gigateum* ، *H.thompsonii* . حيث أنه لم تسجل أية حالات وبائية في الطبيعة من جراء استخدام وسائل لمكافحة الفطرية بين نحل العسل والملقحات الأخرى فإنه لا يوجد الا خطر قليل على هذه الحشرات إذا أجرى تطبيق هذه الفطريات في الحقول. بالطبع يجب توخي الحيلة والحذر إذا تضمن التطبيق التعريض المباشر لمستعمرات النحل أو السارحات أو جامعات الرحيق Foragers.

ب- ديدان الحرير: الأمراض الفطرية أحدثت انهيار ودمار كالمطاعون في مزارع تربية ديدان الحرير منذ بدأ الإنسان في استخدام الحشرات لإنتاج الحرير. من خلال العمليات والتقنيات الحديثة مثل السيطرة والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة في أماكن تربية دودة الحرير وكذلك اختيار السلالات الجيدة وتباع إجراءات النظافة الصحية تم انحسار الأمراض الفطرية في مزارع ديدان الحرير أو استمرت موجودة في مستوى تحت الحد الاقتصادي. في الحقيقة فإن النجاح في مكافحة الأمراض الفطرية Mycoses المتسببة عن بوفاريا باسيانا في مزارع تربية ديدان الحرير في الصين أدت إلى حدوث نقص حاد في الديدان المعديّة ذات القيمة من منظور الأغراض الطبية. لقد أمكن التغلب على هذا النقص عن طريق تبطين العدوى في عذارى ديدان الحرير بعد لف الحرير.

العديد من أنواع وسائل مكافحة الفطرية المؤثرة تستطيع أحداث الاصابات الوبائية في دودة الحرير *Bombyx mori* . هذه الوسائل تشمل بوفاريا باسيانا، نوميريلاريا، باسولوماسيس فارينوس، ميتاريزيوم لنسوبليا وغيرها. لهذا السبب يكون من غير القانونية أو الشرعية استخدام المبيدات الحشرية الميكروبية في بعض مناطق اليابان والصين. لو أنه لم يحدث أية اصابات وبائية من جراء استخدام بوفاريا باسيانا في دودة الحرير في العديد من مناطق الصين حيث استخدمت على نطاق واسع في مكافحة الآفات حتى عندما طبقت في مزارع على بعد ٧٠ متر من مزارع دودة الحرير.

لقد أكدت نتائج الدراسات التي أجريت في الصين أن استخدام بوفاريا باسيانا في مكافحة الآفات لم تسبب أية أضرار على صناعة الحرير. كجزء من الدراسة تم

وضع أبنية ومظلات دودة الحرير في مزارع الصنوبر. ما بين ١٩٧٥-١٩٧٦ تمت معاملة ١١٠ هكتار ستة مرات بكمية ٢١٠٠ كجم من مستحضر بوفاريا باسيانا. لقد تحصل على مكافحة جيدة لديدان الصنوبر وكان وجود العدوى بالبوفاريا باسيانا في ديدان الحرير أقل من ٤%. هذا غير مختلف احصائيا عن الموت في مناطق التربية غير المعاملة. أوضحت دراسات معملية اضافية أن سلالات بوفاريا باسيانا التي عزلت من ديدان الصنوبر كانت ١٠٠ مرة أقل في العنقوانية على ديدان الحرير عن السلالات التي عزلت من الاخيرة. لقد سجلت نفس الاختلافات في حساسية *Bombyx mori* للعزلات المختلفة من البوفاريا باسيانا.

ج- المفترسات وأشباه الطفيليات: لكي نحصى وسائل مكافحة الحيوية اللاقترية للآفات الحشرية يجب أن نأخذ في الاعتبار التأثيرات المعاكسة الممكنة لوسائل مكافحة الفطرية على هذه الكائنات. لقد اتضح في عدد من الحالات أن الفطريات قد تكون ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر على المفترسات وأشباه الطفيليات. لقد أظهرت دراسات أخرى أن الاثنان قد يتوافقا في نفس الوقت. لقد لوحظت الامراض الفطرية *Mycoses* في عدد من المفترسات وأشباه الطفيليات (جدول ٥-٣). القليل معروف عن وبائية *epizootioly* لهذه الامراض الفطرية والتأثيرات الناتجة على مكافحة الانواع المستهدفة ولو أن الدلائل كلها تشير الى أن المرضية الفطرية في الطبيعة في هذه الحشرات غير شائعة نسبيا والعديد من الانواع تقاوم العدوى. من الاستثناءات حدوث وبائية الاصابة من البوفاريا باسيانا في مفترسات ابي العيد في البيات الشتوى. لقد أدى ذلك الى الاقتراح بأن استخدام بعض وسائل مكافحة الحيوية قد يؤثر عكسيا على بعض مجاميع المفترسات خلال البيات الشتوى. البوفاريا باسيانا تحدث كذلك اصابات وبائية في مزارع التربية الموسعة للمفترس *Dendroctonus* وهو *R.grandis* ولو أن هذه العدوى يمكن السيطرة عليها عن طريق الاجراءات الخاصة بالنظافة الصحية.

في احدى الدراسات القليلة التي صممت لتحديد تأثيرات استخدام الفطريات على الكائنات غير المستهدفة *NTO's* وجد الباحثين أن استخدام جراثيم *B.brongriartii* *blastospores* في مكافحة خنفساء مايو *M.melolontha* أدت الى احداث عدوى شاملة بمعدل ١,١% في اللاقترية غير المستهدفة. لم تسجل أية عدوى في المفترسات مثل ابي العيد وشبكيات الاجنحة ولو أن أكثر من ٩% من العناكب وجدت مصابة. لذلك

خلص الباحثون الى أن استخدام البوفاريا برونجيراتي لم يضر بمجموع اللافقاريات غير المستهدفة حيث أن الموت الشامل كان منخفضا كما أن مصدر العدوى سرعان ما يختفي من البيئة.

وسائل مكافحة الفطرية قد تؤثر على المفترسات وأشباه الطفيليات بطريق غير مباشر من خلال خفض مجموع العائل أو في حالة أشباه الطفيليات من خلال المنافسة فيما بينها في نسيج العائل. المثال التقليدي للتأثيرات غير المباشرة عن طريق خفض تعداد العائل ما وجده الباحثان Ulliyett and Schonken (١٩٤٠) في جنوب أفريقيا. لقد وجد أن الوباء الطبيعي يحدث في بداية الموسم.

لو أن أشباه الطفيليات بوجه عام لا تعدى بالفطر داخل نسيج العائل. فإن العديد من الدراسات أظهرت أن كلا أشباه الطفيليات والممرضات قد تتنافس على نسيج العائل. أشباه الطفيليات تجعل العائل ميلا للعدوى. في العادة يتقادم الممرض الاطوار المبكرة من أشباه الطفيليات بينما الاطوار المتأخرة العجوزة تكون ذات مقدرة على استكمال تطورها. لقد حدث ذلك في العلاقات الفطر/شبيه الطفيل/العائل بين *Nomuraea* *Microplites croceipes* /rileyi و *Heliothis zea* وغيرها. تسهيل عدوى الفطر في العوائل المتطفل عليها يعتقد أنها نتيجة لضف جلد العائل مما يسهل من دخول الفطر. التطور المتتابع للفطر داخل العوائل المتطفل عليها تثبط بواسطة مادة مضادة للفطر antimycotic تعزز بواسطة شبيه الطفيل. المادة المضادة للفطريات تنتج كذلك بواسطة بكتريا المعيشة التكافلية Symbiotic bacteria المسماء *Xenorhabdus nematophilus* في النيماتودا الممرضة للحشرات *S.feltiae*. بالرغم من ملاحظة العدوى الفطرية للنيماتودا الممرضة للحشرات إلا أنه لا يعرف ما اذا كانت المواد المضادة للفطريات تحمي النيماتودا من العدوى بالفطر داخل عائلها.

لقد أجريت دراسات قليلة نسبيا لمعرفة التوافق Compatibility بين الفطريات الممرضة للحشرات مع أنواع أشباه الطفيليات أو المفترسات الطبيعية أو المدخلة بهدف تحديد أيهما يستخدم بكفاءة أكثر في الإدارة المتكاملة للآفات. التواجد المرافق الفعال Coexistence للأنواع هيرسوتيللا، ميوفاجس، أنتوموفثورا والطفيليات والمفترسات في مكافحة مفصليات الأرجل في بساتين الموالح تأكد في فلوريدا. لقد وجد Ignoffo أن الانتشار الوبائي للفطر نوميوپاريلياي في حرشفة الاجنحة عن التوكثويد بلاتيبينا سكبيرا لم يؤثر بشكل واضح على كفاءة معقد الطفيل الطبيعي على الافاق. لقد أظهرت العديد من الدراسات والتوافق بين الفطر وأشباه الطفيليات أو المفترسات في برامج

الإدارة المتكاملة للآفات. لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في البرازيل أن من الممكن استخدام الفطر *Metarhizium anisopliae* وثلاثة من أشباه الطفيليات لتأقية قصب السكر دياتريا ساكلاليس في توافق في برامج مكافحة آفات قصب السكر. لقد تحققت نجاحات أكثر باستخدام وسائل مكافحة الحيوية الفطرية في توافق مع المفترسات وأشباه الطفيليات في الصوب. يمكن استخدام الغرينيسيلوم ليكانى مع الاكاروس المفترس الفيتوسيليس بيرسيميليس والذبور النافع انكارسيا فورموزا. لقد اتضح أنه في العديد من الحالات فإن وسائل مكافحة الحيوية الفطرية يمكن أن تتكامل مع أشباه الطفيليات والمفترسات. إن استراتيجية إطلاق الفطريات الممرضة للحشرات وأشباه الطفيليات تأكدت أهميتها. في العديد من الحالات تأكد حدوث توافق من خلال الفعل المشترك ضد العائل ومنع التضاد والمنافسة أو التثبيط بين كلا أنواع وسائل مكافحة الحيوية.

د- الكائنات الأخرى: ولو أن العديد من الفطريات معروف عنها المقدرة على عدوى اللاقاريات غير الحشرية فإنه مع قليل من الاستثناءات فإن الفطريات الممرضة للحشرات لا تحدث في هذه الكائنات. أكثر اختبارات التحدى على الكائنات غير المستهدفة أجريت على الفطريات الممرضة للبعوض *C. opifexi* ، *L. giganteum* ، *L. chapmani* ، *C. clavisporus* و *M. anisopliae*. أظهرت نتائج هذه الدراسات أن هذه الفطريات غير ضارة لمعظم اللاقاريات المائية غير المستهدفة. نقص العدوى الطبيعية في هذه الكائنات عضدت هذه النتائج. لذلك فإنه قد توفرت الأدلة على أن الممرضات الحشرية الفطرية ذات كفاءة في برامج مكافحة مع الحشرات أكثر منها مع اللاقاريات الأخرى.

الخلاصة: المعلومات المتوفرة حالياً على كفاءة وسائل مكافحة الفطرية توضح أن هذه الكائنات ذات أقل خطورة على الكائنات غير المستهدفة. في الحقيقة فإنه بمقارنتها بالمبيدات الحشرية الكيميائية أن وسائل مكافحة الحيوية الفطرية تقدم من بين المميزات الأخرى طريقة مكافحة ذات مدى عوالتى ضيق جداً يمكنها أن تتكامل مع غيرها من وسائل مكافحة الحيوية ومن ثم تستطيع أن تحقق مكافحة على المدى الطويل من جراء استقرارها وتكاثرها في المسكن ومكان المعيشة علاوة على قابليتها للتدهيل الجوى *biodegradable*.

من أفضل الحالات الموثقة عن التأثيرات الضارة للفطريات الممرضة للحشرات على اللاقاريات غير المستهدفة تتمثل في التأثيرات غير المباشرة على مجاميع المفترسات وأشباه الطفيليات من خلال استنزاف العائل. في بعض الحالات قد يحدث الفطر تأثيرات معاكسة مباشرة على بعض اللاقاريات غير المستهدفة بما فيها المفترسات وأشباه الطفيليات. يجب الإقرار بأنه من غير الممكن تقليل مستوى مجموع الآفة دون أحداث تأثيرات معاكسة مباشرة على بعض اللاقاريات غير المستهدفة بما فيها المفترسات وأشباه الطفيليات. يجب الإقرار بأنه من غير الممكن تقليل مستوى مجموع الآفة دون أحداث تأثيرات معاكسة على مكون آخر من النظام البيئي، على سبيل المثال أنه مع انحسار أو خفض مجموع العائل فإنه يكون من المحتوم حدوث تأثيرات معاكسة على المفترسات والطفيليات في هذه الحالات تكون مسئولية القائم بإدارة التعامل مع الآفات أن يحقق التكامل في استخدام وسائل مكافحة الحيوية حتى يستطيع استخدام كل طرق المكافحة المتاحة في نظام أكثر كفاءة وعقلانية. كمثال فإن الحفاظ على الحشرات النافعة قد تتطلب فقط توقيت مناسب لاستخدام الفطريات.

في أي حالة يجب التأكيد من أن الفطر موصف وراثيا وبديهيًا لاينتج عنه الا أقل المخاطر ومع هذا يجب أن يدرك التعامل معه بشكل يحقق الامان. لذلك فإن تسجيل الفطريات ووضع معايير ومحددات لها من الاهمية بمكان. معظم الدلائل الخاصة بتسجيل الفطريات الممرضة للحشرات تتطلب اجراء اختبارات على مقدرة العدوى لللاقاريات غير المستهدفة. إن محدودية المعلومات الحالية عن تخصص الفطريات وكيفية ارتباطها بحدوث الاصابات الوبائية تجعل من المستحيل استقراء البيانات المتحصل عليها تحت ظروف الحقل. الدراسات المحدودة عن العدوى في المعمل مع المنتج المجهز ضد اللاقاريات غير المستهدفة قد تؤدي الى تعريف مخاطر استخدامها تحت الظروف الحقلية.

محدودية استخدام وسائل المكافحة الحيوية الفطرية ترجع الى نقص تواجد المستحضرات النهائية. القطاع الخاص في المقابل يرفض تطوير المنتج الذي يتطلب اختبارات لتأكيد الامان بتكاليف عالية ودراسات مكثفة قبل الوصول لمرحلة التقييم الحقلية. لذلك فإنه من غير الممكن تجنب اجراء كل متطلبات التسجيل وتأكيد الامان ولكن يجب بل من الضروري تحقيق ذلك دون التأثير على نتائج وخطوات اجراء الاختبارات واستخدام هذه المستحضرات. من أفضل الاقتراحات لتأكيد الامان على المدى الطويل على اللاقاريات هو استمرار اجراء الاستكشاف خلال التطبيق الحيوي بعد الاختبارات الأولية على مستوى المعمل والحقل.

## REFERENCES

- Alves, S. B., Personal communication, 1987.
- Anon., Annual Report Rothamsted Experimental Station, United Kingdom, 1984, 93.
- Cameron, J. W. M., Suitability of pathogens for biological control, in *Insect Pathology and Microbial Control*, Proc. Int. Coll. Insect Pathol. Microb. Control, Wageningen, 1967, 182.
- Chapman, H. C., Davidson, E. W., Laird, M., Roberts, D. W., and Undeen, A. H., Safety of microbial control agents to non-target invertebrates, *Environ. Conserv.*, 6, 278, 1979.
- Engler, R. and Arata, A. A., Public health and environmental safety, in *Tests: The Future for Biological Methods in Integrated Control*, Laird, M., Ed., International Development and Research Center, Ottawa, 1977, 157.
- Ferron, P., Biological control of insect pests by entomogenous fungi, *Annu. Rev. Entomol.*, 23, 409, 1987.
- Ferron, P., Pest control by the fungi *Beauveria* and *Metarhizium*, in *Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970-1980*, Burges, H. D., Ed., Academic Press, London, 1981, 465.
- Flexner, J. L., Lighthart, B., and Croft, B. A., The effects of microbial insecticides on non-target, beneficial arthropods *Agric. Ecosyst. Environ.*, 16, 203, 1986.
- Hall, R. A., Zimmermann, G., and Vey, A., Guidelines for the registration of entomogenous fungi as insecticides, *Entomophaga*, 27, 121, 1982.
- Ignoffo, C. M., the fungus *Nomuraea rileyi* as a microbial insecticide, in *Microbial Control of Pests and Plant Diseases: 1970-1980*, Burges, H. D., Ed., Academic Press, New York, 1981, 513.
- Jatala, P., Personal communication, 1987.
- Muller-Kogler, E., *Pilzkrankheiten bei Insekten*, Paul Parey, Berlin 1965.
- Pimental, D., Glenister, C., Fast, S., and Gallahan, D., Invernonmental risks of biological pest controls, *Oikos*, 42, 283, 1984.
- Rombach, M. C., Personal communication, 1987.
- Steinhaus, E. A., *Principles of Insect Pathology*, McGraw-Hill, New York, 1949.
- Toumanoff, C., Action des champignons entomophytes sur les abeilles, *Ann. Parasitol. Hum. Comp.*, 9, 162, 1931.
- Ulyett, G. C., and Schonken, D. B., A Fungus disease of *Plutella maculipennis* Curt. In South Africa, with notes on the use of entomogenous fungi, *Union S. Afr. Dep. Agric. For. Sci. Bull.*, 218, 1, 1940.
- Vincens, F., Sur l'usage de *Baeuveria bassiana* produite experimentalement sur des abeilles, *C. R. Acad. Sci.*, 177, 713, 1923.

ثانيا: أمان الوسائل الحيوية النيماتودية:

مدى النيماتودا التى تؤثر على الحشرات كبير كما أن التداخلات بين النيماتودا والحشرات مختلفة ومتفاوتة. لقد أمكن تمييز بعض أنواع النيماتودا كأحياء مفيدة فى مكافحة الحيوية والقليل منها أختبر على النطاق التجارى. لو أن النيماتودا *Romanomermis culicivox* تنتج تجاريا بغرض مكافحة البعوض الا أن هذا الانتاج قد توقف. النيماتودا التى تستخدم فى الوقت الراهن فى مكافحة الحشرات هى *Deladenus siricidicola* وهو طفيل متخصص لمكافحة دبور الخشب سيريكس نوكتيليو وكذلك الممرضات الحشرية ذات المدى العوائل العريض *Steinernematidae* و *Heterorhabdiidae*.

نيماتودا *Dealenus siricidicola*: اطلاق النيماتودا هذه كوسيلة حيوية تقليدية فى مكافحة ضد دبور الخشب فى استراليا عام ١٩٧٠ كانت من أول التطبيقات الناجحة للنيماتودا فى مكافحة الآفات الحشرية. فى الوقت الراهن توزع هذه النيماتودا وتستخدم فى مئات أو الاف الهكتارات.

أ- تاريخ الحياة: دبور الخشب *S.nocilio* من الآفات الخطيرة للصنوبر بينس (المتوطنة فى جنوب كاليفورنيا) فى استراليا ونيوزيلندا. الانثى البالغة تتجنب للشجرة العائل وتضع البيض وحينئذ تقوم بحقن الشجرة بجراثيم الفطر *Amylostereum areolatum*. تقوم يرقات الحشرة *Siricid* تتغذى على الخشب المتحلل بالفطريات ثم تحدث الاتفاق فى الشجرة. توجد ثلاثة أنواع من الأعداء الطبيعية لدبابير الخشب فى الميريسيد وهى: أشباه طفيليات البيض (غشائية الاجنحة *Ibaliidae*) وأشباه طفيليات اليرقات (غشائية الاجنحة *Ichneumernidae*) والنيماتودا المتطفلة (*Neotylenchidae*: *Deladenus spp*). أحد أنواع هذه النيماتودا وهى *D.siricidicola* تعتبر من وسائل مكافحة الكبرى لدبور الخشب.

دورة الحياة غير العادية للنيماتودا *D.siricidicola* درست بواسطة الباحث *Bedding* (١٩٧٢، ١٩٦٧). الانثى البالغة للصورة الحشرية المتطفلة *Entomogenous* تتطور فى هيوسيل الدبور البالغ المصاب. عند تعثر العائل يوجد نمو زائد كالاتفجار فى الجهاز التناسلى لنيماتودا وتنتج ما يزيد عن ١٠٠٠٠ بيضة لكل فرد نيماتودا. الافراد حديثة الفقس الشبابية *juveniles* تهرب من الاب الى هيموليف الحشرة وتهاجر الى مبايض العائل أو الخصيعة. فى انثى *S.nocilio* (معظم السلالات) فان النيماتودا

الشباب تلتصق أو تحزم في البيض مما يجعل البيض غير حى *nonviable*. أفة خشب الصنوبر *S.noctilio* المعدية تضع البيض طبيعيا وفى هذا السبيل تنقل النيماتودا الى الاشجار الجديدة.

النيماتودا *D.siricidicola* تنتقل بواسطة اناث دبور الخشب التى تتغذى على الفطر الذى يعيش تكافليا مع الحشرة *A. volatum* وينمو داخل الحشرات الكاملة الملتزمة للفطر *mycetophagous* خلافا لأبويها المتطفلة. الصورة الملتزمة لمسيليوم الفطر فى النيماتودا سيريكيديكولا تتغذى وتنمو وتتكاثر فى *tracheids* وقنوات الراتنج وبين القلف والكاميسيوم ثم تنتشر خلال الشجرة. حيث أن دبور الخشب *S.nocilio* يهاجم الاشجار خاصة التى تجذبها مع العلم بأن الشجرة الحساسة تهاجم فى العادة بالعديد من انث دبور خشب الصنوبر. مجموع النيماتودا المنتشرة سوف يتلف البرقات التى فقست فى البيض الموضوع بواسطة الحشرات غير المصابة. فى البيئة الدقيقة المحببة يبرقات دبور الخشب يحدث تغير فى تطور النيماتودا الشابة *Juvenile* بدلا من التطور فى اليافعات الاكولة للهيفات فاتها قد تصبح فى طور الاناث المعدية أو الذكور فيها كل من الجين المنوى أكثر قليلا من النواه عما هو الحال مع الجين المنوى الالمبى الذى يوجد فى جيل الانتهاام الفطرى. بعد التزاوج قد تكون الاناث فى الطور المعدى بالقنب خلال كيوتيكل يبرقات دبور الخشب "نخل الى الهيموسيل".

ب- التخصص *Specificity*: لقد قام *Bedding and Akhurst* (١٩٨٧) بفحص التفضيل الغذائى للنيماتودا من أنواع ديلادينس المرتبطة بدبابير الخشب من *Siricid* وأشباه الطفيليات الحشرية الخاصة بها. الصورة الجاذبة للحشرات فى *D.siricidicola* تنطلق بنجاح على بعض أنواع السيريسيد والسيروباليين بارباتس وهى من الخنافس الشائعة المرتبطة بالميريبيدات. الصورة الملتزمة للفطريات اكثر تخصصا. ولو أن *D.siricidicola* يتغذى بدرجة بسيطة على الفطريات من أجناس أخرى فان النيماتودا سوف تتكاثر عندما تتغذى على عائل واحد فقط هو *A. areolatum*. حتى فى المعيشة التكافلية *Symbion* لبعض أنواع سيريسيد فان *A.chailleni* لا بعضد التكاثر بواسطة النيماتودا المعروفة *D.siricidicola*.

ج- التأثير على اللافقاريات غير المستهدفة: يمكن النظر الى النيماتودا *D.siricidicola* على أنها طفيل يحفز انتقاله الى الى العوائل الجديدة بواسطة التضاعف فى البيئة التى يوجد فيها عائله أو ينظر اليها على أنها متغذى فطرى



تستخدم العائل الحشرى كوسائل للنقل الى الطريات الطازجة. فى طريق اخر فانها ترتبط فى البيئة لعوائلها من سيرسييد عن طريق التخصص الكامل لدورة التهام الفطر *mycetophagous cycle* الى الفطريات. *Aureolulum* واعتماده على هذه الدورة. فى داخل البيئة توجد فرصة لاحداث العدوى فى عدد قليل نسبيا من الكائنات غير المستهدفة *NTOs*. لو أن النيماتودا تدخل يرقات أشباه الطفيليات الحشرية لعوائلها من السيرسييد فإن النيماتودا تكون غير قادرة على استكمال تطورها ومن ثم لا تحدث أضرار لأشباه الطفيليات. اللافلاريات الوحيدة غير المستهدفة التى تصار هى تلك التى تعدى وتصيب أشجار السيريكس الميتة أو المقولة. من غير المحتمل أن أى لاقرى داخلى يعتمد كلية على *Pinus radiata* حيث تستخدم النيماتودا *D.siricidicola* فى مكافحة لأن الشجرة ما هى الا نوع دخيل.

#### النيماتودا *Steinernematidae* و *Heterorhabdidae*:

النيماتودا من عائلتي ستيرنيماتى وهيتيرورابتيدي ذات دور فعال فى مكافحة مدى واسع من الافات الحشرية. حيث أن تطور طرق الانتاج الواسع والاقتصادى والتخزين يحز ويشجع مجهودات الحصول على نيماتودا يمكن أن تنتج وتستخدم على المستوى التجارى.

أ- دورة الحياة: الطور المعدى للنيماتودا يوجد عادة فى التربة أو مقلب النفايات وهو يعتبر طور شاب غير متغذى يحمل نوع واحد فقط من البكتريا وهى النوع المرتبط المتخصص *Xenorhabdus* داخل أمعائه. فى غياب العائل المناسب فإن الشابات القادرة على العدوى قد تدوم شهور أو حتى سنوات بدون التغذية وتجذب النيماتودا للعائل الحشرى وتدخل خلال الفتحات الطبيعية (الفم- الشرج. الثغور التنفسية) وفى حالى النوع *Heterorhabditis* تتغذ وتخرق مباشرة خلال الكيوتكل غير المتغلظ *Unsclerotized cuticle*. تقوم للنيماتودا بغزو الهيموسيل حيث يحرر البكتريا المرتبطة به. يموت العائل مع تكبير وتضخم البكتريا فى الضحية أو الجيفة *Catamer* مع انتاج المواد المغذية الضرورية للنيماتودا والعوامل المضادة للميكروبات التى تثبط نمو العديد من الكائنات الدقيقة الأخرى. النيماتودا تتغذى وتتكاثر داخل الحشرات الميتة وتنتج جيل جديد من الشابات القادرة على احدث العدوى والتى تهاجر بعد ذلك من الجيفة.

ب- **التخصص:** أوضحت الدراسات المعملية أن هذه النيماتودا ما هي الا ممرضات حشرية غير متخصصة. لقد تأكد نقص التخصصية لأى عائل حشرى معين من خلال اجتذابها لمكونات شائعة للبيئة التى توجد فيها (مثل ثانى أكسيد الكربون، البكتريا السالبة لجرام وبعض الايونات). لذلك يمكن القول أنه حتى مع الظروف النموذجية التى يتم توفيرها فى المعمل فإن أى نوع نيماتودا لا يكون ذات قدرات متساوية على العدوى مع كل الانواع الحشرية والاطوار الخاصة بكل نوع. الاختلافات فى حساسية الانواع والاطوار الحشرية قد ترجع الى عدد من العوامل. النيماتودا مقيدة لعزل العوامل الخاصة. خلال الفتحات الطبيعية (الم- الشرج- الثغور التنفسية) للنيماتودا *Heterorhabditis* يكون عن طريق الكيونيكل غير المغلف. بالتبعية ان العدوى قد تنخفض من العوامل أو الاطوار الصغيرة جدا والتي فيها حماية للفتحات الطبيعية بواسطة الوسائل الطبيعية والسلوكية أو حيث يكون الكيونيكل غير المغلف غير معرض للنيماتودا. لا تستطيع النيماتودا الوصول ومن ثم تكون غير قادرة على احداث العدوى فى العذارى المكسوة أو المغطاة وربما فى حالة أطوار الراحة المكسوة بخلايا ترابية مضغوطة. وفى سياق عدم المقدرة فى منع دخول النيماتودا فإن بعض الحشرات تكتسب بعض الحماية عن طريق استجابات المناعة. الحشرات الاجتماعية ذات استجابات سلوكية تنقل من تأثير النيماتودا على مجموع الحشرة.

كفاءة وفاعلية النيماتودا ضد بعض الانواع الحشرية الخاصة قد تنخفض بسبب الموطن البيئى الذى يحتمل بواسطة الحشرة. حساسية النيماتودا للجفاف والاشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة العالية تحدد وتقيد بدرجة شديدة كفاءتها على السطوح المعرضة. المدى الحرارى الذى تتمكن أنواع النيماتودا *Steinernema* و *Heterorhabditis* من احداث العدوى والتكاثر فى الحشرات يحدد كذلك كفاءتها وفعاليتها على الانواع الحشرية التى تحتمل البيئات الظليلة خلال الفترات التى تكون فيها الحرارة منشطة لنشاط النيماتودا.

ج- **الحشرات المستهدفة:** لقد استخدمت النيماتودا *Steinernema* و *Heterorhabditis* بنجاح فى مكافحة الناقبات الضارة الحشرية. فى هذه التطبيقات فإن النيماتودا التى اكتسبت مقدرة على الدخول فى الثقوب التى تحدثها الحشرة تكون محمية ضد الاشعة فوق البنفسجية والجفاف. حيث أن تلك الافراد التى تبقى على سطح النبات أو تتجرف

على سطح التربة تكون ممرضة لهذه العوامل. لن استخدام أنواع نيماتودا *Heterorhabditis* بفيد كوسيلة تجارية في مكافحة خنفساء العنب السوداء *Otiorrhynchus sulcatus* في الصوب والمشاتل. في هذه البيئة الصناعية توجد احتمالات مخاطر قليلة على اللافقاريات النافعة.

لو أن تعرض النيماتودا على الاسطح الممرضة يحدد من استخدامها ضد الحشرات التي تتغذى على المجموع الخضرى فإنه توجد بعض الظروف التي تمكن من استخدامها. العديد من الانواع التي تتغذى على الاوراق تنزل الى التربة للتغذر ومن ثم يمكن أن تكافح بواسطة النيماتودا في هذا الطور (مثل ثاقبة الخوخ *Carposina nipponensis*). في حالة واحدة على الأقل يكون من الممكن مكافحة الانواع التي تتغذى على الاوراق بواسطة استخدام النيماتودا مباشرة على المجموع الخضرى. معاملة واحدة لنيماتودا *S. Feliae* على الكريزانتيم التالي في بيوت محمية ظليلة توقف الضرر والتلف الذى تحدثه الدودة القارضة *S. exigua* التي تتغذى على المجموع الخضرى. العديد من الحشرات لها أطوار تعيش في التربة ومن ثم تكون أهداف واضحة للنيماتودا الملتزمة للحشرات وهذا قد يؤثر بدرجة كبيرة على اللافقاريات غير المستهدفة *NTO's*.

#### د- التأثير على اللافقاريات غير المستهدفة:

##### ١- الحشرات: الطفيليات والمفترسات وغيرها

أ- أشباه الطفيليات *Parasitoids*: في التجارب المعملية تم عدوى أشباه الطفيليات الحشرية بواسطة أنواع النيماتودا *S. Heterorhabditis*. عندما تم عدوى عائل الدودة القارضة *H. exiguae* بالنيماتودا *S. carpocapsae* ٢٤ ساعة قبل خروج شبيه الطفيل لم يتحصل على أشباه الطفيليات البالغة. لقد تم عدوى أشباه الطفيليات من غشائية الاجنحة *G. militaris* و *H. exiguae* والتاكنيدى *C. concinnata* عند خروجها من العوائل للتغذر. *S. carpocapsae* التي تعدى *G. militaris* تلامس بوضوح أشباه الطفيليات بالصدفة أكثر منها عن طريق الجنب. على نفس المنوال فان أشباه الطفيليات فى التاكنيدى *Myxenorhizops sp.* لذباب القش *C. abietis* ليست جانبية للنيماتودا *S. karussei* بينما أشباه الطفيليات تبقى داخل العائل الميت. لم يوجد دليل يشير الى العدوى بواسطة النيماتودا للتاكنيدى أو أشباه الطفيل

ايكونيوميد *C. abietis* في الحقل. لم تحدث عدوى للطفيل ثنائي الاجنحة *S. myopaeformis* باستخدام النيماتودا *Steinernema* في مكافحة عائله. أظهرت التجارب المعملية كذلك أن التاكينيد البالغ حساس كذلك للنيماتودا كما في حالة *M. minense* للنيماتودا *S. carpocapsae*. كذلك وجد أن بلغات *C. concinnata* حساسة كذلك للنيماتودا. النيماتودا قد تؤثر كذلك على أشباه الطفيليات الحشرية. عندما حدث تطفل لحشرة *M. unipuncta* في طور اليرقى بواسطة *G. militaris* وعرضت لشبيه الطفيل *S. carpocapsae* حتى يومان قبل أن يخرج شبيه الطفيل من العائل مما يجعل أشباه الطفيليات غير قادرة على اكتمال التطور بسبب موت العائل. لقد أشار الباحث *Ishibashi* وآخرون (١٩٨٧) أن ٥٠% فقط من شبيه الطفيل المنبثق *T. apantelectemus* من أبي دقيق الكربن تعدى وتصاب بالنيماتودا *S. carpocapsoc* قبل أن يتعدى شبيه الطفيل. لقد وجدت قيود مشابهة على اكتمال التطور مع أشباه طفيليات التاكينيدى. النيماتودا ذات تأثير قليل على أطوار العذارى لأشباه الطفيليات. لقد كانت النيماتودا غير قادرة على اختراق الشرائق غير النافذة لأشباه الطفيليات من غشائية الاجنحة *C. medicaginis*. كانت تحدث عدوى في عذارى *G. militaris* فقط في حالة ما اذا كانت النيماتودا على أو في الحشرة قبل أن يستكمل شبيه الطفيل تكوين الشرنقة.

**ب- المفترسات *Predators*:** في الدراسات المعملية كانت تحدث عدوى في مناسبات لمفترسات ثنائية الاجنحة *C. abietis* ونقل بواسطة النيماتودا *S. krausspi*. لم يتمكن بعض الباحثين من اثبات حدوث أى عدوى للمفترسات في الحقل. عندما تتغذى المفترس من نصفية الاجنحة *A. dohrni* على *M. neusri* بعد ٢٤ ساعة من العدوى بالنيماتودا *S. carpocapsae* ثم عدوى ٢٠% من المفترسات. هذا المعدل من العدوى ربما تتحقق بواسطة تركيز للطور المعدى من النيماتودا في وجود عائل حشرية الاجنحة مما يعرض المفترس لجرعة صناعية عالية.

**ج- حشرات أخرى:** أظهرت الاختبارات المعملية أن اليرقات والافراد البالغة من نحل العسل حساسة للنيماتودا. لقد وجد الباحث *Kaya* وآخرون (١٩٨٢) أن رش النيماتودا مباشرة في خلايا النحل تسبب بعض الوفيات في اليوم الثالث بعد الرش ولكنها لم تؤثر عكسيا على مستعمرة النحل. الحرارة والرطوبة المنخفضة في الخلية لم تحفز بشكل واضح عدوى وتطور النيماتودا. ولو أن الرش المباشر للنيماتودا على شغالات النحل أدى الى حدوث اصابة بمقدار ٤- ١٠% فقط فإن *Kaya* وآخرون

(١٩٨٢) أوصوا بأن تطبيق هذه المعاملة بالنيماتودا يجب أن يتم والنحل في وضع عدم السرحان. عندما تم رش النيماتودا على التفاح والكمثرى لمكافحة الثاقبات من الفراشة *Zeuzera pyrina* لم يحدث تأثير واضح على الذباب أو الدبابير أو النحل في البيئة. استخدام النيماتودا *S. carpolapsae* شهريا (٥٠٠ سم<sup>٢</sup>) على الأرض لمدة ٦ شهور أدت إلى تباين كبير في مستوى الكولومبولا (كذلك الاكروسات ومفصليات الأرجل الأخرى) بعد وقت قصير من المعاملة ولكن التأثيرات لم تكون في مجموع الآفات.

٢- مفصليات الأرجل الأخرى: لم يوجد ما يشير إلى حدوث عدوى طبيعية بواسطة النيماتودا *Heterohabdiis* ، *Steinernematid* في العوائل غير الحشرية. هذا ولو أن العناكب وعمال الحصاد والعقارب الكاذبة تم عواها عندما تعرضت لتركيزات عالية جدا (أكثر من ١٠٠٠ سم<sup>-٢</sup>) من هذه النيماتودا على ورق التشريح. على العكس فإن استخدام النيماتودا في التربة من تلك التي تحدث مستويات عالية من الموت في الخنافس والسوس من النوع *Otiorrhynchus spp.* لم تقتل العناكب أو ذات القدمات كما أن تكرار معاملة التربة بالنيماتودا *S. carpocapsae* لم تطول التأثير على مجاميع *Myriapod* (عديدات الأرجل). للكلروس المفترس الذي يتغذى على الطور المعدي للنيماتودا وجد أن ستة معاملات من النيماتودا في التربة على فترات شهرية لم تحدث تأثيرات طويلة المدى على مجاميع الاكروسات.

٣- اللاقاريات الأخرى: استخدام جرعات عالية من النيماتودا *S. glaseri* أثرت عكسيا على نيماتودا تعقد الجنور في الأرض *Meliodogyne jurueica*. لو أن إضافة النيماتودا إلى التربة أدت إلى خفض ابتدائي في مجاميع النيماتودا المتوطنة إلا أن هذه المجاميع شفيت أو زادت عن المستويات الأصلية خلال أسابيع قليلة. كثافة الأنواع المتطفلة على النباتات انخفضت لاسبوع قليلة عام ١٩٨٤ ولكنها لم تحدث كذلك في تجارب ١٩٨٥. لم تتأثر ديدان الأرض بواسطة النيماتودا حيث كانت النيماتودا قادرة على التكاثر في ديدان الأرض الميتة ولكنها كانت غير قادرة على قتل النيماتودا السليمة ولم تزيد نسب الموت للديدان النافعة.

## REFERENCES

- Taylor, K. L.. The introduction and establishment of insect parasitoids to control *Sirex noctilio* in Australia, *Entomophaga*, 21, 429, 1976.
- Bedding, R. A., Parasitic and free-living cycles in entomogenous nematodes of the genus *Deladenus*, *Nature*, 214, 174, 1967.
- Bedding, R. A., Biology of *Deladenus siricidicola* (Neotylenchidae) an entomophagous-mycetophagous nematode parasitic in siricid woodwasps, *Nematologica*, 18, 482, 1972.
- Bedding, R. A. and Akhurst, R. J., Geographical distribution and host preferences of *Deladenus* species (Nematoda: Neotylenchidae) Parasitic in siricid woodwasps and associated hymenopterous parasites, *Nematologica*, 24, 286, 1978.
- Kaya, H. K. and Hochkin, P. G., The nematode *Neoaplectana carpocapsae* Weiser and its effect on selected ichneumonid and parasites, *Exp. Entomol.*, 10, 474, 1981.
- Welch H. E. and Bronskill, J. F., Parasitism of mosquito larvae by the nematode, DD 136, *Can. J. Zool.*, 40, 1263, 1962.
- Schmiede, D. C., The feasibility of using a neoaplectanid nematode for control of some forest insect pests, *J. Econ. Entomol.*, 56, 427, 1963.
- Miller, L. A. and Bedding, R. A., Field testing of the insect parasitic nematode, *Neoaplectana bibionis* (Nematoda: Steinernematidae) against currant borer moth, *Synanthedon tipuliformis* (Lep.: Sesiidae) in blackcurrants, *Entomophaga*, 27, 109, 1982.
- Begley, J. W., Control of foliar feeding lepidopterous pests with entomophagous nematodes, 20<sup>th</sup> Annu. Meeting, Soc. Invertebr. Pathol., Gainesville, FL, 1987, 65.
- Kaya, H. K., Infecivity of *Neoaplectana carpocapsae* and *Heterorhabditis heliothidis* to Pupae of the parasite *Apanteles miliaris*, *J. Nematol.*, 10, 241, 1978.
- Ishibashi, N., Fah-zu Young, Nakashima, M., Abiru, C., and Haraguchi, N., Effects of application of DD-136 on silkworm, *Bombyx mori*, a predatory insect, *Agriosphodorus dohmi*, a parasitoid *Trichomalus apantelectenus*,

- soil mites and other non-target soil arthropods with brief notes on feeding behaviour and predatory pressure of soil mites, tardigrades, and predatory nematodes in Japan, Report to Ministry Advances in Biological Control of Insect Pests by Entomogenous Nematodes in Japan. Report to Ministry of Education Culture and Sciences, Japan, 1987, 158.
- Kaya, H. K., Marston, J. M., Lindegren, J. E., and Peng, Y. S., Low susceptibility of the honey bee, *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae) to the entomogenous nematode, *Neoselectana carpocapsae* Weiser, *Environ. Entomol.*, 11, 920, 1982.
- Ishibashi, N. and Knodo, E., *Steinernema feliae* (DD-136) and *S. glaseri*: persistence in soil and bark compost and their influence on native nematodes, *J. Nematol.*, 18, 310, 1986.
- Li, P., Den, C., Zhang, S., and Yang, H., Laboratory studies on the infectivity of the nematode *Steinernema glaseri* to *Oncomelania hupensis*, a snail intermediate of blood fluke, *Schistosoma japonicum*, *Chin. J. Biol. Control*, 2, 1986.





## **الباب السادس**

### **المخاطر البيئية للممرضات الحشرية والكائنات الدقيقة والنباتات المهندسة وراثيا بين التشريع والامان الحيوى**

أولا: الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا

ثانيا: النباتات المهندسة وراثيا

ثالثا: الأمان الحيوى فى مصر بين التشريع والتطبيق

رابعا: المخاطر البيئية للممرضات الحشرية المهندسة وراثيا

خامسا: استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الآفات باستخدام مستحضرات

باسيلليس ثورينجينسيس

سادسا: التقانات المستخدمة فى انتاج المركبات الحيوية البكتيرية

سابعا: دراسات عن التأثيرات الحيوية والهيماطولوجية والجزيئية لبعض المبيدات

الحيوية على حيوانات التجارب.

## أولاً: الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً

التقدم المذهل الذى حدث فى طرق وتقنيات البيولوجيا الجزيئية على امتداد الحقيقتان الزميتان الأخيرتان أدى الى الحصول على كائنات دقيقة محورة وراثياً (*GMMs*) تتضمن الفيروسات والبكتريا والكائنات الدقيقة واستخدامها على النطاق التجارى فى الاوساط المحتوية عليها أو لنشرها عن قصد فى البيئة. توجد استخدامات مباشرة للكائنات *GMMs* فى البيئة مثل حماية المزروعات (*Lindow* وآخرون، ١٩٨٣، *Blakeman Fokkema & ١٩٨٢*). والمكافحة الحيوية (*Bishop* وآخرون ، ١٩٨٨) والانهيار الحيوى (الانهيار للمخلفات الكيميائية) واستخلاص المعادن من الخام (*Lindow* وآخرون ، ١٩٨٦). على نفس المنوال تم تطوير نباتات مهندسة وراثياً للاستخدامات الزراعية. نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً *GMMs* يختلف فى الاساس عن الحالات الاخرى لأنه من الصعوبة بمكان تقدير التأثيرات البيئية بسبب المشاكل المتصلة فى استكشاف الكائنات الدقيقة فى البيئة وتقويم تداخلاتها مع الاحياء فى التربة والماء. بالطبع ولن نخرج عن الحقيقة فى أنه اذا امكن تمييز الاضرار التى لم تكن مرئية أو متوقعة بعد نشر الكائنات *GMMs* سوف تجابه موقف فى غاية الخطورة حيث قد يكون من المستحيل إدخال أية عمليات لمعالجة الموقف ولو أن هذا قد يكون أحد الخيارات لإعادة الوضع على ما كان عليه خاصة فى حالة النباتات أو الحيوانات المهندسة وراثياً ولو أن نشر الدنا المندمج خلال حبوب اللقاح من النباتات المتحولة قد يخلق نفس الصعوبات. الاختلافات الاساسية ذات أهمية خاصة فى وضع الدلائل الخاصة بنشر وتداول وتسجيل *GMMs* من قبل الوكالات التشريعية المسؤولة عن اعطاء التراخيص.

لكى يمكن تقييم مخاطر نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً فى البيئة نحتاج للحصول على إجابات دقيقة وعقلانية عن تساؤلات خاصة ببيولوجية الكائنات الدقيقة فى البيئة. نود معرفة أى العوامل تؤثر على نمو وبقاء ونشاط حركة هذه الكائنات خلال مكونات البيئة. من الضروري كذلك توفر معلومات عن التأثيرات التى تحدث من جراء نشر كائنات *GMMs* على الاحياء الموجودة فى الوسط حيث تراكيب المجموع والمجتمعات وثبات "الدنا المندمج" وانتقاله الى الاحياء المستوطنة. لكى نجيب على هذه الاسئلة يجب أن يكون لدينا المقدرة على الكشف والتقدير الكمي لتراكيز الكائنات *GMMs* الكلية والحيوية المزروعة وغير المزروعة لقياس نشاطها الفعلى وتحديد

مستوى الدنا المندمج والتعبير عنه في الكائنات المتوطنة. مفتاح الحصول على هذه المعلومات يتمثل في تطوير الطرق التي تسمح بالكشف عن GMMs المزروعة في البيئة. لذلك تضاعفت جهود العديد من الهيئات الدولية في تطوير تكنولوجيا تمكن من الكشف وتقييم مخاطر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا التي نشرت في البيئة. من أفضل هذه الطرق النظام البريطاني الاساسي الخاص بما يختصر الى PROSAMo (برمجة نشر الكائنات الحية المنتجة والمحورة *Programmed Release of Selected and modified organisms*) والذي يدعم من قبل الحكومة البريطانية والمراكز البحثية والشركات الكبرى التي تصطلع بتنشيط البحوث الخاصة بتقييم المخاطر والكشف عن اضرار البكتريا المهندسة وراثيا وكذلك النباتات (Killham 1992). نتائج هذه التجارب وغيرها من البحوث المماثلة قد ساهمت بشكل كبير في وضع دلائل فعالة عن استخدام الكائنات الدقيقة والحية في البيئة.

#### ١- استعراض شامل عن الكائنات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية

الكائنات الدقيقة مخلوقات حية متناهية في الصغر تشمل البكتريا والفطريات والفيروسات والاولويات الحيوانية. الفيروسات والبكتريا لها اشكال متعددة وتسبب امراض النبات والحيوان والانسان. من البكتريا ما هو نافع كتلك التي تثبت ازوت الهواء الجوي وتستخدم في صناعة الالبان وديغ الجلود وصناعة السماد العضوى واللقاحات المختلفة والأمصال. البكتريا هي حجر الزاوية في تقدم وتطور التكنولوجيا الحيوية لدرجة أنه يطلق عليه: الثورة العلمية الرابعة للقرن العشرين أو ما يحلو للبعض أن يسميها بثورة الهندسة الوراثية. الفطريات بعضها يستخدم كغذاء مثل عيش الغراب وبعضها يدخل في صناعات متعددة مثل الخميرة وإنتاج المضادات الحيوية والكثير من الفطريات ضار للنباتات والانسان وبعضها يفرز سموم ضارة بالانسان والحيوان. الاوليات الحيوانية سواء في التربة أو المياه العذبة والمالحة تسبب أمراض للانسان والنبات والحيوان ومن أشهرها بلازموديوم الملاريا. لسنا في حاجة للقول والتكرار بالأعداد المهولة للكائنات الدقيقة وتنوعها الرهيب ودورها الكبير في احداث التوازن البيئى. لقد ساهمت الكائنات الدقيقة في التوصل الى العديد من الاكتشافات والاتجازات مثل:

- التأكيد على أن المادة الوراثية في الكائنات الحية هي الحمض النووى DNA وليس البروتين.

- اكتشاف الانزيم القاطع.
- استخدام البلازميد في البكتريا في عمل أو تركيب حمض نووى.
- إكثار الحمض النووى المعد تركيبة وعمل ملايين النسخ.
- وسيلة لنقل الحمض النووى.
- المصدر الرئيسى للحصول على أنزيمات الوصل أو الالتحام.
- الحصول على انزيمات لدراسة تتابعات وترتيب القواعد النترجينية على شريط الدنا.
- الحصول على الانزيمات اللازمة لتصنيع الحمض النووى.
- الحصول على الجينات الخاصة بمقاومة الحشرات والفيروسات والمبيدات.
- نستخدم كمفاعل حيوى لتصنيع الهرمونات.
- تستعمل كمبيد حيوى.
- تستخدم في تحويل المخلفات الزراعية.
- وسيلة لجعل النبات مصنع لإنتاج اللقاحات..... وغيرها من الاستخدامات التى كانت فى مصاف الأحلام فى الحقبة الماضية .... أليس كل هذا ثورة رابعة بعد ثورات ثلاثة (تحطيم الذرة - ارنياك الفضاء - عالم الكمبيوتر ...).

مرة أخرى أشير الى دور الكائنات الدقيقة فى إنتاج الغذاء الطبيعى (الصبغات ومواد النكهة - مركبات حلوة قليلة السعرات) من خلال التخمر. هل يعلم الكثيرون أن الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا تستخدم للكشف عن فساد الأغذية من خلال عزل قطعة صغيرة من الحمض النووى للكائن المسبب للفساد واستخدامها كمجس للكشف عنه (كما هو الحال فى الكشف عن السالمونيلا). لقد حدث تقدم كبير فى هذا الاتجاه من خلال استغلال البلازميد (قطعة الحمض النووى فى البكتريا وعليه بعض الجينات ذات الخصائص المعنية وبذلك أصبح فى الإمكان التعرف على أى جين مرغوب. قيمة كل كائن تتحدد بمحتواه من الجينات المرغوبة وبذلك فإن التنوع البيولوجى واجب الحفاظ عليه بهدف الحصول منه على الصفات المرغوبة وتحسين الصفات الوراثية للكائنات الحية خاصة الدقيقة. تكنولوجيا الحمض النووى المتنامية أو المعد تركيبه *rDNA* تعتبر من أهم الوسائل للحصول على كائنات دقيقة تودى وظائف معينة. نحن نتوق لبنك التقاوى على مستوى العالم العربى وفى نفس الوقت نتوق أكثر لبنك للجينات فى السلالات النباتية والحيوانية مع توصيف صفات كل سلالة ولتصبح الجينات قوة

استراتيجية على مستوى العالم العربى فنحن لمتنا أقل مقدرة من العالم المتقدم. يمكن الاستفادة من هذه البنوك الجينية من خلال تقنية الحامض النووى المعد تركيبيته الى التحكم فى النمو والبناء والتطور وتحويل الجينات وما يستتبع ذلك من قفزات هائلة فى الطب والزراعة والصناعة. ليس فى الامكان نقل جين من كائن دقيق كالبكتريا الى الحيوان أو النبات ... سبحانه يا قادر لا علم لنا الا ما علمتنا ...

قد يقول قائل وماذا فى هذا التوجه بعمل بنك للجينات على مستوى العالم العربى؟ هل فى هذا صعوبة؟ ألسنا نملك قاعدة علمية جيدة وإمكانات هائلة؟ الاجابة نعم ولا غرابة ولكن ليكن معلوما أن مزارع الكائنات الدقيقة ذات الصفات المرغوبة والجينات المتميزة التى تصلح للأبحاث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية يجب أن تحفظ فى نيتروجين سائل على درجة حرارة -196°م. لذلك فإن حفظ المعلومات الوراثية مكلف للغاية ومع هذا فهو ممكن وضرورى وحتمى.

للكائنات الدقيقة دور كبير سوف يتعاظم فى القرن الحالى فى تصنيع المواد الغذائية الثانوية مع مضافات الغذاء للحفظ من التلف والمواد التى تعطى المذاق الحلو أو تلك التى تحسن الطعم والروائح والعطور مثل رائحة الخوخ والتفاح والنعناع والبرنقال... أى أن كل ما سنأكله فى المستقبل القريب والأز سكون ناتجا من الكائنات الدقيقة وليس من طريقة زراعة الخلية. هناك بروتين إيثونامين الذى يوجد فى ثمار نبات كاتيف فى غرب ووسط أفريقيا وهو ذو حلاوة 1000 - 3000 مرة حلاوة السكر وقد نقل الجين الخاص بإنتاج هذا البروتين من النبات الى البكتريا ثم نقل لنبات الدخان والخميرة... كل شئ أصبح ممكنا بغض من الخالق العظيم...

عن دور الكائنات الدقيقة فى حماية البيئة من التلوث حدث ولا حرج. هذا الاقتراب يوفر الطاقة والجهد والتكاليف. هذا المجال فى حاجة الى تطوير لأنه ليس كما يظن الكثيرين يمكن تحقيق التخلص من الملوثات بوضع الكائنات الدقيقة مع الملوث وانتهى الامر. الأمر معقد بل فى غاية التعقيد لأن هناك ثلاثة اقترابات فى هذا المجال هى: القطع الى أشرطة عن طريق التهوية أو تحويلها الى معادن وإنتاج غاز ثانى أكسيد الكربون أو الميثان فى النظم اللاهوائية، امتصاص المعادن على مواد انصاصة ثم التخلص والإزالة، التحول الحيوى بالكائنات الدقيقة *Biotransformation* وهو بيت القصيد. الهدف من التحول الحيوى بالكائنات الدقيقة تحويل الملوثات الكيميائية الى معادن وثانى أكسيد الكربون بمسارات معينة سوف نعلم بعضها ولكن الكثير من هذه المسارات سيظل فى علم الغيب لا يعلمها الا الخالق العظيم. الوصول الى هذا الهدف

يتطلب معرفة شاملة وكاملة عن الكائنات الدقيقة وطبيعتها والتوازن والتدخلات فيما بينها حيث التنوع البيولوجي موجود ومحدد. اذا لم تعرف كل مخرجات ونواتج عملية التحول الحيوى يمكن الحصول على نتائج عكسية حيث أن بعض النواتج خاصة المعادن قد تكون هي الاخرى ملوثة ضارة بل أشد ضررا من الملوثات الاصلية. لقد ساهمت الكائنات الدقيقة من خلال تكنولوجيا التحول الحيوى فى تخليص مياه الكرويت من بقعة الزيت الرهيب... ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كتمان فى كتمان... أه من غولاء المركبات الايدروكربونية خاصة تلك التى تحتوى على الهالوجينات اذا لم تتحول حيويا بصورة آمنة؟ يمكن استخدام التحول الحيوى فى تخليص المياه الجوفية والتربة والمياه السطحية من الملوثات الكيميائية. ياسادة لا تتسابقوا نحو استيراد السلالات الخاصة بهذه الكائنات الدقيقة من الخارج... أرضنا غنية جدا بكل هذه الكائنات التى تأكل الملوثات أكلا وتخلصنا من هذا الشر القبيح من أيدينا.

من الصدف العجيبة أنه فى طريقى لمكتب شركة سوميتومو كيميكال حيث أعمل مستشارا علميا لها تناولت إذاعة البى بى سى فى لندن الموجهة بالعربية موضوع الملوثات البيئية وعلاقتها بنقص المناعة فى الانسان وأشارت الى أنه سيعقد فى ٣ ديسمبر ٢٠٠٠ مؤتمر فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لمناقشة هذا الموضوع الخطير يحضره ممثلون عن الحديد من الدول والهيئات والمنظمات المعنية بهذا الموضوع. لقد كان ذلك متوأكبا مع الكتاب الذى أصدرته منذ سنتان عن المبيدات والكيميائيات ودورها فى الانقلاب الجنسى وفقد المناعة من إصدار شركة كلزا جروب للطبع والنشر فى جمهورية مصر العربية. تناولت النشرة الإنجليزية الإشارة الى بعض المركبات الكلورونية خاصة اللدنت والدداي وقالت أنه تأكد أن النساء اللاتى يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية ينقلون اليهم المبيد خلال اللبن. هذا الوضع المتردى كان من أحد الاسباب التى أدت الى الاهتمام بسلامة الاطفال والرضع من خلال تناولهم اللبن الامهات اللاتى تعرضن للمبيدات. من هذا المنطلق شدد قانون حماية جودة الغذاء FQPA على هذا الموضوع وأضاف الى متطلبات تقويم المخاطر Risk assesment التعرض الرسمى للجنة وضرورة اجراء اختبارات الكشف عن مستوى الاستروجين لمعرفة علاقتها بالملوثات حيث أنها ترتبط بحدوث انقلاب فى الجنس ونقص المناعة. لقد تأكد أن هناك سلالات من بكتريا بيسيدوموناس ذات مقدرة على القيام بالتحلل الحيوى لمولوثات مسرطنة مثل PCP وكذلك PAH (ايدروكربونات عطرية عديدة الحلقات).

الشئ بالشئ يذكر حيث تستوطن التربة عديد من الكائنات الدقيقة الضارة بالنباتات من فطريات وبكتريا وغيرها وتسبب أضرارا فظيعة فى الاتبات واستقامة النباتات فما هى أمراض الضلل والنول وخنق البادرات وعفن الجذور والتي تكافح بالمبيدات بشراهة مما أدى الى تقادم مشكلة تلوث التربة ومياه الصرف والمياه الجوفية والمزروعات بهذه السموم الخطيرة. بالإضافة الى ذلك فلا يمكن أن ننكر ما أحدثته هذه المبيدات من خلل فى التوازن الطبيعى بين الكائنات النافعة وبعضها البعض أو الضارة وبعضها البعض أو الضرر والنفع معا وما يستتبع ذلك من خفض الخصوبة وظهور مشاكل أخرى قد تكون أكثر تعقيدا. سبحانهك يا رب خلقت الداء وخلقت له الدواء وكل بمقدار وميزان دقيق. هذه الكائنات الضارة فى التربة لها أعداء طبيعية قد تكون من نفس الجنس أو النوع. لذلك فإن التعرف على هذه الأعداء النافعة يفتح مجالا كبيرا للمكافحة المستتيرة والنظيفة وباحذا لو تدخلت الهندسة الوراثية فى تعظيم شراسة هذه الأعداء النافعة فى القضاء على الآفات ولكن يجب أن يحدث ذلك بحساب ومقدار وحتى لا نحل مشكلة ونخلق مشاكل أخرى نحن فى غنى عنها. لقد نجحت الهندسة الوراثية فى دمج البروتوبلاست الخاص بأكثر من كائن نافع فى كائن واحد (فطر مثلا) ليؤدى أغراض متعددة فى منظومة حماية النباتات والسيطرة على الآفات. هناك مجال آخر للهندسة الوراثية يتمثل فى تعريف الجينات المسؤولة عن مقاومة الآفات لقتل المبيدات والتخلص منها وخلق سلالات حساسة.

لقد كثر الكلام عن خطورة الكائنات الدقيقة المحولة بالهندسة الوراثية وأثيرت تساؤلات عديدة عن تأثيراتها البيئية وظهرت آراء واجتهادات كبيرة بعضها بشير للتشاؤم أكثر من القنول وهذه ظاهرة صحية خاصة مع تكنولوجيات خاصة قد تحمل فى ظاهرها الرحمة بينما تحمل فى باطنها العذاب كما حدث مع المبيدات والسموم الأخرى. من المخاوف التى أثرت وما زالت أن استعمال الكائنات الدقيقة للمهندسة وراثيا قد يؤدى الى التعبير عن صفات غير موجودة فى الآباء وهذه قد تكون غير مرغوبة كما أن هناك احتمالات لنقل هذه الصفات الوراثية للكائنات الأصلية الموجودة فى البيئة أما الاحتمال الخطير هو أن هذه الصفات الجديدة قد تسمى الى البيئة مما قد يضر بصحة الإنسان. الدراسات الخاصة بنقل المعلومات الوراثية بين البكتريا بصرف النظر عن الطريقة التى أتبع (الارتباط - والنسخ والتحويل...). أما الدراسات الخاصة بسلوك الكائنات المهندسة وراثيا فى البيئة الأصلية ما زالت قليلة للغاية. لا يمكن إنكار احتمال حدوث تبادل للمعلومات بنسبة كبيرة بين البكتريا من نوع واحد

وفى عائل واحد كما هو الحال مع العقد الجزرية فى جنور البرسيم وقد يحدث نفس الشئ بين الأنواع المختلفة كما هو الحال بين الريزوبيا والبسيدوموناس وهذا يتوقف على وجود بلازميد ذات مجال عوائلى واسع.

السؤال الآن عن ماهية وحقيقة الأمان الحيوى للانزيمات الناتجة بالهندسة الوراثية؟ هناك توقعات عديدة تشير الى أن أكثر من ٨٠% من الانزيمات التى تنتج بحلول عام ٢٠٠٠ ستكون بواسطة البكتريا المحسنة وراثيا. هذه الانزيمات تشمل الأميليز والبروتيز والليباز وغيرها. الانزيمات نواتج طبيعية صديقة للبيئة ذات أمان عالى. صناعة الانزيمات بالطرق الحيوية ومن خلال تقنيات الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحمض النووى المعد تركيبيه *rDNA* أصبحت فى المرتبة الثانية بعد صناعة الدواء. لقد ثبت أن هذه الكائنات المحورة وراثيا لا تشكل خطورة على الإنسان والحيوان ولا تلوث البيئة. مع هذا فقد أشارت الوكالات المعنية بالأمان الحيوى الى ضرورة الاحتياط والحذر. ها هى وكالة حماية البيئة الأمريكية اضطلعت بمراجعة كل الطلبات التى قدمت اليها سواء بغرض الاختبار والتجريب أو بغرض التسجيل للكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا خاصة تلك التى تستخدم فى مكافحة الآفات الضارة. لقد تم حتى الآن تسجيل ما يزيد عن ٣٠ مركب حيوى كمبيدات امه وكما أكرر دائما أن الأمان نسبى وليس مطلق. نفس النهج إتبع مع الكائنات المهندسة وراثيا فى صناعة الأسمدة أو حماية البيئة الحيوية. بالطبع لا تغفل هذه الوكالات البعد الاقتصادى والاجتماعى لإدخال هذه المنتجات من التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. تشترط وكالة حماية البيئة الأمريكية أن يتضمن طلب اختبار أو التصريح باستخدام الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا بيانات عن الكائن الدقيق والسبل التى أتبع فى تحسين ومكان الاختبار والبيئة المحيطة بالمكان وتعميم التجربة وكيفية إدخال الكائن الدقيق فى البيئة والميزة الاختيارية للكائن الدقيق وحركة الجين. تجدر الإشارة الى وجود قواعد وتشريعات تتضمن أسس تجميع وتحقيق وحفظ وتوزيع وإدارة مزارع الكائنات الدقيقة والحمض النووى المعد تركيبيه. كل هذا من الأمور الهامة والتى تلعب دورا رئيسيا فى الحصول على المعلومات الوراثية اللازمة لتقديم التكنولوجيا والعلوم.

من الاسهامات الايجابية لاستخدامات الكائنات الدقيقة المحسنة وراثيا إنتاج لقاحات لأمراض الحيوان والإنسان داخل النبات باستخدام الكائنات الدقيقة حيث تستخدم بعض الفيروسات النباتية ولتى تحمل تعاقب غريب من البيبتيدات على غلافها بمثابة حامل للأنتيجين. يتم وضع الأوليجوبيبتيد المصنع والمبرمج للأنتيجين الغريب داخل



الغلاف البروتينى للفيروس. لقد اتبعت هذه الطريقة فى فيروس تبرقش نبات اللوبيا لإنتاج مصل الحمى القلاعية والحصول على بروتين من نبات اللوبيا تفاعل الانتيسيرم الخاص بالحمى القلاعية. ما أذهلنى حقا استخدام فيروس تبرقش الدخان ليعبر عن الأنتيجين الخاص بطغول الملاريا والأن يوجد فيروس تبرقش الدخان يحتوى غلافة البروتين المعاد تركيبه على الأنتيجين الخاص بالملاريا. كذلك تم عزل بروتين من لعب البعوضة هو الذى ينقل مسبب المرض. جرى العمل الآن على تحفيز لقاح يهاجم الأطوار الخاصة بالطغول التى تحدث فى تيار الدم. إن إنتاج اللقاحات فى النباتات ضد الأمراض الوبائية يعتبر من الأمور الهامة للدول النامية بسبب توفر النباتات وقلة التكلفة. نتمنى أن نرى فى القريب العاجل مصل لالتهاب الكبد الوبائى من نباتات للقضاء على مأساة ما يقرب من ٣٠٠ مليون نسمة على مستوى العالم.

توجد الآن مستحضرات تجارية تعتمد على جين مأخوذ من بكتريا الباسيليس مثال مبيد فويل لمقاومة خنساء الكلوراندو وثاقبات للذرة على البطاطس كما يستخدم الغلاف البروتينى للفيروسات (VCP) لإنتاج نباتات مقاومة لأكثر من فيروس. الآن توجد نباتات تقاوم ٢٢ نوع من الفيروس.

## ٢- النواحي البيئية والتشريعية التى تحكم نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا:

من المنظور العام قامت السلطات المسئولة عن التشريعات على مستوى العالم وضع وتطوير اقتراب ما يسمى الحالة بالحالة *Case-by-Case* لكل استخدام حيث يجب الحصول على تصريح مسبق بنشر هذه الكائنات الدقيقة ولو أن التشريعات تبقى مختلفة من بلد لآخرى. اعتبارات الأمان الأساسية تختلف عن تلك الموجودة فعلا للتعامل مع غيرها حيث أن الكائنات المحورة وراثيا ذات طبيعة خاصة جدا كما أن هناك تحدى يتمثل فى أن نشر هذه الكائنات يجب أن يصمم بحيث يحقق لها البقاء فى البيئة. لقد عقدت العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية حول نشر هذه الكائنات تحت مسمى نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا *REGEM* (Sussman وآخرون، ١٩٨٨) وعقد المؤتمر الثانى عام ١٩٩١ (Stewart - Tull and Sussman، ١٩٩٢) بالإضافة الى عدد من البرامج البحثية تحت مظلة البيوتكنولوجيا وتقييم المخاطر قبل برنامج التكنولوجيا الحيوية فى الدول الأوربية *BAP* (Economidis، ١٩٩٠) وكذلك مبادرة فى *PROSAMO* (Killham، ١٩٩٢). السبب فى ضرورة وضع هذه التشريعات يتمثل فى أن العلماء غير قادرين على التنبؤ بما قد يحدثه نشر تجارب الكائنات الدقيقة المهندسة

وراثيا وكذلك اعتقاد عامة الناس بأن نشر *GMMs* قد يسبب مخاطر على المدى الطويل على كل من البيئة والصحة العامة (*Kemp*، ١٩٩٢). في إنجلترا (*Steele*، ١٩٩٣) وفي أمريكا (*Shurn*، وآخرون، ١٩٩٢) حدث تطوير وتبسيط على التشريعات المنظمة نشر هذه التكنولوجيا في البيئة خاصة نشر الكائنات الدقيقة المحورة وراثيا *GMMs*.

#### التشريعات الجارية في المملكة المتحدة

في إنجلترا وقبل نشر أى كائن دقيق مهندس وراثيا يجب الحصول على تصريح من وزارة البيئة الإنجليزية. فى الناحية العملية تستقبل وزارة البيئة الانجليزية توصيات ونصائح من العديد من اللجان المستقلة خاصة لجنة النشر للبيئة (*ACRE*) والتي تضم فى تشكيلها خبراء وممثلين من مختلف التخصصات مثل مجاميع الشؤون الصحية والبيئة. قسم شؤون البيئة (*DOE*) الآن هو المسئول عن التنسيق بين اعتبارات كل تطبيقات الكائنات المهندسة وراثيا وغيرها حيث أن هذا القسم هو الذى يعطى التراخيص بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل إدارة الصحة والأمان (*HSE*) ووزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء (*MAFF*) ولجنة السوق الأوروبية. الهدف الأساسى على المدى الطويل يتمثل فى وضع الدلائل العامة والتشريعات الخاصة بالنشر خلال الدول الأوروبية. هذا يعتبر تقدم عقلانى حيث أن الكائنات الدقيقة لا تعترف بوجود حواجز فيما بينها خلال تجارب النشر كما أنها ذات فوائد واضحة للنشر التجارى بواسطة الشركات الأوروبية.

طلب التصريح بتجريب أو نشر هذه الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا يقدم على استمارة موحدة متفق عليها وعلى الطالب أن يقدم كل المعلومات حول الكائن الحى المطلوب نشره وكذلك "الدنا" المندمج والتي سوف تستخدم بتباين تبعا للخطر المرتبط بالنشر والفرض منه. مثال ذلك لا يمكن التصريح بالنشر إذا كان الكائن المطلوب نشره هو الايسيريشياكولاى المهندسة وراثيا للتعبير عن توكسين ريسين *toxin ricin* (من النباتات) بسبب أن الريسين قاتل للإنسان وأنه سوف يمثل خطر غير مقبول على صحة الإنسان. هذا سوف يتعارض مع النشر المقترح لسلسلة للريزوبيوم المهندس وراثيا من خلال جزئ الدنا لبلاتزميد الريزوبيوم الطبيعى الذى يقاوم المضاد الحيوى. وجود المقاومة للمضاد الحيوى سوف تسمح للكائن المحور بالاستكشاف فى البيئة وجمع معلومات عن أيكولوجية البكتريا وكيف أنها ترتبط بمقرئها على تثبيت نترجين الهواء

الجوى. إن نشر مثل هذه الكائنات لن يسبب أضرار على البيئة أو صحة الإنسان وهو يقدم معلومات أيكولوجية ذات قيمة كبيرة. إن الموافقة على طلب الحصول على موافقة بنشر هذه الكائنات المحورة وراثيا يجب أن يشكل توفر العديد من المعلومات عن صفات ومواصفات المانح وأبوية ومستقبلات الكائنات الحية والعلامات الجينية الفينولوجية وكيف يمكن تعريف الكائن وماذا عن حساسية طرق الكشف ومدى دخول واشتراك الكائن الحى فى العمليات البيئية مثل التغذية وتحلل المادة العضوية والتنفس. التشريعات الكاملة منشورة فى كتيب قسم الشؤون البيئية DOE تحت عناوين "التشريعات والسيطرة على النشر العقلانى للكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا (DOE ، ١٩٩٣)".

#### التشريعات فى أستراليا

لقد وضعت دلائل تحدد نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا GMMs على غرار ما هو متبع فى الدول الأخرى (التعديل الوراثى: التهديد والومض؟ ١٩٩٢ فى أستراليا). فى هذا الاصدار الحكومى الأسترالى أخذت فى الاعتبار الفوائد المؤثرة لنشر GMMs فى البيئة. مثال ذلك أن هذا النشر سيكون له تأثيرات ايجابية على البيئة ووضع الاقتراح الأول عن سلالة البكتريا المحورة وراثيا والتي تثبت النتروجين "الريزوبيوم" وجعلها مقاومة للمبيد الفطرى. تأثير هذا كان يتمثل فى حماية هذه البكتريا المثبتة للنتروجين من الضرر بواسطة المبيد الفطرى عندما ترش النباتات بها لحمايتها من العدوى بفطريات الجذور. استخدام هذه البكتريا سوف ينقص الحاجة لدى مزارعى أستراليا لاستخدام المخصبات النتروجينية (التي سوف تؤدى الى وجود مستويات عالية من التزيت والنفرات فى ماء الصرف وفى المراعى (Friend ، ١٩٩١)).

التشريعات فى حد ذاتها تنفذ بطريقة مماثلة لما يجرى فى بريطانيا. مع كل طلب لنشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا GMMs يتطلب توفير كم هائل من المعلومات عن مبررات النشر وتوضيح أسباب ومبررات فشل الطرق الأخرى أو عدم كفاءتها (خاصة تلك التى لا تشترك فى النشر) وتفاصيل عن التحور الوراثى وثباته وكذلك التأثيرات المعروفة للكائن غير المهندس وراثيا ونفس الشئ عن الكائن المحور على الإنسان والحيوان وصحة النبات والإنتاج الزراعى. والبيئة والدلائل والأدلة الخاصة بالثبات والتيسير ونشر الكائن المحور وتفاصيل كاملة عن تجارب النشر وترتيبات الاستكشاف وما هى الخطط المتوقعة للتعامل مع الكوارث البيئية مثل الفيضان خلال النشر وطرق السيطرة للحد من الكائن بعد النشر. مطلوب معلومات

إضافية أخرى اعتمادا على طبيعة الكائن المحور وراثيا والاستخدام النهائي له. هناك مراتب خاصة مثل الفاكسينات الحية والكائنات الدقيقة المرتبطة بالنباتات وتلك المرتبطة بالحيوان (مثل المجترات) والتي تستخدم في القضاء على التلوث والمقاومة الحيوية والكائنات الدقيقة التي تستخدم مع الغذاء. مع كل مرتبة من هذه المراتب يكون على المتقدم للحصول على الموافقة والترخيص بالنشر أن يجيب على ٢٣ سؤال مع ٢- ١٣ سؤال إضافي اعتمادا على المرتبة التي يتبعها الكائن محل الاعتبار. في هذه المرحلة يؤخذ المقترح في الاعتبار في المعاهد المعنية بالأمان الحيوى واللجنة الخاصة به (IBC) والتي ترسل المقترح الى اللجنة الاستشارية للتحويل الوراثي GAMC. اللجنة الأخيرة تضم في عضويتها خيرة العلماء والخبراء في انجلترا وهم يعينون بواسطة الحكومة لمدة ثلاث سنوات ولا تضم اللجنة أى أفراد من نوى الخبرات الخاصة مثل خبراء الشؤون البيئية أو الصحية. تقوم لجنة GAMC بدراسة المقترح مع أخذ كل الدلائل الموضوعية ثم تعد تقرير مفصل وترسله مرة أخرى الى لجنة الأمان الحيوى (IBC) ومنها الى الهيئة التشريعية المناسبة وهي تحمل المسؤولية النهائية في اتخاذ قرار النشر أو منعه ويمكنها أن تسعين بلراء ذو الخبرات الخاصة في هذا الشأن.

#### التشريعات في الدول الأخرى

معظم الدول النامية لا تملك تشريعات خاصة تغطي إنتاج أو نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا GMMs ويوجد على الأقل حالة واحدة موثقة تتضمن الفيروسات المحورة وراثيا مما خلق جدالا واسعا. في عام ١٩٨٦ تم التوصل الى اتفاق بين معهد وبستر في فيلادلفيا بالمریکا وهيئة بلن للصحة الأمريكية (PAHO) لإجراء تجربة صممت لإختبار فاكسين المحور في البقر في مزرعة تجريبية في مركز بان أمريكان سونوزيس وهو يختصر الى (CEPANZO) في الأرجنتين. لقد انتهت هذه التجربة في سبتمبر ١٩٨٦ من خلال السلطات الصحية الأرجنتينية التي قامت بتدمير الحيوانات التي شاركت في التجربة. المبررات لهذا الإجراء استندت على أن التجربة قد أجريت دون إذن أو تصريح ودون تقديم أية معلومات للسلطات العلمية في الأرجنتين. هذه التجربة شملت استخدام فاكسين. الفيروس المهندس وراثيا والذي نوقش في المؤتمر الثالث لمنظم REGEMs (Sussman وآخرون ، ١٩٨٨). الأساس في النقد كان يتمثل في أن مجموعة PAHO استوردت الفيروس المنمذج الى الأرجنتين في الحقيقة الدبلوماسية وهذا خرق للتشريعات والقوانين الأرجنتينية حول استيراد الكائنات الدقيقة

الغريبة *Exotic*. بالإضافة إلى ذلك فإن التجربة نفسها وإدارتها لم تلقى بالاً وأهمية أو اعتبار لصحة وأمان العاملين الذين اشتركوا في هذه التجربة وكذلك للتأثيرات الأيكولوجية الخطيرة لفيروس الفاكسين.

إذا أخذنا كل النواحي الخطيرة التي تحيط بهذا الموضوع في الاعتبار تبقى هذه التجربة في الحسبان حيث يجب ألا يسمح بتكرار هذا العمل الإجرامى في أى بلد عنده تشريعات ودلائل خاصة بالتعامل مع الميكروبات المهندسة وراثياً حتى لو كانت فاكسينات بغرض التطعيم. التساؤل الآن ماذا عن تقييم مخاطر نشر الفيروسات المندمجة. مثال ذلك أن إضافة الدنا الغريب قد يؤثر على المدى العوائلى للفيروس المندمج وقد يؤدي نقل الدنا الخاص للجين الغريب خلال الدمج بين الفيروسات إلى انتاج فيروس ذات مدى عوائلى.

#### ثانياً: النباتات المهندسة وراثياً

لقد تقدمت طرق ووسائل الهندسة الوراثية للدرجة التي مكنت من توفير المنتجات الناتجة من دمج وهنسة الكائنات الحية للمستهلكين. إذا قصرنا الكلام بشئ من التخصص على النباتات يمكن القول أن كل المحاصيل الزراعية الهامة تقريباً قد تم هندستها في مجهودات لتحسين واحد أو أكثر مقاومة للآفات (*Gusser and Fraey*، ١٩٨٩). المحاصيل التي تنتج نوعية أفضل من الغذاء مقاومة للآفات والأجهاد والضغط البيئية مع أنها تتحمل الأضرار السيئة التي تحدثها مبيدات الحشائش وهذه الأخيرة أصبحت حقيقة وأمر واقع وسوف تظهر بكثرة في القريب العاجل. هذه المنتجات ذات أهمية واقعية بشكل معنوى في تحقيق الفوائد لمصنعي الغذاء والمستهلكين وللزراعة بوجه عام. هذه المنتجات ستكون أكثر تكلفة لإنتاجها وتصنيعها كذلك ستكون قيمة غذائية عالية وسوف تحقق مرونة أكثر للفلاحين في العمليات الزراعية المؤثرة. نظرة مستقبلية عن هذا الاقتراب نوضح أن النباتات قد تستخدم لإنتاج كميات كبيرة من الببتيدات المفيدة العلاجية وكذلك الدواء الكيمائى النادر مثل التاكسول بأسعار زهيدة. صناعة التكنولوجيا الحيوية في النباتات وصلت الآن إلى نقطة أصبحت عندها الاختبارات الحقلية للنباتات المحورة وراثياً (*GMPs*) محل تقدير على أنها خطوة عقلانية وحرحة في تقييم الأمان والاقتدار التجارى والتأثيرات البيئية لكل منتج. يمكن القول أنه قد أجريت مئات من الاختبارات الحقلية على مستوى العالم دون

أية حوادث عارضة وتم إعداد تقارير علمية عنها (Ginzburg، ١٩٩١، المركز القومي للبحوث، ١٩٨٩، Halvorion وأخرون، ١٩٨٥) وغيرها. الوصول لهذه المرحلة في العملية التجارية يتطلب العمل مع الهيئات الحكومية التي تملك السلطة للموافقة على إجراء الاختبارات الحقلية للنباتات المحورة وراثيا. إن طلب الحصول على موافقة السلطات المعنية لنشر النباتات المحورة على المستوى الحقلى يتطلب تقديم كافة البيانات والمعلومات عن الكائن وطريقة التحويل والجين وأصله والمنتجات المعبر عنها ونواتج التعبير وتأثيراتها على البيئة. هذه البيانات تتأتى من الدراسات تحت الظروف المتحكم فيها مثل الصوب الزجاجية وحجر النمو.

#### (١) النواحي البيئية المحددة لاستخدامات النباتات المهندسة وراثيا

التوجه نحو قبول الاختبارات الحقلية للنباتات المهندسة وراثيا *GMPs* يختلف ويتفاوت. من المناقشة التي ذكرت قبلا يتضح أنه بينما تختلف التوجهات إلا أن أنواع الاسئلة والأساس العلمى لاتخاذ القرارات متضمنة الإجابة عن نفس الاسئلة الأساسية. فى كل الوثائق التي تعضد *GMPs* تتم مناقشة ثلاثة نواحي:

١- العقلانية فى تطوير المنتج وإجراء الاختبارات والفوائد المرجوة

٢- التأثيرات البيئية

٣- التأثير على أمان الإنسان والحيوان

للحكم على التأثيرات البيئية للنباتات المهندسة وراثيا يجرى تقييم بيئى والذي يتطلب معلومات:

١- حركة الجينات (انتشار اللقاح وكفاءة العبور الخارجى).

٢- الصفة وتأثيرها على ايكولوجية النبات (التأثير على اللياقة فى البيئة ، كفاءة وقدرة الغزو والمقدرة الحشائشية) وكذلك التأثيرات الثانوية والتي تعرف على أنها تأثيرات غير ممكن التنبؤ بها على الهندسة الوراثية مثل مستويات تغيير نواتج التمثول (الممثلات) الثانوية.

٣- أمان منتجات الجين تجاه الكائنات غير المستهدفة واستخداماتها.

٤- مقدرة وعظم المشاكل البيئية غير المرغوب فيها (حركة الجين من خلال تقنيات أخرى بخلاف التقنيات داخل النوع).

لقد تم التركيز على النواحي البيئية لنوعين من النباتات المهندسة وراثيا والتي أختبرت على امتداد سنوات عديدة فى الحقل وفى مناطق متعددة. الأول هو القطن

المقاوم للحشرات (IRC) والثاني هو الكانولا (لغت الشلجم) الذي يتحمل مبيد الحشائش جليفوسات أى الكانولا المقاوم للجليفوسات (GTC Canola). مع كل مناقشة تم استعراض مخاطر التجارب الحقلية وكذلك الفوائد في محاولة لعمل ميزان في أى تقييم يبنى.

يجب التذكرة بثلاث موضوعات ترتبط بشكل واسع بالنواحي البيئية للنباتات المهندسة وراثيا. الأول يتمثل في إمكانية نقل هذه الجينات خلال الأحياء بشكل عشوائي وما بين الأنواع مما يثير نوعان من الانتقادات. بينما هناك إمكانية خلال التطور فان اتجاه حركة الجين يمكن أن تحدث فان كل الأدلة تشير أن حركة الجينات من النباتات الى الكائنات الدقيقة أو للأنواع غير المرتبطة بالنباتات محتملة الحدوث ( Goodman and Newell, 1985). العديد من الأمثلة عن انسياب الجين حتى بين الأنواع المتوافقة يمكن أن تقصر من خلال التطور المتقارب. هذه الحركة العشوائية للجين تظل مثيرة للاستطلاع حتى يمكن اثبات شئ مخالف من التجريب. الثاني أن معظم التغيرات الوراثية تنقل أكثر منها ترديد من الليفة (Crawley, 1992). الأنواع والطرز الوراثية البرية عادة تكون أكثر لياقة وتكون منافسات قوية وكذلك تكون أكثر حشاشية. حيث أن معظم التغيرات الوراثية تسوى النبات تحت بعض النواحي البيئية المؤثرة فإنه لا يتوقع أن النباتات المهندسة وراثيا GMP سيكون لها اقتدار كبير كأن تكون أفة عنه كصنف تجارى يمكن الحصول عليه من خلال التربية التقليدية والانتخاب. فى النهاية لا يوجد أى دليل على الإطلاق من أن الثبررات الناتجة المشتقة من الأجروليكتريوم نومي فيسيانس عديمة الأثرع التى تعول التحولات (IRC and GT Canola) (Huttrer وآخرون، 1992). هذا يوضح أن الكائن يقل بدرجة كبيرة فى مزارع الأنسجة ولا يتضاعف فى البذور.

#### • اعتبارات الأمان فى النباتات المهندسة وراثيا بيكتريا الباسيليليس Bt:

المنتجات الميكروبية الباسيلية Bt من أكثر المبيدات الحيوية استخداما فى العالم وقد احتلت 1- 2% من السوق العالمى للمبيدات الحشرية فى التسعينات (Baum وآخرون 1999). الكراى بروتينات ذات تخصص عالى للآفات الحشرية المستهدفة حيث قد يكون تأثير قليل أو تكون عديمة التأثير على الكائنات الأخرى. على امتداد 40 عاما من الاستخدام العالمى لم تحدث المنتجات الميكروبية Bt أية تأثيرات معاكسة على صحة الإنسان والبيئة. منذ بداية تسجيل هذه المنتجات فى أمريكا منذ 1961 يوجد

الآن تسجيلات جارية على الأكل ١٨٠ منتج بكتيري (EPA ١٩٩٨ - ب) في أمريكا في مقابل ما يزيد عن ١٢٠ منتج ميكروبي في دول الاتحاد الأوربي. لقد استخدمت وما زالت هذه المركبات مستمرة في الاستخدامات الزراعية وفي مكافحة نقلات الامراض. لقد قدرت وكالة EPA اجراء العديد من الدراسات التوكسيكولوجية على منتجات الباسيليلس واتضح عدم حدوث تأثيرات حاكسة مما دعى الى الاستنتاج بأن هذه المركبات غير سامة أو معرصة للانسان (EPA ١٩٩٨ - ا). في اصدارات متطلبات التسجيل للمبيدات من قبل الوكالة أشارت الوثائق أن منتجات الباسيليلس ليس لها تأثيرات معاكسة غير معقولة على الانسان أو البيئة وكل استخدامات هذه المنتجات مؤهلة أو جديرة بالتسجيل. لقد أشار تقدير الأمان الكيميائي في البرنامج الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن بكتريا الباسيليلس *Bi* ومنتجاتها لم تسبب أية تأثيرات معاكسة على صحة الانسان عندما توجد في مياه الشرب أو الطعام (IPCS ٢٠٠٠).

تستخدم مستحضرات *Bi* على نطاق تجارى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وغيرها من دول أمريكا الجنوبية وفي كل دول الاتحاد الأوربي. كذلك يشيع استخدام هذه المنتجات في العديد من الدول الأخرى مثل روسيا والصين وأستراليا ودول أوروبا الشرقية. لقد استعرضت هيئة الصحة العالمية WHO حديثاً قاعدة بيانات عن الأمان العالى لهذه المستحضرات البكتيرية *Bi* وخلصت الى: بسبب الكيفية الخاصة لإحداث الفعل فإن منتجات بكتريا *Bi* لا تسبب أية أضرار على الانسان أو غيره من الفقاريات غير المستهدفة حيث وجدت خالية من البكتريا باسيليلس والمنتجات الفعالة بيولوجياً بخلاف البروتينات التي تكافح الحشرات (ICPS ٢٠٠٠). البيانات التالية والاسباب العلمية تعضد الامان للبني وعلى صحة الانسان من خلال تجارب تقييم أمان الكراى بروتينات.

نتائج دراسات السمية الحادة عن طريق الفم أو الغذاء أشارت الى العديد من المنتجات الميكروبية لبكتريا الباسيليلس التي تحوى على مخاليط مختلفة من الكراى بروتينات لم تظهر أية سمية على الثدييات.

الدراسات على البروتينات الممثلة من ثلاثة أقسام للكراى بروتينات (كراى ٢، ١، ٣) أكدت ان هذه المواد غير سامة على الثدييات عندما تعمل عن طريق الفم بجرعات عالية. كل البروتينات من أقسام الكراى بروتينات هذه تتهازل بسرعة في سائل المعدة.



الكراى بروتينات المحورة وراثيا (الكراى بروتينات التى لم تحدث فيها التغيرات بالطرق الجينية) لم تحدث أية تأثيرات صحية مميزة عندما تؤخذ عن طريق الفم. البيانات عن الكراى بروتينات التى تحدث طبيعيا تنطبق على الكراى بروتينات الأصلية والمحورة وراثيا التى تنتج فى النباتات المحمية ضد الحشرات.

الكراى بروتينات ذات طريقة فعل معقدة وعالية التخصص. بالإضافة الى ذلك توجد مواقع ارتباط خاصة فى اللاقناريات المستهدفة وتتطلب أن يحدث الكراى بروتين النشاط الابدائى ضد الحشرات. التحليل المناعى الخلوى الكيمائى للكراى 1/1 immunocytochemical analysis لم يظهر وجود مواقع ارتباط مقارنة فى الثدييات أو فى الحشرات التى لا تتأثر بهذه البروتينات.

المنتجات الميكروبية الباسيللية Bt ذات تاريخ طويل (٤٠ سنة تقريبا) من الاستخدام الأمن. يوجد تقريرين فقط أشارا الى التأثيرات المعاكسة المؤثرة فى الانسان جراء استخدام المنتجات الميكروبية Bt وأى منهما لم يشيرا الى التعرض للكراى بروتينات (EPA ١٩٨٨، Mc chintock وآخرون ١٩٩٥).

#### التأثيرات الضارة على صحة الانسان Human health implication

المبيدات الميكروبية الباسيللية Bt غير سامة على الثدييات. العديد من الدراسات الخاصة بالأمان على الحيوانات والتى أجريت على مدى أربعين سنة أظهرت أن مخاليط المبيدات الحشرية الميكروبية Bt التى تحتوى على بروتينات غير سامة عندما تتغذى عليها الثدييات. الدراسات التوكسيكولوجية التى سلمت الى وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA لتعصيد تسجيل تحت أنواع الباسيلليس ثوريينجيسيز فشلت فى إظهار أية تأثيرات معاكسة معنوية فى زيادة وزن الجسم أو الملاحظات السريرية أو فى الأنسجة. بشمول أكبر وجد أن هذه الدراسات أكدت غياب السمية الحادة وتحت الحادة والمزمنة عن طريق الفم ترتبط بالمبيدات الميكروبية هذه النتائج وثيقة الصلة ببيانات تقويم أمان النباتات المهندسة وراثيا بيكتريا الباسيلليس لأن التحضيرات الميكروبية تحتوى على نفس أقسام الكراى بروتينات (كراى ١، ٢، ٣) والتى أدخلت وهندست فى النباتات المحمية ضد الحشرات.

أظهرت دراسات السمية الحادة عن طريق الفم التى أجريت على الجرذان والارانب عدم حدوث وفيل مع الجرعات العالية المختبرة ولتى تتراوح من عدة الاف من المليجرامات من المنتج الميكروبي Bt لكل كيلو جرام من وزن الجسم. الدراسات

المنكورة في هذا الجدول لا تظهر أية تأثيرات ضارة في الحيوانات استنادا لعدم حدوث موت أو تغيرات في وزن الجسم واستهلاك الغذاء وكذلك عدم ظهور أية أعراض مرضية شاملة. أظهرت الدراسات الخاصة بالسمية تحت المزمدة في الجرذان أن المستويات عديمة التأثيرات "no effect levels" وصلت حتى ٨٤٠٠ ملجم *Bi* منتج ميكروبي لكل كيلو جرام من وزن الجسم/ يوم. في دراسات التغذية المزمدة لمدة سنتان في الجرذان لم يلاحظ أى نقص في وزن الجسم المكتسب في الإناث التي جرعت جرعة ٨٤٠٠ ملجم/ كجم/ يوم. في غياب التأثيرات المعاكسة الأخرى لم تؤخذ هذه التأثيرات على أنها ذات أهمية من الناحية التوكسيكولوجية كما أن الجرعة ٨٤٠٠ ملجم/ كجم/ يوم اعتبرت هي المستوى عديم التأثير الملحوظ (*McClintock*) *NOEL* (آخرون ١٩٩٥). في دراستان مستقلتان تم تغذية المنطوعين الأميين ١٠٠٠ ملجم من تجهيزات *Bi* الميكروبية كل يوم على امتداد خمسة أيام ولم تظهر عليهم أية أعراض سمية أو أية تأثيرات مرضية. تجهيزات الباسيلليس *Bi* التي استخدمت في دراسات تغذية الأميين كانت تحتوي على جينات تشفر عائلات الكراي بروتينات التالية. *Iaa*، *Iab*، *Ib*، *Ia*، كراي *2A*.

لقد احتوت وثائق دلائل الوكالة *EPA* لإعادة تسجيل مستحضرات *Bi* الميكروبية وغيرها من الدراسات المرجعية إلى مراجع إضافية عن دراسات توكسيكولوجية على الثدييات والتي تم فيها معاملة مستحضرات *Bi* عبر واحد من الطرق والمداخل من التعرض بخلاف الفمى *nonoral* مثل التعرض الرئوى أو الجلدى أو عن طريق العيون أو الحقن البريتونى. لقد أجريت هذه الدراسات لتقويم القدرة المرضية/ العدوى لبكتريا *Bi* في المستحضرات الميكروبية. لقد اعتبرت هذه الدراسات كذلك كمعايير للجودة للتأكد من عدم وجود توكسينات البروتينات غير الكراي (مثل الاكسوتوكسينات) والتي يمكن أن تنتج في بعض سلالات الميكروبات *Bi*. عندما عولمت جرعات كبيرة ( $10^8$  CFUS) من الكائنات الدقيقة الباسيلية *Bi* عن طريق الحقن في القوارض أوضحت بعض من التقارير حدوث وفيات في حيوانات التجارب في بعض الظروف. لقد لوحظ الموت كذلك في القوارض التي تم حفظها بنفس الجرعات الكبيرة من البكتريا غير المرضية مثل الباسيلليس سبتيليس. حيث أن الموت قد يحدث بعد حقن الجرعات الكبيرة من الكائنات الدقيقة غير المرضية فإن الموت الذى حدث في القوارض التي أعطيت جرعات كبيرة من ميكروبات *Bi* ترجع إلى الكراي بروتينات الموجودة في مستحضرات *Bi* الميكروبية (*EPA* ١٩٩٨-1). نتائج دراسات

الحقن والحساسية لم تذكر في هذا المقام لأنها غير وثيقة الصلة بتقويم المخاطر الصحية المؤثرة بسبب التعرض الغذائي للكراي بروتينات التي تنتج في النباتات. حسابات الإستهلاك افترضت عدم حدوث فقد الكراي بروتين خلال تجهيز الغذاء. قيم الاستهلاك الأسمى للغذاء تحصل عليه من قاعدة البيانات *USDA TAS* (*USDA 1993*) / *FRD* (*WHO 1998*) *GEMS*.

متطلبات اختبار الامان لتسجيل منتجات البكتريا *Bi* كانت محط الاعتبار طوال السنوات مع استكمال الدراسات الخاصة بالسمية/المرضية في أعوام ١٩٨٢، ١٩٨٩ ومرة أخرى في ١٩٩٨ (*EPA 1998* ب). بينما أجريت دراسات الامان تحت الزمنة والمزمنة مع ظهور أول منتجات ميكروبية لباسيلية ان الوكالة *EPA* قدرت ان التقويم للأضرار الحادة *acute hazard assessment* كافية لتقويم امان المنتجات الميكروبية *Bi* الجديدة. لقد بنى هذا القرار على حقيقة الكراي بروتينات في منتجات بكتريا *Bi* تعمل من خلال التقنيات الحادة لمكافحة الآفات الحشرية وهذه التقنيات الحادة لمكافحة الآفات الحشرية وهذه التقنيات لا تعمل في الانسان. لقد اعتبرت بطارية من دراسات السمية الحادة/المرضية كافية من قبل الوكالة لإجراء تقويم المخاطر للمبيدات الميكروبية. بالإضافة الى ذلك اتفق على أن الدلتا- اندوتوكسينات للباسيليس *Bi* تؤثر على الحشرات من خلال تقنية معروفة جيدا حيث ترتبط بمواقع خلل في التوازن الاسموزي ليس معروفا وجود مواقع استقبال متماثلة في أنواع الثدييات يمكن أن تتأثر بصرف النظر عن عمر الفرد. لذلك توجد تأكيدات مقنعة بعدم احتمالات احداث ضرر على الرضع والمواليد والأجنة من جراء التعرض الغذائي لمخلفات *Bi*.

#### • تحديد وتقدير امان الغذاء من المحاصيل المهندسة ببكتريا *Bi*:

لقد تم تقرير وتحديد امان النباتات المحمية وراثيا ببكتريا *Bi* والموجودة حاليا في الأسواق كغذاء للإنسان أو علف للحيوان- بالإضافة الى تقييم امان الكراي بروتينات فان الأجزاء التي تؤكل في المحاصيل والبروتينات العلامة للجين تم فحصها كذلك. لقد اتضح أن محاصيل الذرة والقطن والبطاطس المحمية ببكتريا *Bi* متكافئة لحد كبير (مقارنة في التركيب) مع أقرانها غير المهندسة ببكتريا *Bi*. لم تلاحظ اختلافات معنوية في تركيب المكونات مثل الحبوب والبنور والدرنيات والزيت والقش أو أية نواتج ثانوية أخرى بين المحاصيل المهندسة وراثيا ببكتريا *Bi* وأقرانها غير البكتيرية (*Sunders* وآخرون ١٩٩٨). الاختلاف الوحيد يمثل في أن النباتات الباسيليس تقدم

حمية ضد بعض الافات من خلال التعبير عن كراى بروتين خاصة على امتداد البروتين العلامة وكلاما ثبت امانها للاستهلاك الأدمى. تحليل الخصائص الزراعية والمورفولوجية للنباتات المحمية ببكتريا *Bi* تؤكد كفاءة وثبات الصفات المغروسة ونقص التأثيرات غير المقصودة بشكل كبير والتي قد ترجع الى عملية التحويل الوراثى. المحاصيل المحمية ببكتريا *Bi* تحقق المواصفات القياسية لأوامر المنتج والتي وضعت لقليل من الاصناف النباتية. التقييم الخاص بصحة وعفوان النبات، الخصائص النمو والانتاجية المحصولية والجودة والحساسية للأمراض والحشرات أظهر النباتات المحمية ببكتريا باسيللوس متكافئة موفولوجيا وزراعا للنباتات الأم.

### التأثيرات البيئية *Environmental implications*

#### التأثيرات البيئية للكراى بروتينات

لقد خلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية *USEPA* الى مخاطر السمية والعدوى بسبب تأثيرات الدلتا- اندوتوكسينات على الطيور غير المستهدفة وأسماك المياه العذبة واللافقاريات والمحارات والحيوانات البحرية ومفصليات الأرجل من مفترسات/طفيليات ونحل العسل والقراد والحيوانات الثديية تتراوح من أقل ما يمكن *minimal* وحتى عدم الوجود عند معدلات الاستخدام الموصى بها والموضحة على البطاقات الاستدلالية لتسجيل/بكتريا الباسيللوس ثورينجينسيز من المواد الفعالة (*EPA* 1998-1). هذا يقدم دليل قوى أن الكراى بروتينات فى النباتات المهندسة بالباسيللوس *Bi* والتي ووفق على تسويقها تملك مخاطر قليلة على الكائنات غير المستهدفة. مستوى التعرض للكراى بروتين فى نباتات البكتريا *Bi* قليلة لحد كبير عما هو الحال مع التعرض من استخدام المنتجات الميكروبية الباسيلية *Bi* مع المعدلات الموجودة على البطاقات الارشادية. بسبب أن الكراى بروتينات تنهار بسرعة كما أنها تنتج بصفة مستمرة فى النباتات الباسيلية فإن دوام التعرض البيئة سيكون طويلا مع النباتات البكتيرية بالمقارنة بمنتجات *Bi* الميكروبية.

الكراى بروتينات المعبر عنها والتي حظيت بالموافقة الكاملة فى منتجات *Bi* فى أمريكا أظهرت قليل أو عدم تأثير على الطيور والاسماك واللافقاريات المائية ومدى واسع من الحشرات النافعة. أجريت دراسات تم فيها معاملة الكراى بروتين المنقى الذى ينتج فى النظم الميكروبية لتوصيف الصفات التوكسيكولوجية لهذه البروتينات على الكائنات غير المستهدفة. كذلك تمت تغذية الحيوانات بطريقة قريب الشبه وبجحاكى

التعرض الطبيعي للبروتين على الحبوب اللقاح وأنسجة الورقة من مختلف المنتجات النباتية المحمية ببسيليس *Bi*. بوجه عام اتضح عدم حدوث موت أو أية تأثيرات سلوكية على الحيوانات غير المستهدفة التي تغذت على الكراى بروتين بكميات تزيد عن التعرض الطبيعي عشرة أمثال على الأقل وعادة أكثر من ١٠٠ مثل في جميع الحالات لم تسجل حالة واحدة ظهر فيها تأثيرات معاكسة عند مستويات الكراى بروتينات التي تقارب ما يحدث تحت الظروف العادية. بوجه عام تم توصيف الكراى بروتينات على أنها غير سامة على الكائنات غير المستهدفة (*EPA* ١٩٩٦ - ج).

#### التأثيرات البيئية للنباتات مهندسة وراثيا بيكتريا الباسيليليس *Bi*:

بسبب أن الكراى بروتينات ذات تأثير قليل أو عديمة التأثير على الفقاريات واللافقاريات بما فيها مدى واسع من الحشرات النافعة والمجموع غير المستهدفة فإنه يتوقع زيادة تعدادها بسبب ادخال المحاصيل الباسيلية والتي تقلل من استخدام المبيدات الحشرية واسعة التأثيرات. زيادة المجموع هذه يؤدي الى زيادة شاملة في التنوع الحيوى داخل النظم الزراعية وكذلك نقل من احداث خلل في عدد العمليات الايكولوجية المؤثرة. كما نوقش قبالا فإن مجاميع الحشرات غير المستهدفة يتوقع أن تزايد مع خفض استخدام المبيدات الحشرية واسعة التأثير. لقد تأكد هذا الوضع مع نباتات القطن والبطاطس المهندسة وراثيا.

#### ثالثا: الأمان الحيوى فى مصر بين التشريع والتطبيق

عندما تناولت التشريعات الخاصة بالنباتات المهندسة وراثيا والكائنات الدقيقة كذلك فى الدول المتقدمة وأهمية الأمان الحيوى كان لابد أن أبحث عن هذا الأمان فى مصر لأننا مهينين تماما ومستعفين لدخول هذه التكنولوجيا الجديدة من الخارج أو من معاملنا الى الزراعة المصرية والبيئة المصرية. لذلك توجهت الى أخى وصديقى العزيز أ. د. مجدى مذكور مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة أسأله العون والمشورة. لقد تفضل سيادته بإعطائى نسخة من نظام ومحددات وتشريعات تلميس نظام قومى للأمان الحيوى فى مصر: الارشادات والأنظمة" والذي تم إعداده عام ١٩٩٤. سوف أضع هذا الاصدار كما هو دون تطبيق حتى يتأكد القارئ الكريم أننا نتواكب مع متطلبات الامان على نفس المستوى إن لم يكن أفضل من الدول المتقدمة.

## تمهيد:

تحتل تطبيقات التقنية الحيوية موقعا متميزا فى التوسع العلمى الكبير خلال هذا العقد. ولما كان إنتاج وانتشار نواتج الكائنات الحية المعاملة بالهندسة الوراثية قد أثار احتمال تعرض الانسان والبيئة للمخاطر لهذا كان يتعين أن تجرى كافة بحوث التقنية الحيوية فى إطار ضوابط منظمة للأمان الحيوى.

وتعنى هذه الوثيقة بإنشاء نظام قومى للأمان الحيوى فى مصر بهدف تقديم دليل لمساعدة صانعى السياسات فى إنشاء أنسب نظام قومى للأمان الحيوى حيث لا يتوفر هيكل يلائم هذا النظام حاليا. وقد تم إعداد الهيكل المقترح للنظام القومى ويتضمن المرفقات الإرشادات الخاصة بالأمان الحيوى بعد تطويرها بمعرفة المنظمات العالمية المتخصصة.

إن إقامة مثل هذا النظام سوف يؤكد استمرارا التقنية الحيوية فى أمان دون تعريض العاملين والمجتمع والبيئة لأية مخاطر محتملة.

## مقدمة:

المقصود بالتقنية الحيوية أى تقنية تستخدم الكائنات الحية أو مستخرجاتها فى تطوير أو تحسين إنتاج المحاصيل والأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والأمصال والصناعات الكيماوية ومنتجاتها كما ونوعا وتنتج هذه التقنيات بين التقنيات الحيوية التقليدية واسعة الانتشار والتقنيات الحديثة التى تعتمد على طريقة إندماج الحامض النووى الديوكسى ريبوزى المعاد تجميعه (*r-DNA*) ولتى تعرف بالهندسة الوراثية. وتتضمن أعراض استخدام نواتج الكائنات الحية الدقيقة المطورة وراثيا للسيطرة على الأمراض ومبيدات الحشائش فى الزراعة وإنتاج اللقاحات وتطهير النفايات من الكيماويات السامة والفرشيش الميكروبى للخامات المعدنية وتحسين استخلاص الزيوت البترولية. وتكتسب النباتات المعاملة بالهندسة الوراثية عدة مزايا منها زيادة المقاومة للأمراض ومبيدات الحشائش، تحمل الجفاف والظروف البيئية الأخرى الغير ملائمة، تقليل الفاقد من المواد الغذائية أثناء التخزين والنقل وزيادة القيمة الغذائية أثناء التخزين والنقل وزيادة القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية.

## الأمان الحيوى:

يستخدم هذا المصطلح فى شرح السياسات والطرق المتبعة فى تأمين التطبيقات الأمان للبيئة للتقنيات الحيوية الحديثة. ويكتسب سعة الانتشار بقر ما تسعى كثير من

الدول للإفادة من التطبيقات العلمية الحديثة في الزراعة والطب والبيئة دون أن تتعرض الصحة العامة والأمان البيئي للخطر.

وقد أسست العديد من الدول الصناعية الأنظمة الخاصة بقواعد التقنية الحديثة، كما قامت اللجنة الاستشارية *r-DNA* (الحامض النووي الديوكسي ريبوزي) بمعهد الصحة القومي (NIH) بتطوير أساليب اختبار وتقييم الأمان للتجارب المقترحة ونشرت إرشادات مكتفة للشروط التي يقتضى عند إجراء نماذج من التجارب المتنوعة. وتقتصر إرشادات معهد الصحة القومي على الاستخدام للمعوى لمادة *r-DNA* دون إطلاق الكائنات المعاملة وراثيا إلى البيئة ويتضمن المرفق رقم "١" إرشادات معهد الصحة القومي.

ولما كان اختبار الحامض النووي الديوكسي ريبوزي المعامل بالهندسة الوراثية يجب أن يجرى خارج العمل فهناك طريقة تعرف بالاطلاق المثاني *Deliberate* أو الإدخال المخطط *Planned introduction* لإدخال هذه الكائنات المعاملة في البيئة مما قد تنشأ عنه بعض المخاطر المصاحبة لتمرير هذه الكائنات المعاملة بالهندسة الوراثية.

← أسئلة تتعلق بالتعريف بالأخطار التي تنشأ عن إطلاق الكائنات الحية الدقيقة في البيئة:

- هل يمكن أن ينشأ مضافة عن استخدام تكنولوجيا *r-DNA* أمراض وبائية جديدة للنبات؟
- هل يقود استخدام *r-DNA* إلى تحويل الكائن غير المرضى إلى كائن ممرض بمحض الصدفة؟
- هل من الممكن انتشار الجين المستحدث في الأوساط الميكروبية؟
- هل هناك تأثير للكائنات الحية الدقيقة المعاملة بالـ *r-DNA* على إحداث تغيير بالتجمع الميكروبي للتربة؟

حدثت الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم (NAS) المخاطر الناتجة عن إطلاق الكائنات المعدلة بالهندسة الوراثية فيما يلي:

- ليست هناك أية شواهد تنبئ عن وجود خطر واحد سواء من استخدام تقنيات *DNA* أو من نقل الجينات بين كائنات متباينة.

• تتماثل المخاطر المصاحبة لإدخال الكائنات المعاملة بالهندسة الوراثية من حيث النوع- بذلك المصاحبة لإدخال كائنات غير مطورة أو الكائنات المطورة بطرق أخرى.

فى خطوة لاحقة دعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الى عقد اجتماع لمجموعة من الخبراء بفيينا فى مارس ١٩٩١ ضم عشرين خبيراً يمثلون النواحي الأكاديمية والصناعية والحكومات من الدول النامية والمتقدمة والمنظمات الدولية لإعداد مسودة دستور (أو مجموعة مبادئ) تحكم التداول الأمن واستخدام وإطلاق الكائنات الحية المعدلة التركيب الوراثى فى البيئة وذلك فى محاولة لإيجاد تجانس بين الارشادات القائمة واقتباس الحد الأدنى من المبادئ المقبولة على المستوى العام وتقديم إطار عمل دولى فى صورة مجموعة مبادئ لإطلاق الكائنات الحية المعاملة بالهندسة الوراثية، وذلك بهدف إقامة الحد امقبول من التعاون الدولى اللازم.

قد عنى بأن تكون هذه الارشادات تم التعبير عنها فى هذا الكود صديقا للمستخدم بفرض: تنشيط مراحل التقنية الحيوية وتقديمها والتي يمكن تطويرها أو امتدادها لتتلائم مع حالات بعينها تبعاً لرغبة كل دولة ويتضمن المرفق رقم (٢) *Code of conduct* هذا الكود.

ولقد وجهت الدول النامية أيضاً بالطلب المتزايد على ادخال أبحاث الحامض النووى الديوكسى ريبوزى المعاد تجميعه *r-DNA* ونتيجة للحاجة العاجلة للمجتمع العلمى لتوفير المشورة لكل من الباحثين والمنظمين فى مجال تقييم المخاطر المصاحبة للتقنية الحيوية.

لهذا يتعين انشاء نظام قومى للأمان الحيوى فى إطار التنظيم القائم والمعاهد العلمية المتوفرة والافراد والتشريعات الحالية. بأكبر قدر مستطاع بحيث يقيم الآليات المناسبة لكل من التطبيقات المحتواه وغير المحتواه بما يتضمن أمان المنتجات المستخدم فيها أساليب التقنية الحيوية التقليدية.

هذا ويتطلب إعداد سياسة قومىة لقواعد أبحاث *r-DNA* فى الدول النامية توفر العناصر التالية:

١- إيجاد هيكل قومى تنظيمى مع توفر الدعم المالى ، ويتألف الهيكل التنظيمى من:

أ- لجان الامان الحيوى التى تتكون منها السلطة التنظيمية

ب- مجموعة من التشريعات الخاصة بالأمان الحيوى والقواعد والارشادات التى

يجب إتباعها



- ٢- إتاحة التمويل والخبرات العلمية والفنية المناسبة لتحليل قيم المخاطر وأشكالها.
  - ٣- التنسيق مع المنظمات الدولية.
  - ٤- تحديد الية لتجميع المعلومات الخاصة بالظروف الزراعية والبيئية والمحلية.
  - ٥- أنظمة لمراقبة تطور التقنية الحيوية التى قد تؤثر على صحة العاملين وسلامتهم.
  - ٦- توفر الثقة فى خبرة صانعى القرار.
  - ٧- أنظمة لتوفير المعلومات والتوعية اللازمة للجمهور.
- تقدم هذه الوثيقة مقترحات خاصة للسياسات والاجراءات التى قد ترغب السلطات الوطنية فى الأخذ بها عند انشاء نظام الأمان الحيوى، كما تتضمن اقتراح هيكل تنظيمى وأمثلة لطرق تقييم المخاطر والارشادات الملائمة للبيئة المصرية.
- ومرفق طيه المستويات المقبولة دوليا لمجموعة المبادئ مع تقديم أمثلة للبحث مقيمة فى اطار الارشادات. ومما يجدر ذكره أن جميع هذه البنود تقدم وتناقش كامثلة لخطوة متناسقة لنظام الأمان الحيوى. كما أنه من الأهمية بمكان الإشارة الى أن هذا العرض عكس مخترارات بسيطة من العدد الكبير من الأليات المستخدمة دوليا على نطاق واسع لأغراض الأمان الحيوى.
- وختاماً تجدر الإشارة الى أن المخاطر التى قد تتعرض لها صحة الانسان والبيئة لا تقتصر على التقنية الحيوية بوجه خاص، بل أن هذه الاسئلة قد طرحت كعنصر هام فى مجال تقنية وتنظيم الارتفاع بمستوي المنتجات باستخدام أكثر من التقنيات القديمة والحديثة مثل التقنيات القديمة والحديثة مثل الكيموايات والمستحضرات الدوائية.
- تعريفات:**
- البيئة المتاحة (المتكيفة):** تعزى الى تلك البيئة التى فى إمكان الكائن الحى ونتاجه الوصول اليها اذا ادخل الى مكان البحث.
- الأمان الحيوى:** يعزى الى السياسات والطرق المجهزة لكى تضمن التطبيق الأمنى البينى على التكنولوجيا الحيوية.
- الحصر (الاقتصار):** يعزى الى حجز أو تقليل انتشار أو بقاء الكائن الحى أو منتجاته فى البحث الشامل على ادخال هذه الكائنات الحية الى البيئة.
- الإمكانات المتاحة:** تعزى الى المباني (مثل المعامل والصوب) التى تحبط بالكائن الحى وتمنعه أو تحد من حركته خارج البناء.

الكائن الحي المتغير (المحور) وراثيا: يعرف علميا بأنه ذلك الكائن الحي الذي عدلت صفاته الوراثية بواسطة التدخل البشرى باستخدام أى طريقة تؤدي الى ادخال أو إعادة ترتيب أو انتقال المادة الوراثية من جينات الكائن الحي.

النظام البيئي الطبيعي أو المعدل: يعزى الى النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة وتفاعلاتها فى البيئة الداخلية والبرية.

الكائن الحي: هو أى كينونة حيوية سواء كانت خلوية أو لا خلوية مع قدرته على البقاء ذاتيا واستجابته لعوامل وقوة وتطور.

الكائن الحي الأصيل (الابوى): يعزى الى الكائن الحي الأول الذى يصبح مستقبلا لإدخال المادة الوراثية أو الجين الخاص به يصبح متغيرا عن طريق ازالة أو إعادة ترتيب مادته الوراثية.

المشروع البحثى المخطط للإدخال فى البيئة: يعزى الى المشروع البحثى خارج الأماكن المخصصة فى مكان مصمم مع تقييد ملائم المهندس وراثيا للكائن الحي الى البيئة DNA -r.

تقييم المخاطر: يعزى الى تقييم المخاطر من الإدخال على الانسان ونظام التدبير الطبيعى أو المروض.

#### المصطلحات

اللجنة الاستثمارية لبحوث الهندسة الوراثية الزراعية	ABRAC
خدمات فحص صحة الحيوان والنبات	APHIS
موظف (قائد) الأمان الحيوى	BSO
التقييم البيئى	EA
البحث عن أثر غير هام	FONSI
كائنات حية مهندسة وراثيا	GEOS
كائنات حية معدلة وراثيا	GMOS
لجنة الأمان الحيوى	IBC'
معدل الأهمية الأمنية	LSC
الأكاديمية العلمية الدولية	NAS
اللجنة القومية للأمان الحيوى	NBC
برنامج تقييم الأثر الحيوى الدولى	NBIAP
معاهد الصحة الدولية	NIB
الممثل (المفتش) الرئيسى	PI
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	UNIDO
وزارة الزراعة الأمريكية	USDA

أصبحت إقامة نظام قومي للأمان الحيوى ضرورة ملحة نتيجة الزيادة السريعة فى إدخال تطبيقات التقنية الحيوية فى مصر.

إن إقامة أمان حيوى قومي مع ضمان الالتزام بقواعدها يحقق الآتى:

١- التأكيد على استمرارية التقنية الحيوية بصورة امنه دون تعريض العاملين والمجتمع والبيئة لأية أثار ممكن تجنبها.

٢- تسهيل الوصول الى التقنيات الحيوية المبكرة بالخارج حيث أن كثير من المعاهد الدولية والشركات لا تقوم باختبار كلنات حية معاملة بالهندسة الوراثية الا بعد الموافقة عليها من جهة حكومية مسئولة.

٣- سرعة تقبل المجتمع مع ما يتبعه ذلك من مزيد من التنمية للتقنية الحيوية الحديثة.

المبادئ الأساسية لإعداد سياسة قومية لتنظيم التقنية الحيوية.

١- المراجعة الدورية لإبراز الخصائص والمخاطر التى تم التعرف عليها لمنتجات التقنية الحيوية دون الاقتصار على الطريقة التى أحدثتها بصفة أساسية.

٢- يجب أن تكون مراجعة التقنية الحيوية التى يتعين مراجعتها مصممة على أساس معايير الكفاءة والتأثير مع التأكيد على حماية الصحة العامة وأمان البيئة.

٣- يراعى أن تتكامل الاحتياجات التنظيمية للتقنية الحيوية الحديثة فى اطار قواعد المنظومة الشاملة التى تحكم عملية ادخال منتجات جديدة فى القطاع الزراعى.

٤- أن درجة معرفة سلوك الكائنات المثيلة عند اطلاقها فى البيئة يجب أن تحدد مستوى التنظيم المطلوب بحديه الأدنى والأقصى اعتمادا على درجة المخاطر التى تم التعرف عليها.

٥- يتعين أن تكتسب برامج المنظومة المرنة والقدرة على سرعة التكيف مع للمعلومات الجديدة والتقدم السريع فى التقنية الحيوية.

#### الجزء الأول: لجان الأمان الحيوى

إن إنشاء لجنة استشارية قومية للأمان الحيوى يعتبر الخطوة الاولى فى تطوير السياسات الملزمة والاجراءات الخاصة بالتقنية الحيوية، حيث تقوم هذه اللجنة بسرعة وضع السياسات وتحديد الاجراءات التى تحكم استخدام التقنية الحيوية الحديثة فى البلاد.

## (١) اللجنة القومية للأمان الحيوى (NBC) National Biosafety Committee

شكلت لجنة مصرية قومية للأمان الحيوى تضم أعضاء من واضعى السياسات والمصممين والخبراء العلميين فى الزراعة والصحة والبيئة من الحكومة والمعاهد الأكاديمية للبحوث.

### الجزء الثانى: ارشادات (احتياطات) الأمان الحيوى

#### (١) تقدير أو تقييم المخاطر

إن مدى تعرض صحة العاملين والآخرين بالقرب من مكان العمل هو العنصر الرئيسى الهام فى تقدير المخاطر المصاحبة لاستخدام الكائنات الحية المحورة وراثيا. هذه المخاطر تتناسب مع مجال وطبيعة العمل وكل الأجهزة المنظمة تفضل الاستخدام المحدود لها فى مجال البحث والتنمية.

أما الاستخدام الواسع النطاق الذى قد يسبب خطورة على الصحة أو البيئة المحيطة وزيادة المخاطر المحتملة بالبيئة عندما قد يحدث تسرب الكائن الحى من منطقة الانتاج لذلك فإنه يجب استخدام طرق أخرى أكثر صرامة لاحتواء هذه الخطورة.

الاحتواء ممكن أن يكون عملا طبيعيا ومثال ذلك الحواجز التى تحد من تسرب الكائنات الحية أو احتواء حيويا ومثال ذلك التحكم الفسيولوجى فى حيوية وتضاعف وتكاثر الكائن خارج البيئة الأصلية.

• فى عام ١٩٨٩ وضعت الأكاديمية الدولية للعلوم (NAS) الأسئلة الثلاثة التالية للحكم على درجة الخطورة:

- ١- هل نحن ملمين بخواص الكائن الحى والبيئة المحتملة استقدامه إليها ؟
  - ٢- هل نستطيع أن نتحكم فى الكائن الحى بكفاءة ؟
  - ٣- ما هى التأثيرات المحتملة على البيئة وهل الكائن الحى أو الخاصية الوراثية المستقدمة تبقى لوقت أطول من المتوقع أو تنتشر بالبيئة غير المستهدفة ؟
- إن التكنولوجيا الحديثة تثير العديد من الاسئلة على درجة الخطورة والتى تنفجر الى قلة أو انعدام المعلومات التى تساعد فى تقييمها.

والتعريف المقترح يكون الخطر = احتمالية الخطورة x درجة الخطورة

كما شرح مسبقاً أن التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى إنتاج محاصيل بخواص جديدة مفيدة للجنس البشرى وهذا يعنى إذا كان هناك أى زيادة فى الخطورة يجب أن يتوازن مع المنفعة الناتجة من المحصول الجديد وسنعتبر الخطر بأنه الخطر المقبول.

### احتمال المخاطرة × درجة الخطورة

الخطر المقبول =

#### المنفعة من المنتج

وحتى يتسنى لنا فهم الظروف التى يمكن أن تؤدى إلى تحول نبات معدل التركيب الوراثى إلى حشيشة ضارة أو ذو تأثير ضار على البيئة، فإنه يجب معرفة تأثير العوامل فى الموديل التالى:

معدل زيادة النبات المعدل التركيب الوراثى فى بيئة معينة = معدل نمو وتكشف النبات + انتاجه للبذور (الوقت والمدة).

+ بقاء الأجزاء الخضراء حية (مطروح منه معدل الموت)

- تأثير المنافسة مع النباتات الأخرى من نفس النوع

- تأثير المنافسة مع الأنواع الأخرى من النباتات

- تأثير الآفات الزراعية (الحشرات والفطريات)

- تأثير الفطريات وأمراض النبات الأخرى

+ هجرة البذور المنقولة وراثياً من أماكن أخرى

+ معدل إنتاج النباتات المعدلة التركيب الوراثى من بذور ساكنة فى التربة

يجب أن نقيم الظروف التى يجرى تحتها البحث بالكائنات الحية المحورة وراثياً بأمان المقارنة مع الظروف المقبولة طبيعياً لإجراء بحوث على الكائنات الحية الأصلية (الأبوية).

وعلى ذلك فإن تقييم الأمان يكون ضرورياً لتحديد مستوى العمل الأمنى.

#### ١- تحديد مستوى العمل الأمنى LSC

أوصت اللجنة الاستشارية لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية بخطوات متدرجة للسكرتير المساعد للعلوم والتربية لتقييم مستوى العمل الأمنى للكائنات الحية المحورة وراثياً والتى تنقسم إلى ثلاث مستويات وتحديد مستوى العمل الأمنى ذو أهمية عظمى لتحليل خطورة استخدام الكائنات المحورة وراثياً على صحة الإنسان والنظام البيئى الطبيعى.

## الخطوة الأولى:

تحديد مستويات العمل الأمني للكائنات الأصلية (الابوية) والتي تعتمد على خاصيتين هما:

- ١- درجة الخطورة على صحة الانسان والبيئة المحيطة أو النظام البيئي الطبيعي.
- ٢- القدرة على التعامل أو التحكم فى الكائن الحي أثناء استقدامه المخطط الى البيئة وبناءا عليه يجرى البحث بطريقة امه.

### المستوى الأول للعمل الأمني للكائنات الحية الأصلية (الابوية)

الكائن الحي يؤدي الى خطر قليل للصحة وليس هناك خطر غير معقول على البيئة المعاملة أو النظام البيئي الطبيعي. هذه الكائنات الحية والتي لها مساهمات بيئية فى البيئة الخاصة المستقبلية تكون مفهومة.

بعض المساهمات فى الخليط ممكن أن تشير الى المستوى الأول هي:

- ١- ليس هناك تاريخ لأثار سئية فى البيئة المستقبلية.
- ٢- قدرة ضئيلة على التحور لتصبح كائنات حية ضارة فى البيئة المستقبلية (سهلة الوصول).

٣- احتمال ضئيل لبقائها فى البيئة المستقبلية (سهلة الوصول).

### المستوى الثاني للعمل الأمني للكائنات الحية الأصلية (الآباء)

الكائنات الدقيقة والتي لها مساهمات بيئية فى البيئة المستقبلية ممكن أن تؤدي الى خطورة مع صحة الانسان والتي ليست بالضئيلة أى ممكن أن تؤدي الى ضرر أو خطورة غير معقولة للنظام البيئي الطبيعي والتي يمكن أن تعامل وتحكم بواسطة حصر مناسب (وضع مناسب).

### المستوى الثالث للعمل الأمني للكائنات الحية الأصلية (الآباء)

الكائنات الحية التي لها صفات بيئية فى البيئة المتقبلة يمكن أن تؤدي الى خطورة على الصحة الأمية والتي ليست بصورة ضئيلة أو تؤدي الى خطر غير معقول للبيئة المعاملة أو النظام البيئي الطبيعي. وليس هناك حصر يمكن اجراؤه ليؤكد أن التطبيق الأمن للبحث خارج الإمكانات المتوفرة.

بعض الخصائص التي تحدد المستوى الثالث للأمان للكائنات الحية هي:

- ١- ثبات لتأثير ضار على البيئة المخصصة.

٢- القدرة على البقاء والانقسام في البيئة.

٣- ليس له حالة مستقرة في البيئة.

٤- كثرة تبادل المعلومات الوراثية مع تأثير ضار.

٥- افتقاد الطرق المؤثرة للحد من انتشار أو تسرب الكائنات الحية.

٦- افتقاد الطرق الكافية للسيطرة أو منع حالات الانتشار.

**الخطوة الثانية:** تحديد تأثير التغيرات الوراثية على مستوى العمل الأمني

يجب أن يقيم التغيرات الوراثية على أساس تأثيرها على صفة الكائن الحي الأصيل (الأبوي) والتي قد تم تقييمها في الخطوة الأولى. حيث أن التحور الوراثي قد لا يكون له تأثير على الأمان أو يتطلب زيادة الأمان الحيوي.

**تأثير التحور الوراثي على الأمان يجب أن يقيم على الأسس التالية:**

١- تأثير مباشر للكائن الحي على صحة الإنسان أو البيئة.

٢- تأثير غير مباشر للكائن الحي من خلال المواد التي ينتجها.

٣- تأثير التبادل الوراثي مع الكائنات الحية الأخرى.

في الخطوة الثانية يجب على الباحثين أن يفحصوا طريقة التحور الوراثي والخواص الجزيئية وثبات الجينات المحورة والتعبير والوظيفة وتأثيرات الجينات المحورة.

**النوع الأول:** التحور الوراثي الذي يقلل العمل الأمني للكائنات الحية المحورة.

التحورات التي تمنع أو تعوق نشاط الجين أو الجينات المسؤولة عن الصفات مثال ذلك: القدرة على أحداث المرض والخصوبة والبقاء والتلازم بطريقة تؤدي إلى زيادة الأمان للكائن الحي.

**النوع الثاني:** التحور الوراثي الذي ليس له تأثير على العمل الأمني للكائن الحي المحور يتطلب ذلك دراسة واعية بالبيولوجية الجزيئية والعلوم الأخرى التي تتطلب الخبرة المناسبة والتي توضح أن التحور قد تم توصيفه جيدا وأن وظيفة الجين وتأثيره قد تم استيعابها لتوقع الأمان.

**التحورات تشمل:**

١- إدخال أو حذف أو إعادة ترتيب جزء من الأحماض النووية والذي ليس له أي

عواقب في المظهر الخارجي أو الوراثي في البيئة.

٢- إدخال أو حذف أو إعادة ترتيب الأحماض النووية التي لها عواقب متوقعة في المظهر الخارجي أو الوراثي في البيئة وغير مرغوبة ويمكن أن تؤدي إلى تأثير ضار إضافي إلى الصحة الانسية والبيئة.

النوع الثالث: التحور الوراثي الذي يزيد العمل الأمني للكائن الحي المحور تشمل التحورات ما يلي:

- ١- إدخال أو حذف أو إعادة ترتيب الأحماض النووية التي تؤثر على تعبير الجينات ولكن الوظائف أو التأثيرات ليس مفهومة بصورة كافية بالتأكيد ما إذا كان الكائن الحي المحور يؤدي إلى خطر أكبر من الكائن الحي الغير محور.
- ٢- إدخال أو حذف أو إعادة ترتيب الأحماض النووية والتي لها عواقب معروفة أو متوقعة في الشكل الظاهري أو الوراثي في البيئة إلى آثار سيئة إضافية على صحة الإنسان والبيئة.

الخطوة الثالثة: تحديد مستوى العمل الأمني للكائنات الحية المحورة وراثيا تصنف للكائنات الحية المحورة وراثيا تبعا لدرجة الأمان الحيوي المطلوبة إلى ثلاث مستويات تبعا لتأثير التحور الوراثي على خصائص أو صفات الكائن التي تأثرت وقد تؤدي إلى تغيير مستوى العمل الأمني للكائنات الحية المحورة بالمقارنة بالكائن الحي الغير محور.

مستوى العمل الأمني للكائن الحي المحور وراثيا يعتمد على نفس الخصائص المطبقة لتقدير أو تحديد مستوى العمل نس الخصائص المطبقة لتقدير أو تحديد مستوى العمل نفس الخصائص المطبقة لتقدير أو تحديد مستوى العمل الأمني للكائن الحي الأصلي (الأبوي).

#### المستوى الأول (الكائن الحي الأصلي)

- المستوى الأول للعمل الأمني للكائن الحي الأصلي مع النوع الأول من التحور يعتبر LSC-1 للكائن الحي المحور وراثيا.
- المستوى الأول للعمل الأمني للكائن الحي الأصلي مع النوع الثاني من التحور يعتبر LSC-2 للكائن الحي المحور وراثيا.



– المستوى الأول للعمل الأمني للكائن الحي الأصلي من النوع الثالث من التحور  
يؤدى الى LSC-3 , LCS-2 , LSC-1 كائنات حية محورة وراثيا تعتمد على  
درجة العمل الأمني كالاتى:

١- إذا كان التحور من النوع الثالث يؤدى الى زيادة طفيفة فى العمل الأمني وعليه  
الخطر لصحة الانسان تبقى طفيفة أو مهمة والخطورة للبيئة المعاملة أو النظام  
البيئي الطبيعى تبقى معقولة بدون الاحتياج الى مقاييس منع وعليه تبقى الكائن  
الى المحور وراثيا LSC-1.

٢- إذا كان التحور من النوع الثالث يؤدى الى زيادة العمل الأمني للدرجة التى فيها  
الخطورة لصحة الانسان ليست مهمة أو الخطر للبيئة أصبح ليس معقول ولكن  
الحصر الممكن لإجراءه والتمتع لإجراء البحث مع وجود خطورة ضئيلة على  
صحة الانسان والبيئة ومن ثم الكائن الى المحور يكون LSC-2.

٣- إذا كان التحور من النوع الثالث يؤدى الى زيادة العمل الأمني للدرجة التى  
يكون فيها الاخلال للبيئة غير مستطاع التعامل معه أو التحكم فيه بصورة كافية  
لتحقيق خطورة ضئيلة على صحة الانسان وخطورة معقولة على البيئة. ومن ثم  
يكون الكائن الى المحور يكون LSC-3.

#### المستوى الثانى للكائن الحي الاصيل (الأبوى)

١- المستوى الثانى من العمل الأمني للكائن الحي الاصيل من النوع الأول التحورات  
تؤدى الى LSC-1 أو LSC-2 للكائن الى المحور وراثيا تتوقف درجة العمل  
الأمنى على ما يلى:

أ- لو كان التحور من النوع الأول يقلل العمل الأمني الى الحد الذى يؤدى فيه  
الكائن الى خطورة منعدمة أو ضئيلة على صحة الانسان وخطورة  
معقولة على النظام البيئي المعامل أو الطبيعى. بدون الحاجة الى مقاييس  
حصرية وعليه يكون الكائن الى المحور وراثيا LSC-1.

ب- لو كان التحور من النوع الأول يقلل العمل الأمني والخطورة على صحة  
الإنسان تكون منعدمة والخطورة على النظام البيئي الطبيعى أو المعامل  
تكون معقولة فقط عندما تعامل باستخدام المقاييس الحصرية وعليه يكون  
الكائن الى المحور وراثيا LSC-2.

٢- المستوى الثاني من العمل الأمني للكائن الحى الأصل من النوع الثاني المحور يظل LSC-2 كائن حى متحور وراثى. مقاييس حصرية مناسبة ضرورية لنشر المخطط فى البيئة.

٣- المستوى الثاني من العمل الأمني للكائن الحى الأصل من النوع الثالث المحور ينتج فى LSC-2 أو LSC-3 كائن محور وراثى. تعتمد على درجة الزيادة فى العمل الأمني كالاتى:

أ- إذا كان المستوى الثالث للتحوير يرفع من درجة الأمان الحيوى ولكن الإدخال المخطط للبيئة يظل ممكن معاملته أو التحكم فيه بواسطة قياسات حصرية منسبة ومن ثم يكون الكائن الحى المحور وراثيا LSC-2.

ب- إذا كان النوع الثالث للتحوير يرفع درجة العمل الأمني للدرجة التى يكون معها تأكيد غير معقول بأن الإدخال المخطط فى البيئة يمكن أن يعامل أو يحكم. ومن ثم يكون الكائن الحى المحور وراثيا LSC-3 يجرى البحث تحت مقاييس حصرية حتى يكون هناك تأكيد بأنه يحكم بإسلوب امن.

#### المستوى الثالث للكائنات الحية الأصلية (الأبوية)

المستوى الثالث للعمل الأمني للكائن الحى الأصل من النوع الأول المتحور يودى الى كائن حى محور وراثيا LSC-3 , LSC-2 , LSC-1 معتمدا على درجة التقليل فى العمل الأمني كما يلى:

١- لو أن النوع الأول من التحوير يقلل العمل الأمني الى الدرجة التى فيها الإدخال المخطط فى البيئة يودى الى خطورة منعمة أو قليلة على صحة الانسان خطورة معقولة على النظام البيئى المعامل أو الطبيعى وعليه أن يكون الكائن الحى المحور وراثيا LSC-1.

٢- لو كان النوع الأول من التحوير يقلل العمل الأمني ولكن المقاييس الحصرية تكون ضرورية للإدخال المخطط فى البيئة مع خطورة منعمة لصحة الانسان وخطورة معقولة للنظام البيئى المعامل أو الطبيعى وعليه يكون الكائن الحى المحور وراثيا LSC-2.

٣- لو كان النوع الأول من التحوير يقلل العمل الأمني ولكن ليس للدرجة التى يمكن بها معاملة أو التحكم فى الإدخال المخطط للكائن الحى لتحقيق خطورة منعمة

على صحة الانسان وخطورة معقولة للنظام البيئي الطبيعى أو المعامل ومن ثم وعليه يكون الكائن الحى المحور وراثيا LSC-3.

— المستوى الثالث من العمل الأمنى للكائنات الحية الأصلية مع النوع الثالث أو الثانى من التحور ينتج كائنات حية محورة وراثيا LSC-3.

#### ← احتياطات الأمن الحيوي

احتياطات الأمن الحيوي مصممة للتأكد من أن المنتجات من التكنولوجيا الحيوية ليس لها تأثير على البيئة أو الزراعة وكذلك منع انتشار الميكروبات المهندسة وراثيا من الانتشار العشوائى.

بالإضافة لحماية الجماعات المحيطة المتعاملين والباحثين فى مجال استخدام مثل هذه المنتجات بدءا من مرحلة البحث حتى التوزيع التجارى.

#### (١) احتياطات الأمن الحيوي بالمعامل

- ١- ممنوع تخزين الأطعمة وتناول المأكولات والمشروبات والتدخين.
- ٢- ممنوع استخدام الماصات التى تستخدم بالقم.
- ٣- ارتداء الملابس الخاصة بالمعمل إجباريا ويجب أن تخلع قبل الخروج من المعمل.
- ٤- يجب أن تطهر الأسطح المستخدمة بواسطة الصابون والكحول بعد انتهاء العمل اليومى.
- ٥- النفايات أو الفضلات يجب أن تطهر بواسطة التعقيم أو الحرق.
- ٦- تكرار غسل الأيدي إجباريا (على الأقل تواجد حوض واحد لغسل الأيدي).
- ٧- يجب اجتناب لمس الميكروبات المحورة وراثيا والمواد البيولوجية المستوردة ويجب لبس الجوانتى عند التعامل مع هذه المواد ولا تستخدم هذه الجوانتيات إلا مرة واحدة.
- ٨- أبواب المعامل يجب أن تكون مغلقة طوال الوقت.
- ٩- التعامل مع الكيماويات المنتجة للأبخرة داخل المكان المخصص لذلك.
- ١٠- علامات التحذير يجب أن تعلق دائما فى المعامل.

#### (٢) احتياطات أو إرشادات خاصة بالأمن الحيوى للصويك (الببوت الزجاجية)

- يجب أن تكون الصوب مغلقة دائما

- درجة الأمان الحيوى وكود ورمز الأمان يجب أن يكون مطلق على مدخل الصوبة.

- نظام الهواء يجب ألا يسمح بانتشار حبوب اللقاح أو الميكروبات المحورة وراثيا من الصوب.

- جميع أجزاء النبات سواء حبة أو غير حبة أو النباتات التى أدخلت فى الصوب عن التخلص منها يجب تعقيمها أولا أما اذا كانت ستخزن فيجب أن يكون التخزين فى أماكن أخرى مجهزة وفى هذه الحالة يجب مراعاة شروط الأمان وأثناء النقل.

- المياه الناتجة يجب أن تعالج كيميائيا قبل أن يتم تصريفها.

- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالصوب طوال الوقت ويجب تعقيم هذه الملابس قبل الخروج من الصوب لأى سبب.

- يجب غسيل الأيدي قبل الدخول وعند الخروج من الصوب.

- وجود دواسة مغموسة فى مادة مطهرة عند مدخل الصوب.

- تسجيل يومية للتجارب التى تجرى فى الصوب.

### (٣) احتياطات الأمان الحيوى فى التجارب النصف حقلية

- ممنوع إجراء التجارب الحقلية بواسطة افات نباتية مستوردة وممرضة.

- يجب منع حبوب اللقاح الخاصة بالنبات من الانتشار عن طريق ازالة الزهور.

- يجب أن تغطى الزهور قبل النضج إذا كان هناك حاجة للزهور فى إقامة التجربة.

- تصميم مناسب للعزل يجب أن يقام بحيث يتجنب انتشار الزهور الى مناطق أخرى قريبة.

- ممنوع الدخول فى المناطق المعزولة لغير المسموح بهم.

- يجب أن تتخذ احتياطات خاصة للتأكد من عزل النبات أو أجزاء منه عند الحصاد.

- يجب أن يكون محمى من دخول الحيوانات والحشرات عن طريق عمل أسوار محيطة بالمكان.

## تقييم الظروف البيئية

## تقييم الظروف البيئية تمثل:

- النتائج العلمية والمعلومات الأخرى من الهيئات الحكومية قبل إصدارها للسماح للاختبارات الحقلية والمحدودة والمرتبطة بالنباتات المهندسة وراثيا على أن تجرى فى نطاق اختبار ضيق.
- تقييم الظروف البيئية وتحليل النتائج للتأكد من أن المحاولة الحقلية ذات النطاق المحدود سوف لا تؤدي الى مخاطرة عند اجراءها وليس لها مغزى على نوعية البيئة البشرية.
- وذلك يتم تقييمه خلال ما يعرف بإيجاد صدمة ليس ذات أهمية. سوف تحدد ما اذا كان السماح يجب أن يصدر أو يمنع على عدة عوامل قليلة. وهناك مثال واضح فى المقطع رقم ٤.

## (٤) نقط المحتواه المأخوذة فى الاعتبار

- هل الكائن الحى المهندس وراثيا له تأثير على المجتمعات النباتية معرض للخطر أو مهدد للكائن الحى والانسان وصحة النبات والحيوانات وكذلك على المصادر الوراثية (مثل قابلية الأجناس الاقتصادية الهامة للمبيدات الزراعية أو المبيدات الحشرية ، أو الانتاج للزراعى).
- ما هى معدلات إمكانية الحياة للكائنات المحورة فى الحالات المتغيرة مثال وجودها فى المنطقة متحررة أو البيئة المحيطة.
- ما هى معدلات تكاثر الكائنات فى هذه المناطق؟ ما هى مقدرة الكائنات على الانتشار فى المنطقة المنتشرة منها؟
- ما هى مقدرة الكائنات على الانتشار خارج المنطقة الموجودة بها؟
- ما هى وسائل الانتشار؟ وما هى العواقب الناتجة عن وجود هذه الكائنات فى البيئة بعد الخطأ أو الوقت المخطط له؟
- ما هى الطرق المستخدمة للتحكم أو التخلص من الميكروبات أو الكائنات الحية من المكان والبيئة المحيطة وهل هذا الاجراء مطلوب؟ وما مقدرة أو كفاءة هذه الطرق؟
- النباتات: انتشار الجينات المهندسة وراثيا بواسطة حبوب اللقاح هو أحد الاهتمامات الرئيسية اخذين فى الاعتبار أن يكون التصميم التجريبي ومكانة وحالات الطقس كافية للحد من انتقال الجينات الى النباتات المتماثلة جنسيا.

## الكائنات الحية الدقيقة المصاحبة مع النبات

- هل الكائن الحي قادر ليعبر عن نفسه فى أو على النوع الغير مستهدف فى البيئة المحيطة. الى أى مدى يمكن للكائن أن يعيش ويتكاثر على أو فى النبات المستهدف أو النباتات الأخرى فى المكان المختبر والبيئة المحيطة.
- هل الخصائص للمحورة وراثيا يمكن أن تنتقل الى كائنات حية دقيقة أخرى فى البيئة.
- هل هناك أى تأثير على الكائنات الحية الدقيقة بالتربة والتي تعتبر ناقعة للنبات (مثال ذلك الرايزوبيوم وفطريات الميكوريزا).
- هل تستطيع الكائنات الحية الدقيقة المهندسة وراثيا أن تنتشر بواسطة الرياح والماء والتربة والكائنات الحية المتحركة أو بطرق أخرى.

جدول (٦-١): المركبات الحيوية المسجلة وتحت التسجيل فى مصر حتى عام ٢٠٠٢

اسم المركب	صورته وتركيبه	المجموعة التابع لها	رقم التسجيل	الاستخدام
المبيدات الميكروبية البكتيرية				
أجرين	٦,٥% مسحوق	<i>B. huringiensis</i>	٨٥٠	مبيد حشرى
ايكوتك- بيو	١٠% مسحوق	<i>B. huringiensis</i>	٥١٩	مبيد حشرى
برونكتو	١٠% مسحوق	<i>B. huringiensis</i>	٥٤١	مبيد حشرى
دايبل- x٢	٦,٤% مسحوق	<i>B. huringiensis</i>	٥١٠	مبيد حشرى
زنتارى	٣% مسحوق	<i>B. huringiensis</i>	٥٦٩	مبيد حشرى
ريزو- ان	٣٠ مليون جراثيم	<i>B. subtilis</i>	٥٧٠	مبيد فطرى
المبيدات الميكروبية الفطرية				
بيو- فلاى	٣٠ مليون جراثيم/ جرام	<i>B. bassiana</i>	٥٣٤	مبيد حشرى
بيوسكت	٣٢ مليون جراثيم/ جرام	<i>B. bassiana</i>	تحت التسجيل	مبيد حشرى
بيوكانزا	٣٢ مليون جراثيم/ جرام	<i>B. bassiana</i>	تحت التسجيل	مبيد حشرى
بالانتا جارد	٣٠ مليون جراثيم/ جرام	<i>Trichoderma</i>	تحت التسجيل	مبيد فطرى
المبيدات الميكروبية البيوكيماوية				
الفرميك	١,٨% مستحلب	ابلمكتين	٤٦٦	مبيد لكاروسى
اسيغنوساد	١,٨% مستحلب		تحت التسجيل	مبيد لكاروسى

جدول (٢-٦): المركبات الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات والمنتجة في مصر

المركب	المسبب لمرض	الشركة المنتجة
البروتكتو	<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i>	وحدة المبيد الحيوية - معهد بحوث وقاية النباتات
الاجرين	<i>Bacillus thuringiensis Egypti</i>	معهد الهندسة الوراثية - النصر للكيماويات الدوائية
بيوفار	<i>Beauvaria bassiana</i>	وحدة المبيدات الحيوية - معهد بحوث وقاية النباتات
بيوكانزا	<i>Beauvaria bassiana</i>	شركة كانزا
الببوفلاي	<i>Beauvaria bassiana</i>	شركة النصر للأسمدة والمنتجات الحيوية
الببوسكت	<i>Beauvaria bassiana</i>	كفر الزيات للأسمدة والكيماويات
بيورانزا	<i>Metarhizium anisoplae</i>	وحدة المبيدات الحيوية - معهد بحوث وقاية النباتات
فيروتكنو	فيروس فراشة درنات البطاطس	وحدة المبيدات الحيوية - معهد بحوث وقاية النباتات
فيروسيت	فيروس دودة ورق القطن	وحدة المبيدات الحيوية - معهد بحوث وقاية النباتات
البلائتا جاردا	<i>Trichoderma spp</i>	شركة النصر للأسمدة والمنتجات الحيوية
التريكو	<i>Trichoderma</i>	الشركة الدوائية للزراعة الحيوية

جدول (٣-٦): استخدام المركبات الميكروبية لمكافحة الآفات في مصر

المركب الحيوى	الآفة	المحصول	معدل الاستخدام
اجرين	دودة ورق القطن دودة ورق القطن	بنجر السكر القطن	٢٥٠ جرام للفدان ٥٠٠ جرام/ فدان
بروتكتو	دودة ورق القطن دودة درنات البطاطس دودة البهاج الصغرى (الخميرة) دودة ثمار العنب	بنجر سكر - القطن بطاطس (حقل ومخزن) نخل عنب	٣٠٠ جرام/ فدان ٣٠٠ جم/ فدان، ١٥٠ جم/ طن ٦٠٠ جرام/ فدان ٣٠٠ جرام/ ٤٠٠ لتر ماء
دايل	دودة ورق القطن	قطن	٢٠٠ جرام/ فدان
نيمكس	ذبابة البصل الكبيرة	بصل (مخزن)	٥٠٠ سم / طن
بيوفلاي	الأكاروس الأحمر المادى	قطن - بطيخ - فاصوليا	٢٠٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
فيرتيمك	الأكاروس الأحمر المادى	قطن - موالح	٤٠ سم / ١٠٠ لتر ماء
ايكونك - بيو	دودة ورق القطن	برسيم - بطاطس	٣٠٠ جرام/ فدان
دايل	دودة ورق القطن	برسيم	٢٠٠ جرام/ فدان
نات - ١	الأكاروس الأحمر المادى	قطن - فرولة	١ لتر/ ١٠٠ لتر ماء

## المحاصيل التي تطبق فيها مكافحة الحيوية

القطن - البطاطس - النخيل - قصب السكر - العنب - الفراولة - الموز - الموالح

## رابعاً: المخاطر البيئية للممرضات الحشرية المهندسة وراثياً

لقد أصبحت هناك قناعة أن الأيكولوجية - الوبائية الحيوانية *ecology* *epizootology* تعتبر مركز تطوير وإطلاق الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً (*GEMs*). لقد أصبح عنق الزجاجة التي تجابه هذه التكنولوجيا الوليدة ما يتمثل في المشاكل والصعوبات العملية وتلك المرتبطة بالصناعة. من أحد الأسباب الرئيسية للاهتمام المفاجئ في النواحي الأيكولوجية ما يتمثل في تقويم مخاطر هذه الوسائل. الخطر ما هو الا تقدير احتمالات وشدة الضرر أو للتنبؤ بأرجحية بعض الأشياء توجه أو تتجه نحو الخطأ تحت مجموعة من الظروف. تقويم المخاطر *Risk assessment* هو عملية الحصول على مقاييس كمية ونوعية لمستويات الخطر.

هناك ثلاثة نواحي أو معايير بيئية كبرى حزل نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً *GEMs*. الناحية الأولى تتمثل في أنها تظهر خصائص وصفات غير متوقعة وخطيرة الضرر *deleterious* خارج المعمل. بعض العلماء معنيين بالاهتمام بأن الحمض النووي دنا المنتج يميز بشكل كبير عن الهياكل الأخرى *manipulations* مما يؤدي الى حدوث مشاكل غير متوقعة كما هو الحال مع الدنت. لقد خلص العلماء أن الجينات من أي كائن يمكن أن تعزل وتغرس في أي كائن آخر. التبادل بين الكائنات ذات الاجناس المختلفة غير متنبأ بها. التبادل الوراثي في الطبيعة يكون أكثر ميلاً في داخل الجنس الواحد. الطفرات المزدوجة والثلاثية والرابعة لا تحدث في الطبيعة على الإطلاق. هذا بينما يمكن أن تنتج في المعمل. الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً *GEMs* قد تكون ذات نشوء غير عادي بسبب التباين الوراثي المضاف وكذلك إمكانية المقدرة غير العادية على انعزالات التكاثر. الكائن المنلق قد يصبح ممرض للكائنات غير المستهدفة (*NTOs*) وهذا واجب الاهتمام مع الممرضات الحشرية بسبب قصدها في زيادة العفوانية والمدى العوائلي والبقائية *Survivability* أو أنها قد تنقل الجين أو الجينات لكائنات غير ممرضة وجعلها ممرضة *Pathogenic*.

يعتقد باحث آخرون أن إطلاق الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً تكون أكثر قابلية للتنبؤ. النقد الموجه من قبل هؤلاء العلماء يتمثل في أنه لا يوجد ضرر مرتبط بالحامض النووي دنا المرتبط عند العمل في الجينات التي لا تعد ولا تحصى



*innumerable* في العديد من أنواع الكائنات الحية أو في منات المعامل. لا يوجد دليل عن أضرار الكائنات ذات الدنا المنمذج ولا يوجد دليل على أنها تختلف وراثيا عن تلك الكائنات غير المحورة أو تلك المحورة بطرق أخرى. لقد خلص الباحثين أنه على الأقل مع بعض أنواع الكائنات الأبوية يتم إضافة واحد أو قليل من الجينات إلى ما يزيد عن عشرات الآلاف ومع هذا يظل وبالضرورة الكائن الأبوي وقد يكون أكثر أمانا لأن الجين المضاف موصف جيدا ويغرس بدقة متناهية. الأكاديمية العلمية القومية (NAS) من خلال اللجان المختصة خلصت إلى أن الكائن الذي ينطلق والبيئة التي يستهدفها وليست الطريقة التي يحور بواسطتها يجب أن تعتبر أساس تقويم المخاطر. الإستجابة الأخرى لبعض من هذه النواحي يتمثل في أن إضافة المادة الوراثية الوظيفية ليست هي نفسها كما في الخل العشوائي ولو أنه قد تكون الطفرات العشوائية مفيدة وتستخدم في برامج التربية النباتية. للإجابة عن موضوع المرضية على الكائنات غير المستهدفة «*NTOs*» ذكر أن جين واحد لا يمكن أن يحدث اختلافات كثيرة. المرضية تنتج من سلسلة من الخصائص ومن ثم خلال أكثر من جين واحد. التبدلات بين الكائنات بعيدة الارتباط تميل أن تكون أقل ضررا لأن جين واحد لا يستطيع أحداث اختلاف كبير في تغيير الكائن غير الممرض إلى ممرض أو زيادة اللياقة في البيئة.

المرتبة الكبرى الثانية ذات الاهتمام تتمثل في أن نشر الكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا *GEM* قد تسبب خلل أيكولوجي. الانتقادات ضد النشر تتركز حول أن الكائن المنشور سوف لا يكون قابل للتنبؤ في البيئة وقد يصبح هو نفسه آفة. الاختلالات السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية شملت الفراشة العجورية (بورتيترا ديسبار) والزرزور (ستيرنوس فالجارس) وعنب الكوزو (بيويريا لوباتا في جنوب شرق آسيا) أحدثت خلل. بعض من هذه الوافدات أحدثت تلف شديد حيث أشار الباحثين إلى أن ٧١ واحد من ضمن ٨٥٤ سببت اختفاء الأنواع الأصلية المتوطنة وهذه مثلت واحدة من أكبر المشاكل المؤثرة. في دراسة أخرى خلص الباحثون إلى أن ٧٥% من الحيوانات المتوطنة سببت مشاكل ككافات عادة في أماكن أخرى بخلاف الأماكن المستوطنة فيها أو في الأماكن التي كان يعيش فيها السلف أو الأجداد *ancestors*. من بين الثمانية عشر حضينة على مستوى العالم والتي وصفت بأنها الأسوأ لم تستخدم واحدة فقط في الزراعة. الميكروبات المهندسة وراثيا *GEM* قد تصبح أنواع سوبر طاغية *Super species* مع نظم بقاء جديدة ومميزات جديدة وكذلك حتى مع تغيير في واحد أو قليل من الجينات. الأمثلة تشمل سلالات الانفلونزا الفيروسية ومقاومة

الحشرات والبكتريا للمبيدات والمضادات الحيوية على التوالي. فى الانتقادات الموجهة على وجه الخصوص للممرضات الحشرية ما يفيد بأن الاستخدام الواسع للوسائل الثابتة والقاتلة تؤدي الى نشوء المقاومة فى أنواع الاقوات المستهدفة وغيرها وهذه من أوجه النقد الذى يواجه استراتيجيات النشر للكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا والتي يبدو أنها تصمم لتحفيز المقاومة.

الأراء التى فى صالح نشر هذه الكائنات تتمثل فى أن النظام الزراعى مبنى على الاذخالات الجديدة "novel introductions". لقد لوحظ تغيير كبير فى مجموع الأحياء والكائنات ولكن هذا التغيير يعكس التغيرات فى البيئة بدرجة تفوق أو بسبب الكائن الدخيل أو المعدل. فى العادة يكون من الصعوبة بمكان لتوطين واستقرار نوع دخل ولو أن هذا صعب التقدير حيث أن الفشل نادرا ما تمت الإشارة اليه. أحد التقديرات أظهرت أن النسبة ١: ١٠٠٠ وحتى ١: ١٠٠ من الاذخالات أدت الى احداث غزو مدمر. الكائنات قادرة على البقاء كما أنها تتمتع بتأريخ طويل عن الأمان. العديد من العموميات العامة ليست مناسبة حيث أن بعض الاقوات الدخيلة لم تكن متمعة الاذخال، إذا كان الدمج recombinant قد أعيد إدخاله فى المنطقة الأصلية أى موطن الأبناء إن هذا لا يكون مرادف لادخال الأنواع غير المتوطنة وأن الغزوات الناجحة تكون محدودة بنفى معظم الأحوال على الكائنات ذات الاقتدار التناسلى العالى ومعدلات انتشار واسعة ومناطق إيكولوجية عريضة. النظم البيئية الأكثر تعقيدا تكون أقل حساسية للغزو. فيما يتعلق بالنقد الموجه عن الأنواع السوبر فإن احتمالات أن التغيير الوراثى العشوائى سوف ينتج نوع سوبر قليلة جدا حيث أن الكائنات الحية تتحدد عن طريق البيئة وليس من خلال نقص جين أو مجموعة صغيرة من الجينات. على غرار الهجن فإن الميكروبات المهندسة وراثيا تكون ذات لياقة أقل. أعباء الطاقة وأحماها فى تخليق جزيئات عملاقة اضافية واحداث خلل فى العمليات الطبيعية سوف تقلل من اللياقة. الانفلوانزا والأنواع المقاومة تمثل تغيرات وراثية ذات تخصص عالى جدا والتي تختلف عن تلك التى أضيفت بواسطة الإنسان.

المرتبة الكبرى الثلاثة الكبرى من الاهتمام تتمثل فى النقل غير المتعمد للمادة الوراثية الى الكائنات الأخرى. اذا حدث ذلك فإن المرتبتان الأوليتان من الاهتمام تبرز مرة أخرى على السطح: المتلقى غير المقصود ويصبح ذات مواصفات غير مرئية (مثل المرضية فى الكائن غير الممرض) أو قد يسبب خلل إيكولوجى. يوجد دليل مفاده أن النقل الوراثى قد يحدث. الاقتران *Conjugation transduction* والتحول

*transformation* يحدث بين البكتيريا وربما يحدث ذلك بتركابية أقل فى الحقل عما هو الحال فى المعمل. توجد حواجز لهذا النقل فى الحقل مثل تركيزات الكائنات الدقيقة لا تكون عالية بما فيه الكفاية كما أنه لا توجد الأنواع أو السلالات المناسبة وكذلك الحواجز التى نجابه التعبير ولكن هذه الحواجز يتوقع أن تحد ولا توقف *halt* هذه الانتقالات.

من جهة أخرى فإن الانتقالات المعروفة للجين بين الكائنات شديدة الاختلاف لا تؤدى الى ظهور أنواع سوبر ولكنها فى العادة تضع المتلقى فى مصاعب العديد من العيوب. أظهرت الأبحاث الماضية أن نقل شرائح كبيرة من المادة الوراثية نادرا ما تدوم فى المجموع الا اذا كان هناك ضغط انتخابى قوى. البيئة الجديدة أو البيئة المتغيرة هى التى تسبب فوران المجاميع. حتى لو كانت جينات المرضية على عناصر جينية متحركة فانه تكون هناك احتمالات قليلة للنشر *dissemination* الى البكتيريا القريبة مع ترتيب الجينات فى اتجاه المرضية و أو حتى احتمالات قليلة للنقل الى أنواع غير قريبة مع هذا الترتيب والتنسيق.

الأضرار المؤثرة من استخدام الممرضات الحشرية المهندسة وراثيا يجب أن تتوازن مع الفوائد. فى الأساس فإن الهندسة الوراثية يتوقع أن تكون السند فى مكافحة الميكروبية للحشرات ومن ثم تقلل من الأضرار أو التأثيرات الجانبية الضارة المرتبطة بالمبيدات الحشرية الكيميائية (لرجو المعذرة عن وضع هذه العبارات بالإنجليزية).

*The potential hazards of using genetically engineered entomopathogens must be balanced against the potential benefits. Basically, genetic engineering is expected to bolster microbial control of insect and thus reduce the array of hazards or harmful side effects associated with chemical insecticides.*

لا توجد تكنولوجيا مفردة تغطى كل نواحي تقويم المخاطر للميكروبات المهندسة وراثيا *GEM's*. يمكن استخدام ثلاثة أنواع فقط من الدراسات قبل السماح والموافقة على نشر هذه الكائنات وهى اجراء التجارب المعملية على هذه الكائنات *GEM*، نشر هذه الكائنات فى نظام بيئى دقيق وصغير *microcosms* وكذلك دراسة بيولوجية وليكولوجية للكائنات الدقيقة الأبوية. نتاج هذه الأنواع الثلاثة من الدراسات لا تمكن من الاستقرار الذى يمكن من وضع استنتاجات جيدة لو اجراء تنبؤات حول النشر

الفعل للميكروبات المهندسة وراثيا ولذلك يكون من الأهمية لأكمل وإجراء هذه الأنواع الثلاثة من الدراسات لتقليل خطورة الاستقرارات. مثال ذلك الآراء الكثيرة في صالح اللجوء الى البيانات الدقيقة لدراسة مصير الميكروبات المهندسة وراثيا لكن مصير هذه الميكروبات *GEM* التي تنشر في البيئة ولو أنه من أحد العوامل المحددة في تقويم المخاطر الا أنه يتأثر بالعديد من العوامل المعقدة كما أن تداخلاتها تتضاعف في البيئة الدقيقة.

احتمالية الضرر البيئي ما هي الانتاج ستة احتمالات: الإطلاق والبقاء والتضاعف والانتشار ونقل المعلومات الوراثية والضرر. العديد من هذه (البقائية - التضاعف - الانتشار) من الخصائص الأيكولوجية الهامة للكائن.

The probability of environmental is a product of six probabilities: release, survival, multiplication, dissemination, transfer of genetic information, and harm. Several of these (Survival, multiplication, dissemination) are ecologically important characteristics of an organisms.

لذلك فإن أيكولوجية الممرضات الحشرية هي التي بمثابة الأوبئة للميكروبات المهندسة وراثيا *GEM's* خاصة ما يتعلق بالبقائية والانتشار ونمو المجموع ذات أهمية في منظومة تقويم المخاطر. هذه المعايير الأيكولوجية تم استعراضها حديثا للإطلاق الصناعي للفيروسات والبكتيريا والفطريات. ثبات الممرضات الحشرية بوجه عام تقاس في وحدات الأيام عندما تبقى معرضة لضوء الشمس، أو لبعض العوامل البيئية الأخرى. الفيروسات *Baculoviruses* تميل للثبات اذا وصلت الى الأرض. الانتشار ونمو المجموع بعد الإطلاق يتفاوت ويعتمد على عوامل مثل النشر وأماكن المعيشة والعنفوانية. المجموع المدخل يستطيع أن يبقى موضعيا ويتناقص أو ينتشر في مناطق واسعة. البكتيريا ثابتة كذلك في التربة ولو أن البيانات المتوفرة توضح أن بكتيريا *باسيليس بوبيليا* فقط وعرضيا *B* سفيريكمس تنمو بعد الإطلاق ولا يوجد بكتيريا معروف عنها المدى الطويل من الانتشار. الفطريات تستطيع البقاء ثابتة لشهور أو من 1- 2 سنة في التربة أو جثث العائل. البيانات الخاصة بالانتشار ونمو المجموع متوفرة ولكنها غير مفهومة جيدا ومن ثم فإن انتقال الكونيديا بواسطة الرياح تعطيلها مقدرة عالية على الانتشار والتوزيع. لقد تم نشر قليل من النماذج عن الوبائية الحيوانية العامة والنظم الخاصة بالعلاقة بين العائل والممرض في الممرضات الحشرية ولكن لا يوجد نموذج

واحد منها مناسب للتنبؤ بمصير الممرض الذي تم اطلاقه. المعلومات الموجودة في الدراسات المرجعية شديدة التحيز في اتجاه نجاحات الاذخالات. هذه المعلومات تمثل قدرات هذه الكائنات وليس احتمالات ما سوف يحدث بعد الاطلاق.

البيانات المتعلقة بالتأثيرات على البيئة بعد اطلاق الممرضات الحشرية نادرة ولكنها لحد ما تتشابه مع المجموعات المرضية الثلاثة. التأثيرات الكبرى تعكس الغرض من الاطلاق: زيادة أعداد وحدات الممرض في البيئة ونقص أعداد العائل - الحشرة والتلف والضرر على النباتات أو المصادر الأخرى. اللجوء للنشر العريض للممرض أو التوكسين يميل الى تحفيز المقاومة في مجاميع العائل في العديد من الحالات وليس في كل الحالات ومن ثم يوجد مثال واحد فقط من المكافحة الميكروبية للحشرات. عزلات الفيروسات والبكتيريا التي اختبرت حديثاً لم تسبب ضرر مباشر على الكائنات غير المستهدفة. بعض العزلات الفطرية تسبب تفاعلات حساسية وقد تحدث عدوى في بعض الزواحف وفي بعض مفصليات الارجل غير المستهدفة ولكنها تعتبر أمانه بشكل كبير جداً. لقد نشر أن الفيروسات والبكتيريا تسبب أضرار غير مباشرة على أشباه الطفيليات اللاقارية والمفترسات كذلك من خلال ازالة مصادر غذائها وهي الحشرات العائله ولكنها نادراً ما تسبب تأثير شديد كما هو الحال مع المبيدات الحشرية على مجاميع مفصليات الارجل النافعة.

لذلك فانه من الواضح أنه اذا كانت الميكروبات المهندسة وراثياً GEM مشتقة من الممرضات الحشرية الأبوية هذه واذا لم يكن مقصوداً و/أو قدراتها في بعض النواحي انها ستكون ذات مقدرة على البقاء والتضاعف والنشر. بناء على هذه الدراسات السابقة فقط يصبح من الصعوبة تقدير احتمالية البقاء والتضاعف والنشر حتى مع الكائنات الأبوية ومن ثم يكون متاح القليل من الاستقراء للتنبؤ بما سوف يحدث مع الميكروبات المهندسة وراثياً. بالإضافة الى ذلك فانه قام البعض بإضافة النقل الوراثي والضرر الى تقييم المخاطر يصبح من الواضح أهمية ضرورة تقييم الاطلاق وجنواه ومحدداته على أساس حالة - حالة حتى يتم اكتساب الخبرات عنها.

في الوقت الراهن يوجد وضوح رؤية وجوى عن الاقتراب النوعى أو الوصفى لتقويم مخاطر الميكروبات المهندسة وراثياً ولا يوجد هذا الوضع مع الاقتراب الكمى. أية محاولات مع التنبؤ يجب أن تؤخذ كنوع من التقريب. المخاطر في المستقبل القريب يجب أن تحدد من خلال آراء الخبراء في هذا المجال. لن نستطيع أن نتنبأ بالمخاطر من خلال الاحصائيات المتعلقة بالوفيات السابقة أو أية مشاكل أخرى

كما حدث مع وفيات حوادث السيارات أو السرطان أو حتى من مخاطر مدينة تحطمت بفعل النيازك والشهب *meteorite*. هذا بينما الأقوال الوصفية تكون كافية لتقويم المخاطر.

بشمول عريض هناك ادراك أن الميكروبات المهندسة وراثيا *GEM's* فيها احتمالات قليلة لاحداث الأضرار البيئية ولكنها ذات تتابعات خطيرة اذا حدث ضرر فيها. لا يمكن تحقيق صفر الخطر *Zero risk* في المستقبل المنظور القريب. من جهة اخرى لا يستطيع المجتمع الاصرار على تحقيق صفر الخطر في هذا الاقتراب حيث أنه لم يقوم بذلك مع الاقترابات الأخرى. يجب اتخاذ الحذر والعناية في تقويم مخاطر الميكروبات المهندسة وراثيا خاصة من منطق الخبرات التي اكتسبت مع الحالات الابتدائية. ولكن اذا اتخذت الاحتياطات ان معظم الاذخالات ستكون ذات أخطار بيئية قليلة على البيئة.

## REFERENCES

- Alexander, M., Spread of organisms with novel genotypes, in Biotechnology and the Environment, Teich, A. H., Levin, M. A., and pace, J. H., Eds., American Association for the Advancement of Science, Washington, D. C., 1985, 115.
- . Brill, W. J., Why engineered organisms are safe. Issues Sci. Technol., 4, 44, 1988.
- . Florio, J. J., Regulation in biotechnology, in Biotechnology. Implication for public policy, Panem, S., Ed., The Brookings Institution, Washington D. C., 1985, 41.
- . Fuxa, J. R., Fate of released entomopathogens with reference to risk assessment of genetically engineered microorganisms, Bull. Entomol. Soc. Am., in press.
- . Levin, S. A., Safety standard for the environmental release of genetically engineered organisms, in Planned Release of Genetically Engineered Organisms (Trends in Biotechnology/ Trends in Ecology and Evolution Special publication), Hodgson, J. and Sugden, A. M., Eds., Elsevier, Cambridge, 1988, S47.
- . National Academy of Sciences, Introduction of Recombinant DNA-Engineered Organisms into the Environment: Key Issues, National Academy Press, Washington, D. C., 1987.
- . Regal, P. J., Models of genetically engineered organisms and their ecological impact. in ecology of Biological Invasions of North America and Hawaii, Mooney, H. A. and Drake, J. A., Eds., Springer-Verlage, New York, 1986, 111.
- . Williamson, M., Potential effects of recombinant DNA organisms on ecosystems and their components, in Planned Release of Genetically Engineered Organisms (Trends in Biotechnology/Trends in Ecology and Evolution Special Publication), Hodgson, J. and Sugden, A. M., Eds., Elsevier, Cambridge, 1988, S32.

خامسا: استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الآفات باستخدام مستحضرات

#### باسيلليس ثورينجينسيس

من مقاله للأستاذ الدكتور عادل مردان- كلية العلوم جامعة عين شمس- مصر. استخدام الوسائل الحيوية فى مكافحة الآفات معروفة ومورست منذ فترة طويلة. لقد استخدم الصينيون النمل الفرعونى فى مكافحة الآفات فى مخازن الحبوب المخزونة لقد كانت تجلب طيور المياه *Mynah* الى موريثيوس عام ١٧٦٢ لمكافحة الجراد الأحمر كما استخدمت الكلاب وغيرها من الحيوانات الأخرى لمكافحة الحشرات والقوارض. القبط الألفية التى كان يعتقد أنها من أول الوسائل فى مكافحة الحيوية لعبت دورا كبيرا فى مكافحة الفئران والتى كان انتشار طاعون البايونى فى أوربا فى العصور الوسطى كما كانت تأثيراتها على الكائنات غير المستهدفة غير متوقعة وفى هذه الأزمئة لم تكن هناك اختبارات مطلوبة للتسجيل. استخدام الكائنات الدقيقة كمبيدات ظهر حديثا وأثبت بعض النجاحات. فى الوقت الراهن يوجد عدد من أنواع البكتريا والفطريات والفيروسات طرحت فى الأسواق كمبيدات تجارية بعد نجاح الإنتاج وتجهيز المستحضرات. البكتريا من الوسائل الواعدة فى هذا الخصوص. لقد وصف أكثر من ٩٠ نوع من البكتريا تصيب الحشرات. معظم هذه الأنواع تخص عائلات *Pseudomonad aceu*, *Enterobacteriaceae*, *Bacillaceae*, *Micrococcuseae*, *Lactobacillaceae*. غالبية السلالات التجارية تنتمى الى الجنس *Bacillus* ومعظم المنتجات الواسعة الاستخدام جهزت من الباسيلليس ثورينجينسيس (*B. t.*) وفيها ما يزيد عن ٢٢ طرز سيرولوجى (يتميز بوجود الانتيجين السوطى). أعضاء هذه المجموعة سامة لحشرات حرشفية وثنائية وغمدية الأجنحة. لقد اكتشفت بكتريا *B.t.* فى ديدان الحرير فى اليابان فى بداية القرن العشرين. لقد أنتج أول مركب تجارى فى فرنسا عام ١٩٣٥ وكان يعتمد على توكسين خطر على الانسان كذلك سُمى البيتا-اكسوتوكسين. لقد تم تطوير طرق مختلفة لازالة هذا التوكسين من المنتج النهائى عن طريق تجهيز عملية التخمر. لقد قام *Dulmage* بعزل بكتريا *Bt* سلالة *HD-1* وهى سلالة *Bt* كورسناكى خالية من التوكسين الخارجى والذى يمثل الآن المادة الفعالة لمعظم السلالات التجارية من بكتريا *Bt* المستخدمة ضد حشرات حرشفية الأجنحة.

بالرغم من المعلومات المتوفرة عن كفاءة مستحضرات *Bt* تحت الظروف الحقلية الا أنه ما زالت هناك قيود لاستخدام المستحضرات البكتيرية الموجودة فى



مكافحة اليرقات للعديد من الحشرات. من أحد القيود الكبرى صعوبة اقتناع رجالات الصناعة لتطوير مستحضرات محسنة كقتراب ثلثى حيث أن سوق *Bi* ما زال صغيرا حيث أنه يمثل ما يزيد قليلا عن ٠,١% من السوق العالمي للمبيدات ولو أن هذه القيمة تمثل ما يزيد عن ٩٠% من كل مبيعات المبيدات الميكروبية. للتغلب على هذه الصعوبة إلى جانب القيود الأخرى مثل فترة الانتشار، مثابرة وقوة البحث عن العائل ومعدل التضاعف، العنف والثبات في الحقل، طرق وتكاليف الإنتاج وكذلك مقاييس الأمان الحيوى فإن استخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير وسيلة مبشرة تعتمد على بكتريا *Bi* تبدو هي الحل. الهدف الحالى لاستخدام التكنولوجيا الحيوية توجيه المفاهيم العلمية والتكنولوجية مع التركيز على تطوير استراتيجيات للبيولوجيا الجزيئية فى مكافحة الآفات. لقد أدى نجاح استخدام العديد من التحضيرات الميكروبية ضد الآفات المستهدفة إلى تحفيز البحوث الفعالة فى اتجاه استخدام الكائنات الحية فى استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات على المدى الطويل. الكائنات الميكروبية المهندسة وراثيا أصبحت فى المتناول كما تم تطوير تكنولوجيا جديدة للإنتاج الكبير لهذه الميكروبات. لقد أصبح من الممكن تخليق الجزيئات البيولوجية عن طريق زرع جينات خاصة فى مختلف أنواع الكائنات الدقيقة. من أكثر الاستخدامات الملفتة للنظر والاثارة فى اتجاهات الهندسة الوراثية، ما تتمثل فى تصنيع توكسينات بكتريا *Bi* باستخدام البكتريا كمصانع. نواحى ومنظور استخدام طرق الهندسة الوراثية فى بحوث مكافحة الآفات قد تبدأ فى ثلاثة اتجاهات هى الحشرات والوسائل الميكروبية والنباتات العالقة.

#### ١- الحشرات

دراسة كيفية احداث الفعل على المستوى الجزيئى وفهم أسباب تخصصية التوكسينات على الحشرات المختبرة والعلاقات الخاصة بالتركيب والوظيفة وتمثيل التوكسين. تصميم الحصول على معرضات ميكروبية فعالة تتطلب فهم كامل وواعى لكيفية احداث بكتريا *Bi* للفعل والتأثير وكذلك لتوضيح كيف تتداخل مع الحشرة المستهدفة والبيئة. من الأمثلة الأخرى لنواحى المناورة بجين التوكسين الحشرى فى مكافحة الآفات ما يضطلع بتقليل أو منع تطور المقاومة تجاه المبيدات الحشرية البكتيرية وغيرها من الكيميكائيات السامة. من المعروف جيدا ان الكائنات الحية تقاوم تأثيرات المواد السامة عن طريق التوكسينات من الوصول الى المواقع المستهدفة أو بواسطة تحويل الموقع بما يحقق خفض حساسيته للتوكسين. تمثل المواد السامة تعتبر من التقنيات الشائعة لمنع السم من الوصول الى الموقع المستهدف. العلماء فى الوقت

الراهن قادرون على كلونة الجين التى يتحكم فى تخليق المقاومة فى الحشرات ومن ثم مساعدتها فى فهم كيفية عمل الجين.

## ٢- الممرضات الحشرية للباسبيليس (*Enomopahogens (B.t.)*): (١) المباشرة:

البيولوجيا الجزيئية تقدم امكانية ليس فقط تحسين اداء هذه الممرضات الطبيعية بما يجعلها أكثر ملائمة مع أهدافها ولكن أيضا تحويل الميكروب غير الممرض الى ممرض مما يقدم أسلحة جديدة فى الترسانة ضد الافات الحشرية. ان ادخال جينات نوكسين *B.t.* فى البكتريا *E.colic* سوف يخدم فى الانتاج المكثف للتوكسين بالإضافة الى دراسة تداخل التوكسينات المختلفة ومكان احداث الطفرية من وجهة النظر الاكاديمية. نقل التوكسينات بين العوائل المختلفة المعتمدة على الباسبيليس سوف تقدم لنا خدمات افضل فى الحقل ومن ثم يتحقق مدى واسع لبكتريا *Bt* فى بكتريا قادرة على المعيشة والنبات وربما اعادة التوزيع فى البيئة. الامل معقود على رؤية حدوث تنشيط وتطوير أنشطة جديدة ضد اليرقات. استخدام نفس الهدف مع دمج البروتوبلاست قد يتطلب نظام للتقسيم (التسمية) للمواد المندمجة. يجب أن يكون فى الأذهان أننا لم نفهم بعد كل النقاط الخفية فى توزيع مجاميع الحشرات الى جانب المناورات المعملية. البحث عن سلالات جديدة خاصة فى الدول الاستوائية أو النامية يجب أن تستمر وتتواصل.

لقد أمكن تطوير وتحقيق تقدم فى التقييم الحيوى للبلورات المختلفة باستخدام طرق زراعة الانسجة. خلايا أنسجة الحشرات تعتبر من النظم الصالحة كنموذج لدراسة الاستجابة السامة للبروتين المنشط من بلورات بكتريا *B.t.* لقد تم كلونة جينات العديد من توكسينات *Bt* وتكرارها والتعبير عنها فى البكتريا كما تم تعريف أدنى تتابع وراثى مطلوب لتفسير بروتين التوكسين كامل الفاعلية. المسرح مهيا الان للهندسة الدقيقة لتوكسينات *Bt* أكثر كفاءة وفاعلية. لذلك ان الجرعات الاصغر يمكن أن تستخدم فى الحقل لتقليل التكاليف العالية لاستخدام المركب فى الوقت الراهن وتوسيع المدى العوائلى وتحقيق أمان أكثر للكائنات الحية غير المستهدفة وتسهيل الانتاج التجارى وتحقيق النبات المطلوب تحت الظروف الحقلية كذلك ان رجالات البيولوجيا الجزيئية يقومون بنقل توكسين *Bt* فى التحول النباتى وهو غالبا ما يكون تحول اتجاه المقاومة بواسطة اقتراب الاجروبيكتيريوم بالإضافة الى التحول هناك نحذى آخر يتمثل فى أن نتعلم كيف يفيد تخليق نباتات ناضجة من الخلايا المتحولة الى البروتوبلاست. فى

الوقت الحالي يوجد نماذج نباتية جيدة يمكن أن تستخدم لوضع استراتيجية للهندسة الوراثية بغرض مكافحة الآفات. الإدخال الناجح لجينات توكسين بكتريا *B.t.* فى البسبوموناس غير المرضية ومن ثم تحويلها الى وسيلة ميكروبية جديدة فعالة ضد حشرات حرشفية الأجنحة.

## (٢) غير مباشرة (الكلونة فى وسائط تكافلية *Symbiotic* أو غيرها:

من الاقترابات المفيدة والفعالة بشكل أكبر لتوكسينات *Bt* ذات الفعل الإبادى على الحشرات ما يتمثل فى إدخال والتعبير عن جين التوكسين فى خلايا الخميرة. يحدونا الأمل فى أن تكنولوجيا دمج *DNA* سوف تودى الى انتاج مواد سامة فى البكتريا المناسبة قادرة على التغلب على كل مشاكل وعقبات الوسائل الموجودة حاليا فى مكافحة الميكروبية مثل عدم الثبات تحت الظروف الحقلية وفقد النشاط المرض بسبب التعرض للتشعيع. الدلتا- اندوتوكسين من السلالات البكتيرية المتخصصة ضد حشرات حرشفية الأجنحة تعتبر فى الوقت الراهن من أكثر المبيدات الميكروبية التى درست بكثافة وأختبرت على سلاسل كبيرة من أنواع حرشفية الأجنحة. التقييم المناعى مع الأجسام المضادة عديدة وأحادية الكلونة أوضح أن الببتيدات العديدة متميزة التراكيب للمعلم *Mr 130-140* يمكن أن توجد فى سلالة فردية. البروتينات تتحول من خلال التحلل المائى. مجسات *DNA* والبلازميد استخدمت لتوضيح أن الجينات التى تتحكم فى تغليف وإنتاج البلولرات تقع على عدد صغير من البلازميد ذات الوزن الجزيئى العالى. البروتين السام تم كلونته فى بكتريا *E. coli*, *B.subtilis* وتم التعبير عنه خلال مرحلة النمو الخضرى.

لقد أمكن دمج أو خلط البروتينات من السلالات المختلفة ومن ثم توسعت دائرة نشاط السلالة المندمجة. السلالات الجديدة كلية وجدت ذات فاعلية ضد مجاميع اضافية من الحشرات مثل غمدية الأجنحة المعدية بالبكتريا *Tenebrionis B.t.* والصنف سان ديجو. التعبير الأولى لهذه السلالات اشتملت على كلونة والتعبير عن جين التوكسين فى بكتريا *E. coli* وقد خلص الباحثون الى أن تكنولوجيا مضاهات الوراثة الجزيئية يمكن أن تتواصل لتشمل الدنا التى تحتوى على انتاج النيوكلويد المشفر لبروتين التوكسين فى بكتريا *B.t. s.d.* بهدف انتاج الجينات الجديدة التى يحسن من صفات النسيج والترجمة وتشفير البروتين بما يزيد من السمية أو تغيير خصائصه المدى العوائلى. لقد أمكن عزل العديد من الجينات للبروتين السام كما تم تحديد تتابع الحمض الأمينى للموقع الفعال للبروتين من تتابع الدنا المتتابع للجين وتحديد تركيب البلولرة. كيفية القل

على المستوى الجزيئى لم يثبت بعد ولكن المستقبلات مثل الفوسفات تَبدِىل كولين و ن- استيليل جالاكتوسامين قد تكون هى الموقع المستهدفة للتوكسين. لقد تمت الاشارة الى امكانية استخدام رسوم الحاسب الالى لعمل نموذج التداخل بين التوكسين والمستقبلات فى الحشرات والتي تؤدى الى التنبؤ بتراكيب البروتين ذات الابداء على الحشرات. بعد موضة التركيب الثانوى والثلاثى للبروتين وصف الموقع الفعال وهذا يؤدى الى التعود على استخدام المبيدات الحشرية الحيوية. طرق التكنولوجيا الحيوية الجديدة قد نحدث اسهام من خلال زيادة الكفاءة عن طريق تحويل تكامل بلازميد البكتريا التى تكافح تخليق البروتين. هذا يقلل من تكلفة الانتاج ويحقق ويفتح مجال للمستحضرات الجديدة سهلة الاستخدام كبديل فان انتاج السلالات التى لا تكون جراثيم *asporogenic* قد تقلل من تكاليف الانتاج عن طريق تقادى طاقة التمثيل الضائعة فى انتاج الجراثيم يجعل المنتج أكثر قبولاً فى بعض الدول.

على المدى القصير قد يمكن تطوير منتجات تستهدف مواضع متخصصة أكثر. فى عام ١٩٨٥ نجحت شركة ساندوز فى الاختبار الحقلى لمركب جديد تحت الاسم *Javelin* وهو مبنى على سلالة *NRD-12, a3A3B* والتي اكتشفت بواسطة *Norman Dubois* فى شركة خدمات الغابة الأمريكية. بالرغم من أن السلالة كانت قد اكتشفت وتم توصيف خصائصها وتأثيراتها المتزايدة ضد الفارشة العجورية فإن التأثيرات المحسنة للجافيلين كانت ضد دودة ورق القطن وهى آفة تضر بالخضروات وفى بعض البلدان التى تزرع القطن. بعض المنتجات الجديدة لمكافحة حشرات غمدية الأجنحة التى تتكون من السلالتين المذكورتين أعلاه وجدت مجالا فى الأسواق المختلفة خاصة لمكافحة خنفساء كلورادو البطاطس.

### (٣) النباتات المحصولية *Crop plants*:

النباتات المهندسة وراثيا المقاومة للحشرات قد تشهد اليوم الذى يثبت فيه امانها وتعتبر البديل الأمن والرخيص لاستخدام الكيمائيات التوكسينية فى مكافحة الحشرات. ان تطوير ناقلات ذات اصفر بلازميد *Ti* يحتوى على معطيات منتخبة متعددة السيادة ومواقع مكلونة وكذلك محفزات أو بلاذات فعالة واشارات *A* العديد ذات تيار متدفق من اجربكتريوم تعول التحول النباتى فى الطرق الاضافية تشمل الحقن الدقيق والتنقيب الكهربى وتحفيز الجسيم قد يجعل من الممكن تحقيق التحول النباتى وهو غالبا ما يكون تحول اتجاه المقاومة بواسطة لقتراب الاجروباكتريوم بالاضافة الى التحول هناك تحدى آخر يتمثل فى أن نتعلم كيف نغيد تخليق نباتات ناضجة من الخلايا المتحولة أو

البروتوبلاست. فى الوقت الحالى يوجد نماذج نباتية جيدة يمكن أن تستخدم لوضع استراتيجية للمهندسة الوراثية بغرض مكافحة الآفات. الإدخال الناجح لجينات توكسين بكتريا *B.t.* فى الدخان تودى الى الحصول على نباتات عالية مقاومة لودة قرون الدخان.

### عامل الخطر فى المبيدات الميكروبية المهندسة وراثيا *Risk Factor*:

عند اختبار وتقييم الخطر المرتبط بهذه السبببات يكون ممكنا تعريف مجموعة من العوامل العامة التى قد تساهم فى حدوث الخطر. بسبب أن كل مركب ونظام استخداماته محددة ومميزة فان عوامل الخطر هذه يجب أن تؤخذ فى الاعتبار على أساس كل حالة بمفردها *Case-by-case basis*. احتراماً للتشريعات والاختبارات المسبقة للمبيدات الميكروبية التى عرفت قبلاً.

١- بسبب الطبيعة الأساسية الوراثية كمبيدات للافات فان هذه الكائنات مرجو منها ان تكون ذات نشاط بيولوجى. هذه المنتجات قد تكافح الافات عن طريق طرق مختلفة من الفعل مثل: القتل - احداث المرض - المنافسة أو الاحلال - منع التغذية - تثبيط النمو - التأثيرات المعاكسة على التناسل. علاوة على ذلك فان الكائنات الدقيقة تصمم للاستخدامات البيئية والتي يمكن أن تستخدم على المحاصيل الغذائية والغابات أو المراعى وكذلك فى مكافحة نقلات الامراض وبالقرب من أماكن السكن. لذلك فان التعرض للكائنات غير المستهدفة والانسان قد يكون كبيراً.

٢- على خلاف المبيدات الكيميائية فان الميكروبات تعيش فى الكون حيث تستمر فى الحياه وتتضاعف. بمجرد أن تتطلق فى البيئة فان المنع الكامل أو المطلق لانتشارها يصبح غير ممكناً. لذلك فانه قبل إطلاق الميكروبات المهندسة وراثيا فان قدرتها على التكيف وإيجاد أوساط بيئية جديدة أو القدرة على المنافسة مع غيرها من الكائنات الدقيقة فى البيئة يجب أن تقيم بعناية. أى تقييم للتأثيرات البيئية يجب ان تؤخذ فى الاعتبار من حيث المستويات المتوقعة لقواعد الكائن فى البيئة بالإضافة الى نمذجة تمكن من التنبؤات العقلانية عن تأثيرات الظروف البيئية غير العادية وتأثيرها على الزيادات المحلية أو الانفجار فى مجموع الميكروبات.

٣- أى نظام اختبار لتوصيف الميكروبات المهندسة وراثيا أو تقييم تأثيراتها على أو التعرض للكائنات غير المستهدفة فى بيئة أو وسط جديد يمكن أن تودى الى نتائج غير متوقعة. لذلك فان السيناريو الايكولوجى لأى تطبيق مقترح للكائنات

المهندسة وراثيا يجب أن تقيم بعناية باستخدام الاقترانات من فروع المعرفة المختلفة.

٤- بعض أنواع الناقلات المهندسة وراثيا ذات احتمالات عالية للنقل الوراثي. مثل ذلك التحول مع مدى واسع من العوامل تعتبر من العناصر الوراثية للحركة الكروموسومية والتي تمكن من تسهيل النقل من كائن لآخر. هذا قد يؤدي الى حدوث مشكلتان: ادخال الجينات قد يعبر عنه في أنواع أخرى من الكائنات الدقيقة في البيئة بالإضافة الى أنه قد تنتج من الجين في نوع ما من الكائنات الدقيقة مما يزيد من النشاط.

٥- بعض المبيدات الميكروبية المهندسة وراثيا قد تزيد من الفاعلية ضد الآفة المستهدفة أو قد تدخل نوعين من التوكسينات في كائن واحد. حتى لو كان المدى العوائلي للكائن غير المهندس وراثيا وتأثيره على الحشرات النافعة معروف فانه من المفيد اعادة تقييم تأثيرات الكائن المهندس وراثيا من خلال التقييم الحيوي للمرضية واحداث العدوى في الحشرات النافعة وغير المستهدفة.

٦- المبيد الميكروبي المهندس وراثيا الذي قد يتميز بدمج صفات متميزة معينة قد يكون قادرا على الثبات في البيئة في اوساط جديدة بأعداد كافية تسبب تأثيرات معاكسة على الأنواع غير المستهدفة.

٧- زيادة الثبات البيئي قد تمثل مشكلة تحت بعض الظروف. مثال ذلك أن جين توكسين بكتريا Bt يمكن أن يفرس في مستقبل طويل الدوام أو سهل التضاعف أو في العائل المناسب مثل الطحلب الأخضر المزرق. هذا قد يكون مطلوباً لزيادة فترة الحياة وتشير توكسين Bt لبرقات البعوض ولكن قد يؤدي الى مشاكل غير متوقعة خاصة اذا كانت السلالة المهندسة وراثيا ليست محدودة في التخصصية على الآفة المستهدفة.


٨- مع الاستخدامات العريضة وبعد أن توفى الوسيلة الميكروبية المهندسة وراثيا كل اختبارات الأمان فإن الافات المستهدفة قد تكون سلالات مقاومة للتوكسينات الميكروبية للدرجة التي تكون عندها ثابتة لفترات طويلة أو تستمر وجودها في البيئة لمستويات عالية.

التوصيات: لتطوير طرق لتقييم وتقليل الخطر من ادخال الكائنات المهندسة وراثيا ضد البرقات في البيئة يمكن اتباع الاعتبارات التالية:

١. بالإضافة الى الدلائل الموجودة عن اختبارات امان الوسائل الميكروبية فى مكافحة الافات فانه يجب تطوير طرق واقتربات قياسية على خطوات تمكن من اختبار الكفاءة والامكان للكائنات الدقيقة المهندسة وراثيا من المعمل الى الحقل. الاختبارات التى تتعدى نطاق المعمل يجب أن تتحرك تباعا فى اتجاه: ١- كائنات دقيقة متشابهة، ٢- صوب زجاجة أو غرف نمو، ٣- تقييم حقلى محدود ومقيد.
٢. المنتج المهندس وراثيا يجب أن يعرف بدقة ويختار وينتخب بناء على الصفات المطلوبة بما يسمح بالتقييم المناسب للتأثيرات الأيكولوجية.
٣. اختبار الجودة للسلاسل المهندسة وراثيا يجب أن تتطور بشكل جيد. فى الكائنات الدقيقة التى طورت للتطبيقات البيئية ان مقدره وكفاءة الانجراف الوراثى يجب أن تمنع أو تحجم للدرجة المقبولة تقنيا وفنيا. الوسائل الوراثية المنقولة يجب أن تكون غير متحركة وكما لوحظ قلا فان ميكانيكيات الحفظ أو التحطيم الذاتى يجب أن تهندس فى المبيدات الميكروبية المندمجة.

#### سادسا: التقانات المستخدمة فى انتاج المركبات الحيوية البكتيرية

يوضح الشكل رقم (٦- ١) الخطوات المختلفة لانتاج بكتريا *Bacillus thuringiensis kurstaki* أو المركب الحيوى "برونكتو" حيث يعتمد نظام الانتاج على عملية تخمر باستخدام مولا محلية من البيئة المصرية بحيث تكون رخيصة الثمن وتحتوى على الاحتياجات الغذائية اللازمة لنكاثر ونمو وتجربم البكتريا من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنية. تتشابه خطوات انتاج الفطريات فى بعض المراحل ما عدا الاختلاف فى البيئة المستخدمة.



شكل رقم (٦- ١) الخطوات المختلفة لانتاج مركب البرونكتو الذى يحتوى على

*Bacillus thuringiensis kurstaki*

## المشاكل والمعوقات التى تواجه استخدام مكافحة الحيوية فى مصر المعوقات الفنية:

### ١. نقص الخبرة عن الوسائل الحيوية

حتى الآن معظم العاملين فى مجال مكافحة الآفات ليس لديهم المعرفة الكافية عن أنسب الظروف للتعامل مع المنتج الحيوى من حيث توقيت الرش والآلة المستخدمة فى التطبيق وكذلك الطور الحساس من الآفة المراد مكافحتها - عدم توفر الخبرة الكافية عن طبيعة العلاقة بين المسبب المرضى والآفة مثل كيفية حدوث الفعل السام أو الإبادى على الآفة والتأثيرات الجانبية على تطور الحشرات وما هى درجة تخصص المسبب المرضى من آفة لأخرى، بالإضافة الى ذلك عدم معرفة العوامل البيئية التى تؤثر فى فعالية المسبب المرضى ومدة بقائه تحت الظروف الحقلية - نقص المعلومات عن تأثير مكونات العائل النباتى للمعامل الذى تتغذى عليه المسبب المرضى... عدم توفر تلك المعلومات لدى الباحث أو المهندس الزراعى يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى عدم نجاح المسبب المرضى فى مكافحة الآفات تحت الظروف الحقلية.

### ٢. درجة تخصص السلالات Lack of Specificity

من الأخطاء الشائعة الآن فى مجال مكافحة البيولوجية استخدام مركب واحد ضد أكثر من آفة حشرية دون ملاحظة أن هناك درجة كبيرة من التخصص فى فعالية تلك المركبات فعلى سبيل المثال فى حالة استخدام بكتريا الباسيليلس *Bacillus thuringiensis* فإن الاختلاف فى تحت النوع *Sub-species* تلعب دورا هاما فى الفعالية من آفة لأخرى وذلك للاختلاف فى تركيب البلورات السامة التى تنتج بالبكتريا حيث أن هناك ثلاثة أقسام رئيسية للبلورات السامة هى *Crystal I (Cry I)* والتى تعتبر فعالة على الحشرات التابعة لرتبة حرشفية الإجنحة *Lepidoptera*، أما النوع الثانى *Cry II* فهو فعال ضد الحشرات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة ، وثالثية الأجنحة، والنوع الثالث *Cry III* فهو فعال ضد الحشرات غمدية الأجنحة *Cloeoptera* والنوع الرابع *Cry IV* فهو فعال ضد الحشرات التابعة لرتبة ثنائية الأجنحة *Diptera* - هذا بالإضافة الى أن مكونات كل نوع من البلورات بما تحتوى على بروتين سام ودرجة توافق تلك البروتينات مع الفتحات الموجودة على الشعيرات المبطنة للمعى الأوسط وكذلك درجة حموضة المعدة ودرجة نشاط انزيمات تحلل البروتين تلعب دورا فى فعالية سلالة ما من البكتريا على الحشرات المختلفة، وإنلك من الخطأ أن تستخدم سلالة فعالة ضد حشرات حرشفية الأجنحة ضد آفات المخازن من السوس التابع لرتبة غمدية



الأجنحة أو الأكاروس كما يحدث في بعض الدراسات التي تمت بواسطة غير المختصين حيث يكون التأثير في هذه الحالة راجع للاصناف الأخرى في المركب وليس للبكتريا. بالنسبة للفطريات لابد من دراسات موسعة لمعرفة درجة التخصص على الحشرات المختلفة وإن كانت ميكانيكية التأثير واحدة من خلال جدار الجسم حيث يتم الاختراق ثم الانتشار والتغذية والتكاثر على محتويات الحشرة الداخلية.

#### ٣. نوع المستحضر *Type of Formulation*

نوع المستحضر يلعب دورا أساسيا في درجة بقاءه فعلا تحت ظروف التخزين فالمركبات البكتيرية التي تكون في صورة مساحيق قابلة للبلل تكون فترة بقائها تحت ظروف التخزين أطول من تلك التي تكون في صورة سائلة سواء في صورة مائية أو زيتية حيث أن توفر الرطوبة يعمل على نشاط المسبب المرضي باستمرار وفي بعض الأحيان تكون الصورة التي يوجد عليها المسبب المرضي غير ممرضة للأفة كما حدث في مصر بالنسبة لأحد المستحضرات الفطرية والتي تحتوي على فطر *Beauveria Bassiana* حيث حقق هذا المركب خلال موسم ١٩٩٧ نتائج جيدة في مكافحة الذبابة البيضاء على محصول القطن حيث كان المنتج حديثا مما دعا الشركة المنتج إلى تجهيز كميات كبيرة لموسم ١٩٩٨ وخزنت لفترات تزيد على ٦ أشهر ولكنها عند التطبيق لم تعطى أى كفاءة على الذبابة البيضاء مما أفقد ثقة المزارع في المنتج، كما أنه يكون من الصعب تجهيز بعض المبيدات الحيوية في صورة مستحضرات تجارية كما هو الحال في حالة النيماتودا بالرغم من فعاليتها تحت الظروف المعملية، بالنسبة للأعداء الحيوية من الطفيليات والمفترسات بالرغم من العديد من النجاحات التي تحققت في مصر باستخدام الطفيليات والمفترسات إلا أن عملية انتاجها وتسويقها لا زالت تواجهها بعض المشكلات مثل انتاجها بكميات كبيرة وخاصة أنها تحتاج إلى تجهيزات مكلفة من مباني وبيئات لتربية عوائلها المفضلة وجهد لاقتناع المزارعين وأوقات معينة للإطلاق بما يتناسب مع عوائلها من الحشرات حتى يمكنها من البقاء تحت الظروف الحقلية.

#### ٤. قصر فترة بقاء المركب *Low Persistence*

من الخواص المميزة للكلنتات الميكروبية من البكتريا والفطريات والفيروسات أن مدة بقائها في الحقل قصيرة بالمقارنة بالمبيدات وهذا يقلل من أقبال المزارعين عليها مما يتطلب برفع الوعي لدى المزارع عن أن تأثير هذه المركبات تراكمي فبالرغم من أن نسبة كبيرة منها تفقد خلال فترة وجيزة بعد الرش إلا أن المتبقى من تلك الأفراد له القدرة على التكاثر في الوسط المعامل لو نتيجة إعادة انتشارها من الأفراد الحشرية

التي أصيبت بها وهذه الظاهرة تسمى بظاهرة الـ *Epizitotic* مما يساعد في أحداث عدوى مرة أخرى للحشرات. كما أن مكونات المبيد الحيوى المضافة للمستحضر تلعب دورا في طول مدة بقاءه وبخاصة المواد الواقية من الأشعة فوق بنفسجية والتي تلعب دورا هاما في موت تلك الكائنات.

#### ٥. المدى العوائل *Host range*

المدى العوائل لمعظم المركبات الحيوية يعتبر محدود بالمقارنة بالمبيدات مما يجعل عملية لمكافحة معقدة في بعض الأحيان وخاصة عند وجود أكثر من أفة للمحصول ويتطلب التدخل بالمبيدات لمكافحة تلك الآفات بخلاف المبيدات حيث اعتاد الزراع على استخدام مبيد واحد لمكافحة أكثر من أفة في نفس الوقت.

#### ٦. تكاليف الإنتاج في الدول النامية

يحتاج إنتاج المركبات الحيوية سواء التي تحتوى على كائنات ميكروبية أو تلك التي تعتمد على المركبات الحيوية الكيميائية الناتجة من تخمر الميكروبات الى تكنولوجيا عالية للفصل والتعريف للنواتج المختلفة والتجهيز وبالتالي فهي تعتبر مكلفة في الكثير من الدول النامية.

#### ٧. عدم وجود بروتوكولات مراقبة الجودة

عدم توفر البروتوكولات الخاصة بتقييم المركبات الحيوية مثل دراسة خواص البروتينات السامة في البكتريا أو نواتج تمثيل الفطريات أو تقدير جزيئات الفيروس وكذلك طرق أخذ العينات وكيفية حفظ المنتج النهائي وأسلوب الطرق في تقييم تلك المركبات معمليا وحقليا يجعل من الصعب تقارب النتائج المتحصل عليها في الأماكن المختلفة من محطات التقييم في المعامل والحقول.

#### المعوقات الاقتصادية

تتمثل المعوقات الاقتصادية في عدم اقبال شركات إنتاج المبيدات الكيماوية ورجال الأعمال على الاهتمام بإنتاج تلك المركبات لعدة أسباب أهمها تعود شركات إنتاج المبيدات على تسويق الاف الأطنان من المبيدات سواء للسوق المحلي أو للتصدير مما يحقق أرباح طائلة من تلك العملية في فترات قصيرة ، ولكن نظرا لأن المركبات الحيوية لا زالت تحتاج الى مجهود كبير والنجاحات، التي تحققت تعتبر ضئيلة بالنسبة للمبيدات ان معظم الشركات تعتبر الدخول في إنتاج تلك المركبات عملية خاسرة.

#### المعوقات الطبيعية:

الظروف البيئية تعتبر عوامل مؤثرة في نجاح استخدام تلك المركبات وخاصة التي تحتوى على كائنات حية من البكتريا والفطريات والفيروسات مما يستلزم دائما

البحث عن سلالات من البيئة المحلية تتحمل الظروف البيئية السائدة والتغلب على احتمالات ظهور صفة المقارنة لتلك المركبات مع تطوير صورة المنتج باستمرار حتى يمكن مقارنة الظروف البيئية العاكسة.

#### المعوقات المؤسسية:

عدم توفر الدعم المادى الكافى للتطوير المستمر فى مجال بحوث التكنولوجيا الحيوية وخاصة أن الدراسات فى هذا المجال تعتبر مكلفة.

المقترح التطويرى لاستخدام المكافحة الحيوية فى الحد من تلوث البيئة فى مصر:  
الخلفية : نظرا لأن المبيدات الميكروبية أصبحت حجر الزاوية فى برنامج المكافحة المتكاملة للأفات لما لعناصر المكافحة البيولوجية المختلفة من تخصص تجاه عوائلها الحشرية وعدم اضرارها بالحشرات النافعة قد دفع بجذب الاهتمام إليها ، حيث أن أنماط مختلفة منها استعملت لعدد من السنوات دونما ثمة تأثير بيئى غير مرغوب فيه ، وذلك بالرغم من تلك الحقيقة والكه الهائل من البحوث المتعلقة بهذا المجال لم تأخذ المبيدات الميكروبية طريقها المنشود الى السوق التجارى والذى يتناسب مع أهميتها وذلك بسبب قصر مدة بقائها تحت الظروف الحقلية وبطى تأثيرها على الآفات مما يجعل الكثير من الزراع أكثر خوفا من استخدامها مما يحتاج الى بذل المزيد من الجهود للحصول على أفضل النتائج من استخدام المكافحة البيولوجية فمن الضروري توفر برامج متنوعة متكاملة *integrated Diverse Programmes (IDP)* تعتمد على الأعداء الطبيعية والكائنات الميكروبية (بكتريا- فطريات- فيروسات) بجانب الجاذبات الجنسية ، ولتحقيق ذلك يلزم اتخاذ بعض الاجراءات التالية:

#### الاستراتيجية

يجب الأخذ فى الاعتبار أن استخدام الكائنات الميكروبية فى مجال مكافحة الآفات تعتبر أحد أنواع التكنولوجيا الموجهة والتي تعتمد على ضرورة توفر الانتاج فى نوقات محددة وبأفضل صورة حتى يفى بالغرض المستخدم من أجله وهذا يتطلب ما يلى:

1. الاهتمام بعلوم التكنولوجيا الحيوية *biotechnology* خاصة فى مجالات البروتين والتعديل الوراثى *genetic modification* حيث أن ذلك سوف يساعد فى معرفة الأنواع المختلفة من البروتينات السامة لكل سلالة بكتيرية وبالتالي درجة فعاليتها على الآفات المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار درجة حساسية الاطوار المختلفة للآفات وكذلك تأثير العائل النباتى الذى تتغذى عليه الحشرة على فعالية البكتريا، كما أن

التعديل الوراثي سوف يساعد في زيادة فعالية السلالات البكتيرية من خلال ادخال أكثر من جين وبالتالي تستطيع السلالة الواحدة أن تنتج أكثر من توكسين ذو فعالية على أكثر من آفة. وفي حالة الفيروسات يمكن تحسين مدة بقاء الفيروس تحت الظروف الحقلية مع زيادة فعاليتها من خلال ادخال بعض الجينات الوراثية من الكائنات الأخرى مثل الجينات المسؤولة عن افراز المواد السامة في العقرب أو النحل أو بعض أنواع الدبابير.

٢. تطوير البحوث العلمية في مجال الميكروبيولوجي من حيث البحث المستمر عن الكائنات الميكروبية (بكتريا- فطريات- الفيروسات) الممرضة للأفات على مستوى القطر الواحد وبالتالي عمل خريطة جغرافية لتلك المسببات حتى يمكن توفير المعلومات الأولية عن إمكانية نجاحها في كل منطقة طبقا للظروف المناخية السائدة والتي تختلف فيها الآفات الحشرية بناء على اختلاف العوامل المنتشرة بها. كما أن هذا الحصر الجغرافي للمسببات المرضية يمكن أن يساعد على معرفة الكائنات المنتشرة على مستوى الوطن العربي لمعرفة مدى إمكانية تبادلها واستخدامها في أكثر من دولة بالوطن العربي لمكافحة الآفات المتشابهة في تلك الدول.

٣. زيادة الميزات الخاصة بتطوير البحوث العلمية التطبيقية في مجال مكافحة الحيوية للأفات وتبنى المنظمة العربية للتنمية الزراعية فكرة انشاء رابطة العاملين في مجال مكافحة الأبيولوجية مما يمكنهم من التبادل المستمر للمعلومات والبحوث حتى يمكن توحيد طرق تسجيل وتداول ومراقبة الجودة للمركبات الحيوية حتى يمكن تجنب ما يستجد من مشكلات قد تنجم عنها على المدى البعيد مثل ظهور صفة مقاومة الآفات لتلك المركبات.

٤. ضرورة تعاون الباحثين في التخصصات المختلفة مثل مكافحة الآفات والحشرات والأمراض والميكروبيولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية لأن ذلك سوف يساعد في معرفة درجة تخصص المسببات المرضية وميكانيكية احداث الفعل السام لها على الحشرات وكذلك درجة تحملها للظروف البيئية المختلفة وبالتالي العمل على تحسين صورة المنتج التجارى بما يحقق أفضل النتائج على المستوى التطبيقى.

٥. تنشيط دور القطاع الخاص والاستثمار في عملية انتاج المركبات الحيوية بصورها المختلفة مثل انتاج بكتريا الباسيليس بما يخدم الدول العربية في ظل سياسة للتجارة الحرة وانشاء السوق العربية المشتركة.

الاهتمام بالتدريب المستمر للمهندسين لزيادة مفهوم مكافحة الحويية وكيفية العمل على انجاحها وظروف التطبيق الأمثل وربط ذلك بكلا من سلوك وبيولوجية الآفة.

سابعاً: دراسات عن التأثيرات الحويية والهيملتولوجية والجزيئية لبعض المبيدات

### الحويية على حيوانات التجارب

١. دراسة حويية كيمائية حويية وهيملتولوجية على تأثير السم الناتج من سلالة

#### *Bacillus species* على حيوانات التجارب

للطالبة/هاجر اسماعيل طالبة للحصول على درجة الماجستير في العلوم (كيمياء حويية زراعية) من كلية الزراعة جامعة القاهرة تحت اشراف أ. د. أحمد أبو العنين ، أ. د. مصطفى الهرلوى ، أ. د. مصطفى فراج. استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على التأثيرات السامة لإثنين من المبيدات الحويية وهما *B.thuringiensis var. egyptica* and *B.thuringiensis var. Kursta* على ذكور الفئران البيضاء الكبيرة حيث أختبرت ثلاث تركيزات هما:

وحدة تكوين  $1.2 \times 10^6$  ,  $2.4 \times 10^6$  and  $4.8 \times 10^6$  جرثومة/ حيوان تم تناول المبيد عن طريق الفم أخذت عينات الدم في مادة EDTA (إيثيلين داى إيمين تترأ أسيتيك أسيد) المانعة للتجلط وذلك للتعرف على صورة الدم فى اسبوع ١، ٢، ٣، ٤ من بداية المعاملة. كما تم الحصول على بلازما الدم بالطرد المركزي لعينات الدم المضاف اليها مادة الهبارين المانعة للتجلط. ويمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها فيما يلى:

#### (١) العلاقة بين المبيدات وصورة الدم:

أظهرت النتائج أن عدد كريات الدم الحمراء وتركيز الهيموجلوبين نقص بدرجة معنوية فى جميع الفئران المختبرة بينما لم يحدث تغير فى كل من متوسط حجم كرية الدم الحمراء ومتوسط الهيموجلوبين ولكرية الدم الحمراء ومتوسط تركيز الهيموجلوبين لكرية الدم الحمراء وأوضحت النتائج حدوث أنيميا للفئران المعاملة بالتركيز العالى والمتوسط من *B.thuringiensis var. egyptica* فى الاسبوع الأول والثانى ثم حدث استشفاء للفئران فى الاسبوع الثالث والرابع. بينما سبب التركيز المنخفض من نفس المبيد الأنيميا فى الاسبوع الثالث فقط. ومن ناحية أخرى. سبب التركيز العالى والمتوسط من مبيد *B.thuringiensis var. Kursaki*. أنيميا فى الاسبوع

الثانى من بدء المعاملة وفى حين أن التركيز المنخفض سبب أنيميا فى الاسبوع الأول والثانى من بدء المعاملة.

وبالمسة لعد كريات الدم البيضاء الليمفاوية حدث زيادة معنوية فى جميع الفئران المختبرة. بينما لم يحدث أى تغير معنوى فى عدد الخلايا المتعادلة والحمضية. وأيضاً لم تودى المعاملة بالمبيدات المختبرة الى تغير فى عدد خلايا الدم الحمراء الشبكية. ولكن أدت الى تكوين أجسام هيزر فى كريات الدم الحمراء للحيوانات المعاملة أثناء التجربة كما حدث تغير فى الهشاشة الاسموزية لكريات الدم الحمراء فى جميع الحيوانات المعاملة أثناء التجربة.

#### (٢) المبيدات والمعالير البيوكيميائية للحيوانات المختبرة:

أوضحت النتائج المتحصل عليها حدوث انخفاض معنوى فى نشاط انزيم الكرياتينين فوسفوكينيز وإنزيم الاليتينين أمينوترانسفيريز فى جميع الحيوانات المختبرة. كما حدث انخفاض معنوى فى تركيز البروتين والألبومين فى الدم وكذلك أيونات الصوديوم والبوتاسيوم.

#### (٣) الفصل الكهربى للبروتين:

أظهرت نتائج الفصل الكهربى للبروتين تغيرات بسيطة فى أماكن فصل البروتين نتيجة المعاملة بالمبيدات الحيوية.

#### (٤) الفحص الباثولوجى:

أولاً: فى الكبد

عند فحص الخلايا الكبدية للفئران المعاملة بالتركيز العالى من *B.thuringiensis var. egyptica* لمدة ٤ أسابيع لوحظ ظهور احتقان فى الوريد المركزى مع وجود فراغات فى سيتوبلازم بعض الخلايا الكبدية مقارنة بالمجموعة الضابطة كما وجد نشاط ملحوظ للخلايا الأكلة ذات القدرة الاتهامية (خلايا كوفر) فى حين أن التركيز المتوسط *B.thuringiensis var. egyptica* سبب ظهور مناطق بها فراغات فى سيتوبلازمية بالتبادل مع مناطق أخرى طبيعية فى نسيج الكبد. أما فى حالة المعاملة بالتركيز العالى من مبيد *B.huringiensis var. Kurstaki* لمدة ٤ أسابيع لوحظ ظهور تضخم فى خلايا الكبد مع اختفاء الجيوب الكبدية. وكان من الشائع فى هذه المعاملة ظهور انكماشات فى أنوية خلايا الكبد فى حين أن التركيز المتوسط من نفس المبيد أدى الى ظهور انتفاخ فى الخلايا الكبدية مقارنة بالمجموعة الضابطة مع نشاط ملحوظ للخلايا الأكلة ذات القدرة الاتهامية (خلايا كور).

## ثانياً: الطحال

عند فحص خلايا الطحال للفئران المعاملة بالتركيز العالي من *B.huringiensis* var. *egyptica* لمدة ٤ أسابيع لوحظ اضمحلال في الخلايا المكونة لكرات الدم مع زيادة سمك الطبقة المبطن للطحال مقارنة بالمجموعة الضابطة كما ظهرت نفس النتائج في الفئران المعاملة بالتركيز المتوسط بالمقارنة بالمجموعة الضابطة. أما في حالة المعاملة بالتركيز العالي من مبيد *B.thuringiensis* var. *Kurstaki* لمدة ٤ أسابيع لوحظ ظهور زيادة في سمك الشريان المغذي لخلايا الطحال في حين أن التركيز المتوسط من نفس المبيد أدى إلى زيادة في ترسيب مادة الهيموسيدرين.

## ثالثاً: المخ

أظهر الفحص الباثولوجي عدم حدوث تغييرات جوهريّة في خلايا المخ في جميع الحيوانات المختبرة بالمقارنة بالمجموعة الضابطة.

٢. دراسات جزئية على تأثير بعض المبيدات البيولوجية الطبيعية في حيوانات التجارب  
للطالبة فاطمة محمد همام محمد من قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة عين شمس تحت إشراف أ. د. عبد الحليم عبد الهادي مصطفى ، أ. د. محمد سيد سلامة ، د. نادية يوسف صادق مرقس ، د. الحسيني نجيب الخطيب عام ١٩٩٩.  
من دراسات تلوث البيئة ثبت أن معظم المبيدات الكيميائية المستخدمة في حماية المزروعات تضر بالبيئة بطريقة أو أخرى بما فيها الإنسان. ويأتي هذا الأثر السلبي نتيجة انتشار وانتقال هذه المبيدات إلى البيئة المحيطة وبعيها عنها أيضاً. وللدخول من هذه الآثار السلبية لجأ العلماء إلى استخراج واستخدام مبيدات من بعض الكائنات الحية وسميت بالمبيدات البيولوجية الطبيعية.

هدف هذه الدراسة هو تقييم السمية الوراثية لإثنين من المبيدات الحيوية حديثة الاستخدام في مجال مكافحة الآفات الزراعية في مصر وهما:

(١) أفيرميكتين (معتمد على فطر *Streptomyces avermiltis*)

(٢) دايل ٢٧ (معتمد على البكتريا *Bacillus thuringiensis* ssp. *Kurstaki*)

اشتملت الدراسة على ثلاثة أجزاء أساسية وهي:

١. قياس السمية الحادة لهذه المستحضرات (بتقدير الجرعة القاتلة النصفية للفئران البيضاء).

٢. دراسة فترة هذه المستحضرات في إحداث طفرات في كروموسومات ونوبيات خلايا نخاع العظم في حيوانات التجارب المستخدمة بعد تناولها جرعات مختلفة من المبيدين المختبرين في فترات تتراوح ما بين ١- ٢٨ يوم.
٣. تتبع الآثار السمية على الحامض النووي دى لوكسى ريبوز (DNA) في كبد فئران التجارب وذلك باستخدام الطرق الحديثة: تقايل البلمرة المتسلسل (RAPD-PCR). وأنزيمات القطع في اختبار تباين أطوال القطع العشوائى.

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أولاً: قياس السمية الحادة لذكور الفئران البيضاء:

١. تقدير الجرعة النصفية عن طريق الفم لمركب أفيرميكتين: أوضحت النتائج المتحصل عليها أن الجرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم لذكور الفئران البيضاء هي ٣٢,٥ ملجرام/ كيلوجرام من وزن الجسم (الكمية محسوبة على أساس نسبة المادة الفعالة في المستحضر).
٢. تقدير الجرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم لمستحضر (دايل ٢٢): أثبتت النتائج المتحصل عليها أن الجرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم لذكور الفئران البيضاء هي أكثر من ٥٠٠٠ ملجرام/ كيلو جرام من وزن الجسم.

ثانياً: تقييم القدرة الطفرية للمركبات المختبرة:

- استخدمت عدة مستويات للجرعة من مركب أفيرميكتين ( $1/5$  ،  $1/10$  ،  $1/20$ ) من الجرعة القاتلة النصفية ومن مركب دايل ٢٢ (٥٠٠٠ ، ٢٥٠٠ ، ١٠٠٠) ملجرام/ كيلو جرام كذلك تم التعريض عن طريق الفم وأخذ العينات بعد (١٧ و ١٤ و ٢٨ يوم). وأوضحت النتائج ما يلى:-

١. تسببت المعاملة بمركب أفيرميكتين في إحداث تأثيرات طفرية معنوية مقارنة بالمجموعة الضابطة حيث كانت هناك زيادة معنوية في تكرار تكوين النوبيات الصغيرة وكذلك زيادة نسبة التحورات الكروموسومية في نخاع عظام الفئران البيضاء في جميع المعاملات بصفة عامة. وتدرج الأثر السمي من ( $1/5$  إلى  $1/10$  إلى  $1/20$ ) في حين أنه وجد علاقة عكسية بين درجة السمية ومدة التجربة. وكانت معظم التحورات الكروموسومية تحورات تركيبية بينما كانت التحورات الكروموسومية العددية محدودة للغاية.



٢. تسببت المعاملة بمركب (دايل ٢x) في إحداث تأثيرات طفيفة معنوية من خلال زيادة تكرار الخلايا المحتوية على نويات صغيرة وأيضاً المحتوية على تحورات كروموسومية تركيبية. وتدرج الأثر السمي من ٥٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ إلى ١٠٠٠ في حين أنه وجدت علاقة عكسية بين درجة السمية ومدة التجربة. بينما لم تسجل أية تغيرات كروموسومية عددية.

#### ثالثاً: الدراسات الوراثية الجزيئية:

لقد استخدمت خلايا كبد الفئران المعالجة بالمبيدات المختبرة "أفيريكتين دايل ٢x" في الدراسات الجزيئية حيث تم استخلاص الـ (DNA) منها وإجراء التجارب الآتية:

- أ. البصمة الوراثية لجزئ DNA الناتجة عن تباين التضاعف العشوائي لـ DNA الخلايا باستخدام البادئات العشوائية مع تفاعل البلمرة المتسلسل (RAPD-PCR):

استخدمت طريقة التضخيم العشوائي لقطع DNA المتباين عن طريق جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل RAPD-PCR باستخدام سلسلة بادئات عشوائية لتقييم الطفرات الجينية الناتجة عن التعرض لهذه المبيدات محل الدراسة وكانت النتائج كالتالي:

١. كل البادئات سجلت اختلافات واضحة بين عينات DNA الخلايا للمجموعة الضابطة السلبية والعينات المعاملة لكل من المبيدين مما يشير إلى وجود تأثيرات على DNA الخلايا.

٢. سجل البادئ العشوائي OPA-1 أكثر من البادئات العشوائية الأخرى المستخدمة في الحيوانات المعاملة بمبيد أفيريكتين درجة عالية من الاختلافات مقارنة بالمجموعة الضابطة السلبية.

٣. البادئ العشوائي OPA-1 في المجموعة المعاملة بمبيد دايل ٢x كان له كفاءة عالية لتحديد الاختلافات في DNA خلايا الحيوانات المعاملة أكثر من البادئات الأخرى المستخدمة.

ب. تحليل تباين أطوال القطع العشوائي للـ DNA باستخدام أنزيمات القطع:

لقد تم قطع جزئ DNA لعينات خلايا كبد الفئران المعالجة بالمبيدات المختبرة (أفيريكتين ودايل ٢x) وكذلك عينات DNA في المجموعات الضابطة السلبية والتي لم تعامل بأي مادة باستخدام ٥ أنزيمات قاطعة وكانت نتائج القطع كالتالي:

١. DNA الخلايا في عينات كبد الفئران في المجموعة الضابطة السلبية قطعت بواسطة كا الأنزيمات المستخدمة المستخدمة الى منطقة واسعة تتكون من أحجام جزيئية مختلفة شغلت مساحة من الجيل تمتد من (٢٣-٠,٥) كيلو قاعدة وذلك مقارنة بـ DNA الخلية القياسية.
  ٢. DNA الخلايا من الفئران المعاملة بالمبيدين المختبرين أظهرت اختلافا واضحا عن نمط التقطيع في المجموعة الضابطة. أنزيمات القطع (*Xba I*, *EcoRI*) قطعت DNA الخلايا المعاملة بمبيد أفيرمكتين الى ٩ و ٥ قطع من الـ DNA مختلفة الحجم لها وزن جزيئي يتراوح من (٢,٥ - ٠,٤) كيلو قاعدة و (٩,٢ - ٠,١٢٢) كيلو قاعدة. بينما أنزيمات القطع المتبقية *Bam HI*, *Hind III*, *Xho I* قطعت DNA الخلايا المعاملة الى متوسط ٧ قطع يتراوح أحجامها الجزيئية من (١,٥ - ٠,١٤) كيلو قاعدة.
  ٣. DNA الخلايا في المجموعة المعاملة بمبيد داييل x٢ قطعت بواسطة أنزيمات القطع الخمسة المستخدمة الى متوسط ٩ قطع من الـ DNA لها وزن جزيئي يتراوح من (٢ - ٠,٦) كيلو قاعدة.
- مما سبق نستنتج أن:
١. الدراسة الجزيئية تشير الى إمكانية استعمال البادئ العشوائي *OPA-I* لمبيد أفيرمكتين والبادئ العشوائي *OPA-II* لمبيد الداييل x٢ كمحددات جزيئية لمعرفة التغير في DNA الخلايا نتيجة التعرض لهذه المبيدات.
  ٢. *RELAP* و *RAPD-PCR* تعتبر وسيلة جديدة لدراسة التغير في DNA الخلية.
  ٣. يمكن استخدام الطرق السيتوجينية والجزيئية المستخدمة في هذه الدراسة للتوصل الى نفس النتائج في تحديد مدى التأثير على DNA الخلايا.
  ٤. المبيدين الحيويين أفيرمكتين وداييل x٢ أحدثا طفرات مختلفة في كروموسومات ونويبات و DNA خلايا حيوانات التجارب المستعملة.
  ٥. نتائج هذا العمل تشير الى ضرورة تتبع الآثار السمية للمبيدات الحيوية باستخدام التقنيات الحديثة.

جدول (٦-٤): الأسماء التجارية وتحت الأنواع في بكتريا B.t. والأقلام المستهدفة والأصل

Subspecies	Target pest	Company country of origin
Kurstaki Astur (asporogenic)	Lepodoptera	Bushkovskaya et al 1994
Bacilan	Lepodoptera	Lonc et al 1986
Bactec bertan	Lepodoptera	Bactec corporation
Bactospeine 1	Lepodoptera	Abbott; Starnes et al 1993
Bactucide	Lepodoptera	Switzerland: Triggiani&
Baktur	Lepodoptera	sidor 1982
Bathurim	Lepodoptera	Scalco et al 1997
Bioasp (asporogenic)	Lepodoptera	Slovakia: Novotny&Svestka 1986
Biobit	Lepodoptera	India: satapathy&panada 1997
Biodart	Lepodoptera	Abbott; Starnes et al 1993
Biolep (sporogenous)	Various	ICI Canada: Bemier et al 1990
Biotrol2	Lepodoptera	India: satapathy&panada 1997
B.t. Turex	Lepodoptera	Bishop et al 1973
Condor	Lepodoptera	Spain: Cortes&Borrero 1998
CoStar	Lepodoptera	Ecogen: Starnes et al 1993
Crymax	Lepodoptera	Thermo trilogy: Shah&Goettel 1999
Cutlass	Lepodoptera	Ecogen: Shah&goettel 1999
Delfin	Lepodoptera	Ecogen: Starnes et al 1993
Dipel3	Lepodoptera	Thermo: Trilogy
Foray	Lepodoptera	Abbot: Shah&goettel 1999
Futura	Lepodoptera	Abbot: Shah&goettel 1999
Javelin	Lepodoptera	Abbot: Starnes et al 1993
lepidocide	Lepodoptera	Thermo trilogy: Shah&Goettel 1999
Lepinox	Lepodoptera	Goral et al 1984
Manaple	Lepodoptera	Ecogen: Shah&goettel 1999
Matich	Lepodoptera	Brazil, Cnv 1977
MVP4 (Cry 1 Ac)	Lepodoptera	Myeogen
MYX4 (Cry 1 Ab)	Lepodoptera	Myeogen Nyouki et al 1996
Novabac	Lepodoptera	Myeogen Nyouki et al 1996
Novosol	Lepodoptera	Randall et al 1979 Abbott

دراسات كيميائية حيوية وفسيولوجية على تأثير بعض المبيدات في حيوانات التجارب للطلبة هدى السيد أحمد فريد للحصول على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية الزراعية من كلية الزراعة جامعة المنوفية تحت إشراف أ.د. عبد الوهاب اسماعيل عيسى، أ.د. محمد عبد السلام حبيب، د. مامية محمود خليل.

إن إنتشار استخدام المبيدات في مكافحة الأقلام الزراعية منذ أربعينيات القرن الماضي أدى الي حدوث حالات تسمم في الإنسان والحيوانات نتيجة تلوث الغذاء وماء

الشرب الناتج من تراكم الآثار المتبقية من تلك المبيدات ونظرا لهذا الانتشار الواسع في استخدام المبيدات في العقود الماضية ولما تسببه من تلوث البيئة والغذاء والماء والأضرار الصحية للجسيمة على الإنسان والحيوان - فقد اتجهت الجهود البحثية الى استنباط مبيدات من أصل حيوي بدلا من المبيدات الكيميائية كذلك الى استخدام برامج مكافحة متكاملة لهذه الافات نظرا لأن اغلب المبيدات المستخدمة ليس لها تخصص واضح، لذا فانها تسبب الكثير من حالات التسمم للكائنات الأخرى الغير مستهدفة والتي منها الانسان وبعض صور الحياة البرية الأخرى. ونتيجة للتعرض للحطى أو المزمّن لهذه المبيدات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإنها تسبب تأثير بالغ الأهمية في ذكور تلك الكائنات الحية غير المستهدفة.

مما هو جدير بالذكر، أنه ثبت مؤخرا أن الخطورة ليست فقط في التعرض للتركيزات العالية للمبيدات والتي يكون تأثيرها واضحا ويمكن إتخاذ الاجراءات اللازمة لها، ولكن المشكلة أكثر تعقيدا حيث أن المركبات التي قد تحدث بعض التأثيرات الضارة بالتركيزات العالية تظهر أضرارا بالغة الخطورة نتيجة لتراكم التركيزات المنخفضة منها والتي يتعرض لها الانسان والحيوان في المنتجات الزراعية ومياه الشرب. نظرا لعدم توفر معلومات كافية عن احتمالات التأثيرات الضارة لتلك المبيدات وبخاصة المبيدات الحيوية والتي منها مبيد الأبامكتين (الفيرمك) الذي لم تتوفر عنه معلومات كافية من حيث أضراره المحتملة على البيئة وصحة الانسان، فقد أجريت هذه الدراسة فلقاء الضوء على تأثير مركب الأبامكتين على التغيرات الكيميائية والفسيولوجية والهستوباثولوجية في حيوانات التجارب (الفئران البيضاء).

قد قسمت الدراسة الحالية الى قسمين رئيسيين هما كالآتي:

- ١- دراسة السمية الغمية الحادة (الجرعة النصفية المميتة) على الفئران البيضاء: أوضحت النتائج أن الجرعة النصفية المميتة ( $LD_{50}$ ) لمبيد الأبامكتين على ذكور الفئران البيضاء كان ٤٠ ملجم/كجم من وزن الجسم.
- ٢- دراسة السمية تحت المزمّنة *Subchronic toxicity* على ذكور الفئران البيضاء: في هذا الجزء من البحث تم دراسة تأثير المركب المختبر على وظائف الكبد والكل والغدة الدرقية ومعدل استهلاك الغذاء ومعدل الزيادة في وزن الجسم ووزن بعض الأعضاء الداخلية وكذلك الخصوية في الذكور. قد عوملت ذكور الفئران البيضاء بمركب الأبامكتين في مياه الشرب لمدة ٩٠ يوم بثلاثة تركيزات ١,٥، ٣، ٦ جزء في المليون، ثم رفع المركب وتركت الحيوانات للإستشفاء (فترة الإسترجاع) لمدة ٣٠ يوم.

يمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها فيما يلي:

أولاً: الدراسات الكيميائية الحيوية:

١- تأثير المبيد على وظائف الكبد:

تم دراسة القياسات الكيميائية الحيوية التي تستخدم كمؤشرات على التغيرات في وظائف الكبد - ويمكن تلخيص نتائجها كما يلي:

١- حدوث نقص معنوي في نشاط انزيم الأئين أمينو ترانسفيريز (ALT) ونشاط

انزيم اسبارتيت أمينو ترانسفيريز (AST) بدرجات مختلفة.

٢- زيادة معنوية في تركيز الجلوكوز وبدرجات متباعدة.

٣- تذبذب في مستوى البروتين الكلى.

٤- عدم حدوث أى تغيرات معنوية في مستوى الألبومين.

٥- أدى توقف المعاملة وسحب المبيد في مياه الشرب الى اعادة (استرجاع) القيم

الى معدلها الطبيعى بعد فترة الاستشفاء (٣٠ يوم) فيما عدا استمرار ارتفاع قيم

كلا من الجلوكوز والبروتين الكلى.

تأثير المبيد على وظائف الكلى:

استخدمت دراسة القياسات الكيميائية التالية كمؤشرات لوظائف الكلى

وأوضحت النتائج ما يلي:

١- عدم حدوث أى تغيرات معنوية في مستوى اليوريا.

٢- حدوث زيادة معنوية في مستوى الكرياتينين.

٣- استمرار ارتفاع مستوى الكرياتينين أثناء فترة الاستشفاء.

٢- وظائف الغدة الدرقية:

استخدمت المعايير الكيميائية التالية للدلالة على تأثير المبيد على وظائف الغدة الدرقية.

١- زيادة تركيز هرمون الثيروكسين ( $T_4$ ) معنويا.

٢- نقص هرمون التراى ايودوثيرونين ( $T_3$ ) معنويا.

ثانياً: الدراسات الفسيولوجية:

١- أدى استخدام المبيد الى حدوث نقص في كلا من معدل استهلاك الغذاء ومعدل

زيادة وزن الفئران المعاملة كما أن اوزان الأعضاء الداخلية لم تتأثر.

٢- تأثير المبيد على الخصوبة.

أ. عدم تأثر وزن كلا من البروستاتا والحوصلات المنوية بينما حدث انخفاض في وزن الخصى. ثم زال التأثير على وزن الخصى بعد توقف المعاملة.

ب. أدت المعاملة اليومية لذكور الفئران البيضاء لمدة ٩٠ يوم بمركب الأباكتين الى نقص واضح في كفاءتها على الخصوبة وذلك بعد أن قلت نسبة الحمل في الاناث الغير معاملة بعد تزواجها بالذكور التي عوملت بالمركب. وايضا نقص عدد الحيوانات المنوية وكذلك نقص حيويتها وحركتها. وكذلك حدوث زيادة في هرمون التستوسترون.  
ج. بعد توقف المعاملة زالت التأثيرات السابقة على كلا من خصوبة الذكور وعدد وحيوية الحيوانات المنوية.

### ثالثا: الدراسات الهستوباثولوجية:

أظهرت الفحوصات الهستوباثولوجية لكبد وكلى والغدة الدرقية وخصى الفئران المعاملة بالتغيرات التالية:  
١- بالنسبة للكبد:

- أ- حدوث احتقان للأوردة الرئيسية مع وجود ارتشاحات لخلايا الدم الحمراء.
- ب- حدوث تنكس دهني في سيتوبلازم الخلايا.
- ج- موت موضعي في الخلايا مع ظهور ارتشاحات للخلايا الالتهابية.
- د- ظهور بعض الخلايا الالتهابية المحيطة بالقنوات الصفراوية المتكسدة في المنطقة البابية مع وجود زيادة في عدد خلايا كوفر.

### ٢- بالنسبة للكلى:

- أ- حدوث ارتشاحات لخلايا الدم الحمراء واحتقان الأوعية الدموية في منطقة اتصال القشرة بالنخاع.
- ب- احتقان الكبيبة (glomerular) والأوعية الدموية مع ظهور ارتشاحات لخلايا الدم الحمراء في منطقة القشرة.
- ج- احتقان الشعيرات الدموية مع ظهور ارتشاحات لخلايا الدم الحمراء بين الأنابيب المتوصلة في منطقة النخاع.

### ٣- بالنسبة للغدة الدرقية:

أ- إرتشاحات لخلايا الدم الحمراء بين وداخل تجويف الحويصلات مصاحب لذلك حدوث تنكس وسقوط للخلايا الطلائية المبطنة للحويصلات داخل تجويف الحويصلات.

ب- ظهور بعض الخلايا الالتهابية في تجويف الحويصلات.

ج- تليف وضمور بعض الحويصلات وتحوصل البعض الآخر.

٤- بالنسبة للخصية:

انخفاض في نشاط الأنبيبات المنوية مصاحب لذلك عدم اتمام عملية تكوين الحيوانات المنوية.

وجدير بالذكر هنا أن نتائج الفحوص الهستوباثولوجية أكدت اتجاهات نتائج الدراسات الكيميائية والفسيولوجية في إحداث أضرار صحية متباعدة حسب التركيز المستخدم.

## المصطلحات

[A]

A sexual reproduction	التكاثر اللاجنسي
Above ground competition	المنافسة فوق الأرض
Absorption barriers	حواجز الامتصاص
Abutilon theophrasti	حشيشة القطيفة
Additive	إضافي
Age spectrum	طيف أو مدى العمر
Agroecosystem	النظام البيئي الزراعي
Alien substance	مادة دخيلة
Alien weed	حشيشة دخيلة
Allelopathy	الاليلوباثية
Allopatric and sympatric speciation	التنوع الجغرافية والمعلية
Alternating temperature	درجات الحرارة البديلة
Amaranthaceae	فصيلة عرف الديك
Amphoteric	امفوتيرية
Angiosperms	مغطاه البذور
Annedation	تكامل استخدام المصادر
Annual weed	الحشائش الحولية
Anomalous	غير سوي
Antagonism	تنشيطي
Anticipating characteristic	الخصائص المتوقعة (المشتركة)
Antidote	ترياق
Antidrift agents	مواد مقاومة للانجراف
Antifoam agents	مواد مائعة للرغوة
Antifungi	مضاد للفطريات
Antimicrobial	مضاد للبكتيريا
Antioxidant	مضادات التأكسد
Apical dominance effect	تأثير السيادة القمية
Aquatic weeds	الحشائش المائية
Arid	قاحلة



## [B]

Banding	التحزيم
Below ground competition	المنافسة تحت الأرض
Biennials	الحشائش ثنائية الحول
Binomial names	التقسيم العلمي
Biochemical make up	البنية البيوكيميائية
Bioherbicide	مبيد حشائش حيوي
Broad cast coverall	تغطية شاملة
Broad leaf	عريضة الأوراق
Broadcast	النثر
Buckling	التواء
Burn-down	يحرق

## [C]

Calmination	الذروة
Canopy	المجموع الخضري
Chronological	للتطور الزمني
Coalitive	انماجي
Coleoptile	غمد
Colloids	غرويات
Cometabolism	التمثيل المرافق
Community	المجتمع
Community yield	النتاج المشترك
Compatibility	التوافق
Competitiveness	التنافسية
Constant associates	ملازمات ثابتة
Creeping	الحشائش المعمرة الزاحفة
Crop residues	مخلفات المحصول
Crop-monoculture	زراعة المحصول الواحد

## [D]

Decision models	نماذج اتخاذ القرار
Decomposition	الانهيار

Degradation	انهيار
Desiccation	التجفيف
Detoxification	فقد السمية
Dicationic	ثنائي الكاتيون
Dicotyledon	ثنائية الفلقات
Diffusion	انتشار
Directed spray	الرش الموجه
Dominants	الساكنات
Dormancy	السكون
Dry flowable DF	التدفقات الجافة

### [E]

Ecological perspective	المنظور الايكولوجي
Ecological succession	التتابعات البيئية
Economic threshold	الحد الحرج الاقتصادي
Ecosystem	النظام البيئي
Ecotypes	الطراز الايكولوجية
Edge effects	تأثير الحافة
Effects of correlative inhibition	تأثيرات التثبيط المرتبط
Emulsifiers	مواد مستحلبة
Emulsifiable concentrate	مركز قابل للاستحلاب
Encapsulated	كبسولات
Enforced dormancy	السكون المدفوع
Environmental heterogeneity	عدم التجانس البيئي
Enzyme catalyst	محفز الأنزيم
Equidistant pattern	نظام الزراعة على مسافات متساوية
Exotic	خارجي
Exudation	النضج

### [F]

Food reserves	مخزون الغذاء
Formulations	المستحضرات

### [G]

Gemnosperms	عاريات البذور
Genetically controlled	السيطرة الوراثية
Germination	إنبات
Gradient	نظام تدرج
Growth regulating substances	تأثير المواد المنظمة للنمو
Guard cells	الخلايا الحارسة

## [H]

Herbigation	الري الكيميائي بمبيد الحشائش
Hierarchy of biosystems	التسلسل الهرمي للنظم الحيوية
Hierarchy of the plant kingdom	التسلسل الهرمي للمملكة النباتية
Hill reaction	تفاعل هيل
Hook stage	مرحلة الخطاف
Hyperidization	التهجن

## [I]

Incidental metabolism	التمثيل العرضي
Incursion	العزو
Independent	مستقل
Indigenous	داخلي
Induced dormancy	السكون المحفز
Inherent	أصلي
Inherent variability of weeds	الاختلافات الوراثية في الحشائش
Innate dormancy	السكون المتأصل أو الفطري
Inoculative	تطعيم
Intercropping	التحصيل المحصولي
Invert emulsions	المستحلب المعكوس

## [L]

Leaching	الغسيل
Lignified	ملاجننة
Limiting factors	العوامل المحددة
Longevity	الدوام

## [M]

Mass exposure	الإغراق
Maturity	البوغ - النضج
Mesophytic weeds	حشائش المراعي الطبيعية
Microflora & microfauna	الأحياء الدقيقة في التربة
Monocyledoneae	وحيد الفلقة
Monoculture	زراعة أحادية الصنف
Morphology	الشكل الظاهري
Mycoherbicides	مبيدات الحشائش الفطرية

## [N]

Native	متوطن
Nutrition	التغذية

## [O]

Off shoots	خلفات
One-sided interaction	تداخل أحادي الجانب
Orientation	التوجيه
Oxidation	أكسدة

## [P]

Parasitic weeds	حشائش متطفلة
Parenchyma	الخلايا البارانشيمية
Penetration	نفاذية
Perennials	المعمرات
Periodicity	الوقتيّة - الدورية
Phloem	اللحاء
Photodecomposition	التحلل الضوئي
Photosynthate	مواد البناء الضوئي
Photosystem	نظام الضوء
Phytotoxins	السموم النباتية
Pioneer stage	مرحلة الريادة
Pits	نقر
Placement selectivity	الاختيارية الموضعية
Ploidy relationships	العلاقات الكروموسومية في التكاثر
Polarity	القطبية
Populations	المجاميع الحية

Postemergence	بعد الانبثاق
Precociousness	النضج المبكر
Preemergence	قبل الانبثاق
Preplanting	قبل الزراعة
Pubescence	الشيوخوخة

## [R]

Range land weeds	حشائش المراعي الطبيعية
Recirculation	إعادة تدوير
Recipient	المستقبل
Reduced persistence	الثبات المنخفض
Reduction	اختزال
Relative freedom from pests	الخلو النسبي من الآفات
Replacement designs	التصميمات الاحلالية
Restoration	تجديد
Retention	المسك
Role of apomixes	دورة للتكاثر اللاجنسي
Rosettes	المجموع الزهري

## [S]

Safners	مؤمنات
Screening	التفرقة
Seed bank	بنك البذور
Seed killers	مواد قاتلة للبذور
Seed treatment	معاملة البذور
Selectivity	اختيارية
Self fertilization	الإخصاب الذاتي
Semi-arid	شبه قاحلة
Shoot dominance effect	تأثير سيادة الساق
Sieve cells	خلايا المنخل
Simulation	محاكاة
Simultaneously	في نفس الوقت
Soil amendfements	مصلحات التربة
Solubility	ذوبانية

Sorption coefficient	معامل الامتصاص
Spermatophytina	نباتات تنتج البذور
Spreaders	مواد ناشرة
Spyders	جرافات
Staircase	الترتيب السلمي
Standard specifications	مواصفات قياسية
Stomata	ثغور
Stress	الإجهاد
Surfactants	مواد ذات نشاط سطحي
Survival vs. competition	البقاء في مقابل المنافسة
Sustainable agriculture	الزراعة المستدامة
Synchronization	التزامن
Synergism	التنشيط
Systemic	جهازى

## [T]

Taproot	جذر وتدي
Terrestrial weeds	الحشائش الأرضية
Tillage	العزيق
Tolerant	متحمل
Tracheids	قصبيات
Trailing weeds	الحشائش المدادة
Translocation	الانتقال

## [U]

Units of measurements	وحدات القياس
Upward	لأعلى

## [V]

Vessels	لوعية
Viable propagules	أجزاء التكاثر الحية
Volatilization	التطاير

## [W]

Waste land weeds	حشائش الأرض المهجورة
------------------	----------------------

Water dispersible granules (WDG)	المحببات القابلة للانتشار والتعلق في الماء
Water dispersible liquids	السوائل القابلة للانتشار في الماء
Weed density	كثافة الحشائش
Weed killers	مواد قاتلة للحشائش
Weed management	السيطرة على الحشائش
Weed suppressants	خافضات تعداد الحشائش
Weed's ecological niche	المكان الايكولوجي الملائم للحشائش
Weed's Eye view	الرؤية العينية للحشائش
Weediness	العشبية
Wetling agents	مواد مساعدة على البلل
Wettable powders (WP)	مساحيق قابلة للبلل

[X]

Xylem

الخشب

## المراجع العربية

- ١٩٩٥ الأفات الحشرية والحيوانية الناقلة لمسببات الأمراض المستوطنة
- ١٩٩٥ وقاية الثنيات والأمن الغذائي
- ١٩٩٥ السمية البيئية والتفاعلات الحيوية والكيميائية والبيئية
- ١٩٩٩ التسمم الغذائي والملوثات الكيماوية
- ١٩٩٩ أساسيات وطرق تحليل مبيدات الأفات
- ١٩٩٩ انقلاب الجنس وفقد المناعة بين المبيدات والمهرمونات
- ١٩٩٩ مكافحة المستتيرة للأمراض النباتية بين الحاضر والمستقبل
- ٢٠٠٠ موم الإنسان والبيئة (المبيدات/الديوكسينات/الدخان الأسود/التليفون المحمول)
- ٢٠٠٠ فساد الأرض وتدمير الإنسان (المبيدات/المخدرات/الأدوية/الهندسة الوراثية)
- ٢٠٠٠ المبيدات الفطرية ومكافحة الأمراض النباتية
- ٢٠٠٠ ترشيد المبيدات في مكافحة الأفات
- ٢٠٠٠ المولود المائية والانساخ بالمبيدات
- ٢٠٠٢ مخاطر المبيدات علي الصحة العامة والبيئة (بين الترميم والإدارة)
- ٢٠٠٢ التكنولوجيا الحيوية والجزيئية في مجابهة الأفات الزراعية والاجهات البيئية
- ٢٠٠٢ السموم النباتية ومكافحة الأفات
- ٢٠٠٣ نسخ وتقليد المبيدات
- ٢٠٠٣ وبائية التعرض المزمن للمبيدات بين الصحة العامة والبيئة
- ٢٠٠٣ مستحضرات وتطبيقات المبيدات بين القديم والحديث
- ٢٠٠٣ بكتيريا باسيليس ثورينجيسيز رائدة المبيدات الحيوية
- ٢٠٠٤ الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات نخيل التمر
- ٢٠٠٤ تخليق وتصنيع المبيدات ج٢
- ٢٠٠٤ الجانبات الجنسية "الفورمونات"
- ٢٠٠٥ الإدارة المتكاملة في مكافحة الأعشاب "الحشائش" الضارة
- ٢٠٠٥ مقاومة الأفات لفعل المبيدات (المشكلة والحلول)

← جميع المراجع السابقة للأستاذ الدكتور/ زيدان هندي عبد الحميد  
أستاذ كيمياء المبيدات والسموم — كلية الزراعة جامعة عين شمس



- ١٩٩٥ الاتجاهات الحديثة للمبيدات ومكافحة الحشرات ٢ ج  
/ د. زيدان هندي - / د. محمد عبد المجيد
- ١٩٩٦ إنتاج القطن ونظم السيطرة المتكاملة علي الآفات  
/ د. زيدان هندي وآخرون
- ١٩٩٦ الملوثات الكيميائية والبيئية  
/ د. زيدان هندي - / د. محمد عبد المجيد - / د. محمد فوزي الشعراوي







## أ.د. فidan هني عبد الحميد

- بكالوريوس العلوم الزراعية "حشرات" كلية الزراعة جامعة عين شمس ١٩٦٣.
- ماجستير العلوم الزراعية "كيمياء مبيدات" كلية الزراعة جامعة عين شمس ١٩٦٦.
- دكتوراه فلسفة العلوم الزراعية جامعة "مبيدات الآفات" كلية الزراعة جامعة عين شمس ١٩٦٩.
- مدرس في علوم وقاية النبات ١٩٦٩ - ١٩٧٤ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
- أستاذ مساعد في علوم وقاية النبات ١٩٧٤ - ١٩٧٩ بكلية زراعية جامعة عين شمس.
- أستاذ في علوم وقاية النبات ١٩٧٩ وحتى الآن بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
- وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا ١٩٩٢ - ١٩٩٨.
- رئيسشار علمي لشركة سويمتومو كيميكل اليابانية للمبيدات منذ ١٩٧٨ وحتى الآن في مصر والدول العربية.
- المشاركة في معظم المؤتمرات المحلية والعالمية في مجالات وقاية النبات - كيمياء المبيدات - مكافحة المتكاملة للآفات - المشاكل الخاصة بالتلوث البيئي.
- المشاركة في العديد من الندوات الخاصة بالتوعية بمخاطر المبيدات والملوثات البيئية الأخرى في مصر والدول العربية الأخرى.
- المشاركة في المؤتمرات في المؤتمرات القومية الخاصة بالمكافحة المستتيرة للآفات والتلوث البيئي والمكافحة الحيوية للآفات.
- عضو في العديد من الجمعيات في مجالات وقاية النبات والبيولوجية الجزيئية وكيمياء المبيدات والتوكسينولوجي والمبيدات والتلوث البيئي.

## بعض مما نشره أ.د. فidan هني

- ١ ( الاتجاهات الحديثة المبيدات ومكافحة الحشرات ٢ ج.
- ٢ ( الآفات الحشرية والحيوانية .
- ٣ ( الملوثات الكيميائية والبيئية
- ٤ ( التسمم الغذائي والملوثات الكيميائية .
- ٥ ( أساسيات وطرق تحليل مبيدات الآفات .
- ٦ ( انقلاب الجنس وفقد المناعة بين المبيدات والهرمونات .
- ٧ ( السمية البيئية والتفاعلات الحيوية للكيمائيات والمبيدات .
- ٨ ( مكافحة المستتيرة للأمراض النباتية .
- ٩ ( فساد الأرض وتدمير الإنسان .
- ١٠ ( هجوم الإنسان والبيئة .
- ١١ ( الأمراض الفطرية ومكافحة الأمراض النباتية .
- ١٢ ( الموارد المائية والالتصاخ بالمبيدات .
- ١٣ ( ترشيد المبيدات في مكافحة الآفات .
- ١٤ ( التكنولوجيا الحيوية والجزيئية في مجابهة الآفات الزراعية والجهود البيئية
- ١٥ ( مخاطر المبيدات على الصحة العامة والبيئة .
- ١٦ ( السموم النباتية ومكافحة الآفات .
- ١٧ ( نسخ وتقليد المبيدات
- ١٨ ( وبائية التعرض المزمن لمبيدات بين الصحة العامة والبيئة
- ١٩ ( مستحضرات وتطبيقات المبيدات بين القديم والحديث
- ٢٠ ( يكتيريا باسيليس وريتجنيسيز وأداة المبيدات الحيوية
- ٢١ ( الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات نخيل التمر
- ٢٢ ( تخليق وتصنيع المبيدات ٢ ج
- ٢٣ ( الجاذبات الجنسية "الزومونات"
- ٢٤ ( الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية
- ٢٥ ( مقاومة الآفات لفعل المبيدات ( المشكلة وحلول )
- ٢٦ ( الأمان التنسي للمبيدات الميكروبية والحيوية
- ٢٧ ( إدارة التعامل مع التسمم والمبيدات
- ٢٨ ( التأثيرات الصحية والبيئية
- للمبيدات والغازات في حرب الخليج
- ٢٩ ( المرشد في مكافحة آفات المنازل والصحة العامة

